

الباب السابع

القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

Eigen values and eigen vectors

تعريف (١.٧): إذا كان $T: V \rightarrow V$ تحويل خطي من الفراغ V إلى نفسه فإنه يسمى مؤثر خطي Linear Operator.

نفرض أن T مؤثر خطي على الفراغ الاتجاهي V ، $0 \neq X \in V$ يقال أن X متجه ذاتي eigen vector للمؤثر T إذا وجد العدد $\lambda \in \mathbb{R}$ بحيث يكون $TX = \lambda X$ ويقال للعنصر λ أنه قيمة ذاتية eigen value للمؤثر T .

نظرية (١.٧): مجموعة المتجهات الذاتية المناظرة لقيمة ذاتية λ بالإضافة إلى المتجه الصفري تكون فراغ اتجاهي جزئي من V .

البرهان: نفرض أن مجموعة المتجهات الذاتية المناظرة للقيمة

الذاتية λ هي V_λ ومعها المتجه الصفري. ونفرض أن $X, Y \in V_\lambda$ ، إذن

$$TX = \lambda X, TY = \lambda Y$$

$$T(\alpha X) = \alpha TX = \alpha \lambda X = \lambda (\alpha X)$$

إذن $\alpha X \in V_\lambda$ ، لكل $\alpha \in \mathbb{R}$

كذلك

$$T(X+Y) = TX + TY = \lambda X + \lambda Y$$

$$= \lambda (X+Y)$$

إذن $X+Y \in V_\lambda$ وحيث أن $V_\lambda \subset V$. إذن V_λ فراغ جزئي من V .

ولأهمية القيم الذاتية والمتجهات الذاتية في الحياة العملية نقوم

بعرضها بالتفصيل، أي كيفية حسابها ودراسة خواصها.

تعريف (٢.٧): المتجه $X \neq 0$ يسمى بالمتجه المميز للمصفوفة A إذا وجد العدد λ بحيث يكون :

$$A X = \lambda X \quad (1)$$

ويسمى λ بالقيمة المميزة للمصفوفة A المناظر للمتجه $X \neq 0$.

وعلى القارئ أن يتذكر أن المتجه X يمكن أن يكتب في الصورة

$$X = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^t$$

حيث x_1, x_2, \dots, x_n تسمى بمركبات المتجه. ومعنى أن $X \neq 0$ هو أنه يوجد $x_i \neq 0$ لبعض قيم $i=1, 2, \dots, n$.

ملاحظة (١): على القارئ أن يلاحظ أنه لا يوجد متجه مميز X للمصفوفة A يكون مناظراً لقيمتين مميزتين ولتوضيح ذلك نفرض أنه توجد قيمتين مميزتين λ_1, λ_2 وتناظران المتجه المميز X للمصفوفة A أي أن :

$$A X = \lambda_1 X, A X = \lambda_2 X, \lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \lambda_1 X = \lambda_2 X$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) X = 0 \Rightarrow X = 0 \quad (\text{وهذا مستحيل})$$

$$\text{لأن } (\lambda_1 - \lambda_2) X \neq 0 \Rightarrow \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ أي أن } \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0, X \neq 0$$

ملاحظة (٢): قد يكون هناك قيمة مميز واحدة λ بحيث تناظر أكثر من متجه مميز لأنه إذا كانت X متجه مميز فإن $k X$ يكون أيضاً متجهاً

مناظراً لنفس القيمة λ وذلك يمكن استنتاجه من المعادلة

$$A X = \lambda X, \therefore A k X = \lambda k X$$

وهذا يوضح أن $k X$ يكون أيضا متجها مميزا مناظرا لنفس القيمة المميزة λ .

المعادلة المميزة : Characteristic equation

من المعادلة (1) نعلم أن: $A X = \lambda X = \lambda I_n X$. وبفرض أن $A = [a_{ij}]$ مصفوفة من رتبة $n \times n$ ، I_n هي مصفوفة الوحدة فإننا نحصل على :

$$(A - \lambda I_n) X = 0$$

أو على الصورة :

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

ونلاحظ أن النظام (2) عبارة عن مجموعة من المعادلات المتجانسة ونعلم أن النظام (2) له حل غير الحل الصفري إذا كان وكان فقط.

$$\text{Det}(A - \lambda I_n) = \text{Det} \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad (3)$$

ويجب ملاحظة أن مفكوك المحدد (3) هو دالة في λ أي كثيرة حدود في

λ من درجة n وبوضع

$$f(\lambda) = \text{Det}(A - \lambda I_n)$$

نحصل على

$$f(\lambda) = \text{Det}(A - \lambda I_n) = \text{Det} \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad (4)$$

أي أن :

$$f(\lambda) = |A - \lambda I_n| = \lambda^n + C_1 \lambda^{n-1} + \dots + C_n \lambda + C_n \quad (5)$$

حيث C_1, C_2, \dots, C_n تكون كل منها كثيرة حدود في العناصر a_{ij} .
نعتبر المعادلة :

$$f(\lambda) = |A - \lambda I_n| = 0 \quad (6)$$

وهذه المعادلة من الدرجة n في λ وتسمى بالمعادلة المميزة للمصفوفة A وتسمى $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ بالجذور المميزة (latent root) characteristic roots للمصفوفة وهي المناظرة للمتجهات المميزة (الجذور الكامنة).
نظرية (٢.٧) (نظرية كيلي هاملتون) : كل مصفوفة مربعة A تحقق معادلتها الذاتية.

أي أن :

$$A^n + C_1 A^{n-1} + C_2 A^{n-2} + \dots + C_{n-1} A + C_n I_n = 0$$

البرهان: نفرض أن B هي المصفوفة المترافقة للمصفوفة $(A - \lambda I_n)$ فتكون عناصرها كثيرات حدود من الدرجة $(n-1)$ أو أقل ومعاملات λ في كثيرات الحدود هذه كل منها كثيرة حدود في العناصر a_{ij} ولذلك يمكن كتابة

$$B = B_0 + \lambda B_1 + \lambda^2 B_2 + \dots + \lambda^{n-1} B_{n-1} \quad (7)$$

حيث $B_0, B_1, B_2, \dots, B_{n-1}$ كل منها مصفوفة مربعة من رتبة $(n-1)$ وعناصرها كثيرات حدود في a_{ij} .

$$(A - \lambda I_n) \frac{B}{|A - \lambda I_n|} = I \quad \text{: نعتبر المعادلة :}$$

وباستخدام (5)، (7) تصبح هذه المعادلة على الصورة :

$$(A - \lambda I_n)(B_0 + \lambda B_1 + \dots + \lambda^{n-1} B_{n-1}) = (\lambda^n + C_1 \lambda^{n-1} + \dots + C_{n-1} \lambda + C_n) I_n$$

وبمساواة معاملات λ في هذه المتطابقة نحصل على :

$$A B_0 = C_0 I_n \quad \text{: الحد المطلق}$$

$$-B_0 + A B_1 = C_{n-1} I_n \quad \text{: معامل } \lambda$$

$$\dots \dots \dots \quad \text{: } \dots \dots \dots$$

$$-B_{n-2} + A B_{n-1} = C_1 I_n \quad \text{: معامل } \lambda^{n-1}$$

$$-B_{n-1} = I_n \quad \text{: معامل } \lambda^n$$

وبضرب هذه المعادلات في $A^n, A^{n-1}, \dots, A^2, A, I$ على الترتيب والجمع نحصل على :

$$A^n + C_1 A^{n-1} + C_2 A^{n-2} + \dots + C_{n-1} A + C_n I_n = 0$$

وهو المطلوب إثباته.

ملاحظة (٣): من أهم استخدامات نظرية كيلي هاملتون حساب معكوس مصفوفة مربعة غير شاذة.

نفرض أن لدينا مصفوفة A مربعة غير شاذة ومن نظرية كيلي هاملتون نحصل على :

$$A^n + C_1 A^{n-1} + C_2 A^{n-2} + \dots + C_{n-1} A + C_n I_n = 0$$

وبضرب طرفي المعادلة في A^{-1} يمكن الحصول على :

$$\therefore A^{-1} = -\frac{1}{C_n} (A^{n-1} + C_1 A^{n-2} + \dots + C_{n-1} I_n)$$

$$\text{حيث } \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = -C_1, \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = (-1)^n C_n \neq 0$$

كيفية تعيين القيم الذاتية والمتجهات الذاتية المميزة لمصفوفة مربعة A نفرض أن λ هي إحدى القيم المميزة، X هو المتجه المميز

$$A X = \lambda X = \lambda I_n X \quad \text{المناظر لها فإن :}$$

وبفرض أن المصفوفة A من الرتبة $n \times n$ إذن

$$(A - \lambda I_n) X = 0 \quad (8)$$

وبالعكس إذا كان λ هو أحد جذور المعادلة (8) فإن المعادلة المصفوفية :

$$(A - \lambda I_n) X = 0$$

بالضرورة لابد أن يكون لها حل غير صفري X يحقق العلاقة :

$$A X = \lambda X$$

وهذا يعني أن أي جذر من جذور المعادلة المميزة (8) هو أيضاً قيمة مميزة للمصفوفة A .

نظرية (٣.٨): المصفوفة الصفريية قيمها الذاتية منعدمة.

البرهان: نفرض أن

$$A = 0 \Rightarrow |0 - \lambda I_n| = 0 \Rightarrow \lambda^n = 0, \lambda_i = 0, \forall 1, 2, 3, \dots, n$$

نظرية (٤.٧): القيم الذاتية لمصفوفة الوحدة متساوية وتساوي الواحد الصحيح.

البرهان: نفرض أن

$$A = I_n \Rightarrow |I_n - \lambda I_n| = 0 \Rightarrow (1 - \lambda)^n I_n = 0 \Rightarrow \lambda_i = 1, \forall 1, 2, 3, \dots, n$$

نظرية (٥.٧): المصفوفة القطرية $D = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ لها :

$$\lambda_i = a_i, \forall i = 1, 2, \dots, n$$

نظرية (٦.٧): المصفوفة A تكون شاذة إذا كان وكان فقط إحدى قيمها الذاتية يساوي صفرا.

البرهان: من نظرية المعادلات نجد أن حاصل ضرب الجذور المميزة يساوي $C_n (-1)^n$ ، $C_n = \text{Det}(A)$ فإذا كان أحد الجذور يساوي صفر فإن $C_n = 0$ أي أن $\text{Det}(A) = 0$ وبالتالي تكون A مصفوفة شاذة.

نظرية (٧.٧): المصفوفتان A, A^T لهما نفس القيم الذاتية.

$$\text{البرهان: نعلم أن } |A| = |A^T| \Rightarrow |(A^T - \lambda I_n)^t| = |A - \lambda I_n|$$

أي أن المصفوفتين A, A^T لهما نفس المعادلة المميزة وهذا يؤدي بدوره إلى أن لهما نفس القيم الذاتية.

نظرية (٨.٧): إذا كانت λ هي قيمة ذاتية للمصفوفة A فإن $\frac{1}{\lambda}$ هي قيمة ذاتية للمصفوفة A^{-1} .

نظرية (٩.٧): المتجهات الذاتية المناظرة لقيم ذاتية مختلفة تكون مستقلة خطياً.

البرهان: نفرض أن $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ($\lambda_i \neq \lambda_j$) هي القيم الذاتية للمصفوفة A وأن X_1, X_2, \dots, X_n هي المتجهات الذاتية المناظرة للقيم الذاتية على الترتيب.

∴ لجميع قيم i نحصل على :

$$\left. \begin{array}{l} A X_i = \lambda_i X_i \\ A^2 X_i = \lambda_i^2 X_i \\ A^3 X_i = \lambda_i^3 X_i \\ \dots\dots\dots \\ A^n X_i = \lambda_i^n X_i \end{array} \right\}, \forall i=1, \dots, n \quad (*)$$

ونفرض أن هناك علاقة بين هذه المتجهات على الصورة :

$$C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_n X_n = 0 \quad (9)$$

وبضرب العلاقة (9) من اليسار في A, A^2, \dots, A^{n-1} على الترتيب

واستخدام (*) نحصل على :

$$C_1 \lambda_1 X_1 + C_2 \lambda_2 X_2 + C_3 \lambda_3 X_3 + \dots + C_n \lambda_n X_n = 0 \quad (10)$$

$$C_1 \lambda_1^2 X_1 + C_2 \lambda_2^2 X_2 + C_3 \lambda_3^2 X_3 + \dots + C_n \lambda_n^2 X_n = 0 \quad (11)$$

⋮

$$C_1 \lambda_1^{n-1} X_1 + C_2 \lambda_2^{n-1} X_2 + C_3 \lambda_3^{n-1} X_3 + \dots + C_n \lambda_n^{n-1} X_n = 0 \quad (12)$$

والمعادلات (12) - (9) يمكن كتابتها على الصورة المصفوفية :

$$[C_1 X_1, C_2 X_2, C_3 X_3, \dots, C_n X_n] \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^{n-1} \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} = 0$$

أو $C\Psi = 0$ حيث $\text{Det } \Psi = \prod_{1 \leq q < p \leq n} (\lambda_p - \lambda_q) \neq 0$

$\text{Det } \Psi$ يسمى محدد فاندرموند وبالتالي تكون المصفوفة Ψ ($\lambda_i \neq \lambda_j$) غير شاذة وبالتالي $C = 0$ وهذا لا يحدث إلا إذا كلن : $C_i = 0, \forall i$ ، أي المتجهات X_1, X_2, \dots, X_n مستقلة خطياً (أي لا توجد علاقة بينهما).
عكس هذه النظرية غير صحيح والمثال على ذلك مصفوفة الوحدة I_n هي مصفوفة قطرية وجنورها المميزة تساوي الواحد ومكررة n من المرات في نفس الوقت المتجهات الذاتية مستقلة خطياً.

مثال (١): أوجد المعادلة المميزة للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

وأثبت أن هذه المصفوفة تحقق معادلتها الذاتية ومن ثم أوجد A^{-1} .

الحل: $A - \lambda I_3 = \begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{bmatrix}$

∴ المعادلة المميزة هي : $f(\lambda) = |A - \lambda I_3|$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda + 4 = 0 \quad (1)$$

ولإثبات أن المصفوفة A تحقق معادلتها الذاتية نبرهن أن :

$$-A^3 + 6A^2 - 9A + 4I = 0 \quad (2)$$

وبحسابات بسيطة يمكن حساب A^2, A^3 على الصورة

$$A^2 = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 22 & -21 & 21 \\ -21 & 22 & -21 \\ 21 & -21 & 22 \end{bmatrix}$$

وبالتعويض عن A, A^2, A^3, I في (2) نجد أنها محققة.

ولإيجاد معكوس المصفوفة A^{-1} نجد من (2) (بضرب المعادلة (2)

في A^{-1}) أن

$$A^{-1} = \frac{1}{4}A^2 - \frac{3}{2}A + \frac{9}{4}I_3 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

أي يكون :

مثال (٢): أوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

الحل: المعادلة الذاتية هي :

$$|A - \lambda I_3| = \text{Det} \begin{bmatrix} 8-\lambda & -6 & 2 \\ -6 & 7-\lambda & -4 \\ 2 & -4 & 3-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\therefore -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 45\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda-3)(\lambda-15) = 0$$

\therefore القيم الذاتية للمصفوفة A هي : $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 15$

ولنفرض أن x, y, z هي مركبات المتجه المميز X أي أن :

$$[x \ y \ z]^t$$

عندما يكون $\lambda_1 = 0$ يكون $(A - 0I_3) = 0$ فنحصل على :

$$\begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

أي يكون :

$$\left. \begin{aligned} 8x - 6y + 2z &= 0 \\ -6x + 7y - 4z &= 0 \\ 2x - 4y + 3z &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

وهذه المعادلات متجانسة في المجاهيل x, y, z وكما سبق رأينا أن لهذه المعادلات حلاً غير صفري إذا كان $\text{rank}(A) < n$ حيث n عدد المجاهيل أي تكون مرتبة المصفوفة A هي 2 أو $r = 1$ أي أن هذه المعادلات لها عدد لانهائي من الحلول ويمكن في هذه الحالة إعطاء قيم اختيارية لعدد $n-r$ من المتغيرات x, y, z بالنسبة للنظام (3) .

بإجراء العمليات الأولية على صفوفه نجد أن $r=2$ ولذلك نفرض أن المتغيرات بقيمة اختيارية k وليكن z مثلاً ثم نحل باقي المعادلات بدلالة z .
(بضرب المعادلة الأولى في 2 والجمع على المعادلة الثانية)

$$\therefore 10x - 5y = 0 \Rightarrow 2x = y$$

وبالتعويض من المعادلة الأخيرة في (3) نحصل على :

$$-3x + 3z = 0 \Rightarrow x = z$$

وبوضع $z = k$ (عدد ثابت لا يساوي صفر).

$$\therefore \text{حلول المعادلات (3) هي : } x = \frac{1}{2}k, y = k, z = k$$

أي يوجد عدد لانهائي من الحلول غير الصفرية لمجموعة المعادلات (3)

وبأخذ $k=2$ مثلاً نحصل على : $x = 1, y = 2, z = 2$

أي أن المتجه المناظر للقيمة $\lambda_1 = 0$ هو : $X_1 = [1 \ 2 \ 3]^t$

وبالطبع إذا أخذنا أي قيمة للثابت k فإننا نحصل على المتجه المميز kX

أي له نفس اتجاه المتجه X ولكن يختلف في الطول وكما رأينا سابقاً إذا

كان X متجه مميز للقيمة λ فإن kX يكون متجهاً مميزاً آخر مناظراً

لنفس القيمة λ .

عندما $\lambda_2 = 3$ يكون المتجه المناظر هو متجه X الذي يحقق المعادلة :

$$(A - 3I_3)X = 0$$

وبنفس الطريقة السابقة نحصل على المتجه الذي له المركبات :

$$X_2 = [2 \ 1 \ -1]^t$$

وبالمثل عندما $\lambda_3 = 15$ نحصل على المتجه المميز :

$$X_3 = [2 \ -2 \ 1]^t$$

وعلى ذلك فإن المتجهات المميزة المقابلة للقيم المميزة
 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 15$ هي المتجهات التي لها المركبات الآتية حسب
 الترتيب :

$$X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, X_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

يمكنك التأكد من أن هذه المتجهات مستقلة خطياً.

المصفوفة $P = (X_1 \ X_2 \ X_3)$ تحقق أن :

$$P^{-1} A P = \text{diag} (0, 3, 15)$$

أي أن المصفوفة P هي مصفوفة التغير من الأساس القديم $\{e_1, e_2, e_3\}$
 إلى الأساس الجديد $\{X_1, X_2, X_3\}$ المكون من المتجهات الذاتية.
 ومن هذا المثال يمكن صياغة النتيجة الآتية :

نتيجة (١): إذا كانت A مصفوفة مربعة $n \times n$ وكانت كثيرة الحدود
 المميزة لها n من الجذور المختلفة فإن A تشابه مصفوفة قطرية عناصر
 قطرها الأساسي هي الجذور المميزة.

مثال (٣): أثبت أن المصفوفة A تماثل مصفوفة قطرية B ثم أوجد

المصفوفة B التي تحقق العلاقة $B = P^{-1} A P$

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{bmatrix} \quad \text{حيث}$$

الحل: المعادلة المميزة تعطى بالآتي :

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 7-\lambda & -12 & 6 \\ 10 & -19-\lambda & 10 \\ 12 & -24 & 13-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 (\lambda+1) = 0$$

إذن الجذور المميزة هي :

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$$

لإيجاد المتجهات الذاتية (المميزة) $(A - \lambda I)X^t = 0$

في حالة $\lambda = 1$ (جذر مكرر): بالتعويض عن $\lambda = 1$ في النظام

$$(A - \lambda I)X = 0$$

نحصل على :

$$6x_1 - 12x_2 + 6x_3 = 0$$

$$10x_1 - 20x_2 + 10x_3 = 0$$

$$12x_1 - 24x_2 + 12x_3 = 0$$

واضح أن المعادلات الثلاث هي معادلة واحدة مكررة

$$\therefore x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

أو

$$x_1 = 2x_2 - x_3$$

بوضع $x_3 = -1, x_2 = 0$ نحصل على المتجه الذاتي :

$$A_1 = (1, 0, -1)$$

بوضع $x_3 = 0, x_2 = 1$ نحصل على المتجه الذاتي :

$$A_2 = (2, 1, 0)$$

واضح أن A_1, A_2 مستقلين خطياً حيث أن حلول مجموعة المعادلات

السابقة تكون فراغاً اتجاهياً بعده 2.

بالمثل في حالة $\lambda = -1$ نحصل على نظام المعادلات الخطية :

$$8x_1 - 12x_2 + 6x_3 = 0$$

$$10x_1 - 18x_2 + 10x_3 = 0$$

$$12x_1 - 24x_2 + 14x_3 = 0$$

أو

$$4x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0$$

$$5x_1 - 9x_2 + 5x_3 = 0$$

$$6x_1 - 12x_2 + 7x_3 = 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 4 & -6 & 3 \\ 5 & -9 & 5 \\ 6 & -12 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 5 & -9 & 5 \\ 6 & -12 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

أو

$$\therefore 5x_1 - 9x_2 + 5x_3 = 0$$

$$6x_1 - 12x_2 + 7x_3 = 0$$

واضح أن فراغ حلول هذه المعادلات بعده الوحدة.

بوضع $x_3 = t$ نحصل على :

$$\left. \begin{array}{l} \therefore 5x_1 - 9x_2 = -5t \\ 6x_1 - 12x_2 = -7t \end{array} \right\}$$

وبضرب المعادلة الثانية في $\frac{5}{6}$ نحصل على

$$\left. \begin{array}{l} \therefore 5x_1 - 9x_2 = -5t \\ 5x_1 - 10x_2 = \frac{-35t}{6} \end{array} \right\}$$

وبالطرح نحصل على :

$$x_2 = \frac{35}{6}t - 5t$$

بوضع $t = 6$ ومن المعادلة الثانية يكون

$$x_2 = 35 - 30 = 5$$

$$x_1 = 10 - 7 = 3$$

المصفوفة القطرية التي تماثل A تكون على الصورة :

$$\text{diag}(1, 1, -1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

وبكتابة المتجهات A_1, A_2, A_3 كمتجهات أعمدة في المصفوفة P وبنفس

الترتيب نحصل على :

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

ومنها نتحقق من أن :

$$P^{-1} A P = \text{diag}(1, 1, -1)$$

مثال (٤): هل المصفوفة A تشابه مصفوفة قطرية ؟ حيث

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

الحل: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ إذن $|A - \lambda I| = -(\lambda + 1)^3$

أي أن كثيرة الحدود المميزة لها جذر مكرر ثلاث مرات.

المعادلة $(A - \lambda I_3)X' = 0$ تعطي

$$\left. \begin{array}{l} 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_1 - x_3 = 0 \end{array} \right\} , \lambda = -1$$

واضح أن رتبة مصفوفة المعاملات، لهذه المعادلات هي الواحد (المعادلات الثلاث عبارة عن معادلة واحدة هي $x_1 + x_3 = 0$) لذلك فإن متجهات الحلول تكون فراغاً خطياً بعده الوحدة وليكن أساس هذا الفراغ هو المتجه $A=(1,1,-1)$ (بفرض أن x_2 اختياري) وحيث أن الجذور الثلاثة متساوية وجميعها تناظر متجهاً واحداً ذاتياً فإن المصفوفة A لا تشابه مصفوفة قطرية.

تمارين (٧)

(١) أوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للتحويلات الممثلة بالمصفوفات

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

(٢) وضح أن المصفوفات الآتية تشابه مصفوفة قطرية

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 4 & 5 & -4 \\ 6 & 4 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 7 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{bmatrix}$$

(٣) أوجد القيم المميزة والمتجهات المميزة للمصفوفات الآتية

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \quad (ii) \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (iv) \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 10 & 5 \\ -2 & -3 & -4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(vi) \quad F = \begin{bmatrix} 8 & -3 & -6 & -6 \\ 4 & -1 & -4 & -4 \\ 3 & -5 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -4 & -4 \end{bmatrix} \quad (v) \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

(٤) أوجد المعادلة المميزة للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ وأثبت أن هذه

المصفوفة تحقق معادلتها الذاتية ومن ثم أوجد معكوسها.

(٥) أوجد قيم a, b التي تجعل للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 5 & a & 3 \\ 1 & 4 & b \\ 8 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ متجه ذاتي ثم

احسب القيم والمتجهات الذاتية الأخرى.

(٦) أوجد شرط أن يكون للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b \\ 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ قيمة ذاتية مساوية

للوحد الصحيح.

(٧) أوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفة A التي تحقق

$$6 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} + 18 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{bmatrix} + 6I_3 = 0$$

حيث I_3 مصفوفة الوحدة.

(٨) برهن أنه إذا كانت A, B مصفوفتين مربعيتين من درجة $n \times n$ وكانت A غير شاذة فإن المصفوفات $A^{-1}B, BA^{-1}$ لهما نفس القيم الذاتية.

(٩) برهن أن المصفوفات $A^{-1}BA, B$ لهما نفس القيم المميزة.

(١٠) بين أي من المصفوفات الآتية تشابه مصفوفة قطرية

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$