

بعد وتتنوع أسعة لسمس بتجاس على جميع النباتات، التى تلف بانتظام على الحبوب هد ولا تعلم نبات الفصول

المحصول

يتراوح محصول الفاصوليا الخضراء، - فى البيوت المحمية - فى مختلف الدول العربية بين ٣٥ و ١٢ كجم للمتر المربع (كما فى البحرين)، بمتوسط قدره ٦٧ كجم/م^٢. ويتدر متوسط الإنتاج فى مصر بحو ٦ ٤ كجم/م^٢ (المنظمة العربية للتنمية 'الرعاة ١٩٩٥.

الامراض والأفات ومكافحتها

نصاب 'العصوب - فى لرراعات المحمية - بعديد من الأمراض، من أهمها ما يلى

المسبب	المرض
	أولا الأنراض الفطرية
<i>Macrophomina phaseoli</i>	العفن المحمى
<i>Rhizoctonia solani</i> & <i>Sclerotium rolfsii</i>	تساقط البادرات
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>phaseoli</i>	الاصفرار لفيورى
<i>Erysiphe polygoni</i>	البياض الدقيقى
<i>Rhizoctonia solani</i>	عمر أو تقرح لساق الرايركتوسى
<i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>phaseoli</i>	عمر الحدور فيورى
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	مرض اسكليروتيسيا
<i>Uromyces phaseoli</i> var. <i>typica</i>	الحدا
<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	الأشراكبور
<i>Botrytis cinerea</i>	العفن الرمادى
	ثانيا الأمراض البكتيرية
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>	الثلحة الهائية
<i>Xanthomonas campstris</i> pv. <i>phaseoli</i>	الثلحة العادية