

تأثير الهجرة إلى العشيرة فى توازن هاردي - فينبرج

تؤثر الهجرة migration إلى العشيرة على حالة التوازن الذى تصل إليه الأليلات فى العشيرة بعد تحسينها ، ويتوقف مدى هذا التأثير على معدل الهجرة ، وعلى الفرق بين نسبة الأليل فى الأفراد المهاجرة والأفراد الأصلية .

فلو فرض أن كانت نسبة الأفراد المهاجرة إلى عشيرة كبيرة فى الحجم فى m ونسبة الأفراد الأصلية $(1-m)$ ، وأن نسبة أليل ما فى q_m بين الأفراد المهاجرة ، و q_0 بين الأفراد الأصلية ، فإن نسبة الأليل فى العشيرة المختلطة (q_1) تصبح كما يلى :

$$q_1 = mq_m + (1-m)q_0$$
$$= m(q_m - q_0) + q_0$$

ويصبح التغير فى نسبة الأليل (Δq) بعد جيل واحد من الهجرة كما يلى :

$$\Delta q = q_1 - q_0$$
$$= m(q_m - q_0)$$

الانتخاب فى الصفات الكمية

يتوقف مدى التقدم الذى يمكن إحرازه عند الانتخاب للصفات الكمية على العوامل التالية :

- ١- مدى توفر الاختلافات الوراثية .
- ٢- درجة توريث الصفة .
- ٣- شدة الانتخاب للصفة .

ويعبر عن التقدم الوراثى فى كل بورة من دورات الانتخاب (G_c) بالمعادلة التالية :

$$G_c = h^2 D$$

حيث تمثل :

h^2 : درجة التوريث على النطاق الضيق .

D : الفارق الانتخابى Selection Differential ، وهو الفرق بين متوسط الأفراد

المنتخبة من العشيرة والمتوسط العام للعشيرة في الصفة المنتخبة .

ويحسب التقدم الوراثي السنوي (G_y) بقسمة التقدم الوراثي لكل دورة انتخاب على عدد السنوات التي تستغرقها كل دورة (y) كما يلي :

$$G_y = \frac{G_c}{y}$$

ويمكن التعبير عن الفارق الانتخابي (D) كما يلي :

$$D = k\sqrt{V_{Ph}}$$

حيث تمثل :

k : شدة الانتخاب Selection Intensity ، وهي الفارق الانتخابي معبراً عنه بوحدات قياسية .

V_{Ph} : تباين الشكل المظهري .

ويمكن - بالتالي - إعادة صياغة معادلة التقدم الوراثي لكل دورة من دورات الانتخاب ، لتصبح كما يلي :

$$G_c = h^2 D = \frac{V_A}{V_{Ph}} k\sqrt{V_{Ph}} = \frac{k V_A}{\sqrt{V_{Ph}}}$$

حيث يمثل V_A التباين الإضافي .

ويشتمل تباين الشكل المظهري V_{Ph} على الخطأ التجريبي (V_e) ، وتباين التفاعل بين التركيب الوراثي والبيئة (V_{ge}) ، وتباين التركيب الوراثي (V_g) .

ويمكن - بالتالي - تمثيل الجذر التربيعي لتباين الشكل المظهري بالمعادلة التالية :

$$\sqrt{V_{Ph}} = \sqrt{\frac{V_e}{rt} + \frac{V_{ge}}{t} + V_g}$$

حيث تمثل r عدد المكررات ، و t عدداً البيئات التي أختبرت فيها التراكيب الوراثية . ويعنى بالتراكيب الوراثية النباتات المفردة ، أو أنسالها . وتمثل البيئة بالمواقع والسنوات التي أجريت فيها الاختبارات .

ويمكن تقسيم الخطأ التجريبي إلى مكونين ، هما : التباين بين النباتات بكل وحدة تجريبية (V_w) ، والتباين من وحدة تجريبية لأخرى (V) كما يلي :

$$V_e = \frac{V_w}{n} V$$

حيث تمثل n عدد النباتات في كل وحدة تجريبية .

ويتضمن التباين بين النباتات - في كل وحدة تجريبية - الاختلافات التي تعود إلى تأثير البيئة ، وتلك التي ترجع إلى الاختلافات الوراثية بين النباتات . وتشتمل التأثيرات البيئية على الاختلافات في خصوبة التربة ، والرطوبة الأرضية ، وأي عامل آخر ، يمكن أن يسبب اختلافات مظهرية بين النباتات المتماثلة في تركيبها الوراثي . أما الاختلافات الوراثية بين الأفراد في الوحدة التجريبية الواحدة .. فترجع إلى الانعزالات الوراثية التي تظهر في نسل السلالة أو العائلة المختبرة . ويمكن - من ثم - تقسيم التباين بين النباتات داخل الوحدة التجريبية (V_w) إلى تباين بينى (V_u) ، وتباين وراثي (V_{wg}) كما يلي :

$$V_w = V_u + V_{wg}$$

وعليه .. فإنه يمكن إعادة صياغة معادلة التقدم الوراثي السنوي (G_y) لتصبح كما يلي :

$$\begin{aligned} G_y &= \frac{kV_A}{yV_{Ph}} \\ &= \frac{kV_A}{y \sqrt{(V_e / rt) + (V_{ge} / t) + V_g}} \\ &= \frac{kV_A}{y \sqrt{\{[(V_w / n) + V] / rt\} + (V_{ge} / t) + V_g}} \\ &= \frac{kV_A}{y \sqrt{\{([V_u + V_{wg}) / n] + V\} / rt) + (V_{ge} / t) + V_g}} \end{aligned}$$

أما التقدم الوراثى الذى يحدث فى كل دورة من دورات الانتخاب (Gc) .. فإنه يتوقف على طريقة التربية المتبعة ، والتي تتوقف فاعلية الانتخاب فى كل منها على مدى الاستفادة من التأثير الإضافى للجين . وبينما تناسب الطرق الآتى بيانها النباتات الخلطية التلقيح - وهى التى يحدث فيها التزاوج عشوائيا - فإنها يمكن أن تستعمل مع النباتات الذاتية التلقيح ، إذا ما أجرى لها تلقيح عشوائى صناعى فيما بينها . ويتأثر مقدار التباين الإضافى بمدى التحكم الواقع فى اختيار الآباء المستعملة فى إنتاج الأجيال التالية . وتعرف العلاقة بين النبات أو البذرة المستعملة فى التعرف على التراكيب الوراثية المتفوقة (وحدة الانتخاب) ، وبين النبات أو البذرة المستعملة لدراسة الانعزال (وحدة الانعزال) باسم تحكم الآباء Parent Control ، وهو الذى يرمز له بالرمز (c) ، ويعطى القيم التالية :

١- تأخذ c القيمة ٠,٥ . عندما تكون وحدة الانتخاب ماثلة لوحدة الانعزال ، وحينما لاتنتخب سوى الأمهات ! وهو ما يحدث -مثلاً- حينما تُلقح نباتات الأمهات المنتخبة بنباتات آباء منتخبة وغير منتخبة -على حد سواء- مثلما فى طريقة التربية بالانتخاب المتكرر للشكل المظهري ، وطريقة الكوز للخط عندما يجرى الانتخاب بعد التلقيح .

٢- تأخذ c القيمة ١,٠ ، حينما تكون وحدة الانتخاب ماثلة لوحدة الانعزال ، مع انتخاب كل من الأمهات والآباء ، مثلما فى طريقة التربية بالانتخاب المتكرر للشكل المظهري قبل التلقيح ، وطريقة تلقيح النباتات المنتخبة بصنف اختبارى (half-sib family) ، حينما تستعمل البذور المتبقية من التلقيحات (بعد تقييم التلقيحات) ، وطريقة الانتخاب فى نسل النباتات المنتخبة بعد تلقيحها مع بعضها البعض (full-sib family) ، وكذلك فى حالات التلقيح الذاتى للنباتات المنتخبة .

٣- تأخذ c القيمة ٢,٠ ، حينما لاتكون وحدتا الانتخاب والانعزال متماثلتين ! كما فى الحال فى حالات : تلقيح النباتات المنتخبة بصنف اختبارى ، حينما تستعمل البذور الناتجة من التلقيح الذاتى أو السلالات الخضرية للنباتات المنتخبة ؛ من أجل الحصول على الانعزالات ؛ حيث تكون وحدة الانتخاب فى بذور أنصاف الأقارب half-sib ، بينما تكون وحدات الانعزال هى البذور الناتجة من التلقيح الذاتى أو السلالات الخضرية للتراكيب الوراثية المنتخبة .

وفيما يلي .. بيان بالمعادلات المستعملة في حساب التقدم المتوقع في كل نورة من دورات الانتخاب (G_0) ، عند اتباع كل من الطرق التي سبق بيانها :

التقدم المتوقع في كل نورة انتخاب (G_0)	الطريقة
$\sqrt{\frac{kcV_A}{(V_u + V + V_{AE} + V_{DE} + V_A + V_D)}}$	الانتخاب المتكرر للشكل المظهري بدون استعمال تحت وحدات تجريبية (subplots)
$\sqrt{\frac{kcV_A}{(V_u + V_{AE} + V_{DE} + V_A + V_D)}}$	الانتخاب المتكرر للشكل المظهري مع استعمال تحت وحدات تجريبية
$\sqrt{\frac{kc \frac{1}{4} V_A}{\frac{V_e}{rt} + \frac{1}{4} \frac{V_{AE}}{t} + \frac{1}{4} V_A}}$	طريقة الكوز للخط المحورة
$\sqrt{\frac{kc \frac{1}{4} V_A}{\frac{V_e}{rt} + \frac{1}{4} \frac{V_{AE}}{t} + \frac{1}{4} V_A}}$	انصاف الأقارب (Half - Sib)
$\sqrt{\frac{kc \frac{1}{2} V_A}{\frac{V_e}{rt} + \frac{(\frac{1}{2} V_{AE} + \frac{1}{4} V_{DE})}{t} + \frac{1}{2} V_A + \frac{1}{4} V_D}}$	الأقارب التامة (Full - Sib)
$\sqrt{\frac{kc V_A'}{\frac{V_e}{rt} + \frac{(V_{AE}' + \frac{1}{4} V_{DE})}{t} + V_A' + \frac{1}{4} V_D}}$	التلقيحات الذاتية

تستخدم المعادلات السابقة في التنبؤ بالتقدم المتوقع في كل دورة انتخاب لمقارنة مدى كفاءة مختلف طرق التربية ، قبل بدء برنامج الانتخاب ، وذلك حتى يمكن اختيار أكثرها كفاءة . ويعطى Fehr (١٩٨٧) مثلاً مفصلاً لحالة قارن فيها التقدم السنوي المتوقع للانتخاب عند اتباع أى من سبع طرق للتربية ، وعند اختلاف عدد العروات الممكنة من ١-٢ عروات سنوياً . وتقدر مختلف القيم في المعادلات السابقة كما يلي :

١- تباين الشكل المظهرى والتباين الوراثى بمكوناته المختلفة :

يراجع لذلك الفصل الرابع .

٢- شدة الانتخاب :

تُعرف شدة الانتخاب selection intensity بأنها النسبة المئوية لعدد السلالات المنتخبة إلى عدد السلالات المختبرة ، ويعبر عنها في المعادلات بوحدات قياسية ، وهى التى يرمز لها بالرمز k . ويشرح Falconer (١٩٨١) كيفية حساب " k " وهى تقل بزيادة نسبة التراكيب الوراثية المنتخبة إلى التراكيب المختبرة كما يلي :

k	النسبة المئوية للتراكيب الوراثية المنتخبة إلى المختبرة
٢,٦٤	١
٢,٤٢	٢
٢,٠٦	٥
١,٧٥	١٠
١,٥٥	١٥
١,٤٠	٢٠

٣- قيمة تحكم الآباء c (أو Parent Control) :

تتوقف هذه القيمة على العلاقة بين وحدة الانتخاب ووحدة الانعزال ، وتأخذ إحدى ثلاث قيم هى : ٠,٠٠ ، ١,٠٠ ، و ٢,٠٠ فى حالات طرق التربية المختلفة ، كما سبق بيانه .

يتوقف عدد سنوات كل دورة انتخاب على طريقة التربية المتبعة ، وعدد العروات التي يمكن زراعتها من المحصول في كل عام . يكون الرقم صحيحاً إن لم يكن بالإمكان زراعة أكثر من عروة واحدة سنوياً ، بينما قد يحتوى الرقم على كسور في غير ذلك من الحالات . هذا .. وتتطلب كل دورة انتخاب عروة زراعية واحدة في طرق : الانتخاب المتكرر للشكل المظهري عند اختيار أحد الأبوين أو كليهما قبل الإزهار ، وطريقة الكوز للخط عند انتخاب أحد الآباء فقط ؛ بينما تتطلب كل دورة انتخاب عروتين زراعتين في طرق : الانتخاب المتكرر للشكل المظهري عند تلقيح الآباء المنتخبة ذاتياً قبل تلقيحها معاً ، وطريقة الكوز للخط عند انتخاب كلا الأبوين ، وعند اتباع طريقة التلقيح بين النباتات المنتخبة (full - sib) ، وكذلك عند تلقيح النباتات المنتخبة بصنف اختباري (half - sib families) ، حينما تستعمل البذور المتبقية من التلقيحات . ويزيد عدد العروات الزراعية اللازمة في كل دورة انتخاب إلى ثلاث عروات ، حينما يجرى التلقيح بين أنسال النباتات المنتخبة الملقحة ذاتياً ، وإلى أربع عروات حينما يستمر التلقيح الذاتي لجيلين ، وإلى خمس عروات حينما يقوم التلقيح الذاتي لثلاثة أجيال قبل إجراء التلقيح بين السلالات المرياة بالتلقيح الذاتي .

ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Sprague (١٩٦٦) ، و Fehr (١٩٨٧) .

سؤال على التقدم الوراثي بالانتخاب

يوضح شكل (٦-٣) مثلاً افتراضياً على التقدم الوراثي الذي قد يمكن إحرازه بعد دورة واحدة من دورات الانتخاب (عن Simmonds ١٩٧٩) . ويتبين من الشكل .. أن انتخاب الأفراد الموزعة في الجزء المظلل من عشيرة الأساس (الرسم العلوي) يؤدي إلى إنتاج العشيرة المحسنة (الرسم السفلي) . هذا .. علماً بأن شدة الانتخاب (k) في هذا المثال الافتراضي هي ١,٧٦ ، والنسبة المثوية للنباتات المنتخبة ١ ، ويتضح - لدى مقارنة القيم

الإحصائية فى عشيرة الأساس ؛ وفى نسل النباتات المنتخبة - ما يلى :

القيمة إحصائية	عشيرة الأساس	نسل النباتات المنتخبة
المتوسط العام للعشيرة	١٠.٠	١١.٧٦
تباين الشكل المظهري (V_p)	٤.٠	١.٧٢
التباين الإضافي (V_A)	٢.٠	٣.٠
التباين البيئي (V_E)	٢.٠	٢.٠
درجة التوريث (h^2)	٠.٥	٠.٣٣

وقد تحقق فى هذا المثال تقدم قدره ١,٧٦ وحدة من الصفة المنتخبة بعد دورة واحدة من الانتخاب .



تحسين التقدم الوراثى السنوى فى برامج التربية بالانتخاب

يسعى المربي - يوماً - إلى تعزيز وزيادة التقدم الوراثى الذى يحرزه سنوياً فى برامج التربية بالانتخاب ؛ من خلال دراسته لكافة العوامل المؤثرة على القيم التى تدخل فى حساب التقدم الوراثى - والتي وردت فى المعادلات التى سبق بيانها - وهى كما يلى :

١- عدد سنوات كل دورة انتخاب :

يتوقف عدد سنوات كل دورة انتخاب على عدد العروات التى يمكن زراعتها كل عام ، حيث يمكن زراعة عروتين ، أو ثلاث عروات - أحياناً - من المحصول الواحد فى المناطق ذات المناخ المعتدل . أما فى المناطق الشديدة البرودة شتاءً ، أو الشديدة الحرارة صيفاً .. فيمكن زراعة عروات إضافية فى البيوت المحمية ، أو فى مناطق أخرى من العالم ، تسمح فيها الظروف البيئية باستمرار الزراعة .

ويستفاد من العروات الإضافية هذه فى إجراء التهجينات ، وفى التربية الداخلية ، وإكثار البذور ؛ كما قد يستفاد من بعضها فى التقييم والانتخاب ، ويتوقف ذلك على الإمكانيات المتاحة ، والمحصول المزروع ، والصفات التى يجرى الانتخاب لها ، فالزراعات



شكل (٦ - ٢) : مثال افتراضى لتحسين الوراثى الذي يحدث بعد بورة واحدة من الانتخاب يراجع المتن للتفاصيل .

المحمية وحجرات النمو .. لا تناسب إلا المحاصيل التى لاتتطلب مساحات كبيرة لنموها ، وعمليات التربية التى لاتتطلب أعداداً كبيرة من النباتات لإنجازها . ويعد إجراء التهجينات أكثر عمليات التربية شيوعاً فى البيوت المحمية ، كما يجرى فيها - أحياناً - زراعة مزيد من الأجيال ؛ للوصول إلى الأصالة الوراثية ، ويكون ذلك - غالباً - بطريقة التحدر من البذرة المفردة Single - Seed Descent . كما يعد التقييم لمقاومة الآفات أكثر الاختبارات إجراء

فى البيوت المحمية وحجرات النمو . وبالمقارنة .. فإن زراعة العروات الإضافية تحت ظروف الحقل - فى المناطق التى يسودها جو معتدل - تسمح بتقييم أعداد كبيرة من النباتات ، وإجراء معظم عمليات التربية التى تجرى فى العروة الرئيسية ، ولكن يعاب عليها صعوبة الإشراف الدائم على العمليات الزراعية التى تجرى بها ، والتكاليف والجهود الإضافية التى تبذل فى التنقل بين المحطتين ، والتأخير الذى قد يحدث فى انتقال البنور والأجزاء الخضرية المستعملة فى الزراعة فى حالة وجود قوانين حجر زراعى خاصة بالمحصول المراد زراعته . أما زراعة العروات الإضافية فى دول أخرى بنصف الكرة الأرضية المقابل .. فإنها تتطلب اتفاقيات نوية وترتيبات خاصة ، لسرعة انتقال الأجزاء النباتية المستعملة فى الزراعة . ولهذه الطريقة .. مزايا الطريقة السابقة وعيوبها .

٢- شدة الانتخاب (k) :

تفضل -دائماً- زيادة أعداد النباتات أو السلالات التى يجرى تقييمها ؛ لأن ذلك يكون مصاحباً بزيادة فى قيمة شدة الانتخاب بالوحدات القياسية (أو k) ؛ فيفرض أن المرئى يقوم بانتخاب أفضل ٢٠ سلالة .. فإن ذلك يعنى أن شدة الانتخاب (كنسبة مئوية) تكون ٢٠٪ فى حالة اختبار ١٠٠ سلالة ، و ١٠٪ عند اختبار ٢٠٠ سلالة ، و ٥٪ لدى اختبار ٤٠٠ سلالة ، وتكون قيمة k المقابلة هى ١,٤ ، و ١,٧٥ ، و ٢,٠٦ -للحالات الثلاث- على التوالى . وحتى لو حافظ المرئى على نسبة مئوية ثابتة من السلالات المنتخبة .. فإن زيادة عدد السلالات المختبرة يعنى تقليل التربية الداخلية فى العشيرة ، وهو أمر مطلوب . وتعد ميكنة العمليات الزراعية واستخدام الحاسبات الآلية .. من أهم العوامل التى ساعدت مرئى النباتات على زيادة أعداد السلالات التى تختير فى برامج التربية سنوياً .

٣- تحكم الآباء (c) :

يمكن زيادة قيمة (c) من ٠,٥ إلى ١,٠ بانتخاب الصفة قبل تلقيح الأمهات بالآباء المنتخبة وغير المنتخبة . ويفضل انتخاب الأمهات والآباء قبل التلقيح ؛ حتى تكون الآليات المورثة للنسل من نباتات منتخبة . ويعنى انتخاب الأمهات أن نصف الآليات - فقط - هى التى تكون من نباتات منتخبة أما النصف الآخر من الآليات - وهو الذى يتحصل عليه من الآباء غير المنتخبة - فإنه لايسهم فى أى تقدم وراثى . كما يمكن زيادة تحكم الآباء من

١٠٠ إلى ٢٠٠ : باستعمال البنور الناتجة من التلقيح الذاتى أو السلالات الخضرية ؛ لإجراء التلقيحات بين أنسال أنصاف الأقارب المتفوقة Superior half - sib progenies بدلاً من استعمال البنور المتبقية من أنصاف الأقارب (فى التلقيحات القمية) ؛ ذلك لأن الأليلات الموجودة فى البنور الناتجة من التلقيح الذاتى تأتى من الأفراد المنتخبة فقط ، بينما تأتى نصف أليلات بنور أنصاف الأقارب من النباتات المنتخبة ، ويأتى نصفها الآخر من العشيرة التى تضم أفراداً غير منتخبة .

٤- التباينات الوراثية (V_A و V_g) :

يتحدد مقدار التباين الوراثى الإضافى فى العشيرة بالعوامل التالية :

(١) الاختلافات الوراثية بين الآباء :

تتأثر الاختلافات الوراثية بعدد الآباء التى استعملت فى إنتاج العشيرة ، ومدى تقاربها أو تباعدها - وراثياً - عن بعضها البعض ؛ ففى النباتات الثنائية التضاعف .. يمكن أن تحتوى العشيرة الناتجة من تلقيح فردى single cross على أحد أليلين فقط فى كل موقع جينى ، ويزيد هذا الرقم إلى ثلاثة ، وأربعة فى العشائر الناتجة من التلقيحات الثلاثية three - way crosses ، والمزوجة (الرباعية) double crosses على التوالى ... وهكذا ، وهو ما يعنى توفر قدر أكبر من الاختلافات الوراثية . ولهذا الأمر أهمية خاصة فى برامج التربية التى يكون فيها عدة دورات من الانتخاب المتكرر ؛ نظراً لأن مدى التقدم الذى يمكن تحقيقه بالانتخاب يتوقف على عدد أليلات كل جين فى عشيرة الأساس Base Population التى يبدأ فيها الانتخاب . وكلما زاد عدد الآباء المستعملة فى كل دورة انتخاب .. زادت الاختلافات الوراثية التى تتوفر للانتخاب .

وكلما كانت الآباء المستعملة فى إنتاج عشيرة الأساس متباعدة عن بعضها البعض وراثياً (أى مختلفة فى أنسابها) .. زادت فرصة مشاركتها بأليلات مختلفة فى مختلف المواقع الجينية . كما يعمد المرئى إلى الحد من النقص فى الاختلافات الوراثية -الذى يحدث نتيجة للتربية الداخلية أثناء إجراء برنامج التربية- بانتخاب سلالات لدورات الانتخاب ، تنتمى (أو تنتسب) إلى تلقيحات أصلية مختلفة .

هذا .. ولاتعنى المناقشة السابقة أن يعمد المرءى إلى إدخال آباء غريبة exotic parents (وهى الأصناف أو السلالات التى لاتكون منتجة ، أو مزروعة فى المنطقة التى تنتج لأجلها الأصناف الجديدة) لجرد زيادة الاختلافات الوراثية فى عشيرة الأساس ؛ لأن هذه الزيادة تكون مصاحبة بانخفاض عام فى متوسط العشيرة . ولاينصح بإدخال مثل هذه الآباء إلا فى برامج الانتخاب المتكرر الطويلة المدى .

(ب) مدى التربية الداخلية فى العشيرة قبل التقييم والانتخاب :

يزداد التباين الإضافى دائماً بزيادة التربية الداخلية فى العشيرة ، ويزداد معها - أيضاً - التقدم الوراثى الممكن فى كل دورة انتخاب ؛ إلا أنه يجب تقدير ذلك فى ضوء الوقت الإضافى الذى يلزم للتربية الداخلية .

(ج) عدد الأجيال الانعزالية بين دورات التربية :

تزداد فرصة حدوث العبور بين الجينات المرتبطة -تظهر انعزالات جديدة- بزيادة عدد أجيال التلقيح العشوائى فى العشيرة ، وهو ما يسهم فى زيادة الاختلافات الوراثية . ورغم أن زيادة عدد الأجيال فى كل دورة انتخاب يمكن أن يؤثر سلبياً على التقدم الوراثى ، الذى يمكن تحقيقه سنوياً .. إلا أن ذلك التأثير لا يحدث فى الحالات التى تكون فيها الأجيال الإضافية فى غير المواسم التى يجرى فيها الانتخاب .

٥- الاختلافات داخل القطع التجريبية (Within Plot Variability) V_{Wg} و V_{Ug} .

(V_{Wg} و V_{Ug})

تحدد الاختلافات داخل القطع التجريبية (V_{Wg}) بكل من البيئة (V_{Ug}) والانعزالات الوراثية (V_{Wg}) ، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد النباتات التى يضمها القطاع (n) ، وهى النباتات التى يؤخذ متوسطها ليمثل متوسط القطعة التجريبية . وتكون n مساوية للواحد الصحيح عند انتخاب النباتات الفردية من العشيرة ؛ أما فى حالات تقييم السلالات أو العائلات . فإن قيمة n ترتبط بحجم القطعة التجريبية . ويمكن تقدير مدى تأثير زيادة عدد النباتات بكل قطعة تجريبية على V_{Wg} ؛ بافتراض قيمة ثابتة للاختلافات الكلية - ولتكن

٧٠٠ - مع تغيير أعداد النباتات المنتخبة n كما يلي :

$\sqrt{V_w/n}$	n
٢٦,٥	١
١٨,٧	٢
١٥,٢	٣
١٣,٢	٤
١١,٨	٥
٨,٤	١٠
٥,٩	٢٠
٤,٨	٣٠
٤,٢	٤٠
٣,٧	٥٠
٣,٤	٦٠
٢,٦	١٠٠

يلاحظ أن الفائدة - التي يتحصل عليها من جراء زيادة عدد النباتات بالقطعة التجريبية - تتناقص بزيادة n . فبينما يكون الفرق في هذا المثال - ١٨,١ وحدة عند زيادة عدد النباتات من ١ إلى ١٠ .. فإن الفرق يتضائل إلى ٠,٨ وحدة عند زيادة عدد النباتات من ٦٠ إلى ١٠٠ بكل قطعة تجريبية . وعلى المرء أن يقدر بنفسه - عدد النباتات الأمثل بكل وحدة تجريبية للصفات التي يرغب في تقييمها .

٦- الاختلافات بين القطع التجريبية Plot-to-Plot Variation (V) :

ترتبط الاختلافات بين القطع التجريبية بالاختلافات البيئية ، وهي التي يمكن تخفيضها، إما بتقليل عدد الوحدات التجريبية في كل مكررة ، وإما بإنقاص مساحة كل وحدة تجريبية . ويؤدي ذلك إلى نقص المساحة المخصصة لكل مكررة ؛ ومن ثم .. إلى زيادة احتمالات تجانس التربة في المكررة الواحدة .

٧- الخطأ التجريبي (V_e) :

يؤدى أى انخفاض فى V_U ، أو V_{w.g} ، أو V إلى انخفاض فى V_e . كما تتحدد أهمية V_e بكل من عدد المكررات (r) ، وعدد البيئات (t) التى تجرى فيها الاختبارات ؛ كما يتضح فى الموضوع التالى .

٨- التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة Genotype x Environment Interaction (V_{ge}) :

يمكن الحد من تأثير التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة ؛ بتقييم السلالات فى عدة بيئات (t) ، مع حفظ التوازن المناسب بين عدد المكررات (r) وعدد البيئات ، علماً بأن زيادة عدد البيئات يكون له تأثير أكبر على V_{ge} . ورغم أن التقدم الوراثى المتوقع بالانتخاب يكون أعلى مايمكن عند تقييم السلالات فى مكررة واحدة بعدة بيئات .. إلا أن ذلك لا يكون عملياً ، ولايجرى -عادة- بسبب زيادة التكاليف ؛ ويكتفى -عادة- بزراعة عدد من المكررات فى عدد محدود من البيئات (عن Fehr ١٩٨٧) .

٩- الانتخاب غير المباشر :

يكون الانتخاب أسرع ، ويتم التوصل إلى الصنف الجديد فى برامج التربية فى وقت أقل ، لو كان بالإمكان الاستدلال على الصفة الأولية primary character التى يراد انتخابها - مثل صفة المحصول - من صفات أخرى ثانوية secondary characters - مثل صفات حجم الورقة واتجاه نموها leaf orientation ، وارتفاع النبات ، والتفرغ ، أو تكوين الخلفات ، ومدى تعمق الجذور ، ومعدل البناء الضوئى ... إلخ . وتلخص أهمية العلاقة بين الصفة الثانوية والصفة الأولية بالمعادلة التالية :

$$\frac{CR_x}{R_x} = r_A \frac{i_y h_y}{i_x h_x}$$

حيث تمثل .

CR_x : التحسين المتحصل عليه فى الصفة الأولية بالانتخاب غير المباشر للصفة

الثانوية .

- R_x : التحسين المتحصل عليه بالانتخاب المباشر للصفة الأولية
- r_A : الارتباط الوراثي بين الصفة الأولية (x) والصفة الثانوية (y) .
- a_y : شدة الانتخاب للصفة الثانوية .
- a_x : شدة الانتخاب للصفة الأولية .
- h_y : الجذر التربيعي لدرجة التوريث على النطاق الضيق الخاصة بالصفة الثانوية .
- h_x : الجذر التربيعي لدرجة التوريث على النطاق الضيق الخاصة بالصفة الأولية
- (عن Falconer ١٩٨٨) .

وتعرف شدة الانتخاب بأنها : النسبة بين عدد الأفراد أو السلالات المنتخبة إلى عدد الأفراد أو السلالات المختبرة . ولا يكون الانتخاب غير المباشر للصفات الثانوية مجدياً إلا إذا كان التعرف عليها أسهل ، ويتطلب جهداً ووقتاً أقل مما يلزم للتعرف على الصفات الأولية . كما تزيد فاعلية الانتخاب غير المباشر إذا كانت درجة التوريث على النطاق الضيق أعلى في الصفة الثانوية مما في الصفة الأولية . ويتأتى ذلك إذا كانت الصفة الثانوية ذات تباين إضافي كبير نسبياً ، أو كانت أقل تأثراً بالتغيرات البيئية ، أو أقل تفاعلاً مع البيئة . ونظراً لأن الجذر التربيعي لدرجتي توريث الصفتين الأولية والثانوية هو الذى يدخل فى المعادلة التى تبين العلاقة بينهما ؛ لذا .. فإن من الضروري أن تكون درجة توريث الصفة الثانوية أعلى بكثير من درجة توريث الصفة الأولية ، حتى تظل النسبة بينهما كبيرة بعد استخراج الجذر التربيعي لكل منهما .

ولا توجد فائدة ترجى من الانتخاب غير المباشر إن لم يوجد ارتباط وراثي واضح بين الصفتين الأولية والثانوية . ويقدر هذا الارتباط بتقييم تراكيب وراثية مناسبة لذلك فى ظروف بيئية مستباعدة ؛ حيث يستدل من ارتباط الشكل الظاهري phenotypic correlation بين الصفتين -مبدئياً- على العلاقة بين الصفتين . ويتطلب قياس الارتباط الوراثي genetic correlation بين الصفتين استعمال تراكيب وراثية عشوائية من عشائر منعزلة ، كما يستفاد - أحياناً - من السلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة فى هذا الشأن .

هذا .. ويقدر الارتباط الوراثى بالمعادلة التالية :

الارتباط الوراثى =

التباين الوراثى المرافق genetic co-variance للصفاتين الأساسية والثانوية

التباين الوراثى للصفة الأساسية × التباين الوراثى للصفة الثانوية

أما ارتباط الشكل المظهري فيقدر بالمعادلة التالية :

ارتباط الشكل المظهري =

متوسط حاصل ضرب قيمة الصفاتين الأساسية والثانوية فى الأفراد المختبرة

متوسط مربع قيمة الصفة الأساسية × متوسط مربع قيمة الصفة الثانوية فى نفس الأفراد

(عن Kwon & Torrie ١٩٦٤).