

تتراوح - عادة - بين ٢٥، و ٣٠ سم، ويجرى الخف باستعمال فأس صغيرة ذات يد طويلة.

وتبلغ الكثافة النباتية حوالى ٥٠-٧٠ ألف نبات للهكتار (حوالى ٢١-٣٠ ألف نبات/فدان).

مواعيد الزراعة

يزرع الخس ابتداء من أوائل شهر سبتمبر، وتستمر زراعته حتى أوائل شهر نوفمبر. ويمكن تبكير الزراعة أو تأخيرها عن ذلك قليلاً فى المناطق الساحلية.

عمليات الخدمة

الترقيع

يجرى الترقيع أثناء الريـة الأولى بعد الشتل، وتستخدم لذلك شتلات من نفس العمر، سبقت زراعتها على القنوات والبتون.

الخف

لا يجرى الخف - بطبيعة الحال - إلا عند الزراعة بالبذور فى الحقل الدائم مباشرة. ويجب إجراؤه فى المراحل الأولى لنمو البادرات بعد ظهورها ونموها قليلاً؛ لأن التأخير فى هذه العملية يؤدى إلى جعل النباتات رقيقة، وضعيفة. وتخف النباتات على مسافة ٢٠-٢٥ سم. ويفضل أن يجرى الخف على مرحلتين: تكون الأولى منهما بعد ١٠-١٤ يوماً من الزراعة، وتترك فيها مجموعات من النباتات Clusters على المسافات المرغوبة، ويستعان فى إجرائها بفأس صغيرة، أو تتم آلياً. أما المرحلة الثانية .. فتجرى بعد تكوّن الورقة الحقيقية الأولى، وتخف فيها كل مجموعة من النباتات على نبات واحد فقط. ويمكن الاستعانة بالنباتات المزالة فى الترقيع فى مواقع أخرى. ويعتبر الخف أكثر العمليات الزراعية تكلفة فى حقول الخس (Ware & McCollum، ١٩٨٠).

العزيق ومكافحة الأعشاب الضارة

إن الهدف من العزيق هو سد الشقوق، والتخلص من الأعشاب الضارة. ويجب أن