

إنتاج الخضر المركبة

أو بالشتلات المنتجة فى المشاتل الحقلية بحيث تبقى القمة النامية للنباتات - بعد زراعتها - فوق سطح التربة، وبعق حوالى ١٠-١٥ سم عند التكاثر بالشتلات البذرية، بحيث تبقى قمتها هى الأخرى - بعد زراعتها - بارزة فوق سطح التربة.

ويتعين أثناء النمو النباتى الترديم بالتربة حول قواعد النباتات الجديدة أياً كانت الطريقة التى أكثرت بها.

مواعيد الزراعة

يزرع الخرشوف فى مصر - عادة - فى منتصف شهر أغسطس إلى منتصف شهر سبتمبر. وقد تبدأ الزراعة من منتصف شهر يوليو فى حالة انخفاض درجة الحرارة فى منطقة الزراعة. وكقاعدة عامة .. فإن الزراعة المبكرة تصاحبها زيادة فى نمو النباتات، والمحصول المبكر والكلى، لكن يعاب عليها ضعف نسبة الإنبات، بسبب تعفن التقاوى عند زراعتها أثناء ارتفاع درجة الحرارة. ويعتبر النصف الثانى من شهر أغسطس موعداً وسطاً مناسباً للزراعة.

عمليات الخدمة

الترقيع

ترجع أهمية عملية الترقيع فى الخرشوف إلى الانخفاض الكبير الذى يحدث - عادة - فى نسبة الإنبات. ويستغرق إنبات الخرشوف - عادة - نحو ٤٥ يوماً، وتلك فترة طويلة يمكن أن تؤدى إلى اختلاف كبير فى النمو النباتى فى الحقل بين النباتات التى زرعت فى البداية، وتلك التى استخدمت فى الترقيع؛ لذا .. يوصى بالعناية بتربية نباتات فى أصص فى موعد الزراعة نفسه؛ لاستخدامها فى الترقيع. وقد تنقل جور بالصلايا من مكانها إلى الحقل المستديم.

العزق ومكافحة الأعشاب الضارة

يجرى العزق فى حقول الخرشوف، بغرض التخلص من الأعشاب الضارة، والترديم على النباتات. تكون العزقة الأولى فى بداية حياة النبات، ويتم فيها التخلص من الحشائش، وتنعيم التربة، وتقليب السماد. أما العزقات الأخرى .. فتكون بعد الري،