

الأقراص هو ١١ سم للقطر، و١٣ سم للقوس. ويجب ألا يزيد الفرق بين أصغر الأقراص وأكبرها في العبوة الواحد عن ٤ سم عند التدرج على أساس القطر، و ٥ سم عند إجراء التدرج على أساس القوس.

هذا .. و يسمح في الرتبة الإكسترا بنسبة رؤوس لا تتجاوز ٥% لا تكون مطابقة للرتبة ولكنها تكون مطابقة للرتبة الأولى، كما يسمح في الرتبة الأولى بنسبة رؤوس لا تتجاوز ١٠% لا تكون مطابقة للرتبة ولكنها تكون مطابقة للرتبة الثانية، و يسمح في الرتبة الثانية بنسبة رؤوس لا تتجاوز ١٠% لا تكون مطابقة للرتبة، ولكنها تكون صالحة للاستهلاك.

و يسمح في جميع الرتب بنسبة ١٠% من الرؤوس - بالعدد في العبوة الواحدة - تكون مخالفة في الحجم، ولكنها تكون في حدود الحجم الأكبر أو الأصغر مباشرة لحجم رؤوس العبوة. ويجب ألا يقل حجم الرأس في أصغر الأحجام عن ١٠ سم في القطر أو ١٢ سم في القوس.

وفي جميع الحالات يجب ألا تزيد نسبة التجاوزات الكلية عن ١٠% في رتبة الإكسترا، وعن ١٥% في الرتبتين الأولى والثانية.

### الأمراض والآفات ومكافحتها

يصاب القنبيط بالأقراص والآفات ذاتها التي يصاب بها الكرنب، والتي أسلفنا بيانها وطرق مكافحتها في الفصل الرابع.