

يناسب الجو البارد المعتدل زراعة اللفت. وهو محصول ذو موسم نمو قصير، لا يتعدى ٥٠-٧٠ يومًا. بذور اللفت سريعة الإنبات، وتبلغ أنسب حرارة لإنبات البذور ٢٩°م، ويتراوح المجال الحرارى الملائم للإنبات من ١٥-٤٠°م، ولا تنبت البذور فى درجة حرارة تقل عن ٤°م، أو تزيد عن ٤٠°م، يلائم نمو النباتات درجة حرارة معتدلة، تميل إلى الارتفاع (حوالى ٢٤°م) مع نهار طويل فى بداية حياتها، ودرجة حرارة معتدلة تميل إلى الانخفاض (حوالى ١٦°م)، مع نهار قصير فى مرحلة تضخم الجذور.

طرق التكاثر والزراعة

يتكاثر اللفت بالبذور التى تزرع فى الحقل الدائم مباشرة. يلزم لزراعة الفدان من ٢-٣ كجم عند الزراعة فى سطور، ومن ٤-٥ كجم عند الزراعة نثرًا.

تجهز الأرض للزراعة بالحراثة، والتسميد بالأسمدة العضوية، والتزحيف، ثم تقسم إلى أحواض مساحتها ٢×٢، أو ٣×٢م. وتقسم الأراضى الثقيلة إلى خطوط بعرض ٦٠-٧٠ سم (أى يكون التخطيط بمعدل ١٠-١٢ خطًا فى القصبتين). تكون زراعة البذور فى الأحواض إما نثرًا، أو فى سطور تبعد عن بعضها البعض بمسافة ٣٠ سم. وتكون الزراعة على الخطوط سرًا فى الثلث العلوى من ريشتى الخط. ولا يزيد عمق الزراعة فى كل الحالات عن ١,٥ سم.

مواعيد الزراعة

يزرع اللفت البلدى عادة ابتداء من منتصف شهر أغسطس، وتستمر زراعته إلى منتصف نوفمبر. وهو يتعرض للإزهار فى الزراعات المتأخرة عن ذلك. أما الأصناف الأجنبية .. فيمكن الاستمرار فى زراعتها حتى شهر فبراير، أو بعد ذلك فى المناطق الساحلية، وذلك لأنها بطيئة الاتجاه نحو الإزهار بسبب احتياجاتها العالية من البرودة (مرسى والمربع ١٩٦٠).

عمليات الخدمة

من أهم عمليات الخدمة الزراعية التى تعطى لحقول اللفت ما يلى: