

الماء لمدة ٢٤ ساعة ثم معاملتها - بعد تجفيفها سطحياً - بالثيرام ٠,٧٥٪، أو الكابتان ١٪، أو الداى كلون ١٪ ثم زراعتها دون تأخير.

تزرع السبانخ فى أحواض مساحتها ٣×٢م، أو ٣×٣م نثرًا، أو فى سطور تبعد عن بعضها البعض بحوالى ٢٥ سم. وتكون الزراعة على عمق ١,٥-٢ سم.

ويمكن زراعة البذور آلياً بمعدل ١٠ بذور بكل قدم طولى (٣٠سم) من الخط؛ الأمر الذى ينتهى بوجود حوالى ٦-٨ نباتات بكل ٣٠ سم طولى وهى الكثافة المطلوبة.

هذا وتقل كثافة الزراعة المناسبة عند الزراعة فى سطور منها عند الزراعة نثرًا، وعند الزراعة لأجل التصنيع منها لأجل الاستهلاك الطازج، وعند الزراعة فى المواسم الدافئة نسبيًا منها فى المواسم الباردة.

### مواعيد الزراعة

تمتد زراعة أصناف السبانخ المحلية من منتصف أغسطس إلى منتصف شهر نوفمبر، بينما تمتد زراعة الأصناف الأجنبية حتى آخر فبراير، وقد تتأخر عن ذلك فى المناطق الساحلية.

### عمليات الخدمة

#### الخف

يعد الخف من أكثر العمليات الزراعية تكلفة، ولا ينصح بإجرائه؛ لذا .. يجب التحكم فى كمية التقاوى؛ حتى لا تزيد كثافة الزراعة عما ينبغى. ويمكن - عند الضرورة - خف النباتات على مسافة ١٠ سم من بعضها البعض فى السطر، باستعمال فأس صغيرة. وقد تخف النباتات الكبيرة - يدويًا - وتباع؛ وبذا يتوفر مكانها لنمو النباتات الصغيرة المتبقية.

### العزق ومكافحة الحشائش

يستحيل إجراء العزق عند الزراعة نثرًا، ولكن يمكن العزق بفأس صغيرة عند الزراعة فى سطور. وتمتد مكافحة الحشائش فى حقول السبانخ أمرًا ضروريًا، خاصة فى