



شاحبٍ يمتد بطول العروق . وتظهر هذه الأعراض قبيل تكشف التبرقش أو الموزايك .

٢ - التبقع الحلقي الأصفر Chlorotic Ring Spots :

تظهر الأعراض في صورة بقع موضعيةٍ مستديرةٍ شاحبةٍ ، أو قد تكون في صورة حلقاتٍ شاحبةٍ متبادلةٍ مع اللون الأخضر الطبيعي . والغالب أن مراكز هذه البقع تتحلل في النهاية .

٣ - التحلل والموت Necrosis :

مع تقدم أعراض التبرقش أو الاصفرار نجد أن الأنسجة المصابة قد تضعف وتضمحل ، ثم تتحلل وتموت . وتتراوح مساحة الأنسجة المتحللة بين بقع بحجم رأس الدبوس ويقع قطرها سنتيمتر واحد أو أكثر .

٤ - التقزم Stunting والموت المبكر Premature Death :

يظهر ذلك مع تقدم الإصابة في معظم الأمراض الفيروسية .

٥ - التشوهات Malformations والتضخمات :

تظهر تشوهات واضحة بالأعضاء النباتية المصابة ، سواء أكانت أوراقا ، أم أزهارا ، أم ثمارا . ومن هذه التشوهات : التجمد أو التكرمش ، والتثاثل ، وتكوين التواءات والدرنات المغزلية ، وكثرة عدد البراعم وتشوهها .

٦ - الاصفرار Yellowing .

والى جانب ما تقدم . فإن النباتات قد تكون حاملة للفيروس ، دون أن تظهر عليها أعراض مميزة ، وتسمى Symptomless Carriers ( عن Walker ١٩٦٩ ) .

ويعطى Bos ( ١٩٧٨ ) وصفا تفصيليا مزودا بالصور لأعراض الإصابات الفيروسية في النباتات . أما تفاصيل الأمراض الفيروسية ، فيمكن الرجوع إليها في Smith ( ١٩٧٢ ، ١٩٧٧ ) ، و Matthews ( ١٩٨١ ) .