

الذبابة البيضاء

تقوم الذبابة البيضاء بامتصاص عصارة النباتات ، وتشتد الإصابة في العروة الخريفية. وتكافح الحشرة بالرش بأحد المبيدات المناسبة ؛ مثل الأكتليك ٥٠ / بمعدل ١,٥ لترا للفدان ، أو بالسيليكرون ٧٢ / بمعدل ٧٥٠ مل (سم^٢) / ٤٠٠ لتر ماء للفدان .

ومن البدائل الموصى بها لمكافحة الذبابة البيضاء في مصر ، ما يلي :

زيت كيميسول ٩٥ / مستحلب ، وزيت سوپر رويال ٩٥ / مستحلب ، وزيت سوپر مصرونا ٩٤ / مستحلب ، وزيت كزد أويل ٩٥ / مستحلب بمعدل لتر واحد / ١٠٠ لتر ماء .

زيت طبيعي ناتيرلو ٩٠ / مستحلب بمعدل ٦٢٥ مل / ١٠٠ لتر ماء .

بيوفلاي ١٠X٣ وحدة / مل (سم^٢) معلق بمعدل ١٠٠ مل (سم^٢) / ١٠٠ لتر ماء .

إم بيد ٤٩ / سائل بمعدل ١,٥ لتر / ١٠٠ لتر ماء .

حفار ساق الباذنجان

تثقب اليرقات سيقان النباتات وفروعها الغضة ؛ مما يؤدي إلى اصفرار الأوراق وذبولها وجفافها ، وتوقف نمو السيقان أو موتها . وتُميز الإصابة بوجود ثقوب في السيقان ؛ تخرج منها نشارة خشب الساق مخلوطاً بفضلات الحشرة . وإذا أصيبت الدرنات ، فإنها تتعفن وتأخذ لوناً أسود . تشتد الإصابة بالحشرة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو .

ولمكافحة الحشرة يراعى إزالة النباتات المصابة والتخلص منها . ويعتبر الرش لمكافحة دودة درنات البطاطس علاجاً كذلك لحفار ساق الباذنجان (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ١٩٩٤) .

الديدان السلكية

يتبع الديدان السلكية Wireworms عدة أنواع ، منها *Limonijs californicus* ، و *L. canus* ، و *Ctenicera pruinia* ، وجميعها تتشابه في المظهر العام ؛ فهي ديدان