

الأصناف

تقسيم الأصناف

من أهم الصفات التي يبني عليها تقسيم أصناف الفراولة، ما يلي:

نقسيـم الأصناف حسب احتياجاتها من الفترة الضوئية للإزهار

تقسم أصناف الفراولة حسب احتياجاتها من الفترة الضوئية لكي تزهر - أو حسب استجابتها للفترة الضوئية - إلى مجموعتين رئيسيتين، كما يلي:

أولاً: أصناف محايدة للفترة الضوئية (Day Neutral)

تعرف الأصناف المحايدة للفترة الضوئية - كذلك - باسم الدائمة الحمل ever bearing، وهي أصناف ليست لها احتياجات خاصة من الفترة الضوئية لكي تزهر؛ حيث يستحث فيها تكوين مبادئ البراعم الزهرية أيًا كان طول الفترة الضوئية، ولكن تكوينها يتأثر بدرجة الحرارة. ويمكن للأصناف المحايدة للفترة الضوئية الإزهار، والإثمار، وتكوين المدادات في آن واحد، وهي أبكر الأصناف في الإثمار، وتستمر في الإثمار لفترة أطول عما في أصناف المجموعة الأخرى (القصيرة النهار)، وفي عدة دورات خلال الموسم.

ومن بين الأصناف المحايدة للفترة الضوئية التي زرعت في الماضي، ولكنها فقدت أهميتها في مصر حاليًا الأصناف: كابتولا Capitola، وإرفين Irvine، وميور Muir، وصن ست Sunset، وفرن Fern، وهيك، وبرايون.

وتعد أهم الأصناف المحايدة للفترة الضوئية، والتي يوصى بزراعتها لأجل التصدير حاليًا: سلفا Selva، وسي سكيب Seascap، علمًا بأن سلفا هو الأفضل.

ثانيًا: أصناف قصيرة النهار (Short-Day)

تعرف أصناف هذه المجموعة - في المناطق المعتدلة الحرارة صيفًا، ولكن تنخفض

فيها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي شتاءً (temperate zone) - باسم الـ June bearers، ولكن هذه التسمية لاتناسبنا، حيث أن إنتاجها يبدأ في مصر وغيرها من الدول العربية قبل ذلك بكثير. لاتتكون مبادئ الأزهار في أصناف هذه المجموعة إلا عندما تتعرض نباتاتها لفترة ضوئية قصيرة، لاتزيد عن حد معين، ويكون ذلك في الخريف. وهي تبدأ في الحصاد - في الزراعات الفرش - في ديسمبر ويناير، وتستمر في الإنتاج حتى شهر يونية. وتمر فترة الحصاد في هذه الأصناف بعدة دورات مميزة.

ويمكن تقسيم الأصناف القصيرة النهار من حيث أهميتها في مصر إلى ثلاث مجموعات، كما يلي:

١ - أصناف زرعت في الماضي، ومازال لبعضها أهمية محدودة، مثل:

Douglas	دوجلاس	Dorit	دوريت
Pajaro	باخارو	Ofra	عوفرا
Pelican	بلكان	Parker	باركر
Sharon	شارون	Saaid	سعيد
Sequoia	سيكويوا	Smadar	سمادار
		Tufts	تفتس

٢ - أصناف أدخلت حديثاً، ومازال تحت التجربة، ويبدو بعضها مبشراً، مثل:

Carlsbad	كارلس باد	Anaheim	آناهيم
Cabarla	كابارلا	Cuesta	كويستا
	ملاك	Laguna	لاجونا
Redlands Joy	رد لاندز جوي	Redlands Hope	ردلاندز هوب
Yael	ياثيل	Tamar	تامار


٣ - أصناف موصى بها وتنتشر زراعتها، مثل:

Oso Grandie	أوز وجراندى	Camarosa	كاماروزا
Sweet Charle	سويت تشارلى	Rosa Linda	روزا لندا


تقسيم الأصناف حسب شكل ثمارها

تقسم أصناف الفراولة حسب شكل ثمارها إلى ثمانى مجموعات (شكل ٣-١)، هى:


globose	٢ - الكروية	oblate	١ - المفلطحة
conic	٤ - المخروطية	globose conic	٢ - المخروطية الكروية
necked	٦ - المنقطة	long conic	٥ - المخروطية الطويلة
short wedge	٨ - المسطحة القمة	long wedge	٧ - المسطحة القمة الطويلة




مفلطح




كروى




كروى مخروطى



مخروطى




مخروطى



مغنى



طويل بقمة مسطحة



قصيرة بقمة مسطحة

شكل (٣-١): أشكال الثمار فى الفراولة (Scott وآخرون ١٩٧٣).