

وتكون زراعة اللوبيا بالطريقة العفير أو بالطريقة الحراثي. وتتبع الطريقة العفير فى الأراضى الرملية والخفيفة، حيث تزرع البذرة الجافة فى أرض جافة ثم تروى الأرض. وتتبع الطريقة الحراثي فى الأراضى الطميية والثقيلة، حيث تزرع البذرة الجافة فى أرض سبق ريها، وتركت حتى وصلت إلى درجة الجفاف المناسبة. وتوضع البذور على العمق المناسب، ثم تغطى بالثرى الرطب، ثم بالتربة الجافة. وتلك هى الطريقة الوحيدة التى ينصح بها لزراعة اللوبيا فى الأراضى الثقيلة، وخاصة بالنسبة للأصناف ذات البذور الكبيرة، وذلك لأن بذور اللوبيا لا تتحمل الرطوبة الزائدة، وتتعفن إذا زرعت بالطريقة العفير فى هذه الأراضى.

مواعيد الزراعة

إن أنسب موعد لزراعة اللوبيا هو فى عروة صيفية من مارس إلى مايو، وتزرع اللوبيا فى عروة أخرى خريفية من يوليو إلى منتصف أغسطس، إلا أن النباتات تتعرض فيها للإصابة بالأمراض الفطرية - وخاصة مرض الصدأ - بسبب ارتفاع رطوبة الجو خلال هذا الموسم.

وبينما تزرع اللوبيا لأجل إنتاج القرون الخضراء فى أى من العروتين، فإن إنتاج البذور الجافة لا يكون إلا فى العروة الصيفية، وكذلك يمكن زراعة الأصناف المقاومة للصدأ فى أى موعد، بينما لا يجوز تأخير زراعة الأصناف القابلة للإصابة عن منتصف شهر أبريل حتى لا تتعرض للإصابة الشديدة بالصدأ.

عمليات الخدمة

التزقيع والخف

تجرى عملية التزقيع قبل رية المحياة فى الأراضى الرملية، وبعد رية المحياة وجفاف التربة إلى الدرجة المناسبة فى الأراضى الطميية والثقيلة. وتجرى عملية الخف قبل رية المحياة مباشرة، مع ترك نبات واحد أو نباتين بالجورة حسب مسافة الزراعة.