

غالبًا - على مصاطب مرتفعة، تروى بالتنقيط مع التعقيم المسبق لتربة الحقل، واستعمال الغطاء البلاستيكي والأنفاق البلاستيكية.

وعلى الرغم من تلك الفروق الجوهرية بين طريقتي الزراعة، فإننا نجد من بين مزارعي الفريجو من يحاول استعمال الأصناف المبكرة الخاصة بالزراعات الفرش، وزراعتها على مصاطب مرتفعة مع ربيها بالتنقيط، كما نجد من بين مزارعي الفرش من لا يقوم بتعقيم التربة، أو تغطيتها بالبلاستيك، وتلك كلها ممارسات يقوم بها المزارعين الذين تخصصوا في زراعة الفراولة الفريجو في محاولة منهم للاتجاه نحو الزراعة الفرش.

الزراعة "الفريجو"

موعد الزراعة

تعرف الزراعة الفريجو - كذلك - باسم الزراعة الصيفية، نظرًا لأنها تتم في شهر أغسطس، ويستخدم فيها - كما أسلفنا - شتلات سبق تقليعها في شهرى ديسمبر ويناير، وخزنت على حرارة ٢- إلى ١٠م لمدة ٧-٨ شهور حتى ميعاد الزراعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزراعة المبكرة عن الموعد المناسب تؤدي إلى ضعف النمو وإنتاج ثمار صغيرة، بينما تؤدي الزراعة المتأخرة إلى غزارة النمو الخضري، وكثرة إنتاج المدادات، وضعف المحصول.

طريقة الزراعة

تحرث الأرض جيدًا ثلاث مرات مع التزحيف بعد كل مرة، ومع إضافة السماد العضوى قبل الحرثة الأخيرة بواقع ٣٠م^٢ للقدان تنثر على سطح التربة، ويضاف معه سماد السوبر فوسفات العادى بمعدل ٢٠٠ كجم للقدان. ويلى ذلك إقامة خطوط بعرض ٨٠-٩٠ سم (أى يكون التخطيط بمعدل ٩ أو ٨ خطوط فى القصبنتين). تكون الزراعة فى جور تبعد عن بعضها بمسافة ٢٥-٣٠ سم على أحد ريشتى الخط، مع توجيه أول المدادات تكوينًا بعد الزراعة لشغل مواقع النباتات على الريشة الأخرى للخط، ومع مراعاة أن تكون مواقع الجور متبادلة - قدر الإمكان - على ريشتى الخط (شكل

٦-١، يوجد فى آخر الكتاب). ويحتاج الفدان للزراعة بهذه الطريقة حوالى ٢٠ ألف شتلة.

يفضل ألا يجرى الشتل فى وجود الماء - وخاصة إذا كان المجموع الجذرى للشتلة كبيراً - وإنما يتم بالطريقة التالية :

١ - تروى الأرض ثم تترك حتى تستحرق (أى حتى تصل نسبة الرطوبة بها إلى حوالى ٥٠٪ من الرطوبة عند السعة الحقلية).

٢ - تحفر الجور على المسافات المرغوبة، ثم توضع الشتلات بها على أن تكون القمة النامية بارزة فوق سطح التربة، مع جعل تاج النبات - وهو الجزء الذى تخرج منه الجذور الجديدة - محاطاً بالتربة.

٣ - يردم حول الجذور بالثرى الرطب، ثم بالتربة الجافة.

٤ - يروى الحقل فى نفس يوم الزراعة ثم بانتظام بعد ذلك؛ لأن الجذور الجديدة لا تتكون إلا عند توفر الرطوبة حولها فى التربة.

وسواء أكان الشتل بتلك الطريقة، أم فى وجود الماء، فإنه يتعين فرد المجموع الجذرى للشتلة وتغطيته بالتربة كاملاً، وبحيث لا يظهر من الشتلة فوق سطح التربة سوى قممها النامية.

ويفضل كذلك تطهير جذور الشتلات قبل زراعتها، بغمرها فى محلول لأحد المطهرات الفطرية المناسبة، مثل: البنليت، أو الفيتافاكس ثيرام، أو الفيتافاكس كابتان بتركيز ١,٥ فى الألف (١,٥ جم/لتر) لأى منها، وذلك لمدة ٢٠ دقيقة قبل زراعتها.

الزراعة "الفرش"

مواعيد الزراعة

تعرف الزراعة الفرش - كذلك - باسم الزراعة الشتوية نظراً لأنها تتم فى شهرى سبتمبر وأكتوبر، علماً بأن الموعد المناسب يتراوح بين منتصف شهر سبتمبر ومنتصف أكتوبر حسب الصنف، حيث تزرع الأصناف المبكرة أولاً.

وبغرض أن الحرارة ليست شديدة الارتفاع فإن الزراعة المبكرة تفيد فى تحفيز النمو