

مواعيد الزراعة

يزرع الجزر البلدى خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس إلى نهاية سبتمبر. ويؤدى تأخير الزراعة عن ذلك إلى تهيئة النباتات للإزهار، واتجاهها نحو التزهير بمجرد ارتفاع درجة الحرارة. أما الأصناف الأجنبية .. فإن زراعتها تبدأ من منتصف أغسطس مع الجزر البلدى، وتمتد حتى شهر فبراير؛ نظراً لأن البرودة السائدة فى مصر خلال فصل الشتاء لا تكفى لتهيئتها للإزهار. ويمكن استمرار زراعتها إلى شهر مارس فى المناطق الساحلية، إلا أن محصولها يكون منخفضاً.

عمليات الخدمة

استعمال أغطية النباتات

يستجيب الجزر لاستعمال أغطية النباتات (مثل Agryl P17). تتوفر تلك الأغطية فى لفائف بعرض ١٢م، وبطول يناسب أى حقل. تفرد هذه الأغطية بعد زراعة البذور مباشرة؛ فتقلل كثيراً من مشكلة تكون القشور السطحية، وتزيد من نسبة إنبات البذور. ويتعين رفع هذه الأغطية فى حوالى مرحلة نمو الورقة الحقيقية السابعة، لأجل زيادة التبكير والمحصول دون التسبب فى إحداث زيادة كبيرة غير مرغوب فيها فى النمو الخضرى. ويتعين دائماً مراقبة درجة الحرارة تحت الغطاء، مع رفع الغطاء نهائياً إذا ارتفعت الحرارة تحته عن ٢٩-٣٢م لعدة أيام متتالية.

الخف

نادراً ما تخف حقول الجزر؛ نظراً لأن هذه العملية مكلفة للغاية. ويمكن الاستغناء عنها بزراعة البذور على أكبر قدر من التجانس، وبالكمية المناسبة من التقاوى. ويمكن إجراء الخف فى الأماكن المزدحمة بعد نحو شهر من الزراعة، حينما تكون النباتات بطول ٥-٦ سم؛ حيث تخف على مسافة ١٠ سم فى حالة الزراعة بطريقة النثر، وعلى مسافة ٥ سم عند الزراعة فى سطور.

وتجدر الإشارة إلى أن إنبات بذور الجزر لا يكون أبداً فى وقت واحد، وإنما يتم على مدى ١٠-١٥ يوماً. ويعنى ذلك أن البذور التى تنبت أولاً هى التى تعطى أكبر الجذور حجماً.