

الحصاد

تحصد القرون بعد أن يكتمل نموها وهي مازالت غضة . ويبدأ الحصاد بعد نحو ٣ - ٥ شهور من الزراعة ، ويستمر لمدة شهر ونصف الشهر إلى شهرين .

الأمراض والآفات

يصاب الفول الرومى بعدد من الآفات ؛ منها مسببات الأمراض ، والهالوك (وهونبات زهرى متطفل) ، والحشرات ، والعنكبوت الأحمر . وفيما يلى قائمة بالأمراض التى تصيب الفول الرومى فى مصر

المسبب	المرض
<u>Botrytis fabae</u>	تبقع الأوراق البنى
<u>Alaternaria tenuis</u>	تبقع الأوراق الألترنارى
<u>Stemphylium botryosum</u>	تبقع أوراق استيمفيللم
<u>Fusarium oxysporum, f. solani</u> &	اعفان الجذور
<u>Rhizoctonia solni</u>	
<u>Uromyces fabae</u>	الصدأ
<u>Heterodera</u> spp	النيما تودا المتحصلة
<u>Pratylenchus</u> spp	نيما تودا تقرح الجذور
<u>Rotylenchulus</u> spp	النيما تودا الكلوية
<u>Meloidogyne</u> spp	نيما تودا تعقد الجذور
Broad bean true mosaic virus	فيروس موزايك الفول الرومى الحقيقى
Broad bean wilt virus	فيروس ذبول الفول الرومى

كما يصاب الفول الرومى كذلك بحشرات المن ، والدودة القارضة ، وتربس البصل ، وأبو دقيق الفول (دودة قرون البقوليات) ، وخنفساء الفول الكبيرة ، وخنفساء الفول الصغيرة ، وذبابة أوراق الفول .

ولزيد من التفاصيل عن أمراض وآفات الفول الرومى ومكافحتها .. يراجع حسن (١٩٨٩) .