

صنف هجين متوسط التبكير فى النضج ، يزرع فى مختلف العروات .

الاحتياجات البيئية

يتشابه القنبيط مع الكرنب فى احتياجاته البيئية ، ويرجع إلى الكرنب فى هذا الشأن . لكن القنبيط يعد أكثر تأثراً من الكرنب بالارتفاع أو الانخفاض فى درجة الحرارة ؛ فتؤدى الحرارة المنخفضة كثيراً إلى تكوين أقراص صغيرة الحجم ، ويؤدى ارتفاع درجة الحرارة - وقت تكوين الأقراص - إلى نمو أوراق صغيرة بوسط القرص وتفككه فيصبح غير مندمج ، كما يؤدى إلى نمو القمم الميرستيمية المكونة لسطح القرص فيصبح زغبى اللمس ، ويؤدى ارتفاع درجة الحرارة - أيضاً - إلى اكتساب القرص لونا أبيض مائلاً إلى الأصفر.

طرق التكاثر والزراعة

يتكاثر القنبيط ، ويزرع مثل الكرنب تحت أى من نظم الري الثلاثة : بالغمر ، أو بالرش ، أو بالتنقيط . ومن حيث مسافات الزراعة التى تناسب كل نظام من نظم الري .. فإن أصناف القنبيط المبكرة تعامل مثل أصناف الكرنب الأجنبية ، بينما تعامل أصناف القنبيط المتأخرة - ذات النمو الخضرى الكبير - معاملة الكرنب البلدى ، ويرجع إلى الكرنب فى هذا الشأن .

مواعيد الزراعة

يزرع القنبيط فى الفترة من أبريل إلى أكتوبر ، موزعة على ثلاث عروات ، كما يلى :

١ - عروة صيفية : تزرع بنورها فى شهرى أبريل ومايو ، وينضج محصولها خلال شهرى أكتوبر ، ونوفمبر .

٢ - عروة خريفية (طوبوية) : تزرع بنورها فى شهرى يونيو ، ويوليو ، وينضج محصولها فى شهرى ديسمبر ويناير .

٣ - عروة شتوية (أمشيرية) : تزرع بنورها فى شهرى أغسطس وسبتمبر ، وينضج محصولها فى شهرى فبراير ومارس .