

## إضطرابات الحركة المحدثه بالأدوية والتأثيرات الجانبية الأخرى للأدوية Medication-Induced Movement Disorders and other adverse effects of medications

الباركنسونية المحدثه بمضادات الذهان  
Neuroleptic-Induced Parkinsonism(G21.11)

الباركنسونية المحدثه بأدوية أخرى  
Other Medication-Induced Parkinsonism(G21.19)

إن الرعاش الباركنسوني أو الصلابة العضلية أو اللاحركية  
Akinesia (أي فقد الحركة أو صعوبة بدء الحركة) أو bradykinesia  
بطء الحركة يتطور خلال بضعة أسابيع من بدء إعطاء الأدوية (مثلاً  
مضادات الذهان) أو رفع جرعتها (أو بعد تخفيض دواء مستخدم في  
علاج الأعراض خارج الهرمية).

متلازمة مضادات الذهان الخبيثة  
(G21.0) Neuroleptic Malignant Syndrome

خلل التوتر العضلي الحاد المحدث بالأدوية  
(G24.02) Medication-Induced Acute Dystonia

تتطور تقلصات شاذة مطولة في عضلات العيون والرأس أو  
العنق أو الأطراف أو الجذع خلال الأيام الأولى من بدء إعطاء  
الأدوية (مضادات الذهان مثلاً) أو رفع جرعتها (أو بعد تخفيض دواء  
مستخدم في علاج الأعراض خارج الهرمية).

الزلز الحاد المحدث بالأدوية  
(G25.71) Medication-Induced Acute Akathisia

شكاوى ذاتية بالتململ، غالباً ما يرافقها حركات مفرطة يمكن ملاحظتها (مثل حركات تململ للقدمين أو التمايل والتأرجح من قدم إلى أخرى أو المشي أو عدم القدرة على الجلوس بثبات)، تتطور خلال بضعة أسابيع من بدء إعطاء الأدوية (مثلاً مضادات الذهان) أو رفع جرعتها (أو بعد تخفيض دواء مستخدم في علاج الأعراض خارج الهرمية).

#### خلل الحركة الآجل

(G24.01) Tardive Dyskinesia

حركات رقصيه الشكل أو كنعية لاإرادية (تستمر بضعة أسابيع على الأقل)، تحدث عادةً في اللسان أو القسم السفلي من الوجه أو الفك السفلي أو الأطراف (ولكنها أحياناً قد تشمل البلعوم أو الحجاب الحاجز أو الجذع)، والتي تتطور مترافقةً مع استعمال دواء مضاد للذهان لعدة شهور على الأقل.

قد تتطور الأعراض بعد فترة أقصر من استخدام الدواء لدى كبار السن. وفي بعض المرضى، قد تظهر حركات من هذا النوع بعد إيقاف، أو بعد تغيير أو تخفيض الجرعة، من الأدوية المضادة للذهان، وتسمى مثل هذه الحالة: خلل الحركة الناشئ عن سحب الأدوية المضادة للذهان. لأن خلل الحركة الناشئ عادة عن سحب الأدوية يكون محدداً زمنياً، فيستمر أقل من 4-8 أسابيع، إن خلل الحركة الذي يستمر إلى ما بعد هذه الفترة يعد خلل الحركة الآجل.

خلل التوتر العضلي الآجل  
Tardive Dystonia(G24.09)

الزلز الآجل  
Tardive Akathisia(G25.71)

المتلازمة الآجلة والتي تنطوي على أنواع أخرى من مشاكل الحركة، مثل خلل التوتر أو الزلز، والتي تتميز بتأخر ظهورها في مسار العلاج واحتمال استمرارها من أشهر إلى سنوات، حتى عند إيقاف أو تخفيض جرعة مضادات الذهان.

رُعاش الوضعة المحدث بالأدوية  
(G25.1)Medication-Induced Postural Tremor

رعاش ناعم (في مجال 8-12 هرتز) يحدث أثناء المحاولات الرامية إلى المحافظة على وضعية ما، وهو يحدث بالترافق مع استخدام الأدوية (مثل، الليثيوم، مضادات الاكتئاب، الفالبروات). وهذا الرعاش يشبه الرعاش المُشاهد في القلق، واستعمال الكافيين والمنشطات الأخرى.

اضطراب حركة آخر محدث بالأدوية  
(G25.79)Other Medication-Induced Movement Disorder

هذه الفئة مخصصة لاضطرابات الحركة المحدثة دوائياً وغير المصنفة تحت أي من الاضطرابات النوعية المدرجة أعلاه. تتضمن الأمثلة:

- 1- تظاهرات تشبه متلازمة مضادات الذهان الخبيثة مترافقة مع دواء من غير مضادات الذهان.
- 2- حالات آجلة أخرى محدثة بالأدوية.

## متلازمة قطع مضادات الاكتئاب

## Antidepressant Discontinuation Syndrome

(T43.205A) Initial encounter

(T43.205D) Subsequent encounter

(T43.205S) Sequelae

متلازمة قطع مضادات الاكتئاب هي مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تحدث بعد التوقف المفاجئ (أو الخفض الملحوظ في الجرعة) للأدوية المضادة للاكتئاب والتي كانت تؤخذ بشكل مستمر لمدة شهر على الأقل. تبدأ الأعراض عادة خلال 2-4 أيام وعادة ما تشمل تظاهرات حسية، جسدية، ومعرفية عاطفية محددة. ومن الأعراض الحسية الجسدية المتكررة والمزعجة والقلق والرهبة عادةً: ومضات من الضوء، "أحاسيس صدمة كهربائية" الغثيان، وفرط الاستجابة للضوضاء أو الضوء، مشاعر من القلق والرهبة غير المحددة.

تخف الأعراض عن طريق إعادة استعمال نفس الدواء أو بعد بدء استخدام دواء آخر ذو آلية علاجية مشابهة. على سبيل المثال، أعراض الانقطاع بعد سحب دواء من مثبطات عود التقاط السيروتونين - النورايينفرين يمكن تخفيفها من خلال البدء بمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة.

لتناسب الأعراض مع متلازمة قطع مضادات الاكتئاب، فلا ينبغي أن تكون قد وجدت قبل تخفيض الجرعة من مضادات الاكتئاب، ولا تُفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي آخر (مثل نوبة هوس أو تحت هوس، الانسحاب بمادة، سحب مادة، واضطراب

الأعراض الجسدية)

تأثير جانبي آخر لدواء

Other Adverse Effect of Medication

(T50.905A) تَعَرُّض بدئي

(T50.905D) تَعَرُّض لاحق

(T50.905S) عقابيل

تستخدم هذه الفئة لتسجيل تأثيرات دواء ما (عدا الأعراض الحركية) عندما تصبح هذه التأثيرات الجانبية مركزاً للاهتمام السريري. من الأمثلة: انخفاض ضغط شديد، اللانظميات القلبية، انتصاب القضيب المستمر.