


ألم ثلاثي التوائم (Trigeminal neuralgia)

يظهر هذا المرض في منتصف العمر وفي ثلثي الحالات بعد سن الخمسين، ومعدل الإصابة في النساء أكبر منها في الرجال. والعلامة المميزة لهذا الاعتلال هي وجود ألم انتيبيطاعي يستمر للحظات يظهر في منطقة مسار فرع أو فرعين من فروع العصب الثلاثي التوائم الأيسر والأيمن وغالباً ما يكون الفرع الثاني والثالث.



أماكن الإحساس
(الشكل ٢٠)

يؤدي اللمس الخفيف لبشرة الوجه أو للغشاء المخاطي أثناء غسل الوجه أو الحلاقة أو الأكل إلى ظهور نوبة الألم. كما يؤدي تكرار نوبات الألم إلى إعاقة المريض عن الحركة ونادراً ما يؤدي الألم إلى اضطراب النوم وعند ظهور الألم في سن الشباب (١-٣٪ من المصابين) يجب أن يوضع في الحسبان إمكانية

الألم

وجود مرض التصلب العصبي المتعدد (Multiple sclerosis) والذي نادراً ما يكون ألم العصب الثلاثي هو العلامة الأولى للمرض.

يتميز ألم العصب الثلاثي التوائم بما يلي:

- ألم انتيابي شديد في الوجه.
- اختفاء الألم ما بين النوبات.
- وجود مواقع مهيجة للألم.
- عدم وجود أي علامات عصبية.

العلاج:

- الأدوية مثل عقار التجرتول.
- التخدير الموضعي للعصب.
- الجراحة.



تخدير العصب
(الشكل ٢١)