

المصدر: البيان

التاريخ: ١٢ أكتوبر ٢٠٠١

فريق طبي هولندي وخبراء دوليون لرصد هجمات الجمرة الخبيثة


مدة هذه الحالة من 1 : 6 ايام من الرعشة، وتؤدي في معظم الحالات للموت بعد مدة زمنية تتراوح ما بين 24 : 36 ساعة، بعد ظهور الاعراض الاولى للمرض والسابق ذكرها، وثانياً عن طريق «الجروح»، ثم أخيراً عن طريق «القولون» بعد تناول اطعمة ملوثة ببكتريا مرض الجمرة الخبيثة وخاصة اللحوم.

من جهة ثانية مرض «الجمرة الخبيثة» كشفت مصادر أن المرة الأولى التي ظهر فيها هي اثناء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وذلك بسبب اجراء تجارب سرية قامت بها الحكومة البريطانية على الحرب الكيماوية، في منطقة بشمال غرب ساحل سكتلندا بجزيرة «جورينارد» التي وضعتها بريطانيا مدة 40 عاما تحت الحجر الصحي، لعدم تفشي الامراض وحماية سمعتها من النقد العالمي، كما تجري في الوقت الحالي استعدادات كبيرة في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية والبيولوجية في لاهاي، بمعرفة خبراء في الكشف عن الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ممن اشتركوا في لجان المراقبة على مثل هذه الاسلحة في العراق - يقوم هؤلاء الخبراء بتوفير المعلومات الضرورية الخاصة بالحماية من الامراض البيكتيرية شعوب دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كما واكبت هذه الاستعدادات اجراءات امنية واسعة النطاق بهولندا، وذلك عقب اعلان اجهزة الاستخبارات في هولندا وبلجيكا وبريطانيا حصولها على معلومات تفيد وجود خطط إرهابية تستهدف أوروبا، لشن هجمات عليها بالأسلحة البيولوجية.

لاهاي - سعيد السبكي:

أعدت السلطات الهولندية فريقاً طبياً تحسباً لهجمات جرثومية في اطار هستيريا الجمرة الخبيثة يضم الفريق اساتذة خبراء في أمراض البيكتريا، لمكافحة وحصر تفشي امراض وبائية، قد تنتج عن هجمات بيولوجية تطال هولندا وصرح البروفيسور «اوستيرهاوس» بالمستشفى الاكاديمي في جامعة «ايراسميس» بروتردام.

توجد 3 طرق للاصابة بمرض الجمرة الخبيثة اخطرها اصابة «القصبة الهوائية» ببكتريا المرض التي تنتشر في القصبة الهوائية على شكل بذور دقيقة جدا، ومن الممكن حدوث الاصابة دون ظهور اثارها الا بعد سنوات، واعراض المرض هي ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم، يصاحبه ارهاق شديد، وحالة من السعال، وتستغرق



صورة ميكروسكوبية نشرها معهد باستير الفرنسي لجرثوم الانتراكس المسبب للجمرة الخبيثة. أ. ف. ب.