

جدول التطعيمات والتحصينات الواجب إعطاؤها للطفل خلال العامين الأولين من العمر

نوع التطعيم	السن
١ - التطعيم ضد الجدري :	الثلاثة شهور الأولى
يطعم الطفل ضد الجدري بعمل بترتين على أن ينظر الطفل بعد سبعة أيام من تاريخ التطعيم ويعاد في حالة عدم النجاح ببثرة واحدة .	من العمر
٢ - التطعيم ضد الدرن :	
يطعم الطفل ضد الدرن بطعم بي.س. جي - حقناً في الجلد وبدون عمل اختيار تيوبركلين .	الشهر الرابع
التطعيم ضد شلل الأطفال : الجرعة الأولى الطعم المستعمل : الحي المروض « ساين » الجرعة : نقطتان على اللسان	
الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال مع الجرعة الأولى من توكسيد الدفتريا ومقدارها ١ سم حقناً تحت الجلد .	الشهر السادس
الجرعة الثانية من توكسيد الدفتريا ومقدارها ١ سم حقناً تحت الجلد .	الشهر السابع
الجرعة الثالثة من طعم شلل الأطفال الجرعة الثالثة من توكسيد الدفتريا ومقدارها ١ سم حقناً تحت الجلد .	الشهر الثامن
التطعيم ضد الحصبة الطعم . الحي للروض .	الشهر التاسع حتى الثاني عشر

جرعة واحدة مقدارها ٢/١ سم^٢ حقناً تحت
الجلد بأعلى الذراع

١ - جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال
مقدارها تقطتان .

٢ - جرعة منشطة من توكسيد الدفتريا
مقدارها ١ سم^٢ حقناً تحت الجلد .

الشهر ١٨ - ٢٤

☆ ☆ ☆