

الجهاز المناعي THE IMMUNE SYSTEM

مقدمة Introduction

إن وظيفة الجهاز المناعي تكمن في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الأحياء الدقيقة مثل البكتريا ، الفيروسات ، الفطريات ، والطفيليات . ويؤدي هذه الوظيفة الدفاعية كريات الدم البيضاء leucocytes وعدد من الخلايا المساعدة accessory cells المنتشرة في كافة أنحاء الجسم وتوجد على وجه التحديد في الأعضاء الليمفاوية بما في ذلك نخاع العظمي ، الغدة السعترية ، الطحال ، العقد الليمفاوية والأنسجة الليمفاوية المرتبطة بالأغشية المخاطية mucosa-associated lymphoid tissues (MALT) . وقد وجدت الأعضاء الليمفاوية بشكل إستراتيجي لحماية الأجزاء المختلفة للجسم من العدوى والأمراض . وتنقل هذه الخلايا ما بين هذه الأنسجة عن طريق مجرى الدم والجهاز الليمفاوي . وعندما تفعل ذلك فإنها تتفاعل مع بعضها البعض لتوليد استجابات مناعية تهدف إلى الحد من مسببات الأمراض pathogens أو الإقلال من الضرر الذي تسببه .

الكريات الليمفاوية lymphocytes

عبارة عن الخلايا الرئيسية التي تتحكم في الاستجابة المناعية. وهي تقوم بالتعرف تحديداً على المواد "الغريبة" وتمييزها عن مكونات الجسم الأخرى. وعادة أنها تتفاعل مع المادة الغريبة ولكن ليست ضد النسيج الجسدي. وللكريات الليمفاوية نوعان رئيسيان وهما: الكريات "بي" B التي تنتج الأجسام المضادة antibodies والكريات "تي" T التي لها عدد من الوظائف بما في ذلك:

- ١- مساعدة الكريات "بي" على إنتاج الأجسام المضادة.
 - ٢- التعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات وتدميرها.
 - ٣- تنشيط الخلايا البلعمية phagocytes لإتلاف مسببات الأمراض التي تناولتها.
 - ٤- التحكم في مستوى ونوعية الاستجابات المناعية.
- والخلايا الليمفاوية تتعرف على المواد الغريبة من خلال جزيئات المستضد antigen المستقبلية لسطح الخلية. ولأجل التعرف على العديد من الجزيئات المختلفة فإنه يلزم أن تكون مستقبلات المستضد متساوية التنوع.
- وتنتج كل خلية ليمفاوية نوعاً واحداً فقط من مستقبلات، المستضد antigen receptors ولذلك يمكنها التعرف فقط على عدد محدد جداً من المستضدات، ولكن بما أن المستقبلات تختلف في كل مستنسخ clone من الخلايا؛ فإن لمجموعة الخلايا الليمفاوية ككل عدداً هائلاً من مستقبلات المستضد المحددة والمختلفة. كما توجد مجموعة ثالثة تمثل العدد الأصغر من الخلايا الليمفاوية وهي (القاتلة الطبيعية NK Natural killer) تساهم هي الأخرى في الدفاعات المضادة للفيروسات.

الخلايا البلعمية Phagocytes

تشتمل الخلايا البلعمية على الخلايا الأحادية monocytes والخلايا الكبيرة macrophages وكريات بيضاء مصبوغة بالأصبغ المتعادلة neutrophils. ومن وظائفها

التهام مسببات الأمراض pathogens المستضد، ومخلفات الخلية ومن ثم تكسيرها . والأجسام المضادة والمكونات المتممة المتحددة مع هذه الجسيمات تسهل هذه العملية، وتجلب كذلك الكريات العملاقة المستضدات المنضوية للخلايا تي.

الخلايا المساعدة Accessory cells

تشتمل على الخلايا المحيية البيضاء granulocytes ، ألفة الصباغات القاعدية basophil والكريات البيضاء ألفة الإوسين eosinophil ، والخلايا البدينة mast cells ، والصفائح الدموية platelets والخلايا الجالبة للمستضد (APC) antigen-presenting cells . وللخلايا أو الكريات البيضاء من نوع eosinophil دورٌ في إلحاق الضرر بالطفيليات والتحكم في الالتهاب. في حين أن الخلايا البيضاء ألفة الصباغات القاعدية ، والخلايا البدينة ، والصفائح الدموية تحتوي على مجموعة من الجزيئات التي تقلل الالتهاب، ومن ثم فإنها في غاية الأهمية في ربط الاستجابات المناعية مع تفاعلات الالتهابات. وتحتوي الخلايا الجالبة للمستضد APC على العديد من الأنواع الخلوية التي تولد المستضد للخلايا الليمفاوية. وتتفاعل كافة أنواع الخلية هذه لتولد استجابة مناعية فاعلة.

الخلايا الليمفاوية Lymphocytes

تتكون الخلايا الليمفاوية من حوالي ٢٠٪ من إجمالي كريات الدم البيضاء . والنوعان الرئيسيان للخلايا الليمفاوية هما: الخلايا بي، والخلايا تي. وهما خلايا ليمفاوية صغيرة مسئولة عن التعرف على المستضد أو جزيئات من المستضد. والنوع الثالث للخلايا الليمفاوية هو الخلايا المحيية الكبيرة large granular lymphocytes (LGL) ، فإنه يتعرف على التغيرات التي قد تحدث في خلايا العائل عندما تصبح هذه الخلايا مصابة.


الخلايا الليمفاوية المحيية الكبيرة (LGLs) Large granular lymphocytes

عبارة عن خلايا محددة الشكل الظاهري وتحتوي على كمية كبيرة من السيترولازم والحبيبات المحيية للصبغة الأزورية azurophilic وتشكل ٥ - ١٥٪ من

الخلايا الليمفاوية للدم. ولكل من الخلايا القاتلة الطبيعية NK وخلايا تي جاما دلتا $\delta\gamma$ T شكل ظاهري خاص بها .

الخلايا تي T cells

عبارة عن الخلايا الليمفاوية التي تنمو في الغدة السعترية ويغذي هذا العضو بالخلايا الجذعية الليمفاوية lymphocytic stem cell من نخاع العظمي bone marrow أثناء النمو الجنيني. وبعدها تنمو الخلايا وتكون مستقبلات مستضد الخلية تي الخاصة بها (TCR) T-cell antigen receptor وتتشعب إلى مجموعتين فرعيتين رئيسيتين من الخلية تي المحيطة، إحداهما تنتج المؤشر سي دي ٤ CD4 والأخرى تنتج سي دي ٨ CD8 .



الشكل رقم (١،١). الخلايا المشاركة في عملية الاستجابة المناعية . الخلايا البلعمية الكبيرة بإذن من

البروفيسور A.V Hoffbrand .

كذلك تتميز الخلايا تي إلى مجموعتين حسب النوع المستخدم من مستقبل المستضد إذا ما كان ألفا بيتا (مستقبلية المستضد الثانية) $\alpha\beta$ (TCR2) أو جاما دلتا (مستقبلية المستضد الأولى) $\delta\gamma$ (TCR1). والدور الأساسي للخلايا تي هو التعرف على المستضدات المولدة من داخل خلايا العائل.



الشكل رقم (١,٢). أنواع الخلايا الليمفاوية في الدم.

الخلايا تي جاما دلتا $\gamma\delta$ T-cells

تعتبر عن $\gamma\delta$ من مستقبلية الخلايا تي TCR. وتشكل نسبة صغيرة (>5%) من مجموع الخلايا تي ولكنها تشكل شريحة أكبر في مواقع معينة بما في ذلك الأمعاء، والبشرة، والمهبل. وتتفرع عادة بمرحلة مبكرة من مسار النمو السعري الرئيسي وتتعرف على المستضدات المختلفة من الخلايا تي $\alpha\beta$ بما في ذلك الكربوهيدرات والبروتينات الكاملة. والأبعد من ذلك أن بعض الخلايا تي جاما دلتا $\gamma\delta$ لا تحتاج أن يستجلب المستضد من قبل جزيئات معقد التوافق النسيجي الأعظم major histocompatibility complex (MHC).

الخلايا الليمفاوية الطلائية الداخلية Intraepithelial lymphocytes

وهي عبارة عن مجموعات مختلفة من الخلايا الليمفاوية الموجودة في الأنسجة المخاطية الفرعية. وهنالك نسبة ما بين 10 - 40% من الخلايا $\gamma\delta$ ذات شكل متغصن dendritic. أي لها العديد من العمليات الإضافية. وغالبية النسبة المتبقية من الخلايا تكون CD8^+ T.

الخلايا في السامة cytotoxic T (Tc)

وهي قادرة على الفتك بالخلايا المستهدفة المصابة بالفيروسات أو الخلايا المتباينة وراثيا allogeneic. ومعظم الخلايا Tc تنتج سي دي ٨ CD8 و تتعرف على المستضد المرتبط بجزيئات الفئة الأولى من MHC. وتتميز المجموعات الفرعية من (Tc Te1, Te2) حسب إنتاج السيتوكين الخاص بها.

الخلايا في المساعدة T helper (T_H)


هي الخلايا الليمفاوية تي التي تساعد الخلايا بي على الانقسام والتمايز وإنتاج الجسم المضاد. وهناك مجموعة أخرى تسبب تنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة ، جاعلة إياها فتك بمسببات الأمراض pathogens التي تناولتها. وغالبية الخلايا تي المساعدة T_H تنتج سي دي ٤ CD4 ، وتعرف على المستضد المجلوب على سطح الخلايا الجالبة للمستضد APC بالاشترك مع جزيئات الفئة الثانية المشفرة للمتوافق النسيجي الأعظم (MHC).

الخلايا في المساعدة الصفيرية / في المساعدة الأولى / في المساعدة الثانية

T_H0/T_H1/T_H2 cells

عبارة عن مجموعات ثانوية من الخلايا المساعدة تي المميزة أصلا حسب مزيج السيتوكينات التي تنتجها. وتتفاعل T_H1 بفاعلية أكبر من الخلايا البلعمية الكبيرة الأحادية النوى. وذلك من خلايا إفراز الإنتروفيرون جاما (IFN-γ) الذي يقوم بدور العامل المنشط للخلية البلعمية الكبيرة. وتطلق الخلايا T_H2 السيتوكينات مثل الإنترليوكين (IL) -4 و 5 المطلوبة لأجل التمايز differentiation للخلية بي B. وبوسع كلا النوعين تحفيز نمو الخلايا السامة للخلية cytotoxic وبوسع النوعين تكوين استجابات أجسام مضادة من خلال التأثير على الفئات الفرعية للهيموجلوبين المنتج من الخلايا بي. ويعتقد بأن الخلايا T_H1 و T_H2 تنمو من الخلايا T_H0. إن السيتوكينات مثل IL-12 تحفز نمو الخلايا T_H1 في حين أن IL-4 تميل إلى توليد الخلايا

T_H2 . وتنتج بعض المؤشرات السطحية الخلوية في كلتا المجموعتين الفرعيتين ، منها مثلاً $CD26$ والمستقبلات الكيموكينية $CCR5$ kemokine receptors و $CXCR3$ تكون أكثر شيوعاً على الخلايا T_H1 في حين أن المستقبلات $CCR3$ و $CCR4$ أكثر شيوعاً على الخلايا T_H2 .



الشكل رقم (٣، ١). تفاعلات الخلايا الليمفاوية Lymphocytes interaction.

الخلايا المثبطة T Suppressor (Ts) cells

وقد عرفت وظيفياً على أنها الخلايا تي T التي تخفف من تنظيم حركات الخلايا الأخرى تي T و بي B . وليس هنالك مؤشر فريد لهذه المجموعة من الخلايا ويعتقد بأن التثبيط هو الواجهة لحركات الخلايا تي المساعدة T_H و تي السامة T_C .

الخلايا بي B cells

عبارة عن الخلايا الليمفاوية التي تنمو في الكبد ومن ثم في النخاع العظمي. أما في الطيور فإن الخلايا B تنمو في عضو متخصص وهو كيس لنصيه ، هذا وتنتج خلايا بي البالغة الجلوبيولين المناعي السطحي الذي يعمل كمستقبل لها . وتوزع على كامل الأنسجة الليمفاوية الثانوية وخاصة في جزيئات العقد الليمفاوية والطحال ، وتتجاوب مع محفزات المستضد من خلال الانقسام والتمايز إلى الخلايا البلازمية. **الخلايا البلازمية/ الخلايا المكونة للأجسام المضادة**

Plasma cells /Antibody-forming cells (AFC)

عبارة عن خلايا مميزة طرفياً من الخلايا بي B . ولها سيتوبلازما ممتدة مكونة أشعة مميزة متوازية من شبكة إندوبلازمية خشنة ومخصصة تماماً لإنتاج الجسم المضاد المرز. وتشاهد خلايا البلازما في اللب الأحمر من الطحال وفصوص العقد الليمفاوية والنسيج الليمفاوي المرتبط بالمخاطية MALT وأحياناً في مواقع الالتهابات.

الخلايا بي ١ و بي ٢ B1 and B2 cells

عبارة عن مجموعات فرعية للخلية بي . فلدى البالغين تكون غالبية الخلايا بي عبارة عن المجموعة الفرعية B2 . وتولد هذه مجموعة واسعة من مستقبلات المستضد والتي تنضج في مراكز الإنبات germinal centers وتتجاوب جيداً مع المستضدات المعتمدة على T والمحفزة المساعدة بواسطة سي دي ٤٠ CD40. وهنالك مجموعة صغيرة من الخلايا B تنتمي إلى المجموعة الفرعية بي ١ B1 التي تتميز في الأصل بالنمط CD5⁺ CD43⁺ و CD23⁻. وتنمو هذه الخلايا مبكراً وبها مجموعة محددة من المستقبلات المتجاوبة مع عدد من المستضدات الميكروبية العادية وأحياناً تولد أجسام مضادة ذاتية. كما أنها لا توجد في العقد الليمفاوية وتشكل نسبة ٥٪ من الخلايا بي B الطحالية وتعد في غاية الأهمية في المناعة المخاطية. أما في الفئران فإن بعض خلايا B1 تفتقد إلى CD5 وتنقسم بالتالي إلى B1a (CD5⁺) و B1b (CD5⁻) .

الخلايا الليمفاوية البكر/الفطرية Naive/Virgin lymphocytes

عبارة عن الخلايا التي لا تواجه مستضدها المحدد، وتظهر متغيرات بوزن جزئي عالي لمستضد الخلية البيضاء المعروفة مثل CD45RA .

خلايا الذاكرة Memory cells

عبارة عن مجموعة من الخلايا المعمرة طويلاً من تي أو بي المحفزة مسبقاً بواسطة المستضد والتي تقوم باستجابة متسارعة لذلك المستضد إن واجهته ثانية، وتنتقل خلايا الذاكرة بي B كلا من الجلوبيولين المناعي جي IgG، أو الجلوبيولين المناعي أي IgA السطحية كمستقبل لمستضدها وبعد هذا ذا ألفة عالية من IgM و IgD على الخلايا الليمفاوية البكر. وتنتج خلايا الذاكرة تي المتغير الشائع CD45R0 لمستضد الخلايا البيضاء الفطرية وكذلك المستويات المتزايدة من جزئيات الالتصاق بما في ذلك مستضد الخلايا الليمفاوية الفاعل -3 LFA-3 والمستضد المتأخر جد-4 VLA-4 وعلى ما يبدو أن لخلايا الذاكرة نوعاً من القدرة على التجدد الذاتي وتعتمد الذاكرة المناعية على كل من إنتاج خلايا الذاكرة والزيادة في أعداد الخلية الناتجة بعد الاستجابة الأولية.

الاختيار الاستنساخي Clonal selection

هي الطريقة التي من خلالها تنشط خلايا ليمفاوية معينة وأثناء عملية النمو تولد كل خلية ليمفاوية مستقبلاً مستضداً مخصصاً لمستضد معين إلا أن مجموعة الخلايا برمتها بها مجموعة واسعة جداً من الوظائف المختصة. ويتحد المستضد تحديداً مع بعض الخلايا، وتستحث هذه المستنسخات وحدها لأجل الانقسام ومن ثم تولد مجموعة واسعة من الخلايا المؤثرة وخلايا الذاكرة. ومن ثم فإن المستضد يختار مستنسخات معينة تعمل ضده.

الخلايا القاتلة الطبيعية إن كي Nk Cells

خلايا المجموعة الصفيرية (غير تي T ، غير B) / المجموعة الثالثه

Null(non-T, non-B) cells/ Third population cells

توصف مجموعة مميزة من الخلايا الليمفاوية التي تشكل ما نسبته ٥ - ١٥٪ من الخلايا أحادية النوي في الدم. وتفتقد هذه الخلايا إلى مستقبلات المستضد إلا أنها تظهر بعض مؤشرات روابط الخلية تي أو البلعمية أحادية النوى. وحوالي من سبعين إلى ثمانين بالمائة من هذه المجموعة لها شكل الخلايا الليمفاوية الحبيبية الكبيرة large granular lymphocytes (LGL). ومن الناحية العملية فإنها تقوم بدور القاتلة الطبيعية (NK) أو الخلايا القاتلة (K).

الخلايا القاتلة الطبيعية NK (Natural killer) cells


خلايا قادرة على قتل مجموعة من الخلايا المستهدفة المصابة بالفيروسات أو المحولة وخاصة الخلايا التي فقدت أو قللت من ظهور شكل الجزئيات MHC من الفئة الأولى أو بها الجزئيات MHC . ومن ثم فإنها توفر الخط الثاني الدفاعي ضد الفيروسات التي تحاول غزو الجهاز المناعي بالخلايا Tc من خلال تثبيط تنظيم شكل الجزئيات MHC . وتقوم الخلايا NK بقتل أهدافها مستخدمة آليات مماثلة لتلك التي لدى الخلايا تي السامة ، مع مكونات حبيبية هي الأكثر أهمية (ص ١٢٣-١٢٨).

مستقبلات المثبطات ومحفزات القاتل (كار، كير)

Killer inhibitory and Killer-activating receptors (KIR, KAR)

تستخدم من قبل الخلايا NK للتعرف على أهدافها. وهنالك نوعان من KIR ، فإما تكون الليستينات نوع C (مثل المتكثف الثنائي CD94/NKG2 dimer) أو الجزئيات المنتمية إلى العائلة العليا للجلوبولين المناعي (CD158) مع نوعين أو ثلاثة من الفروع الخلوية الخارجية. ويميز كلا نوعي KIR مجموعة من جزئيات الفئة الأولى من MHC وتمرر إشارة للخلية NK كي تثبط مفعولها القاتل cytotoxic . منها على سبيل المثال أن

المكثف الثنائي (dimer) CD94/NKG2 يميز جزئيات مستضد الخلايا البيضاء البشرية (إيتش إل آي إي HLA-E). وبما أن الجزئيات MHC متنوعة ، لذا فإن بها جزئيات KAR التي تتعرف عليها. وهناك العديد من المواقع الجينية gene loci التي تشفر KIR CD158 (والعدد متفاوت ما بين الأفراد) والكثير من الأشكال المتعددة. وتنتج كل خلية NK مجموعة فرعية من مستقبلات الخلية NK الموجودة ومن ثم تدرك فقدان أو التغيرات في إحدى مجموعات جزئيات MHC .



الشكل رقم (٤، ١). الاختيار الكولوني ونمو الخلايا الليمفاوية.

كذلك قد تنتج خلايا تي المستقبلات المثبطة للقاتلة (KIR) Killer inhibitory receptors بعد التنشيط بواسطة المستضد . وبعض الأنواع المختلفة من KIR تفتقد لجزء خلوي داخلي مطلوب لأجل تثبيط التأثير السام للخلايا وتسمى بمستقبلات منشطة القاتل (KAR) Killer-activating receptors . وهناك أيضاً عدد من المستقبلات الأخرى بما في ذلك CD2 ، CD69 و CD16 (طالع الخلايا K أدناه) تجعل خلايا NK تتحد مع الأهداف الفاعلة النشطة. وتتجاوب خلايا NK مع كمية الإشارات من المستقبلات المحفزة والمثبطة لأجل التفاعل المناسب مع خلايا الجسم و التعرف على المتغيرات الحادثة في إنتاج MHC.

الخلايا كاي (القاتلة) K- Killer

عبارة عن الخلايا البيضاء التي تقوم بقتل الخلايا المستهدفة التي لديها حساسية من الأجسام المضادة التي تدركها مستخدمة مستقبلاتها F_C ، ومعظمها من الخلايا NK المستخدمة مستقبلها (CD16) F_C كي تتحد مع الجسم المضاد على الخلية المستهدفة. كذلك تقوم الخلايا البلعمية الكبيرة والكريات البيضاء الإيوسينية بدور الخلايا K حيث بها المستقبلات F_C وتفرز الجزيئات السامة للخلايا القادرة على قتل الخلايا الحساسة أو الطفيليات عديدة الخلايا.

المؤشرات Markers


نظام المؤشر الجيني CD system

يتم التمايز differentiation للخلايا البيضاء من خلال جزيئاتها الخلوية السطحية التي تعرف بالأجسام المضادة أحادية المستسخ monoclonal . والمؤشر الأكثر بروزاً للخلايا البيضاء هو مستقبلة المستضد بها : فالخلايا بي تستخدم الهيموجلوبين المناعي السطحي والخلايا تي تنقل مستقبلة المستضد للخلية تي (TCR). أما أنواع المؤشرات الأخرى فإنها مخصصة حسب نظام CD للتسمية. وبعض أنواع المؤشرات هذه مخصصة لمجموعات فردية من الخلايا أو مراحل معينة من التمايز الخلوي. وتظهر أنواع أخرى

فقط على الخلايا المنشطة أو المنقسمة. وهناك العديد من أنواع المؤشرات CD التي توجد بمستويات مختلفة على العديد من أنواع الخلايا المختلفة، لذا فإن كل مجموعة فرعية من الخلايا الليمفاوية تنتج شكلاً إجمالياً فريداً من المؤشرات السطحية. وقد جرى التعرف على ما يزيد على ٣٠٠ من الجزئيات الفردية في سلسلة CD ويوجد بعضها على الخلايا غير الخلايا البيضاء. والجداول أدناه وما قبلها تبين الأنواع وكيفية الانتشار الخلوي لأكثر جزئيات CD أهمية. وعلى وجه الخصوص هذه الجزئيات التي تستخدم لتمييز الخلايا تي (CD2, CD3) T_H، والمجموعات الفرعية الرئيسة للخلية تي (CD4, CD8) T_H والخلايا T المنشطة (CD25) والخلايا بي (CD19, CD20) والخلايا البلعمية أحادية النوي (CD64, CD68).

فصائل البروتينات Families of proteins

على الرغم من العدد الهائل من الجزئيات السطحية الخلوية فإن معظمها ينتمي إلى عدد قليل من الفصائل التي لها سمات تركيبية مشتركة. وتشتمل تلك العائلات على العائلة العليا للجلوبولين المناعي، عبر الغشاء Y (IgSF), tm4, (Transmembrane) tm7، اللكتينات النوع سي C، وسيط الالتصاق integrins وبروتينات التحكم في الكمل (الشكل رقم ١,٥).



الشكل رقم (١,٥). فصائل الجزئيات السطحية للخلية مع الأمثلة.

الخلايا الجالبة للمستضد (APC) Antigen-Presenting Cells

الخلايا الجالبة للمستضد عبارة عن الخلايا المحددة وظيفتها (APC) والتي تتناول المستضدات وتقدمها للخلايا الليمفاوية على الشكل الذي تدركه. وبعض المستضدات تؤخذ من قبل APC في المحيط لها وتنقلها إلى الأنسجة الليمفاوية الثانوية حيث إن APC الأخرى تمكث في هذه الأنسجة وتقاطع وتعرض المستضد حال وصوله. في حين أن الخلايا B تتعرف على المستضد في مهده، فالخلايا T_H تتعرف على البيبتيدات المستضدية المرتبطة بجزئيات MHC ومن ثم كي تقدم المستضد للخلية T_H ، فإن على APC أن يهيئها موضعياً وأن يحولها لشذرات ويعيد إبرازها على سطح الخلية بالارتباط مع جزئيات الفئة الثانية MHC. أضف إلى ذلك أن العديد من APC تعطى إشارات محفزة مصاحبة للخلايا الليمفاوية سواء بواسطة التفاعلات الخلوية المباشرة أو بواسطة السيتوكينات cytokines. وقد تقوم الخلايا المتغصنة dendritic، الخلايا البلعمية الكبيرة، الخلايا بي B وأحياناً خلايا النسيج يجلب المستضد للخلايا T_H .

الخلايا المتغصنة (دي سي) (DC) Dendritic cells

عبارة عن مجموعة مميزة من APC المنتشرة في العديد من أنسجة الجسم. وتتميز differentiated من بادئات precursors الطلائع الليمفاوية أو النخاعية myeloid. والخلية المتغصنة الكفية (IDC) الموجودة في مناطق الخلية تي من الغص الليمفاوي عبارة عن عضو لهذا الرابط. وتنتج IDC الجزئيات MHC من الفئة الثانية والجزئيات المحفزة المساعدة مثل (B7)، لذا فإنها نشطة جداً في جلب المستضد إلى الخلايا تي البكر ($CD4^+T$). ويعتقد بأن الخلايا المتغصنة النسيجية ترتحل للعقد الليمفاوية حاملة معها المستضد وتقوم عندها بتنظيم الجزئيات المطلوبة لتنشيط الخلية تي T.

الجهاز المناعي

CD	تعريف / وظيفة	نوع الخلية				
		خلايا T	خلايا B	خلايا NK	خلايا DC	خلايا أخرى
CD1	جلب مستضدات البروتينات الدهنية	Thy				IDC
CD2	الارتباط بـ CD 9A أو CD 9A. الأستحداث المشترك					
CD3	مستقبل مستضدات الخلية T (TCR)، نقل الإشارة					
CD4	مستقبل الفئة الثانية من متوافق التمييز الأعمق					
CD5	نقار الجمجمة الفرعية للخلايا B					
CD8	مستقبل الفئة الثانية من متوافق التمييز الأعمق MHC					
CD11a	المستقبل المناعي للخلايا البطيئة-1 سلسلة وسط الاتصال الخا					
CD11b	جزء اتصال MAC-1، سلسلة وسط الاتصال الخا					
CD11c	جزء اتصال CR3، سلسلة وسط الاتصال الخا					
CD13	إيزو أسيبرين N					
CD14	مستقبل للخلايا عديدة السكر					
CD15	LEWIS X، الارتباط بـ ساكنين E					
CD16	مستقبله الجلوبولين المناعي من فصيلة الأنتي PCRIII					
CD18	وسط الاتصال بيتا-2 (تقريباً CD 11)					
CD19	مركب مشترك المستقبل لخلايا B (تقريباً CD 21، 22، 24)					
CD20	تنظيم خلايا B					
CD21	مركب مشترك للمستقبل لخلايا B					FDC
CD23	مستقبله الجلوبولين المناعي من فصيلة الأنتي PCRII					Ea
CD25	سلسلة الأنتي كين 2-1، RA IL	*	*	*		
CD28	الارتباط بـ CD 80، 86، الأستحداث المشترك			*		
CD29	وسط الاتصال بيتا-1 (تقريباً CD 4)					
CD30	تنظيم نواتج وموت الخلايا	*	*			
CD31	بيك، PECAM، تنظيم الاتصال					End
CD32	المستقبله فصيلة الأنتي PCRII					
CD34	الاتصال الخا					End
CD35	سلسلة الأنتي كين 1-1، جزئ اتصال CR1					FDC
CD37	نقل الأنتار					
CD38	أنتي ADP، البيوريزي الخلقى تنظيم الخا	*	PC			
CD40	الارتباط بـ CD 134، الأستحداث المشترك					IDC
CD43	ليو كوساين					
CD44	الاتصال الخا					
CD45	المستضد الشائع لكريات الدم البيضاء (SCA)					
CD45R	المستضد الشائع لخلايا البيضاء، LCA الخا					
CD46	العامل المساعد للخفا (MCP)					
CD48	الارتباط بـ CD 7 الخا					
CD49a	المستضد الخا، جزئ 1، وسط الاتصال الخا	*				
CD49b	المستضد الخا، جزئ 2، وسط الاتصال الخا	*				
CD49c	المستضد الخا، جزئ 3، وسط الاتصال الخا					
CD49d	المستضد الخا، جزئ 4، وسط الاتصال الخا، بغير ليكتين	*				
CD49e	المستضد الخا، جزئ 5، وسط الاتصال الخا، بغير ليكتين					
CD49f	المستضد الخا، جزئ 6، وسط الاتصال الخا، بغير ليكتين					
CD50	PCAM، الأستحداث المشترك					

الشكل رقم (٦، ١). أنواع المؤشر CD.

خلايا لانجرهانسز (الخلايا المقنعة) (Langerhans cells (Veiled)

عبارة عن الخلايا المتغصنة النخاعية للبشرة أو الجلد والتي تلتقط المستضد وتنقله إلى العقد الليمفاوية الإقليمية. وتنتج CDI ومستويات عالية من جزئيات MHC الفئة الثانية ولها حبيبات على شكل المضرب وحبيبات بيريك (مجهولة الوظيفة) أما في الليمفاوي الحامل فإنها تبدو كخلايا مقنعة وفي العقد الليمفاوية تنمو إلى خلايا متغصنة. وهي ذات أهمية خاصة من حيث عملية نمو الحساسية الزائدة للتماس وتستحث عوامل حساسية الجلد للارتحال منه.

الخلايا البلعمية الكبيرة الجالية للمستضد Macrophage APC

الخلايا البلعمية الكبيرة تبلعم المستضد ويوسع بعضها معالجته وجلبه. وتحفز MHC من الفئة الثانية بعد التحفيز بواسطة المركبات الميكروبية. وعادة ترى المتبلعمات الكبرى المنظمة للأنسجة الثانوية الليمفاوية في لب العقد الليمفاوية والفص الأحمر (لب) الطحال. وهي نشطة في توفير المستضدات لخلايا TH1 التي كانت سابقا حساسة بفعل الخلايا المتغصنة. وتقوم الخلايا المتبلعمة الكبرى المنشطة بتنظيم الجزئيات المنشطة بما في ذلك B7 و ICAM-1 و تفرز الإنترلوكين ١ IL-1 .

الخلايا المتغصنة الجرابية (FDC) Follicular dendritic cells

توجد هذه الخلايا في الطحال وحوصلات العقد الليمفاوية وتبدو محاطة بدرجة محكمة بالخلايا الليمفاوية. وتستقر المعقدات المناعية المثبتة على سطح هذه الخلايا بواسطة المستقبلات Fc و C3 حيث إنها تعطي بالشكل الأساس للخلايا B. وهذا الشكل من تموضع المعقد، ومظهره مهم في نمو خلية الذاكرة بي B .

الأيكوسومات Iccosomes

تراكيب سيتوبلازمية سبحية موجودة على الخيوط الكاذبة للخلايا المتغصنة الحويصلة (FDC) والتي يعتقد بأن لها دوراً طويلاً الأمد وضاعياً الأصل للمستضدات. وهي تبرعم أمام وربما تنضوي بفعل الخلايا بي .

الخلايا البلعمية الكبيرة للمنطقة الهامشية Marginal zone macrophages

توجد في المنطقة الهامشية للغمد الليمفاوي الطحالي وعلى امتداد الجيب الهامشي للعقد الليمفاوية. والمستضدات المستقلة عن تي مثل عديد السكريات فإنها تستوطن على هذه الخلايا حيث من النادر أن تكون موجودة دائماً. وتظهر الخلايا البلعمية الكبيرة للمنطقة الهامشية الالتصاق اللعابي ومستقبلاً يشبه اللاكتين للمتزاوجات السكرية glycoconjugates وتوفر المستضدات أساساً للخلايا بي.

الخلايا الجالبة للمستضد اختياري APC Facultative

إن العديد من خلايا الجسم تحفز وتنشط لإعطاء MHC الفئة الثانية عندما تستحث بالإنترفيرون جاما $IFN-\gamma$. وأحياناً تجلب المستضد للخلايا $CD4^+T$ ورغمما من فشلها في تحفيز انقسام الخلية تي بسبب عدم قدرتها على إرسال إشارات محفزة. كذلك فإن جلب المستضدات من قبل تلك الخلايا يجعلها عرضة لتسمم الخلايا بواسطة الخلايا تي.

الخلايا الجالبة للمستضد	مكان التواجد location	سبب التفاعل لأصل الخلية T MHC class II	جزيئات الاستحداث المساعدة co-stimulatory molecules	تجلب إلى present to:
خلايا منسلة نامحية interdigitating dendritic cell	طوق نفرة العقدة الليمفاوية lymph node cortex	++	تي 1-7 بي 2-7 أيكام-1-أيكام-2 B7.1 B7.2 ICAM-1 ICAM-3	خلية تي الأصلية naive T cell
الخلية بي B cell	مركز الإنبات germinal centre	+ → ++	تي 1-7 بي 2-7 أيكام-1-أيكام-2 B7.1 B7.2 ICAM-1 inducible	الخلية تي T cell
الخلية البلعمية الكبيرة macrophage	الأنسجة والأعضاء اللمفية tissues and lymphoid organs	0 → ++	بي 1-7 بي 2-7 3-المتسخت أيكام-1 B2 inducible ICAM-3 ICAM-1 inducible	الخلية تي T cell
البلعمة الكبيرة للمنطقة الهامشية marginal zone macrophage	المنطقة الهامشية للطحالي والعقد اللمفية marginal zone of spleen and lymph node	-	-	T-ind exp → B cell
الخلايا الملتهبة الجرابية follicular dendritic cell	مركز الإنبات germinal centre	-	مخويات الأيكوسوم (مثل C1q) icosomes (complement C1q, C3)	الخلية بي B cell


الشكل رقم (١,٧). الخلايا الجالبة للمستضد.

Phagocytes And Auxiliary Cells المساعدة والخلايا البلعمية

جهاز الخلايا البلعمية أحادية النوى/ الطلائية الشبكية

Mononuclear phagocyte system (MPS) / Reticuloendothelia system

جهاز الخلية البلعمية أحادية النوى (MPS) والجهاز الشبكي المناعي عبارة عن مصطلح للدلالة على الخلايا البلعمية طويلة الأجل المنتشرة على امتداد أعضاء الجسم. وهي نابعة من الخلايا الجذعية للنخاع العظمي وتظهر المستقبلات للجلوبيولين المناعي (FC γ R1) والمكملات (CR1, CR3, وغالبا CR4). وهي عبارة عن جسيمات مستضدة بلعمية كبيرة، ومنها ما له القدرة على جلب المستضد للخلايا الليمفاوية. وتشتمل هذه المجموعة على:



الشكل رقم (١،٨). جهاز الخلايا البلعمية الكبيرة وحيدة النواة.

الخلايا الأحادية Monocytes

عبارة عن خلايا دوارة circulating تشكل ما نسبته ٥٪ من إجمالي الخلايا (الكريات) البيضاء بالدم والقادرة على الارتحال للأنسجة لتصبح خلايا بلعمية كبيرة. ولهذه الخلايا نوى تشبه حدوة الفرس وحببيات محبة لصبغة الأزور (azurophilic) والعديد من الليسومات.

الخلايا البلعمية الكبيرة Macrophages

عبارة عن خلايا بلعمية كبيرة توجد في معظم الأنسجة وتجاويف المظنة (serous) وبالرئة. والخلايا البلعمية الكبيرة المتوطنة قد تبقى في الأنسجة لسنوات في حين تقوم أخرى بالدوران بداخل الأنسجة الليمفاوية الثانوية وربما تقوم بأداء وظيفة الخلايا الجالبة للمستضد APC .

خلايا كوبفر Kupffer cells

عبارة عن الخلايا البلعمية الكبيرة الواقعة على امتداد تراكيب الكبد والمستضد الذي يدخل الجسم عن طريق الأمعاء يزال بواسطة هذه الخلايا.

الخلايا البلعمية الكبيرة الكيبية Mesangial phagocytes

تحافظ على توازن الظاهرة الكيبية عندما تدخل الشعيرات كبسولة بومان.

الخلايا الداعمة للنسيج العصبي الدقيق Microglial cells

عبارة عن خلايا بلعمية كبيرة متوطنة في المخ. وعادة ما يحدث استيطانها قبل الولادة وفي الفترة الجنينية (Neonatal).

الخلايا الزليلية ألف Synovial A cells

خلايا بلعمية تقع في الزليل وفي التماس مع السائل الزليلي.

الخلايا الحبيبية (متعددة الأشكال) (Granulocytes polymorphs)

تعرف من خلال نواتها المتعددة الفصوص والحبيبات السيتوبلازمية الكثيرة وتشكل غالبية كريات الدم البيضاء. وتقسم حسب الصبغة كالتالي:

الكريات البيضاء ذات الصبغة المتعادلة Neutrophils: عبارة عن خلايا بلعمية كبيرة متخصصة والأكثر وفرة بين الكريات البيضاء (أكثر من ٧٠٪). وتقضي أقل من ٤٨ ساعة في الدورة الدموية قبل الارتحال للأنسجة في ظل وجود تأثير المستحثات الكيميائية حيث إنها تبلعم المادة ثم تموت بعد ذلك. ولها أيضا مستقبلات للأجسام المضادة والمكملة لتسهيل عملية أخذ الجسيمات.

الكريات البيضاء التي تألف الإيوسين Eosinophils: عبارة عن خلايا تشكل ٢-٥٪ من كريات الدم البيضاء. وتحتوي حبيباتها على جوهرة كريستالي من البروتين الأساسي الذي يفرز خارج الخلية مسببة التلف لعدد من مسببات الأمراض (pathogens) وخاصة الطفيليات. كما أن الحبيبات تحتوي على أنزيم الهستامين وأنزيم الأريل كبريتاز (aryl sulphatase) الذي يهدئ ويخفف من تفاعلات الآلام.

الخلايا البيضاء التي تؤلف الصباغات الأساسية Basophils: تشكل أقل من ٥٪ من كريات الدم البيضاء. وتحتوي حبيباتها على وسائط الالتهاب وتعمل بطرق ما وظيقياً بما يشبه الخلايا البدينة.

الخلايا البدينة Mast cells

توجد هذه الخلايا في معظم الأنسجة المجاورة للأوعية الدموية. وتحتوي على عدد كبير من الحبيبات مع وسائط الالتهابات مثل الهستامين و PAF التي تفرز بواسطة الاندماج مع C3a و C5a أو بواسطة الرابط المقطعي لرابط Ige السطحية مع مستقبلاتها

(Fce R1) ذات الألفة العالية . كما أن الاستحاثات يجعلها تنتج كلاً من البروستجلاندين (فئة سداسية من الأحماض الدهنية في الجسم) واللوكيوتريز (prostaglandins and leukotrienes). وهناك نوعان من الخلية البدينة التي يعتقد بأنها تابعة من بادئات مشتركة.

الخلايا البدينة للنسيج الضام (CTMC) Connective tissue mast cells

وهي الخلية البدينة الرئيسية المثبتة للنسيج. وهي منتشرة في كافة الأوعية الدموية وتحتوي على كميات هائلة من الهستامين والهيبارين. وتثبطه بواسطة كروموجليجات الصوديوم (sodium cromoglycate).


الخلايا البدينة المخاطية (MMC) Mucosal mast cells

توجد هذه الخلايا في الأمعاء والرئة وتعتمد على كل من IL-3 و IL-4 لانتشارها وتزداد أثناء الإصابة بالطفيليات.

الجهاز الليمفاوي lymphoid System

الأنسجة الليمفاوية الأولية والثانوية Primary and secondary lymphoid tissue

تنبع الخلايا الليمفاوية من الخلايا الجذعية للنخاع العظمي وتنمو أصلاً في الأنسجة الليمفاوية الأولية وهما الخلايا تي في الغدة السعترية والخلايا بي في النخاع العظمي. والخلايا الناضجة التي تعطى مستقبلات المستضد تغذي الأنسجة الليمفاوية الثانوية، الطحال، العقد الليمفاوية ومجموعات من الأنسجة الليمفاوية المصاحبة للأنسجة المخاطية (MALT).




الشكل رقم (١،٩). الأنسجة والأعضاء الليمفاوية الأساسية.

مرور الخلايا الليمفاوية Lymphocyte traffic

تغادر الخلايا الليمفاوية الدورة الدموية بواسطة جعل الأوردة الصغيرة المتخصصة مستعرضة في العقد الليمفاوية والنسيج الليمفاوي المرتبط بالأنسجة المخاطية MALT. وتعيد دورانها في الدم من خلال الجهاز الليمفاوي من خلال سلاسل العقد الليمفاوية ثم العودة ثانية للدورة، وإعادة الدوران يعطى الخلايا الليمفاوية الفرصة للاحتكاك بمستضدها.

الوريدات الكثيفة للطلائحة المبطنه (HEV) High endothelial venules

توجد هذه في معظم الأنسجة الليمفاوية الثانوية وقد يتم تحفيزها في الأنسجة الأخرى خلال التفاعلات المناعية الحادة والمتواصلة. ويتم ضبطها من خلال الخلايا العمودية المميزة التي تنتج مجموعات خاصة بالموقع لجزيئات الالتصاق الجليكوسيلية glycosylated (مثل MAdCAM-1). وقد وجد أن حوالي ٢٥٪ من الخلايا الليمفاوية التي تمر من خلال الأنسجة الليمفاوية الثانوية تتحد مع هذه الجزيئات وترتجل عبر HEV.



الشكل رقم (١٠١). مرور الخلايا الليمفاوية.

الجهاز الليمفاوي Lymphatic system

عبارة عن جهاز الأوعية التي تغطي كامل الجسم ، ويعد مسئولاً عن أنسجة التصريف وإعادة أو إرجاع الرشاخة للدم. كما له دور كمسار لحركة المستضدات من الأطراف إلى العقد الليمفية ولإعادة دوران الخلايا الليمفاوية والخلايا المتغصنة dendritic.

القناة الصدرية والقناة الليمفية اليمنى Thoracic duct and Right lymphatic duct

عبارة عن الأوعية الليمفية الأساسية التي تصب في الدم. و تعيد تدوير الخلايا من الجذع والأعضاء الداخلية والأطراف السفلى تمر عبر القناة الصدرية إلى الوريد الأيسر تحت الترقوة. وتصرف القناة اليمنى الليمفية الربع العلوي من الجسم.

النسيج الليمفي المرتبط بالمخاط Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)

عبارة عن مصطلح عام للدلالة على الأنسجة الليمفية المكشوفة التي تشاهد في المناطق تحت المخاطية للأجهزة التنفسية والمعدة والمعدة والبولية. وتقي هذه المواقع المهمة من غزو مسببات الأمراض. والغالبية العظمى من الخلايا الليمفية للجسم توجد في النسيج الليمفي المرتبط بالمخاط (MALT).

حلقة ويلدر Waldeyer's ring

عبارة عن مصطلح للدلالة على النسيج الليمفي للرقبة والحنجرة والمشملة على الغدد والجيوب الأنفية والعقد الليمفية.

الجيوب الأنفية واللوزتان Tonsils and Adenoids

وهي عبارة عن الأجزاء البلعومية للنسيج الليمفاوي المرتبط بالمخاطية MALT الغنى على وجه الخصوص بالخلايا بي المنظمة في الجريبات الليمفية.

نمو الخلايا البيضاء Eucocyte Development

النخاع العظمي Bone marrow

عبارة عن نسيج مولد للدم يوجد في العظام الطويلة والهيكل المحوري الجذعي. وهناك شبكة من الجيوب الشريانية منظمة حول الوريد، والشريان المركزي وتخرق هذه الخلايا النامية. وتتبع كافة خلايا الدم من الخلايا الجذعية للنخاع العظمي، وتشكل نسبة ١٠٪ من الخلايا النخاعية والخلايا الليمفية، وتكون على هيئة عناقيد تحيط بالأوردة القطرية. أما في الثدييات البالغة فإن الخلايا B تنمو وتتمايز في النخاع. وتفرز الخلايا السدوية stromal السايوتوكينات اللازمة لنمو الخلايا البيضاء بما في ذلك عامل الخلية الجذعي stem


IL-7 و (SCF) cell factor اللازم لأجل النمو المبكر للخلايا تي و بي الأولية. كذلك هنالك أعداد صغيرة من الخلايا الليمفية الناضجة تستقر في النخاع.

عامل الخلية الجذعي (Stem cell factor (SCF, Steel factor)

عبارة عن الساييتوكين (sytokine) الذي يلعب دوراً على عدة روابط لبدء تشغيل الانقسام . وعملية تمايز الخلايا تفتقد لاحتياجها من عامل الخلية الجذعي SCF .

معدات سي (سي دي ١١٧) (c-Kit (CD117)

عبارة عن مستقبل عامل الخلية الجذعي SCF الموجودة على بادئات الخلية تي و بي التي بها مكون أساسي لأنزيم التيروسين الحركي البلازمي الخلوي الداخلي (intracytoplamic tyrosine kinase domain). وتختفي عندما تبدأ بادئات الخلايا الليمفية بالاتحاد ثانية لجينات مستقبلية المستضد بها. وتنتج دائماً المجموعات الفرعية من خلايا NK المستقبلية c-kit . كذلك إن بادئات الخلية البدينة تظهر c-kit التي تتحد مع عامل نمو الخلية البدينة (MGF) mast cell growth factor



الشكل رقم (١١, ١). التحكم بتمايز الخلايا البيضاء من قبل الساييتوكينات.

العوامل المستحثة للمستعمرة (CSF) Colony-stimulating factors

تقوم بالتحكم في تمايز الخلايا الجذعية ذات التكوين الدموي في كل من نخاع الشوكي والمحيطي (راجع المضاد). وتشتمل مجموعة السايٲوكينات هذه على الخلايا الحبيبية والخلايا البلعمية و CSF الخلايا الحبيبية/ والخلايا البلعمية M-CSF, G-CSF و GM-CSF على التوالي، والتي تبدأ عملية تمايز مجموعاتها الفرعية المحددة من الخلايا البيضاء. أضف لذلك أن (panspecific haemopoietin) IL-3، IL-5، IL-7، IL-11 والإريثروبويتين erythropoietin هرمونات تشجيع تكوين الكريات الحمراء عبارة عن أعضاء عاملة لهذه المجموعة.

الخلايا النخاعية Myeloid cells


عبارة عن روابط الخلايا الحبيبية والخلايا البلعمية أحادية النوى التي تنمو من الخلية الجذعية العامة. وتنتج الخلية الجذعية (CFU-GM) كلاً من CD34 و الفئة الثانية من MHC التي تزول وتختص كلما ازداد التمايز.

الغدة السعترية Thymus

الغدة السعترية عبارة عن العضو الليمفي الأساس الواقع فوق القلب، وتغذي عن طريق الخلايا الجذعية الليمفية من نخاع العظمي والذي يميز الخلايا تي T. وهي ثنائية الفصوص ومرتبة في حلقة فصوص منفصلة بواسطة حواجز النسيج الضام. وكل فص مقسم إلى القشرة واللب.

الخلايا السعترية Thymocytes


عبارة عن الخلايا الليمفية السعترية. وتنمو مستقبلات المستضد الخلية تي. وتحصل عملية إلغاء للخلايا النشطة الذاتية أثناء نضوج الخلية تي في الغدة السعترية من خلال التفاعل مع الخلايا الجذلية للمستضد APC. وتشتمل العملية على تكاثر الخلايا غير الناضجة إلا أن العديد من الخلايا تموت بواسطة (التهتك apoptosis) أثناء الاختيار.



الشكل رقم (١٢، ١). تمايز الخلايا التفاعلية.

القشرة السعترية Thymic cortex

تحتوي المنطقة الخارجية للغدة السعترية على حوالي ٨٥٪ من إجمالي الخلايا السعترية. وتكون الخلايا غير ناضجة وتنتج CDI لدى الإنسان ثم تنقسم بسرعة. وتنتج معظم الخلايا السعترية القشرية على كل من سي دي ٤ CD4 و سي دي ٨ CD8 .



الشكل رقم (١٣، ١). تركيبه فص الغدة السعترية.

اللب السعترى Thymic medulla

يحتوي اللب السعترى على نسبة قليلة نسبياً من الخلايا الليمفية إلا أنها أكثر نضجاً من تلك المتوفرة في القشرة وعندها تبدأ تجمعات الخلية تي المحيطة (CD4⁺ أو CD8⁺) في الظهور.

الخلايا الطلائية السعترية Thymic epithelial cells

عبارة عن شبكة من MHC الفئة الثانية الحاملة للخلايا الجالبة للمستضد ABC الذي يمتد في كافة أنحاء القشرة واللب والتي لها دورٌ في اختيار تعداد repertoire الخلية تي.

كريات هاسيل Hassall's corpuscles


عبارة عن تلافيف وتراكيب ملتفة داخلية، وعلى الأرجح من الخلايا الطلائية وتشاهد في اللب ومن غير المعروف بعد وظيفتها.

نمو الخلية تي T-Cell Development**تعليم الخلايا تي Education of T cells**

يحدث في الغدة السعترية. وتغذي الخلايا تي الأولية الغدة السعترية من النخاع العظمي وتنتشر وتكاثر في المنطقة تحت المحفظة. وهذه الخلايا هي CD4⁺8⁺ إلا أنها تنمو إلى تجمع قشري يتكاثر إلى CD4⁺8⁺ (موجب مزدوج) منتشرة بسرعة والذي يشكل غالبية الخلايا السعترية. وتولد مستقبلاتها المستضدة (TCR) وتمر بحالة الاختيار الموجب والسالب. وتفقد الخلايا السعترية إما CD4 أو CD8 أثناء التمايز، تاركة الخلايا تي الناضجة تتج CD4 أو CD8 فقط (موجب واحد) في اللب. أما الخلايا التي تفشل في توليد TCR فاعل أو التي لا تقدر على التفاعل مع MHC أو التي تتعرف على المستضدات الذاتية، فإنها تموت أثناء النمو في القشرة، لتلتهم من قبل البلعيمات الكبيرة الجسدية.

الاختيار الموجب والسالب والاختيار السلبى

عبارة عن العمليات التي يتم من خلالها إنقاذ الخلايا السعترية من التهتكات apoptosis أثناء النمو. وتختار الخلايا إيجابياً بواسطة التفاعل مع جزيئات MHC على الخلايا الطلائية السعترية وتختار سلبياً إذا ما تعرفت على مستضدها الذاتي بواسطة جزيئات MHC على الخلايا العصبية التي تعمل على APC .



الشكل رقم (١٤، ١). نمو الخلية تي في الغدة السعترية.

العقد الليمفية Lymph Nodes

إن العقد الليمفية عبارة عن أعضاء داخل محفظة تخترق الشبكة الليمفية وتحتوي على تجمعات من الخلايا الليمفية والخلايا الجالبة للمستضد APC . وهي موجودة إستراتيجياً لأجل اعتراض المستضدات من المحيط وهنالك مجموعات كبيرة من العقد

الليمفية في الأباط والأربية والرقبة. والعقد الليمفية المسارية كبيرة جداً وفي مكان مناسب لأجل حماية الجسم من المستضدات ومسببات الأمراض من المعى. كذلك إن العقد الليمفية منظمة تركيبياً في مناطق مختلفة.

الجيب الهامشي Marginal sinus

يقع مباشرة أسفل المحفظة ومبطن بالخلايا البلمعية، الخلايا البلمعية الكبيرة بالمنطقة الهامشية التي تقوم باصطياد المستضدات الداخلة للعقدة.

القشرة Cortex


إن الجزء الخارجي من العقدة الليمفية تحتوي أساساً على الخلايا B وتقع الجريبات داخل هذه المنطقة.

فوق القشرة Paracortex

تحتوي أساساً على الخلايا تي ومختلطة مع الخلايا المتغصنة المتجهة لمستويات عالية من جزيئات MHC الفئة الثانية التي تجلب المستضد للخلايا تي. ويحتوي فوق القشرة على الوريدات الكثيفة للطلائع المبطنة high endothelial venules (HEV) والتي هي عبارة عن أوعية متخصصة موجودة في الأنسجة الليمفاوية. وهناك أعداد كبيرة من الخلايا الليمفاوية تهاجر على طول الطلائع لهذه الأوعية التي تقوم بإنتاج كيموكينات chemokines متخصصة وجزيئات الالتصاق.

اللب Medulla

يحتوي على خلايا ليمفية أقل نسبياً وعلى كثير من البلمعيات والخلايا البلازمية من المناطق الأخرى. وحيال اللب عبارة عن خيوط من الخلايا الليمفاوية الممتدة إلى اللب.



الشكل رقم (١٥٠). توكية العقدة الليمفية.

الأوعية الليمفية الداخلة والخارجة Afferent and Efferent lymphatics

تصل إلى العقدة الليمفية عبر الوريدات الطلائية الكثيفة HEV والخلايا الليمفية الناقلة للخارج تقوم بالتصريف في الجيب الهامشي (تحت المحفظة). وترتحل للمناطق المتخصصة وتغادر أخيراً عن طريق الوعاء الليمفي الناقل.

الجريبات الليمفاوية Follicles Lymphoid


عبارة عن تكديسات من الخلايا الليمفية المغلفة جيداً والخلايا الجالبة للمستضد APC. وتحتوي العقدة الليمفية غير المستحثة على الجريبات الأولية التي تنمو في الجريبات الثانوية الممتدة بعد استحداث المستضد.

مراكز الإنبات Germinal centres

عبارة عن مناطق الخلايا المنتشرة سريعاً والمشاهدة في مركز الجريبات الثانوية وتعد مهمة في نمو ذاكرة الخلية بي والتجاوب للجسم المضاد الثانوي. وهناك بعض الخلايا بي تحفز المركز الخاص بالإنبات. وتعرض بعد ذلك إلى حالة انقسام سريعة في المنطقة الداكنة القاعدية centroblasts. ويرتبط هذا بالطفرة الجسدية somatic mutation للجينات المناعية الجلوبيينية وتصبح الخلايا المتنوعة خلايا مركزية في المنطقة القاعدية المضاءة حيث قد تأخذ المستضد المفرز من الخلايا العصبية الجرابية. وتختار الخلايا بي عالية الألفة مع الجسم المضاد في حين تموت الخلايا ذات الألفة المتدنية وتلتهم تبلعها من قبل الخلايا البلعية الكبيرة. وتتحرك الخلايا بي المحفزة للمستضد لحافة مركز الإنبات لجلب المستضد للخلايا CD4⁺T. وبعدها تمر في الطور الثاني من الانقسام قبل أن تغادر عن طريق منطقة قشرة المخ كي تصبح خلايا ذاكرة أو خلايا بلازما.

جزء الإنقاذ بي سي إل-2 Bcl-2

الجزء المحفز في الخلايا المركزية التي التقتت المستضد. وينفذ ارتباط Bcl-2 الخلية من التهلك. وينتج Bcl-2 على مكونات الخلايا الدموية النامية في نخاع.



الشكل رقم (١٦، ١). نمو الخلية بي في مراكز الإنبات.

الطحال Spleen

الطحال عبارة عن عضو ليمفاوي ثانوي داخل محفظة يقع في الصفاقي peritoneum وأسفل الحجاب الحاجز وخلف المعدة. ويحتوي الطحال على نوعين من النسيج ، عرفا اصطلاحاً بالللب الأحمر والللب الأبيض أو الغمد الليمفي حول الشريان periarteriolar lymphatic sheath (PALS).

الللب الأحمر Red pulp

يتكون الللب الأحمر من شبكة من الأحيال الطحالية و الجيوب الشريانية المبطننة بواسطة الخلايا البلعمية التي تؤثر على تكسير الخلايا الحمراء العاجزة. كما قد تشاهد الخلايا البلازمية في هذه المنطقة.

الللب الأبيض (الغمد الليمفاوي حول الشريان)

White pulp / PALS (Periarteriolar lymphatic sheath)


يحتوي على غالبية النسيج الليمفي المنتشر حول الشرايين. وتوجد أساسا الخلايا تي حول الشرايين المركزية والخلايا بي حول المنطقة الأبعد قليلاً. والخلايا بي منظمة في جريبات أو حويصلات ليمفاوية ثانوية ولها مراكز إنبات. كما توجد الخلايا البلعمية الكبيرة و الجالبة للمستضد APC في الجريبات.

المنطقة الهامشية Marginal zone

عبارة عن المنطقة الخارجية للغمد الليمفاوي حول الشرايين. وتحتوي على الدورة البطيئة للخلايا بي والخلايا البلعمية للمنطقة الهامشية التي تجلب المستضدات المستقلة عن الخلايا بي. في حين أن الجيوب الهامشية تقع على حافة المنطقة الهامشية. وتدخل معظم الخلايا الليمفاوية إلى الغمد الليمفاوي حول الشريان PALS عن طريق الشعيرات الدموية المتخصصة في المنطقة الهامشية وترتحل خارجة عن طريق القنوات الواصلة ، ما بين الجيوب الهامشية ، وإلى الجيوب الشريانية لللب الأحمر.

الأنسجة الليمفاوية المصاحبة للمعي (جالت)
(Gut-Associated Lymphoid Tissues) GALT

يتكون الـ GALT من الأنسجة الليمفاوية المصاحبة لمخاطية المعى. وتشتمل هذه التراكبات من الخلايا الليمفاوية في الصفائح (lamina) ولويحات بيرير (Peyer) المشتملة على أعداد مرتفعة ثنائية التناسب للخلايا بي المنتجة للجلوبيولين المناعي آي IgA وخلايا البلازما.



الشكل رقم (١٧، ١). الغمد الليمفاوي حول الشرايين (PALS).


لويحات بير Peyer's patches

عبارة عن مجموعات وتشكيلات من الخلايا الليمفاوية في جدار الأمعاء الدقيقة والتي تظهر مجهرياً كأنها لويحات (بقع) شاحبة على جدار المعى. إلا أن الجزء المرتبط بالمادة المخاطية المعوية يفتقر إلى خلايا جوبلت وبها طلائية متخصصة مشتملة على نوع فريد من الخلايا وهي الخلية إم (M) التي لها دور في نقل المستضدات للخلايا الليمفاوية

السفلية. وتدخل الخلايا الليمفاوية للويحة عن طريق HEV التي انتقائيا تنتج الجزئي اللاصق وهو MAAdCAM-1 الذي يقوم بربط الخلايا الليمفاوية المنتجة لوسيط الالتصاق ألفا ٤ بيتا ٧ integrin $\alpha_4\beta_7$ المستقبل (الذي يربط الخلايا بالنسيج المحيط) وتغادر الخلايا الليمفاوية لويحة بير عن طريق الليمفاويات الموضعية وتختار موضعها في صفيحة الأغشية المبطنة lamina propria للمعي.

الجهاز المناعي الإفرازي Secretory immune system

يشير هذا إلى الدفاعات المناعية الموجودة في الأعضاء الإفرازية مثل الغدد اللعابية والغدد الثديية والأنسجة الليمفاوية المصاحبة للمعي GALT. وحماتها الأساسية تتم بواسطة IgA الإفرازي. كذلك إن IgA ثنائي الجزء يتحد مع مستقبله Poly-Ig على السطح القاعدي للخلايا الطلائية وتنقل إلى تجويف lumen المعوي.



الشكل رقم (١٠٨). تركيب لويحة بير.