

وض طبلة الأذن

Injury of the Tympanic Membrane

إن غشاء الطبلة محمي بشكل جيد، الأذية عندما تحدث إما أن تكون مباشرة وإما أن تكون غير مباشرة.

الرضى المباشر: يمكن أن يحدث عن طريق إدخال أدوات حادة إلى الأذن مثل دبابيس الشعر، كذلك يمكن أن يتهم غسيل الأذن والمحاولات - بالأيدي غير الخبيرة - لإزالة الشمع والأجسام الغريبة.

الرضى غير المباشر: يحدث عادة من ضربة كف أو من الانفجارات، ويمكن أن يحدث في كسور العظم الصدغي وفي إصابات الرأس الشديدة. الشرارات الناجمة عن لحام المعادن يمكن أن تسبب حروقاً في طبلة الأذن.

الأعراض

Symptoms

- ١- عادة ما يكون الألم عابراً وشديداً أثناء تمزق طبلة الأذن.
- ٢- الصمم، عادة ليس شديداً، و من النمط التوصيلي و من الممكن أن تتأذى

- القوقعة في حال تحرك الركاب نحو الأذن الداخلية، يحدث في مثل هذه الحالة صمم حسي عصبي. افحص السمع وقم بإجراء اختبارات الشوكة الرنانة.
- ٣- يمكن للطنين أن يصبح دائماً، وهذا ينجم عن إصابة القوقعة.
- ٤- الدوار (نادر).

العلامات

Signs

- ١- نزف في الأذن.
- ٢- خثرة دموية في مجرى السمع.
- تمزق في طبلة الأذن (الشكل رقم ٧، ١).



الشكل رقم (٧، ١). التهاب وحمي في طبلة الأذن، يُظهر قهراً مشوهاً مع دم في مجرى السمع الخارجي.

المعالج (دع الانقباض وشأنه)

Treatment (Leave it Alone)

- ١- لا تقم بتنظيف الأذن.
- ٢- لا تضع قطرات أذنيه.
- ٣- لا تقم بغسيل الأذن.
- ٤- أعط المضادات الحيوية إذا كان هناك دليل على العدوى.
- ٥- راقب بعناية حتى يعود السمع إلى وضعه الطبيعي.

نقطة سريرية عملية Clinical Practice Points

معظم الانقباضات الرضوية في طبله الأذن تشفى دون تأثيرات جانبية طويلة الأمد.

التهاب الأذن الوسطى


Otitis Media

التهاب الأذن الوسطى هو مصطلح يتضمن عدة أمراض قائمة بذاتها، يعتبر الفهم الجيد للمصطلحات أمراً أساسياً.

التهاب الأذن الوسطى الحاد

Acute Otitis Media

يعتبر التهاب الأذن الوسطى الحاد عدوى قصيرة الأمد (١-٥) أيام. إذا كان فيروسياً يمكن أن يستمر قرابة يوم أو نحو ذلك لكنه يمكن أن يبقى مؤدياً إلى تجمع القيح تحت الضغط خلف طبلة الأذن. التي يمكن أن تنقب. قبل انتهاب طبلة الأذن. يكون التهاب الأذن الوسطى الحاد (AOM) مؤلماً بشدة. ويحدث في الأطفال بشكل رئيس (الشكل رقم ١، ٨). يشير التهاب الأذن الوسطى المتكرر (ROM) إلى تكرار مثل هذه الالتهابات أكثر من ثلاث مرات خلال ستة أشهر.



الشكل رقم (١، أ). رسم تخطيطي يشرح نتائج التهاب الأذن الوسطى الحاد (AOM).

التهاب الأذن الوسطى الرشحى

Otitis Media with Effusion

يعتبر التهاب الأذن الوسطى الرشحى (OME) شائعاً أيضاً في الأطفال.

تتراكم السوائل - عادة ثقيلة ولزجة (غري) - في الأذن خلف طبلة الأذن السليمة. وبما أن وجود بعض السائل ضمن الأذن الوسطى لمدة تصل إلى عدة أسابيع بعد حالة التهاب الأذن الوسطى الحاد يعتبر طبيعياً، فإن مصطلح التهاب الأذن الوسطى الرشحى (OME) يتطلب بقاء السائل على الأقل ثلاثة أشهر.

التهاب الأذن الوسطى المزمن

Chronic Otitis Media

ينطوي هذا ضمناً على أن طبلة الأذن مثقوبة، وأن الثقب فشل في الالتحام وهناك عدوى مستمرة. يستخدم مصطلح التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن (CSOM) عادة للتأكيد على ميل الأذن المصابة بانتفاخات مزمنة في طبلة الأذن أن تصاب بالعدوى والسيلان.

الورم الكولسترومي

Cholesteatoma

الورم الكولسترومي هو تراكم ليشرة متقرنة في الأذن الوسطى، عادة في الأذن ذات الانتفاخ المزمن في غشاء الطبلة، وهو الشكل الأكثر خطورة من أشكال التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن (CSOM).

نقطة سريرية عملية Clinical Practice Points

- ينطوي التهاب الأذن الوسطى المزمن ضمناً على أن طبلة الأذن مثقوبة.