

## الباب الثالث

### قسم الفطريات السوطية

#### Division Mastigomycota

- مقدمة
- قسم الفطريات أحادية السوط
- قسم الفطريات ثنائية السوط



## مقدمة

يطلق على فطريات هذا القسم بالفطريات الحقيقية غير الراقية أو الدنيا، وتمتاز بإنتاجها للأبواغ المتحركة أثناء دورة حياتها، وينقسم هذا القسم وفقا لعدد الأسواط المتكونة بأبواغها السابحة إلى قُسَمَينِ هما:

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Subdivision Haplomastigomycotina | ١- قسيم الفطريات أحادية السوط |
| Subdivision Diplomastigomycotina | ٢- قسيم الفطريات ثنائية السوط |



## قسيم الفطريات أحادية السوط

### Subdivision Haplomastigomycotina

تتميز فطريات هذا القسيم بأن البوغ السابح فيها يكون دائما أحادي السوط ويكون سوطها دائما من الطراز الكرياجي أو عديم الشعيرات Whiplash وهو يقع في الجهة الأمامية من البوغ والتكاثر الجنسي متماثل الأمشاج أو متباين الأمشاج، ويضم الطوائف الثلاث التالية :

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Class Chytridiomycetes      | ١- طائفة الفطريات الكيتريدية       |
| Class Hyphochytridiomycetes | ٢- طائفة الفطريات الهيفوكيتريدية   |
| Class Plasmodiophoromycetes | ٣- طائفة الفطريات البلازموديوفورية |

#### طائفة الفطريات الكيتريدية

##### Class Chytridiomycetes

معظم الفطريات الكيتريدية ضئيلة الأهمية الاقتصادية، ولا يوجد في هذه الطائفة إلا قلة من الطفيليات الخطيرة اقتصاديا. وتوجد غالبا إما متطفلة على الطحالب الخيطية والوحيدة الخلية، أو قد تهاجم فطريات العفن المائية، والحيوانات الأولية والحشرات، كما توجد غالبا مترممة على الطحالب الميتة في الماء أو التربة. ويمكن

الحصول على هذه الفطريات بوضع طعم مناسب كجناح حشرة أو شعرة في ماء مأخوذ من مستنقع ، أو في محلول التربة. وقليل منها يتطفل على نباتات راقية ، ومثال ذلك فطر سينيكيتريوم اندوبيوتيكم *Synchytrium endobioticum* الذي يصيب نبات البطاطس ويسبب مرض التآكل الأسود. إن معظم هذه الفطريات صغيرة جدا ولا يمكن رؤيتها إلا عند استعمال القوة الكبرى للمجهر الضوئي ، وفي الأنواع الأرقى توجد هيفات جذرية Rhizoids تشبه الجذور وتساعد على التغذية ، وفي الأنواع الأرقى من ذلك يتكون ميسيليوم أولى يشبه الهيفات الجذرية ، ويطلق عليه الغزل الفطري الجذري Rhizomycelium التي تتكون عليه أعضاء التكاثر ، وهو عبارة عن مجموعة ممتدة من خيوط شبيهة بالخيوط الفطرية ، ولا تحتوي عادة على أنوية ، وما زال هناك من الطرز الأكثر رقيا ما تنتج غزلا فطريا هزيلا يتمثل فقط بفروع من خيوط فطرية قصيرة وقليلة ، أما أعظم الفطريات الكيتريدية رقيا فلها ثالوس من غزل فطري حقيقي.

وتضم الفطريات الكيتريدية ما يقرب من خمسة وثمانين جنسا وحوالي أربعمائة وخمسين نوعا ، وهي موزعة على أربع رتب على أساس تراكيبها الجسدية والتناسلية وهي مرتبة حسب الأسبقية المحتملة لتطورها كما يلي :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Order Chytridiales      | ١- رتبة الكيتريديات      |
| Order Harpochytriales   | ٢- رتبة الهاريو كيتريات  |
| Order Blastocladales    | ٣- رتبة البلاستوكلاديات  |
| Order Monoblepharidales | ٤- رتبة المونوبليفاريدات |

## رتبة الكيثريديات Order Chytridiales

تضم هذه الرتبة الفطريات أحادية السوط التي لا يكون ثالوسها على الإطلاق غزلا فطريا حقيقيا، وأفرادها غالبا تعيش في الماء مترمة أو متطفلة على ما به من طحالب ونباتات مائية، والقليل منها يعيش متطفلا على بعض النباتات الزهرية. وتكاثر أفرادها لا جنسيا بواسطة أبواغ متحركة أحادية السوط الخلفي، ويكون هذا السوط من الطراز الكراجي. أما التكاثر الجنسي فهو متمثل الأمشاج Isogamy (يتم باتحاد أمشاج متشابهة) أو متباين الأمشاج Heterogamy (يتم باتحاد أمشاج غير متشابهة).

وتضم هذه الرتبة ما يقرب من خمسة وسبعين جنسا وحوالي أربعمائة نوع، وقد وزعت هذه الأجناس على ست فصائل.. أهمها الفصيلة السينكيترية، وتستخدم جنس «سينكيتريوم» كمثال لهذه الفصيلة.


الوضع التصنيفي لجنس سينكيتريوم Systematic position of Genus *Synchytrium*

Division: Mastigomycota	اسم: الفطريات السوطية
Subdivision: Haplomastigomycotina	اسم: الفطريات أحادية السوط
Class: Chytridiomycetes	طائفة: الفطريات الكيثريدية
Order: Chytridiales	رتبة: كيثريديات
Family: Synchytriaceae	الفصيلة: السينكيترية
Genus: <i>Synchytrium</i>	جنس: سينكيتريوم


يعد جنس سينكيتريوم من أهم الأجناس التابعة للفصيلة السينكيترية وهو واسع الانتشار ويضم أكثر من ١٥٠ نوعا أهمها: سينكيتريوم اندوبيوتيك *Synchytrium endobioticum* الذي يتطفل داخل نبات البطاطس ويسبب لها مرضا يسمى بمرض الثآليل الأسود للبطاطس Black wart disease سواء في التربة، أو في مستودعات

التخزين (الشكل رقم ١٦)، وترجع أهمية هذا المرض بسبب إصابته الشديدة لمحصول البطاطس خلال الحرب العالمية الأولى وانتشارها في بعض دول شمال غرب أوروبا كما أنه ظهر أيضا في أمريكا حيث لوحظ بدرجة أقل خطورة، وقد أمكن التغلب عليه عن طريق استنباط أصناف جديدة من البطاطس تكون مقاومة له، وكذلك عمل حجر زراعي لمنع انتقاله إلى المناطق الخالية منه.

وتحدث إصابة درنات البطاطس في الأرض خلال فصل الربيع، وذلك عندما تتوفر الرطوبة الكافية في التربة فإن الأبواغ السابحة تتحرر بأعداد ضخمة من الحوافض البوغية الشتوية الساكنة التي توجد في التربة (الشكل رقم ١٨ك)، وتسيح هذه الأبواغ في التربة في غشاء رقيق من الماء (الشكلان رقما ١٧ط، ١٨ك)، ويعمل البوغ السابح أحادي السوط عند ملامة الظروف على إذابة ثقب دقيق في جدار بشرة الدرنة السليمة (الشكل رقم ١٧أ، ب)، ثم ينفذ من خلاله إلى الأنسجة الداخلية للعائل تاركاً سوطه في الخارج (الشكل رقم ١٧ج)، وبمجرد أن ينفذ البوغ إلى داخل خلايا بشرة البطاطس يتغذى ويزداد في الحجم ثم يعطي كل بوغ ثالوسا وحيد الخلية يسمى البثرة الأولية Protorus (الشكل رقم ١٧هـ)، ويصحب نمو الطفيل في خلايا العائل حدوث تنبيه ونشاط لخلايا العائل المجاورة لموضع الإصابة فتتقسم عدة انقسامات متتالية ويتضخم حجمها بصورة غير طبيعية (الشكل رقم ١٧و)، مما ينتج عنه تكوين أورام متضخمة مشوهة وقريبة من بعضها على هيئة ثآليل Warts كما يستدل منها اسم المرض. تنبت البثرة الأولية بعد نضجها وهي داخل خلية العائل فينفجر جدارها السميك، ويقى البروتوبلازم مغلقاً بغشاء رقيق شفاف وينتقل إلى النصف العلوي من خلية العائل ثم تنقسم نواة الفطر عدة انقسامات غير مباشرة، ثم تتكون جدر رقيقة تقسم البثرة الأولية إلى أربعة - تسعة أقسام عديدة الأنوية وتعرف




الشكل رقم (١٦). درنة بطاطس مصابة بمرض التأليل الأسود المسبب عن الفطر سينكتريوم اندوبيوتيكم  
*Synchytrium endobioticum*.



الشكل رقم (١٧). التكاثر الجنسي في فطرة سينكتريوم اندوبيوتيكم *Synchytrium endobioticum*.

حينئذ بالبشرة Sorus (الشكل رقم ١٧ ز). ويستمر انقسام البثرة النووي حتى يصل عدد الأنوية في كل قسم إلى ٢٠٠-٣٠٠ نواة وتكون كل منها احادية المجموعة الصيفية وينتج عن ذلك تكوين حافظة بوغية صيفية Summer sporangium (الشكلان رقما ١٧ ح، ١٨ أ)، رقيقة الجدر مليئة بالأبواغ الهدبية المتحركة.



الشكل رقم (١٨). المراحل المتتالية لدورة حياة سينكتريوم اندوبيوتيكم *Synchytrium endobioticum*.

وتكبر الحافظة البوغية الصيفية فتضغط على جدار البثرة، ثم على الجدار الخلوي للخلية المصابة، فتفتتح البثرة وتخرج الأبواغ الهدبية التي يمكنها أن تبدأ العدوى من جديد. وقد تسلك هذه الأبواغ الهدبية أحيانا مسلك الأمشاج Zoogametes (الشكل رقم ١٨ ج)، فتلتحم في أزواج لتعطي لاقحة Zygote (الشكل رقم ١٨ د)،

وكل لاقحة تعطى بعد أن تحترق أنسجة العائل الداخلية حافظة بوغية ساكنة Resting sporangium غليظة الجدر تسمى الحافظة البوغية الشتوية Winter sporangium (الشكل رقم ١٨ و، ز، ح)، وتكبر الخلايا المجاورة لهذه الحواظ وتنمو نموا شادا فتتكون نتيجة لذلك ثآليل Warts كبيرة نسبيا ومجموعة على الدرنه المصابة، وحين تتآكل هذه الثآليل تنطلق الحواظ البوغية الشتوية في التربة (الشكل رقم ١٨ ط)، وتستطيع هذه الحواظ أن تظل حية عددا من السنين وذلك نتيجة لتغلظ جدرها ويمكن أن تبدأ العدوى في الفصل التالي حيث تنبت عندما تنهيا لها الظروف الملائمة مكونة عددا من الأبواغ المتحركة التي تتحرر من الحافظة (الشكل رقم ١٨ ك)، وتنتشر في التربة لتصيب نباتات البطاطس السليمة، وهكذا تتكرر دورة حياة الفطر من جديد (الشكلان رقما ١٧، ١٨).

#### رتبة البلاستوكلاديات Order Blastocladales

يعيش أغلب أعضاء هذه الرتبة معيشة رمية على النباتات، والحيوانات المتحللة التي توجد في الماء والقليل منها يتطفل على فطريات أخرى أو حشرات أو ديدان ثعبانية، وتتميز أفرادها بوجود غزل فطري حقيقي، ويتم تكاثرها اللاجنسي بواسطة أبواغ متحركة أحادية السوط الخلفي، وتتكون داخل حواظ بوغية. وتبدى بعض الأفراد التابعة لهذه الرتبة في دورة حياتها ظاهرة تبادل الأجيال بين جيل مشيجي وجيل بوغي، إلا أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة، ففي الجنس بلاستوكلاديلا Blastochladiella والوميسس Allomyces يتميز الثالثوس إلى قاعدة ريزومية (يثبت الفطر بواسطة نفسه في وسط البيئة الأرضية) ومحور أساسي غليظ حتى أنه قد يسمى جذعا. ويكون هذا المحور منتهيا بأفرع رفيعة يختلف تفرعها من الشائي إلى المحور الكاذب.

وتحمل أفرع الطور البوغي على نهاياتها طرازين من الحوافظ البوغية، أحدهما رقيق الجدار يحمل بداخله أبواغ سابحة والآخر غليظ الجدار. أما الجذع والأفرع الرفيعة فكلاهما مجزأ أو مقسم ولكن هذه الحواجز التي تقسم الجذع والفروع مثقبة، وعلى هذا فالبروتوبلازم متصل الأجزاء.

وتضم هذه الرتبة خمسة أجناس وحوالي أربعين نوعاً موزعة على ثلاث فصائل أهمها الفصيلة البلاستوكلادية Blastocladiaceae التي تضم أربعة أجناس، ويعد جنس الوميسس *Allomyces* وبلاستوكلاديا *Blastocladiella* من أكثر أجناسها المعروفة.

#### Systematic position of Genus *Allomyces*

#### الوضع التصنيفي لجنس الوميسس

Division: Mastigomycota	قسم: الفطريات السوطية
Subdivision: Haplomastigomycotina	قسم: الفطريات أحادية السرط
Class: Chytridiomycetes	طائفة: الفطريات الكثرية
Order: Blastocladiales	رتبة: البلاستوكلاديات
Family: Blastocladiaceae	الفصيلة: البلاستوكلادية
Genus: <i>Allomyces</i>	جنس: الوميسس

يعيش هذا الفطر مترهماً في التربة أو على بقايا النباتات والحيوانات المتحللة. وقد تم اكتشافه ودراسته لأول مرة في الهند بواسطة العالم بتلر (Butler 1911) ثم وجد أنه واسع الانتشار خاصة في المناطق الاستوائية والمناطق المعتدلة الدافئة، وقد درس دراسة أكثر استفاضة من أي جنس آخر في الرتبة، ويضم هذا الجنس عدداً من الأنواع أهمها الوميسس أريبيسكيولا *A. arbuscula*، الوميسس جافانايكس *A. javanicus*، الوميسس ماكروجينس *A. macrogynus*. ويتميز الثالوس المشيجي Gametothallus في النوع الأخير بوجود قاعدة ريزومية ينشق من وسطها مجموعة من أشباه الجذور Rhizoids التامة

التكوين والمتفرعة والتي يتم بواسطتها تثبيت الفطر في الطبقة التحتية من الوسط الذي يعيش فيه. وتتفرع هذه الريزومة من الأعلى في عدة فروع جانبية تكون عادة ثنائية التشعب، وبما أن الخيوط الفطرية لهذا الفطر غير مقسمة إلا أنه يلاحظ وجود حواجز كاذبة على هيئة حلقات مغلظة في نقطة منشأ تلك الفروع، حيث تنتهي من الأعلى بالحواظ المشيجية الذكرية والأثوية للفطر، وتكون مرتبة على شكل سلاسل.

أما الثالوس البوغي Sporothallus فهو يحمل نوعين من الحواظ البوغية احدهما رقيقة الجدر اسطوانية وعديمة اللون. والأخرى سميكة الجدر، بنية منقرعة. وتكون عادة إما كروية، أو بيضية، أو ليمونية الشكل. ويتكون بكل منها أبواغ ساجحة بسوط واحد خلفي. الأبواغ الساجحة الناتجة من الحواظ البوغية رقيقة الجدر أكبر حجماً من مثلثتها الناتجة من الحواظ البوغية سميكة الجدر.

### دورة حياة الفطر

تتضح في دورة حياة هذا الفطر ظاهرة تبادل الأجيال Alternation of generation النادرة الحدوث في الفطريات. حيث يتبادل الثالوس المشيجي (الشكل رقم ١٩ أ) أحادي المجموعة الصبغية Haploid مع الثالوس البوغي (الشكل رقم ١٩ ط) ثنائي المجموعة الصبغية Diploid ويصعب على المرء التمييز بين هذين الطرازين إلا بعد أن تبدأ أعضاء التكاثر في التكوين.

تنقسم محتويات الحواظ البوغية الرقيقة الجدر Zoosporangia لتعطي أبواغ ساجحة ثنائية المجموعة الصبغية (لأنها نتجت عن انقسام غير مباشر) ويستطيع كل بوغ

من هذه الأبواغ بعد تحررها أن تسبح لفترة ما (الشكل رقم ١٩ ي) ثم تستدير وتثبت لتعطي الثالوس البوغي الثانوي (الشكل رقم ١٩ ط) وعلى هذا فيمكن اعتبار أن هذه الأبواغ هي وسيلة مساعدة في تكاثر الطور البوغي (الجيل الثنائي المجموعة الصبغية) أما حين تنقسم محتويات الحوافظ البوغية الغليظة الجدر Resting sporangia (الشكل رقم ١٩ ي) فإن انقساماً اختزالياً يحدث فيها، وبالتالي تكون الأبواغ الناتجة أحادية المجموعة الصبغية (الشكل رقم ١٩ ك)، وهي أصغر حجماً من مثلتها الناتجة من الحوافظ البوغية الرقيقة الجدر. كل بوغ بعد إنباته يعطي طوراً مشيجياً (الشكل رقم ١٩ أ)، هذا الطور المشيجي يشبه في شكله الطور البوغي، ولكنه يختلف عنه في أنه يحمل حوافظ مشيجية (جاميطية) بدلا من الحوافظ البوغية. وتتكون الحوافظ المشيجية Gametangia في أزواج (الشكل رقم ١٩ ب) على أطراف الأفرع، والحوافظ المشيجية الذكرية Male gametangia ذات لون برتقالي طرفية، أما الحوافظ المشيجية الأنثوية Female gametangia فهي أكبر قليلاً من الحوافظ المشيجية المذكورة وتتكون أسفلها (الشكل رقم ١٩ ب)، وهي عديمة اللون وتتميز الأمشاج الناتجة من تلك الحوافظ إلى أمشاج ذكرية صغيرة متحركة (الشكل رقم ١٩ ج) وأمشاج أنثوية كبيرة (الكل رقم ١٩ د)، وعندما تتزاوج تلك الأمشاج فإنه يتكون بعد ذلك لاقحات ساجحة ذات سوطين (الكل رقم ١٩ هـ)، وهي ثنائية المجموعة الصبغية. وبعد فترة سكون تنبت هذه اللاقحات (الشكل رقم ١٩ ح) معطية أطوراً بوغية (الشكل رقم ١٩ ط) تحمل في نهاية أفرعها حوافظ بوغية من نوعين، رقيقة الجدر وسميكة الجدر، وهكذا تتكرر دورة حياة الفطر.



## طائفة الفطريات البلازموديوفورية

## Class Plasmodiophoromycetes

الفطريات البلازموديوفورية هي طفيليات إجبارية داخل خلايا بعض النباتات الراقية، والطحالب والفطريات، وهي تسبب عادة إفراطاً وتضخماً في حجم خلايا النبات العائل يعرف بالتضخم Hypertrophy، الذي يحدث في الأجزاء المصابة من العائل، وذلك نتيجة للانقسام السريع للخلايا وبصورة غير طبيعية. وتتطفل كثير من أفراد هذه الطائفة على طحالب المياه العذبة مثل «فوشيريا»، أو على الفطريات المائية مثل «سابروليجنيا» و«أكليا»، وتتطفل أنواع أخرى منها على النباتات الوعائية الأرضية ذات الفائدة الاقتصادية مثل الكرنب والبطاطس.

## رتبة البلازموديوفورات Order Plasmodiophorales

تضم الطائفة البلازموديوفورية رتبة واحدة هي رتبة البلازموديوفورات، وتشتمل على فصيلة واحدة هي الفصيلة البلازموديوفورية (Karling 1968) و (Alexopoulos & Mims 1979) وهي تشبه الفطريات الهلامية من حيث تكوينها لأجسام هلامية يطلق عليها «البلازموديوم» الذي يمثل الطور الخضري في حياة تلك الفطريات، وهو يتكون من كتلة بروتوبلازمية عارية عديدة الأنوية، وينمو داخل خلايا العائل. وعند التكاثر تعطي البلازموديومات كرات بوغية داخل الخلية، إما أن تتكشف، إلى أبواغ ساجحة يحمل كل منها عند تحررها من خلية العائل سوطين أماميين، غير متساويين في الطول، وهما من الطراز الكرياجي «الأملس»، أو قد يتحول البلازموديوم داخل خلية العائل إلى عدد من الأبواغ الساكنة Resting spores، أحادية النواة، ومقامة للظروف البيئية غير الملائمة. تنبت الأبواغ الساكنة لتعطي أبواغ متحركة، كبيرة الحجم نسبياً ثنائية السوط.

وتختلف الفطريات البلازموديوفورية عن الفطريات الهلامية من حيث تكوينها لحواظ الأبوغ السابحة ، وأنها لا تكون أجساماً ثمرية عند إنتاجها للأبوغ الساكنة ، وكذلك فإن جدر الأبوغ تبدو خالية من مادة السليلوز ، بالإضافة إلى أن بلازموديوماتها يحتل بأنها أحادية المجموعة الصبغية ، وليست ثنائية كما هو الحال في الفطريات الهلامية التي سبق التحدث عنها.

وتحتوي الفصيلة البلازموديوفورية على تسعة أجناس ، ولكن العالم ووترهاوس (Waterhouse 1973) استطاع التعرف على عشرة أجناس تابعة لتلك الفصيلة هي :

*Plasmodiophora, Spongospora, Tetramyxa, Octomyxa, Sorosphaera, Sorodistus, Lingniera, Woronina, Polymyxa and Membranosorus.*

ويمكن التفريق بين هذه الأجناس مبدئياً من حيث طريقة انتظام أبوغها الساكنة ، وكذلك شكل وطريقة تجمع الأكياس البوغية داخل خلية العائل ، ولو أن هناك شكوكاً كثيرة حول جدية الأخذ بمثل تلك المميزات (Palm & Burk 1933). ويعد الجنس بلازموديوفورا وسبونجوسبورا من أكثر الأجناس السابقة أهمية من الناحية الاقتصادية.

### الوضع التصنيفي لجنس بلازموديوفورا

#### Systematic position of Genus *Plasmodiophora*

Division: Mastigomycota	قسم: الفطريات السوطية
Subdivision: Haplomastigomycotina	قسم: الفطريات أحادية السوط
Class: Plasmodiophoromycetes	طائفة: الفطريات البلازموديوفورية
Order: Plasmodiophorales	رتبة: البلازموديوفوريات
Family: Plasmodiophoraceae	الفصيلة: البلازموديوفورية
Genus: <i>Plasmodiophora</i>	جنس: بلازموديوفورا


يسبب الفطر بلازموديوم فوراً براسيكي *Plasmodiophora brassicae* مرضاً لأفراد من الفصيلة الصليبية وخاصة الكرنب Cabbage. ويؤثر على مجموعة الجذري، وقد سمي هذا المرض بأسماء مختلفة مثل الجذر صولجاني Clubroot والقدم صولجاني Club foot والتصولج Clubbing ومرض التصوبع Finger and toe disease وهو مرض عالمي واسع الانتشار، وله أهمية خاصة.

وعند إصابة النبات بهذا الفطر يفقد أوراقه السفلى بالتدرج وتلتوي وتتغير أشكالها وذلك لأن الخلايا المصابة والمجاورة يزداد نموها زيادة غير طبيعية، ونتيجة لذلك فإن زوائد صولجانية أو انتفاخات كروية تظهر على الجذور أو على قاعدة الساق للنباتات المصابة، وإذا تكونت هذه التضخمات على الجذر الرئيسي للنبات، فإن ذلك يؤخر التكوين الطبيعي للمجموع الجذري.

وأبواغ هذا الفطر (الشكل رقم ١٢٠)، كروية الشكل دقيقة الحجم وحيدة النواة أحادية المجموعة الصبغية ومغلقة بغلاف كيتيني أملس يقيها من الظروف الأرضية غير المناسبة، وهي توجد في التربة وعندما تتوافر لها الظروف البيئية المناسبة فإن كل بسوغ ينبت ليعطي بسوغ سابح Zoospore (الشكل رقم ٢٠ج)، وحيدة النواة كمترية الشكل ذات هديين أحدهما طويل، والآخر قصير، وهذه الأبواغ يجب أن يتوافر لها وسط مائي حتى يمكنها أن تسبح فيه لتصل إلى عائتها، وتحدث الإصابة بأن تخترق الأبواغ الهدية الشعيرات الجذرية فإنها تفقد أهدابها وتعرف حينئذ باسم الأميبا المخاطية Myxamoeba (الشكل رقم ٢٠د)، وفي داخل أنسجة الشعيرات الجذرية تستطيل هذه الأميبا وتنقسم نواتها عدة انقسامات عادية، فيتشكل نتيجة ذلك جسم رغوي هو بلازموديوم Plasmodium (الشكل رقم ٢٠هـ)، صغير وهو جسم عارٍ عديد الأنوية كل نواة أحادية المجموعة الصبغية ثم يتجزأ البلازموديوم بعد ذلك إلى عدد من

البروتوبلاستات Protoplasts (الشكل رقم ٢٠ ح)، الكروية الشكل الرقيقة الجذر، ثم يتقسم كل بروتوبلاست إلى عدد من الوحدات المتحركة التي يبلغ عددها من ٤ إلى ٦ أبواغ هدية (الشكل رقم ٢٠ ط)، في كل منها هديان أحدهما طويل والآخر قصير، وهي تشبه تماماً الأبواغ الهدبية التي تكونت من الأبواغ الساكنة إلا إنها أصغر منها قليلاً وهذه الأبواغ الهدبية تنطلق من أكياسها إلى خارج العائل، وتسلك حينئذ مسلك الأمشاج فتلتحم في أزواج (الشكل رقم ٢٠ ك)، ويتكون عن ذلك اللاقحة Zygote (الشكل رقم ٢٠ ل)، ذات الشكل الأميبي، التي تغادر الطبقات الخارجية للعائل لتهاجم الطبقات الداخلية، حيث يتكون بلازموديوم جديد عديد الأنوية (الشكل رقم ٢٠ م)، ويستطيع هذا البلازموديوم أن ينتشر من خلية إلى أخرى في أنسجة النبات ويتكاثر بطريقة التفتيت (الشكل رقم ٢٠ ن)، وبعد هذا يكون كل بلازموديوم كرة بوغية (الشكل رقم ٢٠ س)، ونتيجة لذلك تنقسم خلايا العائل بسرعة، ويزداد حجمها مما يؤدي إلى تكوين تضخمات مميزة للمرض على جذر العائل وهذا ما يعبر عنه بالإفراط في أحجام الخلايا Hypertrophy (الشكل رقم ٢٠ ع).

وفي نهاية الموسم يتجزأ البلازموديوم بأكمله إلى كتلة متزاحمة من الأبواغ الساكنة تعرف باسم الحويصلة البوغية Cystosorus. وحين يتآكل الجذر وتنتشر الأبواغ بالتربة تستطيع هذه الأبواغ حينئذ أن تظل حية إلى سنوات قد تبلغ السبعة، وفي الربيع عندما تكون الظروف البيئية مناسبة لحدوث العدوى، فإن الأبواغ تنبت بعد انطلاقتها من بقايا أنسجة الجذور المصابة المختلطة بالتربة، ويعطى كل منها بوغ هدي أحادي النواة كمشية الشكل ذات هدين أحدهما طويل، والآخر قصير ويجب أن يتوفر لها وسط غذائي لتسيح فيه حتى تصل إلى الشعيرات الجذرية للنبات العائل وتحدث الإصابة من جديد (الشكل رقم ٢٠).



الشكل رقم (٢٠). رسم تخطيطي يوضح الأطوار اشملة في دورة حياة فطر بلازموديوفسورا براسيكي

*Plasmodiophora brassicae*