

الفصل الخامس

نتائج الدراسة المرتبطة بالتساؤلات

١- النتائج المرتبطة بالإجابة على تساؤلات الدراسة

٢- النتائج العامة للدراسة وتفسير النتائج

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

١ - النتائج المرتبطة بالإجابة على تساؤلات الدراسة:

لقد أمكن للباحثة من خلال نتائج الدراسة الإجابة على تساؤلاتها وكانت كالاتي:
أولاً: بالنسبة للتساؤل الأول والذي كان مؤداه:

" هل يواجه مدمني المخدرات مشكلات اجتماعية ناتجة عن إيمانهم للمخدرات؟"
ولقد جاءت النتائج كالتالي:

جدول رقم (٨)

يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة على مقياس الدراسة

ن = ٦٧

مجموع الدرجات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية
٩١٥٣	١٣٦,٦١	٢٠,٤٩	%٧٥,٨٩

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إيمان المخدرات قد بلغ ١٣٦,٦١ درجة بانحراف معياري ٢٠,٤٩ وبنسبة مئوية ٧٥,٨٩% وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة مما يعكس أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلات اجتماعية ناتجة عن إيمانهم للمخدرات وهذه المشكلات تؤثر بلا شك على علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين وأيضاً على علاقاتهم بأسرهم وتؤدي بهم إلى الاكتئاب والقلق وتركزهم حول ذواتهم وعدم قدرتهم على التعامل مع الآخرين المحيطين بهم في المجتمع.

ثانياً: بالنسبة للتساؤل الثاني والذي كان مؤداه:

" ما هي نوعية المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات؟" ولقد جاءت

النتائج كالتالي:

جدول رقم (٩)

يوضح نوعية المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات

ن = ٦٧

نوع المشكلات	الدرجة	س	ع	النسبة المئوية
١- مشكلات مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية	٤٤٨٠	٦٦,٨٧	٦٧,٧١	٧٤,٣%
٢- مشكلات نفسية	٤٦٥٩	٦٩,٥٤	٥٠,٣٦	٧٧,٢٦%

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على المشكلات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية قد بلغ ٦٦,٨٧ درجة بانحراف معياري ٦٧,٧١ ونسبة مئوية ٧٤,٣% وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة مما يعكس أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلات مرتبطة بعلاقاتهم مع الآخرين وهذه المشكلات مرتبطة بعلاقاتهم مع أسرهم وأيضاً علاقاتهم مع الآخرين المحيطين بهم واتضح أيضاً من الجدول أن متوسط درجات عينة الدراسة على المشكلات النفسية الناتجة عن إدمان المخدرات قد بلغ ٦٩,٥٤ درجة بانحراف معياري ٥٠,٣٦ ونسبة مئوية ٧٧,٢٦% وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة مما يعكس أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلات نفسية تعتبر آثاراً للمشكلات الاجتماعية الناتجة عن الإدمان وهذه المشكلات تمثلت في مشكلة الاكتئاب ومشكلة التمرکز حول الذات.

ثانياً: بالنسبة للتساؤل الثالث والذي كان مؤداه:

" ما هي المشكلات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات؟" ولقد جاءت النتائج كالتالي:

جدول رقم (١٠)

يوضح المشكلات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات

ن = ٦٧

نوع المشكلات	الدرجة	س	ع	النسبة المئوية
١- سوء العلاقات الاجتماعية	٢٢١٦	٣٣,٠٧	٦,٠٤	٧٣,٤%
٢- التفكك الأسري	٢٢٦٤	٣٣,٧٩	٥,٤٦	٧٥,٠٩%

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية قد بلغ ٣٣,٠٧ درجة بانحراف معياري ٦,٠٤ درجة وبنسبة مئوية ٧٣,٤% وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة مما يعكس أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية ناتجة عن إدمانهم للمخدرات ويتضح أيضاً من الجدول أن متوسط درجات عينة الدراسة على مشكلة التفكك الأسري قد بلغ ٣٣,٧٩ درجة بانحراف معياري ٥,٤٦ درجة وبنسبة مئوية ٧٥,٠٩% وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة مما يعكس أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة التفكك الأسري ناتجة عن إدمانهم للمخدرات وهذا ما أوضحتته نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة (مديحة مصطفى فتحي) التي أكدت أن الأضرار والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن التعاطي تتضمن المشكلات الخاصة بالعلاقات مع الأسرة ومع الآخرين أي العلاقات الاجتماعية مع الآخرين وتوضح إلى أي مدى تأثرت هذه العلاقات بعد إدمان المخدرات.

رابعاً: بالنسبة للتساؤل الرابع والذي كان مؤداه:

" ما هي المشكلات النفسية الناتجة عن إدمان المخدرات؟" ولقد جاءت النتائج

كالتالي:

جدول رقم (١١)

يوضح المشكلات النفسية الناتجة عن إدمان المخدرات

ن = ٦٧

نوع المشكلات	الدرجة	س	ع	النسبة المئوية
١- التمرکز حول الذات	٢٤١٠	٣٥,٩٧	٤,٠٩	٧٩,٣%
٢- الاكتئاب	٢٢٤٩	٣٣,٥٦	٦,٣٦	٧٤,٦%

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مشكلة التمرکز حول الذات قد بلغ ٣٥,٩٧ درجة بانحراف معياري ٤,٠٩ درجة ونسبة مئوية ٧٩,٩٣ % وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة جداً مما يعكس أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة التمرکز حول الذات ناتجة عن إدمانهم للمخدرات واتضح أيضاً من الجدول أن متوسط درجات عينة الدراسة على مشكلة الاكتئاب قد بلغ ٣٣,٥٦ درجة بانحراف معياري ٦,٣٦ درجة ونسبة مئوية ٧٤,٦ % وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة مما يعكس أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة الشعور بالاكتئاب ناتجة عن إدمانهم للمخدرات وهذا ما أوضحته بعض الدراسات السابقة مثل دراسة (إيمان محمد صبري) والتي أكدت من خلال نتائجها أن إدمان المخدرات يعتبر خلقاً لحالة هوس اصطناعي هروباً من حالة اكتئاب وانطواء اجتماعي ومن خلال ما تم عرضه من نتائج يمكن القول بأن مدمني المخدرات يعانون من حالة الاكتئاب والانطواء والتمرکز حول الذات وعدم رغبتهم في التعامل مع الآخرين حيث إنهم يكونون أكثر سعادة عندما يكونون بمفردهم وذلك كله نتاج ومحصلة نهائية لإدمانهم للمخدرات.

خامساً: بالنسبة للتساؤل الخامس والذي كان مؤداه:

"هل توجد علاقة ارتباطية بين المشكلات الاجتماعية والمشكلات النفسية

الناتجة عن إدمان المخدرات؟"

أولاً: النتائج المرتبطة بمعامل الارتباط بين مؤشرات كل نوع من أنواع

المشكلات:

ولقد جاءت النتائج كالتالي:

جدول رقم (١٣)

يوضح العلاقة الارتباطية بين مؤشرات كل نوع من أنواع المشكلات

ن = ٦٧

نوع المشكلات	س	ع	ر	الدالة المعنوية
١- المشكلات الاجتماعية			٠,٧٤	ت المحسوبة = ٨,٩١
أ - التفكك الأسري	٣٣,٧٩	٥,٤٦		ت الجدولية عند ن = ٦٥
ب- سوء العلاقات الاجتماعية	٣٣,٠٧	٦,٠٤		٠,٩٩ = ٢,٦٦٠
				عند ن = ٦٥ ، ٠,٩٥ = ٢,٠٠٠
٢- المشكلات النفسية			٠,٧٥	ت المحسوبة = ٩,١٤
أ - التمرکز حول الذات	٣٥,٩٧	٤,٠٩		ت الجدولية عند ن = ٦٥
ب- الاكتئاب	٣٣,٥٦	٦,٣٦		٠,٩٩ = ٢,٦٦٠
				عند ن = ٦٥ ، ٠,٩٥ = ٢,٠٠٠

يتضح من الجدول السابق أنه توجد علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين مشكلة التفكك الأسري ومشكلة سوء العلاقات الاجتماعية لدى مدمني المخدرات وهذه العلاقة ذات دلالة معنوية عند ن = ٦٥ ، ٠,٩٩ ، ن = ٦٥ ، ٠,٩٥ ويتضح أيضاً من الجدول أنه توجد علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين مشكلة التمرکز حول الذات ومشكلة الاكتئاب لدى مدمني المخدرات وهذه العلاقة ذات دلالة معنوية عند ن = ٦٥ ، ٠,٩٩ ، ن = ٦٥ ، ٠,٩٥

ثانياً: العلاقة الارتباطية بين أبعاد المقياس الرئيسية:

ولقد جاءت النتائج كالتالي:

جدول رقم (١٣)

يوضح العلاقة الارتباطية بين أبعاد المقياس الرئيسية

ن = ٦٧

البعد	س	ع	ر	الدلالة المعنوية
١ - المشكلات الاجتماعية	٦٦,٨٧	٦٧,٧١	٠,٨٤	ت المحسوبة = ٨,٨٧
٢ - المشكلات النفسية	٦٩,٥٤	٥٠,٣٦		ت المحسوبة = ٩,١٤

يتضح من الجدول السابق أنه توجد علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين المشكلات الاجتماعية المتمثلة في مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية ومشكلة التفكك الأسري وبين المشكلات النفسية المتمثلة في مشكلة التمرکز حول الذات ومشكلة الاكتئاب لدى مدمني المخدرات وهذه العلاقة ذات دلالة معنوية عند $n = ٦٥, ٠,٩٩$ ، $n = ٦٥, ٠,٩٥$ سادساً: بالنسبة للتساؤل السادس والذي كان مؤداه:

"هل توجد علاقة بين متغيرات الدراسة والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات؟" ولقد جاءت النتائج كالتالي:

جدول رقم (١٤)

يوضح العلاقة بين متغير السن والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان

المخدرات

ن = ٦٧

المجموع	فئات السن						درجة المشكلات
	٤٠-٤٥	-٣٥	-٣٠	-٢٥	-٢٠	-١٥	
١	-	١	-	-	-	-	-٧٠
-	-	-	-	-	-	-	-٨٠
٢	-	٢	-	-	-	-	-٩٠
٦	١	٢	٢	١	-	-	-١٠٠
٨	١	٣	٢	٢	-	-	-١١٠
٤	١	٢	-	١	-	-	-١٢٠
٥	-	٢	١	-	١	١	-١٣٠
٢٤	٦	٦	٤	٥	٢	١	-١٤٠
١٣	٤	٥	١	١	١	١	-١٥٠
٤	-	٢	١	١	-	-	١٧٠-١٦٠
٦٧	١٣	٢٥	١١	١١	٤	٣	المجموع

يتضح من الجدول السابق أن العلاقة بين متغير السن والمشكلات الاجتماعية علاقة عكسية ضعيفة ليس لها دلالة إحصائية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون للتوزيعات التكرارية المزدوجة في توضيح العلاقة بين السن والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات $r = -0.048$ أي أن الارتباط العكسي الضعيف غير الدال إحصائياً يمكن تفسيره من خلال أنه كلما قل السن كلما زادت درجة المشكلات

الاجتماعية لدى المدمنين ومن ثم تزداد درجة التعرض للمشكلات النفسية كالقلق والاكتئاب والتمركز حول الذات.

وبالرغم من عدم الدلالة الإحصائية لتلك العلاقة إلا إنها تعتبر مؤشراً للأخصائي الاجتماعي الذي يتعامل مع مدمني المخدرات أنه من الواضح أنه كلما قل سن المدمن كلما زادت المشكلات التي يعاني منها وأن إدمان المخدرات يؤثر تأثيراً سلبياً على الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠-٤٥ سنة وتبدو وحدة المشكلات عند هذه الفئة واضحة.

جدول رقم (١٥)

يوضح العلاقة بين متغير الدخل والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات

المجموع	قيمة الدخل							درجة المشكلات
	-٩٠٠	-٨٠٠	-٧٠٠	-٦٠٠	-٥٠٠	-٤٠٠	-٣٠٠	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	-٨٠
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	-٩٠
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	-١٠٠
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	-١١٠
٣	٢	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	-١٢٠
٣	١	صفر	صفر	صفر	١	صفر	١	-١٣٠
٣	١	صفر	صفر	١	١	صفر	صفر	-١٤٠
٥	١	١	صفر	١	١	١	صفر	-١٥٠
٣	١	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	١٦٠-١٧٠
١٧	٦	٢	صفر	٣	٣	٢	١	المجموع

يتضح من الجدول السابق أن العلاقة بين متغير الدخل والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات علاقة موجبة ضعيفة غير دالة إحصائياً حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون للتوزيعات التكرارية المزدوجة في توضيح العلاقة بين متغير الدخل والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات $r = 0.2645$. وهذا يعني أن هناك علاقة بين الدخل ودرجة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات أي أنه كلما زاد مستوى دخل الفرد المدمن كلما زادت المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها.

جدول رقم (١٦)

يوضح العلاقة بين الحالة الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن

إدمان المخدرات

المجموع	النوع		درجة المشكلات
	متزوج	أعزب	
-	-	-	-٦٠
١	١	-	-٧٠
-	-	-	-٨٠
٢	١	١	-٩٠
٦	١	٥	-١٠٠
٨	٢	٦	-١١٠
٤	٢	٢	-١٢٠
٥	١	٤	-١٣٠
٢٤	١٢	١٢	-١٤٠
١٣	٨	٥	-١٥٠
٤	١	٣	-١٦٠
-	-	-	-١٧٠
-	-	-	-١٨٠
٦٧	٢٩	٣٨	المجموع
كاي ٢ المشاهدة أو المحسوبة = ١٥٠,٨ درجة الحرية = ٣٦			

يتضح من الجدول السابق أن قيمة كاي^٢ المشاهدة أكبر من قيمة كاي^٢ الجدولية أي أن درجة المشكلات الاجتماعية لا تختلف بحسب الحالة الاجتماعية أي أن درجة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات والتي يعاني منها المدمن الأعزب لا تختلف عن

درجة المشكلات التي يعاني منها المدمن الأعزب و المتزوج فدرجة المشكلات واحدة عند المدمن والمتزوج ولا تختلف حدتها عند كلاهما.

جدول رقم (١٧)

يوضح العلاقة بين الحالة الصحية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات

الدرجة على المقياس	الحالة الصحية			المجموع
	جيدة	متوسطة	غير جيدة	
-٦٠	-	-	-	-
-٧٠	١	-	-	١
-٨٠	-	-	-	-
-٩٠	-	-	١	١
-١٠٠	-	٢	٤	٦
-١١٠	٢	٢	٥	٩
-١٢٠	-	١	٣	٤
-١٣٠	١	٢	٢	٥
-١٤٠	-	٦	١٨	٢٤
-١٥٠	-	١	١٢	١٣
-١٦٠	-	-	٤	٤
-١٧٠	-	-	-	-
-١٨٠	-	-	-	-
المجموع	٤	١٤	٤٩	
$\text{كا}^2 \text{المشاهدة أو المحسوبة} = ٣٢٩,٦٠٧$ درجة الحرية = ٢٤		$\text{كا}^2 \text{الجدولية عند } ٠,٩٥ = ٣٦,٤١٥$ عند ٠,٩٩ = ٤٢,٩٨٠		

يتضح من الجدول السابق أن قيمة كا^2 المشاهدة أو المحسوبة أكبر من قيمة كا^2 الجدولية وهذا يعني أن درجة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الإدمان والتي يعاني منها المدمنون لا تختلف بحسب الحالة الصحية أي أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني

منها المدمن و الذي تكون حالته الصحية جيدة لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية لدى المدمن الذي تكون حالة الصحية متوسطة وأيضاً لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية لدى المدمن الذي تكون حالته الصحية سيئة أو غير جيدة بمعنى آخر إن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف عند المدمنين الأصحاء والمرضى فهي واحدة عندهم.

جدول رقم (١٨)

يوضح العلاقة بين الحالة العملية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات

الدرجة على المقياس	الحالة العملية		المجموع
	لا يعمل	يعمل	
-٦٠	-	-	-
-٧٠	-	١	١
-٨٠	-	-	-
-٩٠	١	١	٢
-١٠٠	٥	١	٦
-١١٠	٦	٢	٨
-١٢٠	٣	١	٤
-١٣٠	٣	٢	٥
-١٤٠	٢١	٣	٢٤
-١٥٠	٨	٥	١٣
-١٦٠	٣	١	٤
-١٧٠	-	-	-
-١٨٠	-	-	-
المجموع	٥٠	١٧	٦٧
كأالمشاهدة أو المحسوبة = ١١٢,٦٠١		كأالجدولية عند ٠,٩٥ = ٢١,٠٢٦	
درجة الحرية = ١٢		عند ٠,٩٩ = ٢٦,٢١٧	

يتضح من الجدول السابق أن كاً المشاهدة أو المحسوبة أكبر من كاً الجدولية وهذا يعني أن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف بحسب الحالة العملية أي أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون الذين يعملون لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون الذين ليس لديهم عمل معين وبمعنى آخر إن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات واحدة عند الأشخاص العاملين والأشخاص غير العاملين وقد تختلف حدتها ولكن نوعية هذه المشكلات لا تختلف عند هاتين الفئتين.

جدول رقم (١٩)

بوضم العلاقة بين الحالة التعليمية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات

المجموع	الحالة التعليمية		الدرجة على المقياس
	غير متعلم	متعلم	
-	-	-	-٦٠
١	-	١	-٧٠
-	-	-	-٨٠
٢	١	١	-٩٠
٦	٥	١	-١٠٠
٨	٥	٣	-١١٠
٤	٤	-	-١٢٠
٥	٣	٢	-١٣٠
٢٤	٢٢	٢	-١٤٠
١٣	١٠	٣	-١٥٠
٤	٤	-	-١٦٠
-	-	-	-١٧٠
-	-	-	-١٨٠
٦٧	٥٤	١٣	المجموع
كاً الجدولية عند $٠,٩٥ = ٢١,٠٢٦$		كاً المشاهدة أو المحسوبة $= ١٢٣,٨٢٢$	
عند $٠,٩٩ = ٢٦,٢١٧$		درجة الحرية $= ١٢$	

يتضح من الجدول السابق أن كاً^٢ المشاهدة أو المحسوبة أكبر من كاً^٢ الجدولية وهذا يعني أن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف بحسب الحالة التعليمية أي أن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الإدمان لدى المتعلمين عن المشكلات الاجتماعية لدى غير المتعلمين وبمعنى آخر إن المشكلات الاجتماعية واحدة عند المتعلمين وعند غير المتعلمين أي لا تختلف نوعية هذه المشكلات عند هاتين الفئتين.

سابعاً: بالنسبة للتساؤل السابع والذي كان مؤداه:

"ما هو التصور المقترح لعلاج المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات من منظور خدمة الفرد؟"

في ضوء نتائج الدراسة السابقة أمكن للباحثة التوصل إلى تصور مقترح لعلاج المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات من منظور خدمة الفرد وهذا ما سوف تقوم الباحثة بعرضه في الفصل السادس والذي يتضمن التصور المقترح من منظور خدمة الفرد لعلاج المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات.

٢- النتائج العامة للدراسة وتفسير النتائج :

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تفسيرها في الآتي:

بالنسبة للتساؤل الأول:

اتضح من نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة على مقياس المشكلات الاجتماعية أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلات اجتماعية ناتجة عن إدمانهم للمخدرات وتمثلت هذه المشكلات الاجتماعية في مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية ومشكلة التفكك الأسري وأدت هذه المشكلات إلى شعور المدمنين بالاكتئاب وشعورهم بتمركزهم حول ذاتهم وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين.

بالنسبة للتساؤل الثاني:

اتضح من نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة على المشكلات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية أن مدمني المخدرات يعانون بالفعل من مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية مع الآخرين المحيطين بهم وأيضاً من مشكلة التفكك الأسري وقد بلغت نسبة المشكلات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية ٧٤,٣% وهذا دلالة على ارتفاع نسبة وجود هذه المشكلات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية لدى مدمني المخدرات واتضح أيضاً من نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة على المشكلات النفسية الناتجة عن إدمان المخدرات أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلات نفسية تمثلت هذه المشكلات في مشكلة التمرکز حول الذات ومشكلة الاكتئاب وقد بلغت نسبة المشكلات النفسية ٧٧,٢٦% وهذا دلالة على ارتفاع نسبة وجود هذه المشكلات النفسية لدى مدمني المخدرات.

بالنسبة للتساؤل الثالث:

اتضح من نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة على مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية وبلغت النسبة المئوية لهذه المشكلة ٧٣,٤% وهذا دلالة على ارتفاع نسبة وجود مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية لدى المدمنين.

واتضح أيضاً من خلال نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة على مشكلة التفكك الأسري أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة التفكك الأسري وبلغت النسبة المئوية لهذه المشكلة ٧٥,٠٩% وهذا دلالة على ارتفاع نسبة وجود مشكلة التفكك الأسري لدى مدمني المخدرات وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة مثل دراسة (مديحة مصطفى فتحي) والتي أكدت على المشكلات الاجتماعية الناتجة عن التعاطي مثل المشكلات الخاصة بالعلاقات مع الأسرة والمشكلات الخاصة بالعلاقات مع الآخرين أي سوء العلاقات الاجتماعية.

بالنسبة للتساؤل الرابع:

اتضح من نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة علي مشكلة التمرکز حول الذات أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة التمرکز حول الذات وبلغت النسبة المئوية لهذه المشكلة ٧٩,٩٣% وهذا دلالة على ارتفاع نسبة وجود مشكلة التمرکز حول الذات لدى مدمني المخدرات.

واتضح أيضاً من خلال نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الدراسة على مشكلة الاكتئاب أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلة الاكتئاب وبلغت النسبة المئوية لهذه المشكلة ٧٤,٦% وهذا دلالة على ارتفاع نسبة وجود مشكلة الاكتئاب لدى مدمني المخدرات.

بالنسبة للتساؤل الخامس:

اتضح من نتائج العلاقة الارتباطية بين مؤشرات كل نوع من أنواع المشكلات أنه توجد علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين مشكلة التفكك الأسري ومشكلة سوء العلاقات الاجتماعية لدى مدمني المخدرات وهذه العلاقة لها دلالة معنوية . وأيضاً توجد علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين مشكلة التمرکز حول الذات ومشكلة الاكتئاب لدى مدمني المخدرات وهذه العلاقة لها دلالة معنوية .

واتضح أيضاً من نتائج العلاقة الارتباطية بين أبعاد المقياس الرئيسية أنه توجد علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين المشكلات الاجتماعية المتمثلة في مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية ومشكلة التفكك الأسري و بين المشكلات النفسية المتمثلة في مشكلة التمرکز حول الذات ومشكلة الاكتئاب لدى مدمني المخدرات وهذه العلاقة أيضاً لها دلالة معنوية .

بالنسبة للتساؤل السادس:

اتضح من نتائج العلاقة بين متغير السن والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات أن هناك علاقة عكسية ضعيفة ليس لها دلالة إحصائية حيث بلغ معامل الارتباط بينهما $r = -0.048$ وهذا الارتباط العكسي الضعيف غير الدال إحصائياً يمكن تفسيره على النحو التالي أنه كلما قل السن كلما زادت درجة المشكلات الاجتماعية لدى المدمنين وبالتالي تزداد درجة التعرض للمشكلات النفسية كالتمركز حول الذات والقلق.

اتضح من نتائج العلاقة بين متغير الدخل والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات أن هناك علاقة طردية ضعيفة غير دالة إحصائياً حيث بلغ معامل الارتباط بينهما $r = 0.2645$ وهذا يعني أن هناك علاقة بين الدخل ودرجة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات ولكن هذه العلاقة ليست قوية.

اتضح من نتائج العلاقة بين متغير الحالة الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات أن درجة المشكلات الاجتماعية لا تختلف بحسب الحالة الاجتماعية حيث اتضح أن قيمة كاي^٢ المحسوبة أكبر من قيمة كاي^٢ الجدولية وهذا يعني أن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات والتي يعاني منها المدمن الأعزب لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمن المتزوج. فالمشكلات الاجتماعية واحدة عند المتزوج والأعزب.

اتضح من نتائج العلاقة بين متغير الحالة الصحية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات أن درجة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف بحسب الحالة الصحية حيث اتضح أن قيمة كاي^٢ المحسوبة أكبر من قيمة كاي^٢ الجدولية وهذا يعني أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمن والذي تكون حالته الصحية جيدة لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها

المدمن الذي تكون حالته الصحية متوسطة وأيضاً لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمن الذي تكون حالته الصحية سيئة.

اتضح من خلال نتائج العلاقة بين متغير الحالة العملية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات أن المشكلات الاجتماعية لا تختلف بحسب الحالة العملية حيث اتضح أن قيمة كاي^٢ المحسوبة أكبر من قيمة كاي^٢ الجدولية وهذا يعني أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون الذين لا يعملون لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون الذي يعملون أي أن المشكلات الاجتماعية واحدة عند العاملين وعند غير العاملين من المدمنين.

اتضح من خلال نتائج العلاقة بين متغير الحالة التعليمية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات أن المشكلات الاجتماعية لا تختلف بحسب الحالة التعليمية حيث اتضح أن قيمة كاي^٢ المحسوبة أكبر من قيمة كاي^٢ الجدولية وهذا يعني أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون المتعلمون لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون غير المتعلمون فالمشكلات الاجتماعية واحدة عن كلا الفئتين.

كما توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج العامة للدراسة :

- ١- يعاني مدمني المخدرات من مشكلات مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية وتمثلت هذه المشكلات في مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية ومشكلة التفكك الأسري .
- ٢- يعاني مدمني المخدرات من مشكلات نفسية وتمثلت هذه المشكلات في مشكلة التمركز حول الذات ومشكلة الاكتئاب .
- ٣- وجود علاقة ارتباطيه إيجابية قوية بين مشكلة التفكك الأسري ومشكلة سوء العلاقات الاجتماعية لدي مدمني المخدرات .
- ٤- وجود علاقة ارتباطيه إيجابية قوية بين مشكلة التمركز حول الذات ومشكلة الاكتئاب لدي مدمني المخدرات.

٥- وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين المشكلات الاجتماعية المتمثلة في مشكلة سوء العلاقات الاجتماعية ومشكلة التفكك الأسري وبين المشكلات النفسية المتمثلة في مشكلة التمرکز حول الذات ومشكلة الاكتئاب لدي مدمني المخدرات .

٦- وجود علاقة عكسية ضعيفة ليس لها دلالة إحصائية بين متغير السن والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات .

٧- وجود علاقة إيجابية ضعيفة غير دالة إحصائيا بين متغير الدخل والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات .

٨- المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف بحسب الحالة الاجتماعية أي أن درجة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات التي يعاني منها المدمن الأعزب لا تختلف عن درجة المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمن المتزوج .

٩- المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف بحسب الحالة الصحية أي أن درجة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات التي يعاني منها المدمن الذي تكون حالته الصحية جيدة لا تختلف عن درجة المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمن الذي تكون حالته الصحية متوسطة وأيضاً لا تختلف عن درجة المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمن الذي تكون حالته الصحية سيئة .

١٠- المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف بحسب الحالة العملية أي أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون الذين يعملون لا تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المدمنون الذين ليس لديهم عمل معين .

١١- المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لا تختلف بحسب الحالة التعليمية أي أن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات لدي المتعلمين لا تختلف عن المشكلات لدي غير المتعلمين .

١٢- اتضح من نتائج هذه الدراسة أن أقل متوسط لفئات العمر كان (١٧,٥ سنة) وأن أكبر متوسط لفئات العمر كان (٤٢,٥ سنة) وأن أعلى نسبة من العينة (١٩,٤٠%) تقع أعمارهم بين (٣٠- ٤٥ سنة).

١٣- أن (٤٩%) من العينة يدمنون الهيروين ، (١٩%) الأقراص ، (١٥%) الحشيش ، (١٢%) البانجو ، (٣%) الأفيون ، (١,٤٩%) الماكستون فورت .

١٤- اتضح من نتائج الدراسة أن نسبة (٤٩,٢٥%) هم الذين تعرضوا لإدمان المخدرات لمدة ٥ سنوات فأكثر ، وأن نسبة (٣٤,٣٢%) هم الذين تعرضوا لإدمان المخدرات لمدة تقل عن ٥ سنوات ، وأن نسبة (١٦,٤%) هم الذين تعرضوا لإدمان المخدرات لمدة تقل عن سنة .

١٥- اتضح من نتائج الدراسة أن أقل متوسط لقيمة الدخل قد بلغ (٣٥٠ جنيها) ، وبلغ أكبر متوسط لقيمة الدخل (٩٥٠ جنيها) .