



الجزء الثالث

فسيولوجيا النبات

الفصل الحادى عشر

تركيب النباتات الكيمياوى

١ — يجب علينا بعد اذ عرفنا بنية النباتات ظاهرها وباطنها أن نتقدم الى درس العمل الذى تؤديه الأجزاء على اختلافها لحفظ حياة النبات .

ويسمى هذا الفرع من علم النبات "بالفسيولوجيا" (Physiology) .

بين الأنواع الراقية من النباتات أجزاء وأنسجة شتى مهياة للقيام بوظائف خاصة أى أنواع من الأعمال الفسيولوجية ، فالأجزاء والأنسجة التى تؤدي بها هذه الوظائف تسمى "أعضاء النبات" (Plant Organs) .

ويحدر بنا فى المبدأ أن ننبه الى أن كل الوظائف على اختلافها تتوقف على مادة البروتوبلازم الحية ، والى أن عملها وقوتها للقيام بهذه الوظائف قياما تاما ، انما هو مرتبط ببعض الشرائط الخارجية وهى وجود الحرارة الملائمة ، والمدد الكافى من المواد الغذائية ، وتوافر مقدار خاص من الضوء فى حالة النباتات الخضراء وكذلك تعرضها لأوكسيجين الجو فاذا لم تتوافر هذه الشرائط حدث الموت وبطلت به الظواهر الحيوية المختلفة .

وتتقسم وظائف النباتات الى ثلاثة أقسام :

(١) الوظائف الغذائية — هذه مختصة بامتصاص مدد الغذاء واصطناعه وتخصيصه فهى لذلك مهياة خاصة ببقاء حياة الفرد .

(٢) الوظائف التناسلية — هذه مختصة بتوليد أفراد جديدة وحفظ النوع .

(٣) الحس والحركة والنمو .

٢ — يجب علينا قبل فحص عملية التغذية بالتفصيل أن نعرف شيئاً عن المواد التى تدخل فى تركيب النباتات . اذا احتقر نبات جديد من الأرض ووضع فى فرن محمى الى درجة فوق درجة غليان الماء قليلاً كأن تكون ١٠٥ م — ١١٠ م فانه يفقد شيئاً من وزنه بسبب خروج الماء من أنسجة النبات . فاذا استمرت عملية التجفيف أبداً بضع ساعات انطرد كل الماء من عصارة الخلية ومن مادة البروتوبلازم وجدران الخلايا ولم يبق من النبات إلا مادته الحامدة .

هذه البقية أى المادة الجافة تستعمل على مركبات كثيرة كيميائية مختلفة الأنواع بين عضوية وغير عضوية ، اذا أحرقت تركت وراءها مقداراً قليلاً من رماد لا يقبل الاحتراق لونه أبيض أو ضارب الى الصفرة وهذا الرماد متكون من مركبات غير عضوية أهم مؤلفاتها كان قد امتص من التربة بواسطة جذور النبات .

وفى الجدول الآتى بيان لمقدار الماء والمادة الجافة والرماد فى ١٠٠ جزء بالوزن من البزور والثمار والأوراق وغيرها من أجزاء النباتات الشائعة :

أنواع	ماء	مقدار المادة الجافة	الجزء القابل للاحتراق	رماد
القمح (حبوب)	١٤٠٣	٨٥٠٧	٧٦٠٥	٩٠٢
الشعير	١٤٠٣	٨٥٠٧	٧٢٠٧	١٣٠٠
الشوفان	١٤٠٣	٨٥٠٧	٧٥٠٧	١٠٠٠
القول	١٥٠٠	٨٥٠٠	٧٩٠٥	٥٠٥
بزر اللفت	١١٠٨	٨٨٠٢	٨٤٠٣	٣٠٩
التفاح	٨٤٠٨	١٥٠٢	١٤٠٨	٠٠٤
جذور الجزر	٨٥٠٠	١٥٠٠	١٤٠١	٠٠٩
درنات البطاطس	٧٥٠٠	٢٥٠٠	٢٤٠١	٠٠٩
الحشائش وهى خضراء ...	٨٠٠٠	٢٠٠٠	١٨٠٠	٢٠٠
البرسيم	٨٦٠١١	١٣٠٨٩	١٢٠٢٢	١٠٦٧
ساق البطاطس وورقه ...	٨٥٠٠	١٥٠٠	١٣٠٤	١٠٦

ومقدار الماء فى البزور الناضجة قليل نسبيا ويتراوح متوسطه بين ١٠ ١٥ ٦ فى المائة . فأما فى الثمار الطريئة والجذور الشحمة والدرنات والأوراق الخضراء والأعضاء الخضراوية الغضة فيندر أن يقل مقدار الماء فيها عن ٧٥ فى المائة وقد يبلغ ما بين ٧٥ و ٩٠ فى المائة من مجموع وزنها . ونسبة الرماد فى المادة الجافة من الحبوب والجذور الطرية والدرنات هى فى الجملة أقل بكثير منها فى الأوراق وقلف النباتات .

تج ٧٣ : زن قطعا من الجزر والفت والبطاطس والتفاح والشليك كلا منها على حدة فى أطباق فخارية ثم انقع كلا منها قطعا كثيرة صغيرة الحجم . وضع الأطباق ومحتوياتها فى فرن دافئ . أو فرن مائى وزنها كل ثلاث ساعات ولاحظ مقدار ما تفقده من الوزن .

تج ٧٤ : كرر التجربة السابقة بأوراق البطاطس والفت والبنخ وغيره من الأشجار وكذا أوراق الحشائش المقطوعة حديثا ودقيق القمح جميعه ودقيق القول جميعه .

٣ — المادة الجافة من نبات ما تشتمل على : مقدار قليل من مواد غير عضوية لم تستعمل امتصت من التربة ، ومقدار كبير من المركبات المختلفة العضوية صاغها النبات من المواد الغذائية التي امتصها من التربة والهواء .

وإذا أعطينا قائمة بالمركبات التي تصادف في باطن النباتات احتاج الأمر الى مجلد ضخم على أن الأمر غير محتاج هنا الى وصف شئ غير المواد العضوية المهمة التي منها يتكوّن جرم النبات . وقد تقسم هنا قسمين .

(١) مواد غير نتروجينية (٢) ومواد نتروجينية تبعاً لما اذا كانت المركبات تشتمل على نتروجين أو لا تشتمل .

(١) المواد العضوية غير النتروجينية .

أهم أنواع هذا القسم هى الكاربوايدرات والدهون والحوامض المذكورة بعد .

(١) كاربوايدرات — هذه المركبات تتكوّن أكبر جزء من جسم النباتات . وتشتمل على كاربون وايدروجين وواوكسيجين .

والايدروجين والواوكسيجين موجودان فيها بنفس النسبة التي يوجدان عليها فى الماء . وأهم المواد الكاربوايدراتية هى أنواع السكر والنشا والأنيولين وأنواع السلولوز وأنواع البنتوزان .

(٢) أنواع السكر — كل أنواع السكر تقريباً حلوة المذاق قليلاً أو كثيراً . وهى توجد فى الغالب ذائبة فى العصارة الخلوية . وأشيع أنواعه الجلوكوز والفراكتوز وقصب السكر والمولتوز .

(١) الجلوكوز أى الدكستروز أو سكر العنب (ك_٦ بد_{١٢} أ_٦) يوجد فى أغلب الفواكه ولا سيما فى العنب إذ يشتمل عصيره على مقدار يتراوح بين ٢٠ و ٣٠

فى المائة أما التفاح الناضج فيشتمل على متوسط من السكر مقدار ١٠.٦ ٧ فى المائة ويشتمل الكرز على ٩ الى ١٠ فى المائة ويشتمل البرقوق على مقدار بين ٣ و ٥ فى المائة من هذا السكر .

(٢) الفراكروز أى سكر الفواكه أوليفيولوز (ك يد ١) يوجد فى الفواكه الناضجة أيضا مرافقا لسكر العنب . وكلا نوعى الدكستروز والليفولوز يختزل محلول فهلينج ، وهما قابلان للاختمار مباشرة باليستة (الخميرة) (Yeast) .

تج ٧٤ : أذب ٣٥ جراما من سلفات النحاس فى ٥٠٠ سم م م من الماء وضع على ماعون المحلول ورقة مكتوبا عليها حرف (أ) ثم أذب ١٦٠ جراما من البوتاسا الكاوية و ١٧٣ جراما من نترات الصوديوم البوتاسيوم فى ٥٠٠ سم م م من الماء وضع عليها ورقة مكتوبا عليها حرف (ب) فاذا خلطت مقدارين متساويين من (أ) و (ب) بعضهما ببعض تجهز لديك المحلول المعروف بمحلول "فهلينج" . (ويجب حفظ كل من المحلولين (أ) و (ب) منفصلين ولا يمزجان إلا عند الحاجة الى محلول فهلينج فانه يفسد اذا حفظ طويلا) .

اعصر بضع نقط من عصارة العنب فى أنبوبة اختبار تشتمل على ١٠ سم م م من محلول فهلينج . وشحن الأنبوبة وما فيها على مصباح بنسن (Bunsen flame) وانظر الراسب المحمر من أكسيد النحاسوز . (نح ١) اختبر عصارة البرقوق الناضج وغيره من الفواكه بنفس الطريقة .

(٣) سكر القصب أو سكروز (ك يد ١) يوجد فى العصارة الخلوية من السوق والجذور فى كثير من النباتات ولا سيما قصب السكر والبنجر اللذين يستخرج منهما هذا النوع للتجارة به .

وعيدان سكر القصب تشتمل على مقدار يتراوح بين ١٥ و ٢٠ فى المائة والبنجر من ١٢ الى ١٦ فى المائة من هذا الكربوايدرات وهو يختلف عن السكرين السابقين فى أنه لا يختزل محلول فهلينج ولا يمكن تخميره بالخميرة مباشرة . واذا غلى مع حوامض مخففة أو أثر فيه بانزيم (الانفرتاس) الذى يوجد فى الخميرة

وفى كثير من أنسجة النباتات تحلل الى مخلوط من الدكستروز واللفيولوز يسمى "السكر المقلوب" (Invert-sugar) .

تج ٧٥ : اغسل بعض قطع البنجر فى الماء .

(١) اختبر بعض المحلول لمعرفة ما اذا كان به سكر مما يختزل محلول فهلينج أم لا ، كافى (تج ٧٤)

(ب) خذ ١٠ سم م م من محلول وأضف اليها ثلاث نقط أو أربعا من حامض الكلوريدريك القوى واغل الجميع مدة ٢٠ دقيقة وبعد معادلة الحامض بمحلول من كربونات الصودا اغله وأعد فحصه بمحلول فهلينج .


(٤) مولتوز (ك بد ا) هو نوع من السكر مكون بتأثير الانزيم داياستاز فى النشا وهو يوجد فى بزور شعير البيرة المستنبئة (Malt) وغيره من الحبوب المستنبئة . وهو قابل للاختبار بواسطة الخميرة مباشرة ويختزل محلول فهلينج ولكن ليس بدرجة سكر العنب .

(ب) النشا (ك بد ا) يوجد هذا الكربوايدرات على شكل حبوب عضوية صغيرة الحجم صلبة متركبة من طبقات عديدة بعضها فوق بعض ومنظمة حول نواة أو سرة تكاد تكون مركزية ، على أنه قد يرى نواتات أو أكثر فى نفس الحبة فتسمى الحبة إذ ذاك "مركبة" وحبوب النشا تكونها بلاستيدات الخلايا عادة وأوفر ما تكون فى الجذور والدرنات والحبوب حيث تكون بمثابة مخزن من الغذاء المدخر . ويوجد النشا فى حبوب الغلال الحافة بنسبة ٥٠ الى ٧٠ فى المائة من وزنها وفى البطاطس بنسبة ١٠ الى ٣٠

وحبوب النشا تختلف حجما وشكلا حتى فى نفس النبات على أنها فى بعض النباتات ذات خصائص ممتازة فى شكلها وأبعادها حتى ليستطاع تمييزها تحت الميكروسكوب . فحبوب النشا المستخرجة من درنات البطاطس منبسطة

بيضية بلا انتظام . حجمها كبير بالقياس الى غيرها ونواتها غير مركزية (Excentric) رقم ١ . (شكل ٦٩) .

وفى القمح والشعير يوجد من هذه الحبوب فى خلايا الالندوسبرم ماهو كبير وصغير وكلاهما مفرطح على شكل بزر العدس وله نواة مركزية (٢ . شكل ٦٩) .



(شكل ٦٩)

- (١) حبوب نشوية من البطاطس : ن = نواة الحبة (٢) حبوب نشوية من القمح .
 (٣) حبوب نشوية من الشوفان ؛ ح = حبة مركبة ؛ ق = قطع من حبة مركبة .
 (٤) حبوب نشوية من الفول . (مكبرا ٣٦٠ قطرا) .

أما فى فلقات بزور البازلاء والفول وغيرهما من النباتات القرنية فإن الحبوب بيضية وعلى شكل الكلوة (كما فى رقم ٤ . شكل ٦٩) وفيها شقوق متشعبة فى وسطها .

وتكون الحبوب فى القرطم بيضية مركبة ، جزئياتها المركبة لها (ن) صغيرة وزاوية (Angular) .

وتسمى المادة التى تكوّن الحبة ” بالنشا ” أو ” الأميلوز ” ويوجد منها على ما يظهر نوعان مختلفان اختلافا يسيرا وإذا عوملت بمحلول اليود انقلب لونها أزرق بنفسجيا قائما .

وايزيم الدياستاز يحولها الى مالتوز وكثير من المواد القابلة للذوبان من المواد الكربوايدراتية الشبيهة بالصمغ وهذه تسمى ” دكستريانات ” .

قد كان العالم ” ناجيل ” وغيره يرون أن حبة النشا تشتمل على مادتين هما ” الجرانولوز ” و ” السلولوز النشوى ” و ” الفارينوز ” الذى يبقى كمتخلف غير قابل للذوبان إذا عوملت حبوب النشا باللغاب أو بالأحماض المخففة ، على أن هذا المتخلف لم يكن موجودا فى حبوب النشا من قبل ولكنه حاصل فعل المذوبات المستعملة وعليه فهو كما قال العالم ماير ” أميلودكسترين ” وإذا غلى النشا مع الأحماض المخففة استحال جلوكوزا ودكسترينا . وإذا غلى مع الماء انتفخ النشا وكون عجينة فالودجية القوام غير قابلة للذوبان . وإذا عرضت لحرارة جافة أو حمصت الى درجة ١٥٠ - ٢٠٠ انقلب النشا أسمر واستحال الى نوع من الدكسترين .

وتشتمل حبوب النشا فى بعض الأحيان على مادة الأميلوز ومعها مقدار من الأميلودكسترين وهذا ينقلب أحمر اللون كالنيذ إذا عومل بمحلول من اليود .

ويحصل على النشا التجارى بواسطة فصله فصلا ميكانيكيا من درنات البطاطس بعد هرسها أو من حبوب القمح والذرة .

تج ٧٦ : اقم بذرة من القمح والشعير والذرة والاورعرضيا بسكين واكشط بلطف جزءا صغيرا من الاندوسبرم وثبتة فى الماء واخص حبوب النشا بالقوتين الصغرى ثم الكبرى وانظر هل هى بسيطة أم مركبة ولاحظ صورتها وحجمها النسبى وكذا شكل السرة وموضعها فى كل من هذه الحبوب .

تج ٧٧ : اقطع بذرة فولة وبازلاء مارا بالفلقتين وكذا اقطع درنة بطاطس . واكشط الجزء المقطوع بمعد السكين وانقل الحبوب النشوية المنحصلة الى نقطة من الماء على لوحة زجاجية . واخص صورة الحبوب النشوية وحجمها وشكلها ودون ذلك .

تج ٧٨ : اقطع أجزاء رقيقة من قطعة من درنة بطاطس وكذا من بذرة قمح . واخصها بالقوة الصغرى واعمل رسما عن الحبوب النشوية الموجودة داخل الخلايا المنظورة .

تج ٧٩ : اعمل محلولاً قويا من يودورالبوتاسا فى الماء وأضف اليه بعض بلورات اليود واترك المخلوط مدة اثنتى عشرة ساعة وهزها من آن لآن ليو م كله فأضف إليه ماء آخر حتى يصبح لون المخلوط كيتا (أحمر كالنيبذ) .

عند فحص حبوب النشا فى التجارب السابقة (٧٦ — ٧٨) ضع نقطة من هذا المحلول بالقرب من حدة قطعة الغطاء الزجاجى الشئى حتى يجرى ماء النقطة تحت الزجاجية وتتصل بحبوب النشا ولا حظ تغير لون حبوب النشا .

تج ٨٠ : اسخرج مستحلبا من الدياستاز كالآتى : هز خمس حبات من مسحوق المولت (الشعير بعد انباته وفصل الأجنة عنه) فى خمسين سم م من الماء البارد وبعد تركه راكدا مدة أربع ساعات رشحه لتحصل على محلول رائق . ثم اطحن قليلا من النشا فى الماء أوليكن الطحن فى هاون . وصب قليلا من المخلوط فى دورق سعته ٢٠٠ سم م فيه ماء غال . فاذا برد فصب ٢٠ سم م تقريبا من هذه العجينة الرقيقة من النشا فى ثلاث أنابيب اختبارية . بين وجود النشا باضافة بضع نقط من محلول اليود المذكور فى تج ٧٩ الى أنبوبة من الثلاث . وأضف الى

الاثنين الباقيتين ٣ سم م أو ٤ من خلاصة الدياستاز وسخنها الى درجة ٦٠ مثنية . واختبر وجود النشا فى احدى هاتين الأنبوبتين بأن تأخذ كل خمس دقائق بضغ نقط بشفاطة وتضيفها الى محاليل مخففة من اليود بعد أن تكون قد وضعت فى عدة أنابيب .

بعد مدة ينقلب النشا سكرًا ودكستريّن . فاذا حصل ذلك فاختبر وجود السكر بواسطة محلول فهلينج .

تبين هل تؤثر عجينة النشا الرقيقة فى محلول فهلينج . اذا لم يصف اليها دياستاز مطلقا .

السلولوزات — يتركب هيكل النبات الصلب من جدران خلوية بينها البروتوبلازم . وتكون هذه الجدران فى أول عهدها رقيقة ثم يغلب أن تغلظ من تراكم طبقة من المادة فوق طبقة على باطن الجدران حيث نتلامس بالسيتوبلازم . واذا كانت الخلايا فى حالة انقسام وكانت الجدران فى حالة تكون ترى هذه على صورة طبقات رقيقة من مادة السيتوبلازم ممتدة فوق الخلايا الآخذة فى الانقسام . وفى عملية التغلظ تبدو الطبقات الجديدة كأنما تكونت من تحوّل الطبقات الخارجية من السيتوبلازم وذلك لأنه اذا حدث غلظ فى جدار خلية شوهد نقص تدريجى فى المشتملات البروتوبلازمية من الخلية حتى لا يبقى من هذه المشتملات شئ فى تجويفها .

وقد جرت العادة بتسمية المادة المكونة لجدار الخلية "بالسلولوز" كأنما هو مادة كىماوية مفردة . على أنه يعرف الآن من هذا السلولوز أنواع مختلفة . وتتركب جدران خلايا النبات من مخاليط أو مركبات من هذه السلولوزات مع غيرها من المواد .

فأما ما يسمى "بالسلولوز الأصيل" فيمكن الحصول عليه من وبر القطن وألياف الكتان بواسطة معالجة الأخيرة بمواد كىماوية شتى لازالة المواد المتحددة معها أو المختلطة بها . فما السلولوز إلا كروايدرات له ذلك الرمز النظرى الذى

تمثله (ك ب د ا) . هذا السلولوز الأصيلى غير قابل للذوبان فى الأحماض ولا القلويات المخففة ولكنه يذوب فى أوكسيد النحاسيك النوشادرى وفى محاليل كلورور الزنك المركزة الحارة وغيرها من المذوبات وإذا عومل السلولوز بحامض الكبريتيك واليود معا أوزنك اليود ازرقة لونه . وإذا عومل بحامض الكبريتيك وحده استحال الى سكر دكستروز .

وهناك نوع آخر من السلولوز يوجد فى جدران خلايا الأنسجة المتخشبة . فإذا حصل عليه خالصا من المواد المتحدة معه أو المختلطة به تبين أن هذه الأنواع مختلفة عن السلولوز الناتج من وبر القطن فى بنائها الكيماوى أكثر من اختلافها فى تركيبها النظرى المشار اليه . فهى تشتمل على نسبة مئوية من الأوكسيجين أكثر قليلا من ذلك وتكون أضعف مقاومة للعملية الهيدروليزية ولا تعطى إلا مقادير صغيرة من سكرى الدكستروز والمنوز إذا هى عوملت بحامض الكبريتيك ، وزد على ذلك أن الدهيد الفورفورال ينتج إذا تآدرت (Hydrolysed) سلولوزات من هذا القبيل من حامض الايدروكلويك المخفف . وجدران خلايا الأنسجة الاندسهرمية وفلقات البرور متكونة من مواد هيميسلولوزية وهى من الاختلاف عن النوعين المذكورين فى خواصها الكيماوية بحيث لا تستحق أن تدرج فى سلك السلولوزات مطلقا . إلا من حيث انها تشابه الآخرين فى مظهرهما وأنها هى المواد التى يتكون منها بعض جدران الخلايا . وأنواع الهيميسلولوزات سهلة الأدرتة بواسطة الأحماض والقلويات المخففة فتستحيل الى سكر الجللاكتوز والمنوز والبنروز . ولا يوجد أى نوع من السلولوزات المذكورة على حالة نقاوة فى النباتات مطلقا الا فى ألياف تبيلة القطن فقد يوجد نقيا ، وانما تكون متحدة أو مختلطة بمواد أخرى تكون ثلاثة أنواع أصلية مما يسمى "بالسلولوز المركب" كما هو مبين فيما يلى :

(١) بيكتوسلولوزات — هذه مركبات أو مخاليط متألفة من السلولوزات الأصلية مع البكتوز . وإذا أدريت الأخير مع الأحماض أو القلويات المخففة يعطى مادة بكتين التى هى مادة لتجلتن (Gelatinise) بسهولة . والجدر الخلوية من القطن الخام وألياف الكتان وغيره من الألياف غير الخشبية وكذلك غالب الأنسجة البرنشيمية ولا سيما أنسجة الجذور الشحمة والثمار كالجزر واللفت والتفاح والكثيرى تتكون فى الغالب من هذا النوع من السلولوز المركب .

ويؤكد مانجن (Mangin) أن أول الجدر التى تتكون أثناء انقسام الخلية إنما هى من البكتوز على الأخص . فأما الطبقات المسددة الثانوية من أغلب الجدران الخلوية غير الخشبية فهى مكونة من سلولوز وبكتوز معا .

ويلحق بالبيكتوسلولوزات مواد الميوكوسلولوزات المتكونة من سلولوز ومواد أخرى تعطى محاليل لزجة إذا أذيت فى الماء . وتوجد هذه المواد فى العادة فى بعض الجذور والثمار .

(٢) الاديوسلولوزات — تظهر الجدر الخلوية من النسيج الفلى كأنها مؤلفة على الأخص من مادة دهنية أو شمعية تسمى ”سوبرين“ (Suberin) متحدة مع مقدار قليل جدًا من السلولوز وهذه المواد تلحق الكيوتوسلولوزات التى تتكون الجدر الخلوية فى بشرة النباتات . وتشبه المادة المعروفة بالكيوتن (Cutin) مادة السوبرين مشابهة قريبة فى تركيبها وخواصها . وإذا عوملت الجدر السوبرينية أو الكيوتينية بمادة كلورزنك اليود انقلبت سمراء ضاربة الى الصفرة وهما غير قابلتين لنفوذ الماء منهما وعلى ذلك فهما يمنعان فقدان الماء من الأنسجة المغطاة بهما . فأما أن الكيوتن والسوبرين هما حاصلان ناتجان من تحوّل مادة السلولوز مباشرة فهى مسألة لم تحل حتى الآن .

(٣) الجنوسلولوزات — تتكوّن الجدر الخلوية فى النسيج الخشبى فى النباتات من جنوسلولوزات وهذه مركبات متجانسة من :

(١) سلولوز أو اوكسيسلولوز .

(ب) بنتوزان وهذا يعرف ”بالصمغ الخشبى“ .

(ج) بعض مركبات عطرية لم تعزل نقية .

فأما المادتان ب و ج فيطلق عليهما فى العادة اسم ”لجنين“ أو ”لجنون“ والجنوسلولوزات هى مكونات ابتدائية من الأنسجة النباتية وليست سلولوزات صلبة ملبسة باللجنين تكونت بسبب تغيرات كىماوية ثانوية .

والجدر الخشبية تصبح قرنفلية اللون اذا هى عوملت بمادة الفلوروجلوسين وحامض الادر وكلوريك وتكون صفراء اللون فى محاليل كلورور الأنيلين وتصبح الجدر صفراء اذا هى عوملت بمادة كلورزنك اليود .

والجدر الخلوية من النسيج الخشبى فى الخشب الصمى من الأشجار وغيره من أجزاء النباتات تتلون أحيانا بالدباغ أى بالتين ومواد ملونة شتى .

ويتركب الورق على اختلاف أنواعه من سلولوز يحصل عليه من خرق التيل والقطن والخشب والقش غالبا .

تحج ٨١ : لتحضير كلورزنك اليود يذاب ٢٥ جزء من كلورور الزنك وثمانية جزء من يودور البوتاسيوم فى $\frac{1}{4}$ ٨ أجزاء من الماء ويضاف اليه من اليود بقدر ما يجعل لون المحلول كلون جبيد غامقا .

أقطع قطاعات من السوق وغيرها من أجزاء النباتات وثبتها فى المحلول ، لاحظ أن الجدر غير الخشبية وغير الكيوتوكلارية ذات لون أزرق ولاحظ تأثير المحلول فى وبر القطن وفى قطاعات الخشب .

تج ٨٢ : اقطع قطاعات من البزور بواسطة مومى جافة . وثبت بعض هذه القطاعات فى الماء واغصها وثبت البعض فى الجليسرين النقى واغصها وانقع بعض بزور الخردل والكّان فى الماء . ولاحظ لزوجة سطح البزور .

تج ٨٣ : اقطع قطاعات من سوق نباتات شتى وثبتها فى محلول مشبع من كلورورالانيلين اضعف اليه قطا قليلة من حامض الايدروكلوريك . هنا تتلون الجدران الخشبية بلون ذهبي .

(د) البنتوزانات — ويلحق بسلولوز الأنسجة النباتية كربوايدراتات تسمى البنتوزانات (ك بد ا) واذا سخنت هذه المواد مع الأحماض المخففة ادرت وانقلبت سكرات بنتوزية (ك بد ا) عرابينوز أوزيلوز .

وتتكون البنتوزانات أثناء عهود النمو الأولى ويزداد مقدارها بتقدم النبات فى السن . ويظهر أن هذه الكربوايدراتات قليلة الفائدة فى عمليات التغذية فى النباتات ولكن أكلة العشب من الحيوانات تهضمها جزئيا وتمثلها . وهذه البنتوزانات شائعة فى الأنسجة النباتية جميعها وأكثر ما تكون فى النجيليات وقش الغلال .

(هـ) الأنثولين (Inulin) — هو كربوايدرات له نفس التركيب المئبى الذى للنشا وهو قابل للذوبان فى الماء ويوجد ذاتيا فى العصارة الخلوية من كثير من نباتات الفصيلة المركبة والناقوسية (Campanulaceae) وغيرها من الفصائل . وهو يوجد أيضا فى بصلات كثير من نباتات الفصيلة الزنبقية (Liliaceae) والأماريليداسية (Amaryllidaceae) وكذلك فى أوراق هذه النباتات وأجزائها الخضراوية ويكثر الأنثولين فى جذور الدهلية (Dahlia) والسريس (الشيكوريا) وفى درنات الطرطوفة إذ تحل محل النشا كغذاء مكثز .

واذا وضعت أجزاء من هذه الجذور والدرنات فى كؤول قوى بضعة أيام انفصل الأنىولين على صورة كتل كرية صلبة فى بلورات ابرية الشكل منتظمة على شكل متشعب خاص ولا يختل الأنىولين محلول فهلنج ولكنه اذا غلى مدة طويلة فى الماء أو لمدة قصيرة فى أحماض مخففة انقلب كله الى ليفيولوز .

تج ٨٤ : انقع قطعة من جذر العارطوفة فى كؤول مثل قوى بضعة أسابيع . واعمل قطاعات منها بعدئذ وثبتها فى جليسرين نقى واخصها بعد ذلك وارسم البلورات الكرية من الأنىولين .

(٢) الدهون والزيوت الثابتة : هذه المواد التى هى مخاليط من مركبات شتى من الجليسرين والأحماض الدهنية تتركب من نفس العناصر الثلاثة التى توجد فى الكربوايدرات ولكن أوكسيجينها أقل من أوكسيجين تلك بالنسبة الى الهيدروجين فى الكربوايدرات وترى فى المبدأ غالباً على شكل نقط مستديرة صغيرة من جزئيات غير منتظمة تكاد تكون طرية أو نصف صلبة داخل سيتوبلازم الخلايا وبعد ذلك تجرى النقط بعضها الى بعض ثم تفرز فى العصارة الخلوية حيث تجتمع .

والزيوت والدهون مواد غذائية نباتية مكثزة وهى على ذلك تكثر فى الاندوسبرم وفى الفلقتين من البزور وكذا فى بعض الثمار . وبزور نبات الريب (نوع من اللفت) تشتمل على متوسط من الزيت مقداره ٤٢ فى المائة . أما بزور الكان فتوسطها ٣٦ ٪ ومتوسط بزور القطن ٢٥ ٪ .

ويتكون مختلف أنواع الكعكات الزيتية (Oil cakes) ، أى الكسب التى تستعمل لتغذية المواشى ، من حثالة كثير من أنواع البزور والثمار بعد اذ استخرج أكثر ما فيها من الزيت بواسطة العصر وغيره من الوسائل .

نحج ٨٥ : اعمل قطاعات عريضة رقيقة من بزور اللوز واللفت والبندق البرازيلى والكّان .
ثبتها فى الماء واغصها بقوة مكبرة لاحظ استدارة النقط الزيتية ولعانها فى الخلايا وفى الماء
حول القطاع .


(٣) الزيوت الطيارة أو الأساسية — يعزى الى هذه المركبات تلك
الرائحة العطرية التى توجد فى كثير من النباتات كالورد والنعنع واللاوندة
والفليسة .

وكثير من الزيوت الأساسية متكوّن من كربون وايدروجين فقط فى حين
أن غيرها يشتمل فوق ذلك على أوكسيجين . وهى توجد غالبا على شكل نقط
فى سيتوبلازم الخلايا وقد تجتمع هذه النقط فى أجزاء خاصة من الشعيرات
الغددية وغيرها من التخوت الزهرية .

(٤) الأحماض العضوية : أشيع أمثلة هذه المركبات التى توجد فى خلايا
النباتات الخضراء هى حوامض الاكساليك والماليك والستريك والطرطاريك .
وتوجد إما منفردة أو متحدة مع قواعد شتى عضوية أو معدنية فتكوّن إذ ذاك
أملاحا حمضية أو متعادلة .

وأشيع ما فى النبات من الحوامض هو الحامض الأوكساليك وهذا يكون
منفردا وفى الاكثر يكون متحدا بالكلسيوم او البوتاسيوم فى النسيج البرنشىمى
من الأوراق والسوق والجذور وإلى الملح البوتاسى الحمضى تعزى حموضة
طعم أوراق الحميض (روميكس) وبعض أنواع الأوكساليكس .

وبلورات أوكسالات الجير شائعة جدا فى أنسجة عدد عظيم من النباتات
وهى تتكوّن فى الفجوات التى فى السيتوبلازم وتحدث على شكل (١) بلورات



(شكل ٧٠)

- (١) بلورات مفردة كبيرة من أوكسالات الكلس من خلايا برنشيم ورقة البرسيم الحجازى ؛
(ب) مجاميع بلورية من ورقة الراوند ؛
(ح) حزم بلورية من ورقة نبات الفخسيا .

مفردة (١ . شكل ٧٠) .
(٢) مجاميع بلورية متشعبة (ب)
أو (٣) حزم من البلورات الابرية
الشكل أورافيدات (ح) وهذه
الصورة شائعة فى الخلايا فى كثير من
ذوات الفلقة المفردة .

أما حوامض المالك والستريك
والطارتاريك فتوجد منفردة أيضا
أو متحدة مع الجير أو البوتاسا ولا سيما
فى أنواع شتى من الثمار الفجة ويشتمل
الليمون على ٥ الى ٧ فى المائة
من الحامض الستريك .

نمج ٨٦ — عالج أوراق بعض البرسيم والخلبان وأوراق غيرهما بماء جافيل (كما فى نمج ٧٠)
واغسلها فى الماء وثبت قطعة صغيرة فى الجليسرين .

ثم لاحظ صورة بلورات أوكسالات الكلسيوم وموضعها فى الأوراق . واعرف فى أى
جزء من أنسجة الأوراق تكثر هذه البلورات .

(٢) المواد النتروجينية العضوية — تشتمل هذه المركبات على عنصر
النتروجين وكثيرا ما تشتمل أيضا على عناصر أخرى كالكبريت والفوسفور
فضلا عن الكربون والهيدروجين والأكسجين .


وأهم أمثلتها البروتيدات والاميدات والالكلويدات .

(١) البروتيدات — البروتيدات مركبات معقدة التركيب جدًا لم يمكن الى الآن معرفة علامتها الكيماوية . وهى فى العادة لزجة القوام كبياض البيض وهى كمثلها تتجمد بالتسخين ؛ بعضها قابل للذوبان فى الماء وبعضها غير قابل . وأبسط أنواع البروتيدات مركبة من الكربون والايديروجين والأوكسيجين والنيتروجين والكبريت وهى تشتمل على ما بين ١٥ و ١٧ فى المائة من النيتروجين وما بين $\frac{1}{4}$ و ٣ فى المائة من الكبريت وبما أن البروتوبلازم يتركب فى الأكثر من بروتيدات فهى ترى فى كل أجزاء النباتات الحية وزد على ذلك أن منها ما يوجد ذاتيا فى العصارة الخلوية .

وبعض البروتيدات تكون مخزونة فى الفجوات الخلوية وفى العصارة الخلوية من البزور وغير ذلك من الأعضاء الساكنة (Resting Organs) كغذاء لتروچينى مخزن على صورة حبيبات صلبة مستديرة أو غير منتظمة الشكل وتسمى هذه ” بالحبيبات الأليرونية “ (Aleuron-grains) أو ” الحبيبات البروتيدية “ وهذه الحبيبات الأليرونية تكون فى الغلال صغيرة جدًا ومستديرة وتكون مخترنة على الأخص فى الطبقات الخارجة من الاندوسبرم (شكل ٧١) . أما فى غيرها من البزور النشوية كالفول والبازلاء فتكون صغيرة ولكنها فى كثير من البزور الزيتية كحبوب الحروع والبندق البرازيلى تكون كبيرة وتشتمل فى الجملة على جزء صغير مستدير من فوسفات الكلسيوم والمغنيزيوم مضاف الى بلورة بروتيدية أصغر منه أو أكبر .

وتشتمل بزور الترمس على متوسط فى المائة من البروتيد قدره ٣٤ و بزور الفول على ٢٤ والقمح على ١٣ والشعير على ١٠ والقش على ٣ والبطاطس على ٢ واللفت على ١ تقريبا .

والبروتيدات الصلبة تنصبغ بفعل اليود فتقلب صفراء .



(شكل ٧١)

(١) قطاع عرضى من حبة القمح . لك = برىكارب ؛ طل = طبقة اليورونية ؛ ف = جزء نشوى من الاندوسبرم ؛ ق = قناة فى ظهر الحبة . (٢) الجزء أ من القطاع المذكور (مكبرا ١٦٠ قطرا) ؛ لك = برىكارب ؛ طل = طبقة اليورونية ترى الحبيبات الاليورونية الصغيرة ونواة مركزية داخل كل خلية ؛ خ = خلايا اندوسبرم تشتمل على حبوب نشوية .

تج ٨٧ : (١) اقطع قحمة قسمين عرضيين ثم اقطع شريحة رقيقة مشتملة على جزء صغير من الطبقة البرىكاربية والاليورونية كما فى شكل (٧١) .

ثبت ذلك فى جليسرين مخفف وضع نقطة من محلول اليود تحت الغطاء الزجاجى . لاحظ لون حبيبات النشا والحبيبات الاليورونية .

(٢) اعمل قطاعا مثل ذلك من حبة الشعير وانتارهل الطبقات الاليورونية فى هذه الحبة مثل ماهى فى حبة القمح ؟

تج ٨٨ : اعمل قنانات من فلفلى النول والبازلاء وثبتها فى جليسرين مخفف ثم افحصها . لاحظ الحبيبات الصغيرة الاليورونية فى الخلايا هى والحبيبات النشوية الكبيرة . اصبغها باليود ثم أعد فحصها .

(٣) الأميدات — هذه المواد مركبات نتروحينية بلورية قابلة للذوبان توجد ذائبة في العصارة الخلوية . وأكثرها حوامض أميدية أمشتقات بسيطة منها . وهى مواد مخترنة توجد على الأخص في الريزومات والبصلات والدرنات والجذور من النباتات ويندر أن توجد في البزور الكامنة وأشيع هذه المواد انتشارا مادة الاسبراجين (Asparagine) فهى توجد في برنشيمة كل أجزاء النباتات تقريبا وتكثر على الأخص في صفار فراخ الهليون وأزهار البروكسل ودرنات البطاطس وفي بواذر الترمس والجلبان وغير ذلك من النباتات القرنية المزروعة في الظلام .

ومن الأحماض الأميدية الشائعة الجلوتامين والبيتين واللوسين والتيروسين وهذه توجد في بنجر السكر واللفت وغيرهما من الجذور .

(٣) الالكلويدات — هى مركبات عضوية قاعدية أكثرها سام وتكون الجوهر الفعال في كثير من النباتات المستعملة في الأقرباذين وأعرف أمثلتها المورفين الذى يحصل عليه من الخشخاش (أبي النوم) والنيكوتين الذى يستخرج من شجرة التبغ والهايوسيامين الذى يستخرج من شجرة الهايوسيامس ميوتيكوس ، والأستركنين الذى يحصل عليه من الجوز المقيء .