

مشابهة بينها وبين النباتات الطحلبية التي تكاثر بالانقسام كما تكاثر هذه الاحياء. ووجه مشابهة بينها وبين النباتات الفطرية في امور كثيرة فاعشروها تسمى من النباتات المنفل التي تدخل تحت رتبة الثالوفيتا^(١) واطلق عليها اسم الشيزوميستز

المكروبات بوجه عام

(١) تركيب الكروب - يتحرك جسم الكروب من خلية صغيرة جداً لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بواسطة الميكروسكوب مكبرة الف مرة أو أكثر. ويصعب درس هذه الخلية نظراً إلى صغر حجمها المتناهي ومع ذلك فقد يشاهد فيها عند التأمل مادة شغافة في الغالب زججة قد تكون مشتملة على حبيبات دقيقة جداً وهذه المادة تسمى بالبروتوبلاسم^(٢) ويحيط بالمادة المذكورة غلاف من مادة آليّة نيتروجينية يتكوّن منه جدار الخلية. أما البروتوبلاسم فتركب من الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين وفي الغالب من عناصر اخرى مثل الفسفور والكمبريت وغيرها بنسب مختلفة لم يتكّن الكيماويون من وضع طلامة كيميائية لها ولا يرى في الخلية نواة محدودة كما هي في الخلايا الزاوية وإنما يشاهد فيها حبيبات كروماتينية^(٣) غالباً قد تكون منتشرة أو متجمعة في اطرافها والحبيبات المذكورة معتبرة كنواتها

وقد يوجد بعض الاحيان في البروتوبلاسم حبيبات زججة او كبريتية او نشوية او غليكوبروتينية او حديدية غير الحبيبات الكروماتينية المذكورة تحقق وجودها بطرق كيميائية عملت في الخلية المكروبية

(١) الرتبة الاولى من النباتات هي الثالوفيتا (Thallophyta) وتشتمل على جميع النباتات التي يستحيل فيها تطورها عن سوتها وتكثرت اجزائها خلية وعلينا ثلاثة اقسام (الاول) الشيزوميستز (Sizomycetes) اي المكروبات او الفطر الذي يتكاثر بالانقسام (Kasion) (والتالي) الفنجامي (fungi) نباتات فطرية عديدة المادة المخضراء ولذلك لا تغل ثاني اكسيد الكبريت من الهواء (والتالي) الاضي (algae) اي النباتات الطحلبية ذات المادة المخضراء. هذه اقسام الرتبة الاولى وهناك رتب ثلاث ارق من هذه هي البريوفيتا (Bryophyta) والثيريدوفيتا (Pteridophyta) والنبوتوجاميا (Planerogamia)

(٢) البروتوبلاسم (Protoplasm) كلمة مركبة من كلمتين يونانيتين معناه المادة الاولى للتكوين

(٣) الحبيبات المذكورة وصفت بانها كروماتينية فاعلمنا فنقول باصاح انروموم (Chromium)

مكروب في اربع وعشرين ساعة عرف ما ينتج عن سرعة هذا التكاثر من مساعدة الانتشار وكثرة المضار فكم يكون مقدار الضرر اذا حمل مكروب واحد من المكروبات الفارة في سائل كاللبن معد للتخذية مدة ساعات قليلة - ولكن الطبيعة تحول دون تكاثر المكروبات بهذه السرعة الهائلة تخفيفاً لما ينتج عنها من المضار بجملة وسائط حرمانها من التغذية الكافية او الوسط الصالح لغيرها وتكاثرها

(٥) حركة المكروب - أكثر ما تنقل المكروبات بالوسائل الخارجية كالماء والهواء الى غير ذلك على ان قسماً عظيماً منها غير محروم من حركة ذاتية تسبح في السوائل التي يعيش فيها الا ان سباحة بطيئة نظراً لضعف جسمه المشاهي وباعده " طينيا ذئب" (١) او جملة ذبيات دقيقة ملتصقة بها. والمكروبات من حيث ذبياتها تنقسم الى ثلاثة اقسام (الاول) المكروب ذو الذئب الواحد في احد طرفيه (٢) والثاني) المكروب ذو الذئبين او أكثر في طرف واحد او في كلا الطرفين (٣) (والثالث) المكروب ذو الذبيات المنتشرة حوله (٤) فمكروب الحلي التيفودية ومكروب الكوليرا يتحركان حركة ذاتية وقد وجد العلماء ان المكروب الاول يتحرك في الماء الساكن بسرعة ٤ مليمترات في الساعة وان الثاني يتحرك بسرعة تبلغ ١٨ مليمترًا في الساعة ولا دخل لحركة المكروبات الذاتية في سرعة انتشارها بل انتشار المكروبات المتحركة بذاتها والنير المتحركة لا يتم الا بالهواء والماء والميوان على ما سبق

(٦) تكاثر المكروب - تكاثر المكروبات بالانقسام اي ان الخلية الكروية النامة النمو تنقسم الى نصفين مباشرة وهذا لا يتم الا في البيئة الصالحة بالحرارة المناسبة والتغذية ويتبدى انقسامها بواسطة حاجز يفصل النصف الواحد عن الآخر تمامًا وقد يبقى النصفان متصلين احدهما بالآخر لا يفصلهما الا ذلك الحاجز فيكونان مكرويين ينوان بالتغذية حتى يصير كل منهما في حجم المكروب الاصلي ثم ينقسم كل منهما على الطريقة السابقة وقد يكون من نتائج الانقسام شبه سلسلة وكل ذلك يتم بسرعة فائقة وينتج عن تكاثر المكروب الكروي ست حالات :-

(الاولى) وهي التي ينقسم فيها المكروب الى نصفين يفصل احدهما عن الآخر انفصالاً تاماً ويصير شبيهاً بالاصل ويقال للواحد منها كوكوس (٥)
(والثانية) ينقسم فيها المكروب الى نصفين كما في الحالة الاولى لكنها بقيات

(١) وضعت كلمة ذئب مقابل كلمة فلاجيولم (Flagellum) اللاتينية لانيها البني

(٢) (Monotrichous) (٣) (Lophotrichous) (٤) (Peritrichous) (٥) (Coccus)

متصلين ويقال لكل زوج منها ديبوكوكوس^(١)

(والثالثة) ينقسم فيها المكروب الى نصفين بقيات متصلين كما في الحالة الثانية ثم يكرر الانقسام في مستوى واحد فيتكون من ذلك شبه سلسلة من المكروبات يقال لها ستربتوكوكوس^(٢)

(وارابعة) ينقسم فيها المكروب الى اربعة اقسام بواسطة فاصلين متقاطعين تقاطعاً عمودياً فينتج من ذلك اربعة مكروبات تبقى متصلة يقال لها تتراكوكوس^(٣)

(والخامسة) ينقسم فيها المكروب الى ثمانية اقسام بواسطة ثلاثة فواصل متقاطعة تقاطعاً عمودياً فينتج من ذلك ثمانية مكروبات تبقى متصلة يقال لها سارسينانة^(٤)

(والسادسة) ينقسم المكروب فيها بغير انتظام في مستوى واحد فيتكون من ذلك مجموعة مكروبية يقال لها ستيفلوكوكوس^(٥)

وينتج عن تكاثر المكروب العصوي حالتان مهمتان :-

(الاولى) ينقسم فيها المكروب الواحد الى نصفين يجاوز عرضي غالباً ثم يفصل الواحد منها عن الآخر انفصالاً تاماً ويصير شيئاً بالاصل يقال للواحد منها باسيلوس^(٦)

(والثانية) ينقسم فيها المكروب كالحالة الاولى الى نصفين لكنهما بقيات متصلين ثم يتكرر الانقسام في مستوى واحد حتى تتكون شبه سلسلة يقال لها ستربتوباسيلوس^(٧)

تحول الطبيعة دون تكاثر المكروبات على ما ذكر بوسائط كثيرة كوجودها في البيئات الغير الصالحة بالجفاف وقلة الغذاء وتراكم الافرازات السامة لها وعدم مناسبة الحرارة ووجود الهواء اذ عدم وجوده خلافاً لما تقتضيه طبيعتها. ففي هذه الاحوال تزول المكروبات او ينف تكاثرها وتطور الى حالة كونها تحفظ بها ضد المؤثرات الطبيعية ثم تبقى كامنة حتى تتوفر لها الاحوال المناسبة والبيئة الصالحة فتعود الى نشاطها الاول وتكاثر من جديد ولا تقع في حالة الكون المذكور الا اذا كانت في وسط جاف فتنتقل في الهواء بسرعة وتنتشر بها العدوى وبم الضرر الذي ينتج في الغالب منها

اصطلح العلماء على تسمية هذا الكون بالنول الجراثيمي^(٨) وما هو الا توقف او تطور في حياة الكروب بدأ عند مهاجمة الطبيعة له وقت ضعفه بالتكاثر السابق فيتكون في

(١) (Diplococcus) (٢) (Streptococcus) (٣) (Tetrads) (٤) (Sarcinae)

(٥) (Staphylococcus) (٦) (Bacillus) (٧) (Streptobacillus)

(٨) اصول الجراثيم (Spore Reproduction)

جسم كل مكروب جرثومة^(١) واحدة في الغالب من مادة البروتوبلاسم داخل الخلية التي يزول جدارها فتستقل الجرثومة وتكون بيضية الشكل غالباً شفاقة يحيط بها جدار مميز لها عن جدار الخلية المكونة الاصلية . ويلاحظ ان مادة البروتوبلاسم تكون داخل الجرثومة اكتف منها داخل الخلية وجدار الجرثومة اسلك واقرى من جدار الخلية الاصلية . ولذلك تقاوم الجراثيم المؤثرات التي لا يمكن للكرويات تقصمها مقاومتها فلا تموت الجراثيم في الماء الذي في درجة الفيليان مثلاً بعد ساعة من الزمن كما تموت الكرويات . وتبقى حافظة لقوة الابيات عدة سنين ولو تركت في يسات جافة جداً طول هذه المدة فاذا وضعت في التينة الصالحة نبتت^(٢) وخرج من كل منها مكروب يشكأثر بالاتقسام

محمد مصطفى الدمياطي

مدرس مدرسة الزراعة العليا بالجيزة

فقراء الهند

كانت العادة عند الهنود ان ينفرد بعض الساك منهم في الغابات بالقرب من شطوط الانهر المقدسة فيعكفون على عبادة الآلهة ويمشون عيشة التقشف زاهدين في الدنيا ولذاتها ويجمعون اليهم تلاميذ يظلمونهم على قوى الطبيعة القامضة واسرار نواميسها وينسرون لهم اسفار « الفيدا » Vedas وهو اقدم كتاب ديني وصل الينا وقد نشأ من هؤلاء النسك في توالي الايام طائفة من المباد المشولين استعمار القرىجة كلمة « فقير » العربية للدلالة عليهم . وقد ادخلوا هذه الكلمة في قواميس لغاتهم فصارت كلمة Fakir « فقير » عند تدل على المتصوفة من الهنود الذين ينفردون عن الخلق لعبادة الخالق ويعرضون عن زخرف الدنيا وزينتها . ثم اطلقت على كل الساك الهنود الذين ينقطعون عن الناس زهداً في الدنيا ويمشون من صدقة المحسنين

وفقراء الهند في يومنا هذا فرقان . فرقة تؤلف جمعية دينية يهتم افرادها بخدمة هياكل الاصنام وارشاد الشعب وتعليمه . والفرقة الاخرى قوم من السجاليين يطوفون البلاد عراة الابدان محرغي الاوجه بالرماد ويتعاطون الشعوذة والسحر

(١) جرثومة (Spore) (٢) يستغرق ابيات الجرثومة زمناً يختلف غالباً من ثلاث ساعات

الحاربع على درجة حرارة مناسبة (٢٠٠ مغراد)