

باب الزراعة

تقوم الفلاحة وادارتها

في شهر يونيو

(الجو والعرف الزراعي) يوافق شهر يونيو شهر بؤنه وفيه يشتد الحر وتزل القطعة ليلة ١١ بؤنه (١٧ يونيو تقريباً) ويقال في العرف حينئذ انه يتبدى زيادة النيل في اعاليه حيث ينبع وتنضج الخضراوات الصيفية ويحصد ري المزروعات اشباعاً متتابعاً ويجب ان يسرع باتمام دراس الحصيد (اي الزرع المحصود من الزروع الشتوية) الدرسة التمهيدية المعروفة بالتكبير في دراس التواريخ تقادياً من اصابة الطوب بالوس اذا بقيت بالتش بدون درس — وان يتم قبلها خف القطن وزراعة الرز الصيني سبا النينو والسلطاني اللذين يكثان في الارض نحو ٦ شهور فان زراعتهما بعدها بل قبيلها ايضاً تعد متأخرة

(احوال الري والصرف) بدء تحاريق النيل في مصر وامتداد وطأة المناوبات الصيفية وشدة حاجة الروع للري بالنسبة لزيادة النمو والحرارة معاً (فلاحة الارض قبل الزراعة) يبدأ بتحويل السباح لفيضان الدرة وبخدمة

الارض للرز النبي البدي

(فلاحة المزروعات) تم زراعة الفول السوداني والسهم خصوصاً الاول والمقاني والدرة الرفيعة العتيقة وتسر زراعة الحار والنجرو وخدمة القطن رياً وعزقاً ونقاوة ديدانه وخدمة الرز رياً وتقليتاً وشتلاً (ترقيماً) ويصير ازهار القطن تاماً ويبدأ تكوين الثور فيه ويتم حصد المزروعات الشتوية ويسر درسا وتذريتها وتخزينها ويحصد البرسيم الربابة ويوزع الرز شتلاً

(الخضراوات) تم زراعة الخضراوات الصيفية عامة وخاصة يزرع الخيار والباذنجان والملوخية والفاصولية والقرع الكومى والبطاطا ويشتل التفلل والكراث ابوشوشه والضمائم والكرنب والقرنبيط المزروع في برموده والكرفس — ويحني من البطيخ والشمام واللوية والبامية والباذنجان والخيار الخ

(آفات الريح) في القطن - دودة الورق والندوة العملية - في القصب -
الدودة القارضة

(الماشية) آخر ربيما وبدء تمويها بالمقرونة الجافة دريساً وفولاً وتبناً
ملحوظة: يشتد القيظ بعد نزول النقطة وفي العرف ان تموين المواشي الشغالة
بمدها بالدريس مضعف لها فلا بد من خلطه بالفول والتبن ان كان لا بد من
تمويها به

احمد الالقي
مأمور زراعة

استعمال الجرذان

ما من صاحب اطيان في هذا القطر الا ويشكو من الجرذان وعيشها في غاربه
ويود ان يجد سبيلاً سهلاً لاستئصالها لاسيما وان الجيوب التي تأكلها قد غلا منها
الان واشتدت الحاجة اليها وليس من الجرذان اقل فائدة نياً يعلم
كتب بعضهم في مجلة ديوان الزراعة بيلاد الانكليز يقول ليس افضل من
قتل الجرذان بالسم فاشترت اربعا وعشرين صفيحة من سم الجرذان المعروف باسم
سم سنفر Sanford's rat poison بستة جنيهات لان عن كل صفيحة خمسة
شلتات ولم اصرف مطلقاً ستة جنيهات في عمل اتسع من هذا العمل فاني مشيت
مع خمسة من رجالي في امدية ساحتها القافدان وجعلنا نقتش عن كل ثقب في
الارض ونضع فيه قليلاً من ذلك السم فلم تترك ثقباً في الاطيان وطارتها
وسياجتها والا ماكن المرشة فيها الا وضعنا فيه جانباً من ذلك السم في يوم واحد
لاعتقادي ان الجرذان اذا شعرت بشيء ليس على خاطرها اخبر بعضها بعضاً فتجتنبه .
فكانت النتيجة على غاية المرام لاني رأيت الجرذان ميتة في اليوم التالي في كل
مكان . ولا بد للنجاح من ان يوضع السم في كل اوكار الجرذان وفي وقت واحد
وانقلت مرة الى حقل طرحت فيه روم الحيوانات النافقة فكثرت جرذانه
فدست لها السم في كل مكان رأيت فيه آثار الرم في ارضي وارض غيري وبعد
يومين جاءني رجل وقال لي ان صاحب الاطيان المجاورة يريد ان يعرف هل القيت
في اطيانه سمّاً للجرذان . حاولت في الجواب لان وضع السم في ارض الغير غير
جاز وقلت له لماذا تسأل هذا السؤال فقال نعمال وانظر . فبعته وانا اقدم رجلاً

وأخرى واذا انا بكومة من الجرذان الميتة فيها من ٦٥ الى ٧٥ جرذاً أكثرها من النوع الكبير . قلت له ماذا تريد ان تعرف فقال اسم هذا السم فأخبرته باسمه . وبلغ عدد الجرذان الميتة التي جمعناها نحو مئة ولكن لا بد من ان يكون قد مات كثير غيرها ولا يندر ان تحفر وكرأ فتجد فيه جرذة ميتة واثني عشر من صفارها موت معها . واذا كثرت الجرذان في الاطيان فلا افضل من دس السم لها كلها في وقت واحد على هذه الصورة

ويفضل هذا السم على الزرنخ والامتركنين بانه سهل الاستعمال ولا يمتد القطم والكلاب لانها لا تمسه . ولا تضر القطم به الا اذا اكلت جرذاً مات به ولكن ذلك نادر جداً . اما القراخ فتأكله وتموت ولذلك يجب ان لا يوضع في مكان تردد اليه . وكذلك سائر الطيور ودفماً لذلك لا يذر السم على الارض بل يلقى في وكر الجرذ وطريقتي في ذلك ان اضع حصى صغيرة في جيبى وكلما وصلت الى وكر ادهن حصاة منها بقليل من السم قدر البندقة والقيها في الوكر فتنزل الى اسفله ويجدها الجرذ هناك ويلعس السم عنها لانه يستطيعه واذا كان النقب غائراً في الارض عمودياً فلا داعي للحصى بل يلقى السم قبيحاً الى قاعه

وسر النجاح دس السم في الفيض كله في يوم واحد ولو كان الامر في يدي لعينت اياماً مخصوصة لسم الجرذان في البلاد كلها . ولا داعي لوضع السم في الفيض الواحد أكثر من مرتين في السنة الا اذا جاءت الجرذان من مكان آخر . واذا دس السم للجرذان وحذرت منه فحذرتة فالحالب انها تصير تحذره دائماً وتحذر غيرها منه فلا يفعل بها حينئذ الا الفخ والمصيدة

اما الزرنخ والامتركنين فلا يكن استعمالها الا بمزوجين بالكرو لان الجرذان لا تعرفي جماً بغير ذلك ويجب ان تطعم الجرذان سكرأ صرفاً اياماً حتى تعتاده ويسهل شها به متى مزج بالسم . فالعمل شاق والنجاح فيه ليس آتم من النجاح بالسم الاول

ثم ان السم مهما كان مميتاً ومهما أتن استعماله لا يقتل كل الجرذان ولا يستأسلها فيبقى بعضها حياً ولا بد من مكر بالفخاخ والمصائد لانه يصير حذوراً لا يفسر السم . والمصيد والفخاخ لا تتأصل الجرذان كلها لانها قد تدرك الخطر وتتجنبه قبل الوقوع فيه

مرض الحميرة واتقاؤه

نشرت الحكومة الانكليزية تعليمات في بلاد الانكليز لاتقاء مرض الحميرة الذي يسبب التسح والشعير خلاصتها ان يمزج رطل من الفورمالين في ٢٤٠ رطلاً من الماء مزجاً جيداً وتوضع الحبوب في هذا المزيج وتحرك فيه جيداً مدة عشر دقائق حتى تقتل به كل حبة ثم تخرج من الماء وتترك كومة مدة اربع ساعات وتشر بعد ذلك في مكان نظيف حتى تجف ثم تزرع. ولكن من الحميرة نوعاً تدخل زوره جرثومة الحبة التي تنمو فلا يقتلها مذوب الفورمالين

والفورمالين سائل معروف في الصيدليات والاماكن الصناعية وهو مذوب غاز الفورمالددهيد بالماء وقد غلا ثمة في هذه الايام قصار ثمن اللتر منه نحو ثلاثين غرشاً وكان رخيصاً قبل الحرب ويحتمل ان يوجد منه صنف للزراعة غير نقي يباع بشن بخس. ويمزج اللتر منه في ٢٤٠ لتراً من الماء لكل اردب من الحنطة او الشعير ويمكن ان تتفع فيه نحو ربع ساعة الى ثلث ساعة ثم تسط حتى تنشف في مكان نظيف من جراثيم مرض الحميرة بمذوب الفورمالين. وخير من ذلك ان تزرع حالاً بعد تقصها

وعندم طرق اخرى احسنها غسل الحبوب بمذوب الشب الازرق اي كبريتات النحاس او مزيج بوردو ولكن ظهر من التجارب انه اذا وجد في القدان الذي لم تعالج تقاويه ٣١٠ سابل مصابة بمرض الحميرة فيوجد في القدان الذي عولجت تقاويه بمزيج بوردو ١٨٠ سبلة مصابة وفي القدان الذي عولجت تقاويه بكبريتات النحاس ٣٥ سبلة مصابة وفي القدان الذي عولجت تقاويه بمذوب الفورمالين ٣ سابل فقط

دود اللوز والماء

كتب حضرة احمد افندي حلمي الى المقطم يقول

في العام الماضي كانت قطعة من الارض في غيط قطن مساحتها ١٢٠ فداناً وكلة من معدن واحد وقد تمت زراعتها في وقت واحد تقريباً. وفي شهر اغسطس بعد ان اكتمل الطرح طفت مياه المصرف على تلك القطعة من الغيط ثم ركد الماء

ركوداً تاماً فيها وكان ارتفاعه على وجه الارض نحو خمسة عشر سنتيمتراً وكانت الشمس تقع على الماء نهاراً فيسخن ثم يبرد في الليل وما زال الماء على هذه الحالة حتى ايسنت باستحالة الحصول على قطن ما من تلك القطعة لان شجيرات القطن فيها مكثت غارقة نحو خمسة وعشرين يوماً

ورأيت في يوم شديد الحر وماء تلك القطعة شديد الحرارة ان جميع شجيراتها الغارقة منذ ٢٥ يوماً فتح جميع لوزها وهي كلها بيضاء ناصعة خلافاً لبقية الفيظ فطفت اجنيها غير مصدق بهذه النتيجة وكان ذلك في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر في حين ان بقية الفيظ لم اشرع في جنيها الا في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر المذكور اي ان محصول تلك القطعة جاء مبكراً ثلاثة عشر يوماً واغرب من ذلك ان الجنية الثانية لم يبق فيها لوزة واحدة لم تفتح وكانت نتيجة المحصول فيها زيادة ٢٥ في المئة على محصول بقية الفيظ والراجح ان هذه الزيادة هي التي فتكت بها الدودة في القطع الاخرى . واشد من ذلك غرابة ان سمر قطنها زاد عشرين قرشاً في القنطار عن قطن غيرها

اما الذي ارجعه في هذه المسألة فهو انه لما غرقت قطعة الارض بماء المصرف الساخن بالركود وفعلت الشمس خرجت الدودة من اوكارها في الارض الى الارض المجاورة وانهما قتلت بمفاجأة المياه . هذا ما اظنه ولا اجزم به وفوق كل ذي علم عليم

معالجة القطن في الزراعة

اشار المتر ددجن المستشار الزراعي بتطويش نبات القطن وتعطيشه لكي يسلم على نوع ما من دودة اللوز القنفذية الشديدة الفتك بانها مشورتاً هذه على اسباب طبيعية وعلى بعض التجارب العملية وقال ان التجارب اثبتت الامور الآتية وهي ان تقليل مياه الري تجعل نضج المحصول فتخفف اذى دودة اللوز ولا تؤدي الى نقص في المحصول ولا الى تلف في تيلة القطن . وان التطويش اي زرع بعض الاوراق والترويع العنينا يخفف وطأة الدودة ولا يتلف التيلة ولا ينقص المحصول . اما ماء الري فينقص تدريجاً بعد يونيو الى ان يبلغ الحد الادنى الكافي لسوائل النبات ثم ينقص الماء بتاتاً بعد الاسبوع الاول من اغسطس . فيجب ان ينقص مقدار الماء في كل رية بالتدريج حتى تسير مارت ربات يونيو ويوليو سلسولاً ضيقاً بين الخطوط

تقصص المواشي في العالم

عمدت الامم المتحاربة في اوربا الى التخلص من جانب كبير من قطعان المواشي التي عندها بذبحها لانه ليس في بلداتها من العلف ما يكفيها كلها ورأت انها اذا جاءت بعلف لها من الخارج شغل العلف من البواخر اضعاف ما يشغله اللحم الذي يستورد من الخارج ويساوي لحم المواشي التي يجلبون العلف لها . وزد على ذلك ان الاراضي التي كانت الامم المتحاربة تزرعها حبوباً لعلف المواشي صارت تزرعها الآن قحاً وحبوباً لطعام الناس . ثم ان تمهيد الملايين من الرجال الاشداء واخراجهم من الاعمال والصناعات المنتجة قتل الايدي العاملة ولاسيما في الزراعة وتربية المواشي . اصف الى ذلك انتقص العظيم في الاسبدة الكيماوية وسواها مما يلزم للزراعة فان ذلك كله يقلل العلف . والخطة التي يجري الخلفاء عليها الآن هي ان يقلنوا استخدام البواخر الا في الامور المتعلقة بالحرب رأساً وهذه الخطة قد تحملهم على اكل ما عندهم من المواشي لتوسيع زراعة القمح وسواها من الحبوب التي تستعمل في صنع الخبز واستيراد ما يحتاجون اليه من اللحم من الخارج لان ذلك يفسح لهم المجال لزيادة الانتفاع بما عندهم من البواخر

وفي الجدول التالي بيان لتقص المواشي في بلدان العالم

بلدان الخلفاء — ٨٤٢٠٠٠٠ رأس من البقر و ١٧٥٠٠٠٠٠ رأس من الضم
 و ٧١٠٠٠٠٠ رأس من الخنازير ومجموع ذلك ٢٣٠٠٢٠٠ رأس
 سائر بلدان العالم وسنها بلدان الاعداء — ٢٦٧٥٠٠٠٠ رأس من البقر
 و ٣٤٠٠٠٠٠٠ رأس من الضم و ٣١٦٠٠٠٠٠ رأس من الخنازير ومجموع ذلك
 ٩٢٤٣٥٠٠٠ رأس

تتكون جملة صافي النقص في بلدان العالم كلها ٢٨٠٨٠٠٠٠ رأس من البقر
 و ٥٤٥٠٠٠٠٠ رأس من الضم و ٣٢٤٢٥٠٠٠ رأس من الخنازير ومجموع ذلك
 ١١٥٠٠٥٠٠٠ رأس من المواشي

وهذا النقص أكثره في بلدان الاعداء و سيزداد ازدياداً مطرداً ما دامت
 رحى الحرب دائرة