

## الباب الثامن خواص المصفوفات Properties of Matrices

المصفوفات: هي مجموعة من الأرقام بترتيب له دلالة معينة مكتوبة على شكل مستطيل داخل قوسين

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, (a_1 \ a_2 \ a_3), \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

في شكل (1) يسمى هذا الشكل المصفوفة وتسمى الأرقام  $a, b, c, d$  عناصر المصفوفة (elements) والخطوط الأفقية تسمى المصفوفة الموجبة (rows or row vectors) والخطوط الرأسية تسمى الأعمدة الموجبة (columns or column vectors)

المصفوفات ذات  $m$  صفوف ،  $n$  اعمدة يطلق عليها  $(m \times n)$  matrix  
 $(m \text{ by } n)$  matrices or  $A$  or  $(a_{ij})$  . يعبر عن المصفوفة السابقة بـ  
حيث  $a_{ij}$  هو العنصر العام الموجود في الصف رقم  $i$  والعمود  $j$  في شكل (2) يحتوي على عمود واحد فقط يسمى (column vector or column matrix)  
في شكل (3) يحتوي على صف واحد فقط ويسمى (row vector or row matrix)

### المصفوفة المربعة Square matrix

هي المصفوفة التي عدد أعمدها يساوي عدد صفوفها ورتبة المصفوفة

هو عدد الصفوف أو الأعمدة .

ويسمى  $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mm})$  القطر الرئيسي (principle diagonal) .

تعريف : تساوي مصفوفتين Equation of matrices

يكون  $A = B$  أي  $(a_{ij}) = (b_{ij})$  إذا كان  $A, B$  لهما نفس عدد الصفوف وعدد الأعمدة .

وكان  $a_{jk} = b_{jk}$  for  $j = 1, 2, 3, \dots, m, k = 1, 2, 3, \dots, n$

### جمع المصفوفات Addition of matrices

جمع المصفوفات يعرف فقط للمصفوفات التي لها نفس عدد الصفوف ونفس عدد الأعمدة فإذا كان

$$A = (a_{jk}), B = (b_{jk}), C = (C_{jk})$$

وكان كل من المصفوفات  $A, B, C$   $(m \times n)$  matrix

$$C_{jk} = a_{jk} + b_{jk} \text{ for } j = 1, 2, 3, \dots, m, k = 1, 2, 3, \dots, n$$

فإنه يمكن كتابة  $C = A + B$

لاحظ أننا نحصل  $A + B$  بجمع العناصر المناظرة للمصفوفين  $A, B$

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

### المصفوفة الصفرية Zero matrix

هي مصفوفة كل عناصرها تساوي صفر

$$a_{ij} = 0(0, 0, 0), \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

المعكوس الجمعي للمصفوفة

## تعريف :

يرمز بها بالرمز  $-A$  وهي مصفوفة نحصل عليها من ضرب كل عنصر من عناصر  $A$  في  $(-1)$  أي

$$A = (a_{ij}) \Rightarrow -(A) = (-a_{ij})$$

وتسمى المصفوفة  $-A$  المعكوس الجمعي للمصفوفة  $A$ .  
من التعريفات السابقة نجد أن خواص جمع المصفوفات لها نفس خواص جمع الأعداد

a)  $A + B = B + A$

b)  $(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$

$$A + 0 = A$$

$$A + (-A) = 0$$

## طرح المصفوفات difference of two matrices

إذا كان  $A = (a_{ij})$ ,  $B = (b_{ij})$ ,  $D = (d_{ij})$

وكان كل من المصفوفات الثلاث ذات نظم  $(m \times n)$  matrix

$$d_{ij} = a_{ij} - b_{ij} \quad \text{for } j = 1, 2, \dots, m$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

فإنه يمكن كتابة  $D = A - B$

مثال:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

## ضرب المصفوفة في عنصر

ليكن  $A$  مصفوفة وليكن العدد  $\lambda$  فيكون

$$A\lambda = \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{2n} \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A + A \quad 2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$$

## المصفوفة المبدولة $A^T$ Transpose of a matrix

إذا كان  $A = (a_{ij})$  matrix  $(m \times n)$  فإن  $A^T$  ( $n \times m$  matrix)

$$A^T = (a_{ji}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{m2} \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 3 & 8 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

## المصفوفة المتماثلة والمتماثلة عكسيا

### Symmetric and skew symmetric matrices

يقال للمصفوفة المربعة  $A = (a_{ij})$  إنها متماثلة symmetric إذا كان

$$A^T = A$$

$$a_{ij} = a_{ji} \quad , \quad \text{for} \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, n \\ j = 1, 2, \dots, n \end{matrix}$$

ويقال للمصفوفة المربعة  $A = (a_{ij})$  إنها skew symmetric إذا

$$A^T = -A$$

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad , \quad \text{for} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} = A$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -8 \\ -3 & 0 & -1 \\ 8 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 8 \\ 3 & 0 & 1 \\ -8 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

مصفوفة متماثلة عكسيا Skew symmetric matrix

المصفوفة المثلثية Triangular matrix

المصفوفة المربعة  $A = (a_{ij})$  التي عناصرها أعلى القطر الرئيسي أو أسفله كلها أصفارا .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

مصفوفة مثلثية سفلى

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

مصفوفة مثلثية عليا

The diagonal matrix

المصفوفة القطرية

المصفوفة المربعة  $A = (a_{ij})$  التي عناصرها أعلى القطر، أسفل القطر كلها تساوي أصفارا تسمى diagonal matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$I \equiv$  the unit matrix

مصفوفة الوحدة

$$I, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

هي مصفوفة قطرية كل عناصر قطرها تساوي الوحدة .

## ضرب المصفوفات Multiplication of Matrices

لدينا مصفوفات  $B = [b_{jk}]$  ,  $A = [a_{ij}]$

تعرف عملية الضرب  $AB$  بشرط معين لابد من توافره وهو "عدد أعمدة المصفوفة الأولى  $A$  يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية  $B$ ".

لذلك نفرض أن المصفوفة  $A$  من نوع  $m \times n$  وعليه، لكي يتحقق الشرط المذكور يجب أن تكون عدد الصفوف في  $B$  مساوية لعدد  $n$  (عند الأعمدة في  $A$ ) أي أن المصفوفة  $B$  من نوع  $n \times p$ .

بالنسبة للمصفوفة  $A = [a_{ij}]$  وهي من نوع  $m \times n$  نجد أن

$$i = 1, 2, \dots, m \quad , \quad j = 1, 2, \dots, n$$

أما بالنسبة للمصفوفة  $B = [b_{jk}]$  وهي من نوع  $n \times p$  نجد أن

$$j = 1, 2, \dots, n \quad , \quad k = 1, 2, \dots, p$$

تعرف المصفوفة  $AB$  بالمصفوفة  $C = [c_{ik}]$

$$C_{ik} = a_{i1} \times b_{1k} + a_{i2} \times b_{2k} + \dots + a_{in} \times b_{nk}$$

هذا العنصر يقع في الصف  $i$  والعمود  $k$  في المصفوفة  $c$ .

$$A \quad B = B$$

$$m \times n \quad \leftrightarrow \quad n \times p \quad m \times p$$

↓

↓

عدد الصفوف في  $B$  عدد الأعمدة في  $A$

مثال:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} = 4 & -1 \\ 11 & 11 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -11 \\ 19 & 22 \end{pmatrix}$$

خواص ضرب المصفوفات

## Properties of Matrices Multiplication

أولاً :

ضرب المصفوفات خاضع لقوانين التنسيق (Associated laws) وقوانين التوزيع

(distributive laws) بالنسبة لجمع المصفوفات

$$(i) (\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$$

$$(ii) (A + B)C = AC + BC$$

$$C(A + B) = CA + CB$$

مع مراعاة أن عملية الضرب ممكنة .

ثانياً :

هل حاصل ضرب المصفوفات إبدالي أو بعبارة أخرى

$AB = BA$  بالطبع لا لأسباب كثيرة .

1- ليس من الممكن أن تكون  $AB$  ،  $BA$  في الوقت نفسه فمثلاً

إذا كانت  $A$  من نوع  $2 \times 3$  ،  $B$  من نوع  $3 \times 5$  فإنه يمكن تكوين  $AB$  ، لا يمكن تكوين  $BA$  .

2- حتى في الحالات التي يمكن تكوين فيها  $AB$  ،  $BA$  فليس من الضروري أن يكون  $AB$  ،  $BA$  من نفس النوع .

3- أيضا إذا أمكن تكوين المصفوفين  $AB$  ،  $BA$  وكأنا من نفس النوع عملية ضرب المصفوفات ليست عملية إبدالية .

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \&$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**ثالثا : The cancellation law**

غير صحيح على العموم

أي أنه إذا كان  $AB = 0$  فإنه ليس من الضروري أن تكون  $A$  أو  $B$  مساوية للمصفوفة الصفرية .

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} .$$

رابعا :

لأي مصفوفة مربعة  $A$  من نوع  $n \times n$

$$AI = A , IA = A$$

حيث  $I$  هي مصفوفة الوحدة من نفس النوع .

خامسا :

$$(AB)^T = B^T A^T$$

**القوى الصحيحة الموجبة للمصفوفة المربعة**

نفرض أنه لدينا مصفوفة مربعة  $A$  . تعرف المصفوفة  $A^2$  هكذا

$$A^2 = A.A \quad , \quad A^3 = A^2 A = (A.A).A \quad \text{وهكذا}$$

قاعدة لأي مصفوفة مربعة  $A$

$$A^m . A^n = A^{m+n} = A^n . A^m$$

$$(A^m)^n = A^{mn}$$

$$A^2 . A^3 = A^5 \quad , \quad (A^2)^3 = A^6$$

فمثلاً : القوى الصحيحة السالبة للمصفوفة (غير المنعزلة)

يقال للمصفوفة المربعة  $A$  إنها مصفوفة غير منعزلة

(non – singular matrix) إذا كان محددًا

$$\det A = |A| \neq 0$$

أما إذا كان  $|A| = 0$  تسمى منعزلة (singular matrix)

لتعريف المصفوفة  $A^{-1}$  يلزمنا التعريف الآتي :

**المصفوفة المرتبطة adjoint matrix**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

ونفرض أن  $A_{ij}$  يرمز للعامل المرافق (co-factor) للعنصر  $a_{ij}$

في المحدد  $|A|$  . نكون مصفوفة أخرى تعتمد عناصرها على هذه

العوامل المرافقة هكذا .

- 1- يستبدل كل عنصر بالعامل المرافق له .  
 2- نوجد محور المصفوفة (transpose) وذلك بجعل المصفوفة أعمدة تسمى هذه المصفوفة بالمصفوفة المرتبطة للمصفوفة  $A$  ويرمز لها بالرمز  $a_{dj}$  (وهذا الرمز هو اختصار adjoint of  $A$ )

تعريف : معكوس المصفوفة

إذا كانت  $A$  مصفوفة مربعة وكانت هناك مصفوفة  $B$  بحيث يكون  $AB = I = BA$  حيث  $I$  هي وحدة المصفوفات يقال للمصفوفة  $B$  إنها معكوس للمصفوفة  $A$  .

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A \quad -1$$

- 2- معكوس أي مصفوفة مربعة  $A$  (في حالة وجوده) وحيد .  
 3- الشرط اللازم والكافي لكي يوجد للمصفوفة المربعة معكوس أن تكون غير منعزلة  $|A| \neq 0$   
 4- معكوس حاصل ضرب مصفوفتين هو حاصل ضرب معكوسى

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \text{ المخالف}$$

مثال:

اوجد قيمة  $A^{-1}$  إذا كان  $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

$$|A| = 14, \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

مثال:

إذا كان  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$  اوجد  $A^{-1}$  ثم حقق أن

$$A A^{-1} = I = A^{-1} A$$

لحساب  $A^{-1}$  نتأكد أولاً أن  $A$  مصفوفة غير منعزلة ( $|A| \neq 0$ )

$$|A| = -12 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-12} \text{adj}A = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 \\ -2 & -10 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 \\ -2 & -10 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

قاعدة :

إيجاد معكوس المصفوفة التي من نوع  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2 \times 2}$

1- نستبدل عنصرى القطر الرئيسى (وهما  $a, d$ ) أى كل منهما مكان الآخر

2- نغير إشارتي العنصرين الآخرين وهما  $b, c$

3- نقسم عناصر المصفوفة الناتجة على قيمة محددة  $A$

مثال:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = 7, A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

حل المعادلات الآتية باستخدام معكوس المصفوفة  $A^{-1}$

لتكن المعادلات الآتية

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 = b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 = b_2$$

$$a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 = b_3$$

والتي يمكن كتابتها على الصورة

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

أو باختصار

$$A X = b \dots\dots\dots (1)$$

حيث

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

فإنه يمكن إثبات أن حل كل من المعادلات (1) هو

$$\underline{X} = A^{-1} \underline{b}$$

البرهان :

$$A \underline{x} = \underline{b} \Rightarrow A^{-1} A \underline{x} = A^{-1} \underline{b} \Rightarrow$$

$$I \underline{x} = A^{-1} \underline{b} \quad (A^{-1} A = I)$$

$$\underline{x} = A^{-1} \underline{b} \quad (I \underline{x} = \underline{x})$$

مثال:

حل المعادلتين الآتيتين باستخدام معكوس المصفوفة

$$3 x_1 - 2 x_2 = 4$$

$$X_1 + 4 x_2 = 6$$

$$A\underline{x} = \underline{b} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \underline{x} = A^{-1}\underline{b} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 28 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

فيكون حل المعادلتين هو  $x_1 = 2, x_2 = 1$

**مثال:**

باستخدام معكوس المصفوفة اوجد حل المعادلات :

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$x_1 + 10x_2 - 3x_3 = 5$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 = -3$$

يمكن كتابة المعادلات الثلاث على الصورة :

$$A x = b$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 10 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

أو

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 10 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{46} \begin{pmatrix} 13 & 3 & -17 \\ 2 & 4 & 8 \\ 11 & -1 & 21 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = x = A^{-1}b = \frac{1}{46} \begin{pmatrix} 13 & 3 & -17 \\ 2 & 4 & 8 \\ 11 & -1 & 21 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = -1$$

## المعادلة المميزة للمصفوفة (المربعة)

### Characteristic Equation for the matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

إذا كانت

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 60 \\ 5 & 21 \end{pmatrix}$$

فأثبت أن

$$A^2 - 5A - 6I = 0$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 60 \\ 5 & 21 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - 5A - 6I = \begin{pmatrix} 16 & 60 \\ 5 & 21 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 16-10-6 & 60-60 \\ 5-5-6 & 21-15-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

والآن تكون المصفوفة  $A - \lambda I$  (حيث  $I$  مصفوفة الوحدة  $2 \times 2$ ) ثم يكون محدد هذه المصفوفة كما يلي :

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 12 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(3-\lambda) - 12$$

$$= \lambda^2 - 5\lambda - 6 \dots \dots \dots (1)$$

تسمى كثيرة الحدود هذه بكثيرة الحدود المميزة للمصفوفة .

$$\text{Characteristic polynomial } |A - \lambda I| = D(\lambda) = \det(\lambda)$$

كما تسمى المعادلة الناتج

$$\lambda^2 - 5\lambda - 6 = 0 \dots \dots \dots (3)$$

بالمعادلة المميزة للمصفوفة characteristic equation of matrix

وتسمى جذور هذه المعادلة بالجذور المميزة للمصفوفة

$$\text{Characteristic roots - eigen values } |\lambda - A I| = 0$$

وبمقارنة (1) & (3) نلاحظ أنه يمكن الحصول على المعادلة (1) من المعادلة (3) بوضع  $A$  بدلا من  $\lambda$  بوضع  $6I$  بدلا من  $6$ . ويقال إن المصفوفة  $A$  تحقق المعادلة المميزة لها .

**نظرية كايلى هاملتون:**

كل مصفوفة مربعة  $A$  تحقق المعادلة المميزة لها .

**نتيجة :**

إذا كانت  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  هي الجذور المميزة للمصفوفة  $A$  يمكن كتابتها على الصورة

$$(-1)^n (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$$

### نظرية كايلى هاملتون Kayli Hamelton

تأخذ الصورة

$$(A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) \dots (A - \lambda_n I) = 0$$

أو

$$\prod_{r=1}^n (A - \lambda_r I) = 0$$

**ملحوظة :**

يجب أن يلاحظ في (4) أن

$$A - \lambda_r I \neq 0 ; r = 1, 2, \dots, n$$

وذلك لأن في جبر المصفوفات  $AB = 0$  لا تعني أن

$$B = 0 \quad \text{أو} \quad A = 0$$

**مثال:**

فأوجد:  $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$  إذا كانت

- (i) كثيرة الحدود المميزة لمصفوفة  $A$  والمعادلة المميزة لها .  
(ii) الجذور المميزة للمصفوفة  $A$  وحقق نظرية كايلى - هاملتون .

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 3 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 6$$

المعادلة المميزة للمصفوفة هي (2)  $\lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$

لإيجاد الجذور المميزة نلاحظ  $\lambda - 1$  احد العوامل للعدد يحقق المعادلة

معنى ذلك  $(\lambda - 1)$  عامل للطرف الأيسر من المعادلة

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + a\lambda - 6)$$

بمقارنة معامل  $\lambda^2$  في الطرفين نجد أن

$$-1 + a = -2 \quad \& \quad a = -1$$

وبالتالى يمكن كتابة المعادلة (2) على الصورة

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda - 6) = 0, (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2) = 0$$

$$\lambda_1 = 1 \quad , \quad \lambda_2 = 3 \quad , \quad \lambda_3 = -2$$

وبالنسبة لتحقيق نظرية كايلى هاملتون أي أن

$$A^3 - 2A^2 - 5A + 6I = 0$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = Aa^2 \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -4 & 17 \\ 13 & 4 & 11 \\ 13 & 11 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^3 = 1A^2 - 5A \begin{pmatrix} 14 & -4 & 17 \\ 13 & 4 & 11 \\ 13 & 11 & 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = -6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 06 I$$

تمرين:

اثبت أن

$$A^4 = 9A^2 + 4A - 12I$$

مثال:

إذا كانت  $A$  هي المصفوفة المذكورة في مثال: (1)،  $(n)$  عدد صحيح موجب فاثبت أن

$$30A^n = (5\alpha - 2\beta)A^2(8\beta - 5\alpha)A = 6(5 - \beta)I$$

حيث

$$\alpha = 3^n - 1 \quad \beta = 3^n - (-2)^n$$

الحل:

الجزور المميزة هي 1, 3, -2 فتكون كثيرة الحدود المميزة لها هي

$$-(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2)$$

إيجاد  $30A^n$  كتعبير خطي بدلالة  $A^2, A, I$  نتبع الخطوات الآتية:

1- نقسم  $30\lambda^n$  على كثيرة الحدود ولنفرض أن خارج القسمة هو

$p(\lambda)$  الباقي سيكون من الدرجة الثانية في  $\lambda$  (لاحظ أن المقسوم عليه

من الدرجة الثالثة) وليكن الباقي  $a\lambda^2 + b\lambda + 2$

2- يمكن كتابة العلاقة

$$30\lambda^n = P(\lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2) + a\lambda^2 + b\lambda + c$$

3- نضع  $A$  بدلا من  $\lambda$

$$30A^n = P(A)(A-I)(A-3I)(A-2I) + A^2 + bA + cI$$

$$= P(A)x0 + aA^2 + bA + cI$$

وذلك من نظرية كايلي هاملتون أي أن

$$30A^n = aA^2 + bA + cI$$

-4 لإيجاد الثوابت  $a, b, c$  بالتعويض عن  $\lambda$  بالقيم  $1, 3, -2$  وهي الجذور المميزة .

$$30 = a + b + c \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 8a + 2b = 30(3^n - 1)$$

$$30(3)^n = 9a + 3b + c$$

$$30(-2)^n = 4a - 2b + c \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 5a + 5b = 30(3^n - (-2)^n)$$

$$\left. \begin{array}{l} 4a + b = 15\alpha \\ a + b = 6\beta \end{array} \right\} a + 5\alpha - 2\beta, b = 8\beta - 5\alpha$$

$$c = 30 - a - b = 30 - 6\beta \Rightarrow$$

بالتعويض عن  $a, b, c$  نحصل على

$$30A^n = (5\alpha - 2\beta)A^2 + (8\beta - 5\alpha)A + 6(5 - \beta)I$$

**مثال:**

مصفوفة مربعة من نوع  $3 \times 3$  جذورها المميزة  $2, 1, 0$  اثبت أن

$$A^n = (2^{n-1} - 1)A^2 + (2 - 2^{n-1})A$$

حيث إن الجذور المميزة للمصفوفة هي  $2, 1, 0$  فتكون كثيرة الحدود

هي

$$-(\lambda - 0)(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

باتباع الخطوات السابقة في المثال السابق:

$$\lambda^n = P(\lambda) \cdot \lambda(\lambda - 1)(-2) + a\lambda^2 = b\lambda + c \quad (1)$$

$$A^n = 0 \quad + a\lambda^2 + b\lambda + cI$$

لإيجاد  $a, b, c$  تعوض في (1) عن  $\lambda$  بالقيم  $2, 1, 0$  نحصل على

$$0 = c$$

$$1 a + b + c$$

$$2^n = 4 a + 2 b + c$$

$$a = 2^{n-1} - 1, \quad b = 2 - 2^{n-1}$$

$$A^n = (2^{n-1} - 1) A^2 + (2 - 2^{n-1}) A$$

### Eigen vectors المتجهات المميزة للمصفوفة

ليكن  $A = (a_{ij})$  مصفوفة معلومة من نوع  $n \times n$  وليكن  $Ax = \lambda x$  معادلة موجهة تمثل  $n$  معادلة  $x$  هي مصفوفة عمود غير صفري من نوع  $n \times 1$

$$Ax - \lambda x = Ax - \lambda Ix = 0 \quad A - \lambda Ix = 0 \quad (1)$$

إذا كانت  $x$  هي  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  فإن المعادلة (1) تكتب على الصورة .

$$Ax = \lambda x$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = \lambda x_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = \lambda x_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = \lambda x_m$$

والتي يمكن كتابتها على الصورة

$$(a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + (a_{mm} - \lambda)x_m = 0$$

$$(A - \lambda I)X = 0$$

لنعتبر الحالتين الآتيتين

$$a - |A - \lambda I| \neq 0$$

في هذه الحالة نجد مباشرة باستخدام قاعدة كرام لحل المعادلات الخطية

أن

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_n = 0$$

وهذا يعطينا  $x = 0$  وهو الحل التافه

في هذه الحالة يوجد حل اخر غير  $x = 0$  لكن  $|A - \lambda I| = 0$  هي المعادلة المميزة للمصفوفة  $A$  ،  $\lambda$  يمكن أن تأخذ قيمة أي واحد من الجذور المميزة للمصفوفة .

نفرض أن  $\lambda$  هي إحدى هذه الجذور . لهذه القيمة تتحقق المعادلة (1)، (2) وعلينا أن نبحث عن حل غير الحل التافه للمعادلة المصفوفة .

$$(A - \lambda I)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$$

ويطلق على الموجهات  $x$  المناظرة لقيم  $\lambda$  eigen vectors

مثال:

اوجد القيم الذاتية والموجهات الذاتية للمصفوفة

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D(\lambda) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 4 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5-\lambda)(2-\lambda) - 4 = 0$$

فتكون الجذور هي  $\lambda_1 = 1$  ،  $\lambda_2 = 6$

$$\lambda_1 = 6$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 -X_1 + 4X_2 = 0 \\
 X_1 + 4X_2 = 0 \\
 X_1 = 4X_2 \Rightarrow \underline{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \left| \begin{array}{l}
 4X_1 + 4X_2 = 0 \\
 X_1 + X_2 = 0 \\
 X_1 - X_2 \Rightarrow x = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{array} \right.$$

مثال:

اوجد الجذور المميزة والمتجهات المميزة للمصفوفة

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

مثال:

اوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفة

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

مثال:

اوجد الجذور المميزة والمتجهات المميزة للمصفوفة

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = 0$$

المعادلة المميزة للمصفوفة

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 3 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 3$$

$$\lambda_1 = 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X_1 - 2X_2 + 3X_3 = 0$$

$$X_1 + 0 \cdot X_2 + X_3 = 0$$

$$\frac{X_1}{\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{X_2}{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{X_3}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$\frac{X_1}{-2} = \frac{X_2}{-2} = \frac{X_3}{-2} \Rightarrow$$

$$\frac{X_1}{-1} = \frac{X_2}{1} = \frac{X_3}{1} = a \Rightarrow x = \begin{pmatrix} -a \\ a \\ a \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$4X_1 - 2X_2 + 3X_3 = 0$$

$$X_1 - 3X_2 + X_3 = 0$$

$$\frac{X_1}{\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{X_2}{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{X_3}{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}}$$

$$\frac{X_1}{-11} = \frac{X_2}{-1} = \frac{X_3}{14} = -b \Rightarrow x_2 = \begin{pmatrix} 11 & 6 \\ 6 \\ -14 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_3 = 3 \Rightarrow X_3 = \begin{pmatrix} c \\ c \\ c \end{pmatrix} \quad \text{حيث } a, b, c \text{ ثوابت اختيارية}$$

\* \* \*

# ثانيا الهندسة التحليلية

## مقدمة

الهندسة أحد علوم الرياضيات، أو أولها في نظر ابن سينا، وهو علم يتعامل مع النقطة، المستقيم، السطح، الفضاء ويؤدي إلى دراسة الأشكال من حيث مجموع قياسات زواياها، مساحاتها، حجمها وتأثير الحركات عليها كما يهتم بتحديد درجات تقوس السطح. وأحد أنواع تلك الهندسة يسمى الهندسة التحليلية التي أمكن باستخدامها حل بعض المسائل الجبرية هندسياً، وأمکن التعبير عن النماذج الهندسية بمعادلات رياضية.

وللهندسة التحليلية أهمية بالغة عند دراسة معظم علوم الرياضيات والتطبيقات الفيزيائية وعلم التقنية.

وكذلك الهندسة ساعدت على دراسة الفضاء وخواصه الهندسية في العصر الحديث، وترتبط بكل ما هو جديد، حيث إنها تُعتبر الأساس في تفسير الصور في علم الكمبيوتر، وتعتبر الهندسة التحليلية مدخل لدراسة الهندسة التفاضلية.

(هندسة الحركة) والهندسة الجبرية حيث إن الهندسة التفاضلية تختص بدراسة الأشكال الهندسية وخاصة المنحنيات والسطوح من حيث خواصها الهندسية، وذلك بتطبيق حساب التفاضل والتكامل، ويرجع ظهور الهندسة التفاضلية إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر. وأول من أسس هذا الجزء من الرياضيات أويلر - موبخ - جاوس وقد تطورت الهندسة التفاضلية مع تطور التحليل الرياضي حتى أصبح الآن لها ارتباط وثيق بالعلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية، وكذلك لها تطبيقات مباشرة على العديد من العلوم التطبيقية مثل الهيدروديناميكا والهندسة الضوئية نظرية المجال.

## المؤلف

الاستاذ الدكتور/ عادل نسيم اديب