

ميكروبيولوجيا الأراضى

- الأرض كوسط بينى
- مكونات التربة
- أحياء التربة
- الرايزوسفير
- العلاقات المتبادلة بين ميكروبات الأراضى
- دورات العناصر
- دورة الكربون
- دورة النتروجين
- أولاً : معدنة النتروجين العضوى
- ثانياً : فقد النتروجين من التربة
- ثالثاً : تثبيت النتروجين الجوى
- التثبيت اللاكافلى
- التثبيت الكافلى
- ١- التكافل بين الرايزوبيا والنباتات البقولية
- ٢- التكافل فى النباتات غير البقولية
- ٣- التكافل بين السيانوبكتريا والأزولا
- دورة الكبريت
- التحولات البيوكيميائية للعناصر الأخرى
- تحليل مبيدات الآفات
- الأسمدة الحيوية
- إنتاج الغاز الحيوى - البيوجاز
- المراجع

الفصل الخامس


ميكروبيولوجيا الأراضى Soil Microbiology

Soil as an environment

الأرض كوسط بيئي

الأرض (التربة) Soil ، هي ذلك الجزء من سطح القشرة الأرضية ، الذى تكون بفعل عوامل التعرية ، وتأثير العوامل البيولوجية ، فأصبح المهد الصالح ، لحياة النبات والحيوان . والطبقة السطحية من التربة الزراعية ، فى الحقيقة ، عبارة عن عالم يموج بالحياة ، فبالإضافة إلى ما بها من جنود نباتية ، فإنها تحتوى على ملايين الملايين من الأحياء الدقيقة ، ذات الدور المؤثر على خواص التربة ، وعلى إنتاجيتها من المحاصيل الزراعية .

يختلف تركيب التربة وخواصها ، باختلاف الموقع ، والظروف المناخية ، والبيئية ، ومادة الأصل ، والعمق ، وشكل (١-٥) . يبين قطاع فى تربة .



١- أفق أ Horizon A : مخلفات عضوية على درجات مختلفة من التحلل

٢- أفق ب Horizon B : الحبيبات الدقيقة ، والمعادن

٣- أفق جـ Horizon C : مواد معدنية تعرضت لعوامل التعرية

٤- أفق د Horizon D : أصل الصخور ، التى لم تتعرض لعوامل التعرية

شكل ١-٥ : رسم تخطيطى لقطاع فى تربة

مكونات التربة

تتكون التربة من خمسة مكونات رئيسية ، هي :

١- الجزء المعدني

ينتج الجزء المعدني بالتربة ، من عملية تعرية الصخور ، وهو خليط من الحبيبات المعدنية ، المختلفة الأحجام ، التي توجد في تجمعات . وتتكون تلك الحبيبات ، اساسا من سليكات الألومونيوم والحديد ، مع معادن أخرى بكميات قليلة . ويتراوح أحجام تلك الحبيبات ، من حبيبات الطين ، دقيقة الحجم ، ذات القطر الأقل من 0.002 مم ، إلى حبيبات الحصى الكبيرة ، ذات القطر الأكبر من 2 مم . وبين الاثنين يقع السلت ، والرمل الناعم ، والخشن .

نسب هذه الحبيبات إلى بعضها ، يؤثر على خواص التربة ، وعلى تهويتها ، وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ، كما يؤثر على تيسير العناصر الغذائية ، وعلى النشاط البيولوجي بها .

٢- الجزء العضوي

يأتي الجزء العضوي بالتربة ، من المخلفات النباتية والحيوانية ، وما يضاف للتربة من أسمدة عضوية ، ومن كائنات التربة ومخلفاتها . وتتعرض المواد العضوية للتحلل بواسطة الميكروبات ، وما يتخلف عن التحلل ، من مواد معقدة التركيب ، يكون الدبال Humus ، وهو مادة ذات لون بني غامق ، وطبيعة غروية ، ويؤثر على خواص التربة ، فيحسن البناء ، ويزيد من قدرة التربة على احتفاظها بالماء ، وسعة تبادل القواعد ، وله قدرة تنظيمية عالية ، كما أن له تأثيره الكبير على النشاط البيولوجي بالتربة ، حيث يعتبر مخزنا للعناصر الغذائية ، ذات الإنسياب البطيء .

٣- الماء الأرضى

الماء الأرضى (محللول التربة) ، له أهميته الكبيرة ، على نمو النبات، وعلى النشاط البيولوجى بالتربة . فالماء يكون ٧٠٪ على الأقل من بروتوبلازم الخلية الحية ، كما أنه يذيب الكثير من المواد العضوية وغير العضوية ، فتصبح ميسرة .

وتعتمد نسبة الماء الموجودة بالتربة ، على الظروف المناخية ، والصرف ، وتركيب التربة . وهو يوجد فى المسافات البينية ، بين حبيبات التربة ، كما يمتص كغشاء رقيق على أسطح الحبيبات .

٤- الهواء الأرضى

يتكون هواء التربة أساسا من N_2 ، O_2 ، CO_2 ، علاوة على نسب ضئيلة من الغازات الأخرى ، الناتجة عن النشاط الميكروبي . وهواء التربة ، مصدره الأساسى الهواء الجوى ، وإن كان يختلف عنه فى التركيب ، بسبب العمليات البيولوجية التى تحدث بالتربة . فالهواء الأرضى مشبع ببخار الماء ، ومحتواه من CO_2 أعلى كثيرا مما فى الهواء الجوى ، بينما نجد أن محتواه من O_2 أقل . كما يحتوى الهواء الأرضى ، على نسب قليلة من الأمونيا ، والميثان ، وبعض المركبات المتطايرة . ويحدث باستمرار تبادل غازى ، بين هواء التربة والهواء الجوى ، فيدخل إلى الأرض الأكسجين ، ويخرج منها ثانى أكسيد الكربون .

يوجد الهواء الأرضى بين حبيبات التربة ، فى المسافات البينية الخالية من الماء ، لذلك ، فإن كمية الهواء الأرضى الموجودة بالتربة ، ترتبط عكسيا ، مع كمية الرطوبة الموجودة بها .

سيادة الظروف اللاهوائية بالتربة ، لها تأثير سيء على النشاط البيولوجى بها ، حيث تتوقف العمليات البيولوجية الهوائية المفيدة للتربة ، وتنشط الميكروبات اللاهوائية ، وتحدث تحولات ضارة ، كما تتراكم الكثير من المركبات غير المرغوب فيها ، والتى قد تضر النباتات ، والأحياء الموجودة بالتربة .

٥- أحياء التربة

بالإضافة إلى المجموع الجنزى الموجود بالتربة الزراعية ، فإنه يوجد بها أيضا ، الكثير من الكائنات الحية الحيوانية ، كالنيماتودا ودودة الأرض ، والديدان والحشرات ، والمفصليات والقوارض ، كما يوجد عند ضخ من الأحياء المجهرية ، التي يطلق عليها ميكروبات الأراضى ، والتي تشمل البكتريا ، والأكتينومييسيتات ، والفطريات ، والطحالب ، والبروتوزوا ، والفيروسات .

ميكروبات الأراضى

تلعب أحياء الأراضى المجهرية ، دورا أساسيا فى المحافظة على خصوبة التربة ، وعلى إمداد النباتات النامية بإحتياجاتها الغذائية ، من خلال معدنتها للمواد العضوية ، وتيسيرها للعناصر الغذائية ، وتثبيت النتروجين الجوى ، وتكوين الدبال ، وإفرازها للكثير من المواد المشجعة للنمو . كما أن تلك الميكروبات ، لها دور فعال فى المحافظة على التوازن البيولوجى فى الكون ، عن طريق إنتاجها لثانى اكسيد الكربون ، الذى تبلغ نسبته بالجو حوالى ٠,٣ ٪ حجما ، وذلك خلال عمليات تحلل المواد العضوية ، مما يعوض النقص ، الذى يحدث بسبب عملية التمثيل الضوئى المستمرة ، وتحلل ملوثات البيئة ، والمبيدات الزراعية .

وتحت ظروف معينة ، مثل سيادة الظروف اللاهوائية بالتربة ، أو نقص العناصر الغذائية بها ، قد تتنافس ميكروبات التربة مع النباتات النامية ، على العناصر الغذائية الموجودة بالتربة ، أو تفرز الميكروبات موادا ضارة بنمو النباتات ، أو تسبب لها أمراضا ، فتؤثر بذلك على إنتاجية الأراضى .

ويختلف أعداد وأنواع الكائنات المجهرية كثيرا ، من تربة لأخرى ، بإختلاف تركيب التربة ، والعمق ، ونوع الزراعة القائمة ، وظروف التربة البيئية ، من حرارة ورطوبة وتهوية ، ودرجة الحموضة ، ومحتوى التربة من العناصر الغذائية .

وحتى فى نفس الأرض الواحدة ، فإن أعداد وأنواع الأحياء المجهرية ، يختلف كثيرا ، حسب الطريقة المستخدمة فى التقدير ، ووقت أخذ العينة ، وعمق التربة ، وعمليات الخدمة الزراعية ، والإضافات العضوية ، وطبيعة العلاقات المتبادلة ، بين كائنات التربة المجهرية .

Bacteria

البكتريا

تعتبر البكتريا ، أكثر ميكروبات الأراضى وجودا بالتربة ، سواء من حيث الأعداد الكلية ، أو تعدد الأجناس والأنواع ، أو تنوع النشاط الذى تقوم به ، خاصة فى الأراضى المتعادلة ، أو المائلة قليلا للقلوية ، مما يعطى للبكتريا ، دورا رئيسيا بين أحياء التربة المختلفة . وقد قدر أن البكتريا الموجودة فى الأرض الخصبة ، تمثل من ٠,٠١ إلى ١,٠٪ من حجم التربة الكلى ، ويصل أعدادها إلى 10^{10} و 10^9 / جم تربة .

يوجد بالأراضى مجاميع ، وأنواع ، عديدة من البكتريا ، ذات إحتياجات غذائية مختلفة ، ومنها الهوائى واللاهوائى ، والمحب للحرارة المرتفعة ، والمتوسطة ، والمنخفضة . ولا تتوزع البكتريا بانتظام فى كتلة التربة ، ولكنها تتركز بأعداد كبيرة خليطه ، مكونه من مستعمرات ، بالغشاء المائى حول الحبيبات الصغيرة المعدنية والعضوية ، كما أنها توجد بكثرة حول جذور النباتات النامية ، وعلى أسطح الشعيرات الجذرية .

ونظرا لأن أغلب البكتريا هوائية ، فإنها توجد بكثرة فى الطبقة السطحية بالتربة ، وتقل مع العمق . وتعتبر البكتريا العسوية سواء السالبة ، أو الموجبة لصبغة جرام ، أكثر انتشارا من الأنواع الكروية ، ومن الأجناس السالبة لجرام ، الواسعه الانتشار بالأراضى *Arthrobacter* , *Pseudomonas* ، كما يكثر وجود جنس *Bacillus* الموجب لجرام ، خاصة فى أراضى المناطق الحارة .

ومن المجاميع البكتيرية الهامة بالأراضى مايلى

١- البكتريا غير ذاتية التغذية (الهتروتروفية) (Heterotrophs (Organotrophs)

وتحصل هذه البكتريا على احتياجاتها ، من كربون وطاقة ، من المواد العضوية . وتمثل هذه المجموعة ، أغلب أنواع البكتريا الموجودة بالتربة ، وتقوم بالعديد من التفاعلات الهامة منها :
تحليل ، ومعدنة المواد العضوية ، وتحويلها إلى صور بسيطه صالحة لتغذية النبات ، ونشدة المواد البروتينية ، وتثبيت النتروجين الجوى ، تكافليا ولا تكافليا ، وتيسير العناصر المعدنية ، وتكوين الدبال .

٢- البكتريا ذاتية التغذية (الأوتوتروفية) Autotrophs (Lithotrophs) .

وتحصل هذه البكتريا ، على الكربون اللازم لها من CO_2 الجو ، وتحصل على الطاقة من أكسدة المواد الكيميائية ، أو من الضوء .

فمن البكتريا الأوتوتروفية تلك المؤكسدة للمواد الكيميائية ، مثل بكتريا التآزوت (النترجة) . التي تؤكسد الأمونيا إلى نترات ، ثم إلى نترات ، وبكتريا أكسدة الكبريت ، وبعض أنواع بكتريا الحديد .

ومن البكتريا الأوتوتروفية تلك الممثلة للضوء ، الهوائية ، مثل السيانوبكتريا (وقد تسمى البكتريا الخضراء المزرقفة ، وكانت تسمى سابقا الطحالب الخضراء المزرقفة) ، وهي مثبتة لنتروجين الهواء الجوى ، ومن أجناس السيانوبكتريا الواسعة الانتشار بالتربة : *Nostoc* ، *Anabaena* .

ومن البكتريا الأوتوتروفية الممثلة للضوء ، اللاهوائية ، بكتريا الكبريت ، الخضراء والأرجوانية ، المؤكسدة للكبريت غير العضوى .

٣- الأكتينوميسيتات

توجد الأكتينوميسيتات ، وهي أحد المجاميع الهامة للبكتريا ، بكثرة فى الأراضى ، خاصة فى المناطق الحارة الجافة ، ويصل أعدادها إلى 10^{11} / جم تربة ، وأكثر أجناسها إنتشارا بالأراضى

Micromonospora ، *Nocardia* ، *Streptomyces*

وتلعب مجموعة الأكتينوميسيتات ، دورا هاما ، فى تحليل المواد العضوية المعقدة كالكيتين ، وفى تكوين النبال ، وإعطاء التربة راحتها المميزة ، وإنتاج المضادات الحيوية . كما أن بعض أنواعها ممرض للنبات ، مثل *Streptomyces scabies* ، المسبب لمرض الجدرى العادى *Common scab* ، بالبطاطس ، وبنجر السكر .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن جنس فرانكيا *Frankia* التابع لهذه المجموعة ، له القدرة على تثبيت النتروجين الجوى تكافليا ، مع النباتات غير البقولية ، مثل الأناناس ، والكازورينا .

الفطريات Fungi

الفطريات هوائية ، لذا تكثر بالطبقة السطحية من التربة ، وهى توجد كهيفات ، أو كجراثيم ، وتصل أعدادها إلى ١٠^٩ / جم تربة ، وتكثر فى الأراضى الحامضية .

والفطريات السائدة بالأراضى ، هى الفطريات الحقيقية *Eumycetes* بكل أجناسها ، وإن كانت الأنواع التابعة لمجموعة *Deuteromycetes* ، هى الأكثر إنتشارا . وتكثر الفطريات للزجة *Myxomycetes* ، فى أراضى الغابات، والمناطق الباردة .

تحلل الفطريات المواد العضوية المعقدة ، والمخلفات النباتية كالسليولوز ، والبكتين ، واللجنين ، كما أنها تساعد على تجميع حبيبات التربة ، بواسطة الميسيليوم الذى يمتد ، ويتخلل الأرض ، كما أن بعض أنواعها معرض للنبات.

تعيش فطريات الميكوريزا *Mycorrhiza* ، معيشة تعاونية ، مع جذور كثير من النباتات ، مثل الأبصال ، والذرة ، والموايح ، حيث تقوم فطريات الميكوريزا ، بعمل الشعيرات الجذرية ، من حيث إمتصاص الماء ، والغذاء ، والأملاح خاصة الفوسفور ، الذى تقوم فطريات الميكوريزا بتحويله لصورة ميسرة للنبات . ويمد النبات ، فطر الميكوريزا ، بإحتياجاته من كربوهيدرات وأحماض أمينية وفيتامينات .
ومن أجناس الميكوريزا المنتشرة بالأراضى *Glomus* ، *Gigaspora* .

الطحالب Algae

الطحالب أقل إنتشارا بالأراضى ، من البكتريا والفطريات . وهى هوائية أوتوتروفية ممثلة للضوء ، لذا تكثر فى الطبقة السطحية من التربة فى وجود رطوبة عالية . وتسود الطحالب الخضراء والدياتومات ، فى أراضى المناطق المعتدلة ، بينما تسود الطحالب الخضراء المزرقمة (السيانوبكتريا)، فى أراضى المناطق الحارة. وتوجد الطحالب فى الأراضى ، إما وحيدة الخلية، أو فى خيوط . وتصل أعدادها إلى ١٠^٩ / جم تربة .

ونظرا لقدرة الطحالب على التمثيل الضوئي ، فإنها قادرة على تكوين مواد عضوية بالتربة ، من مواد معدنية بسيطة مع ثاني أكسيد الكربون . وعند نموها على سطح الصخور ، تكون طبقة سميكة ، تعتبر مصدرا عضويا لنمو الكائنات المجهرية ، من بكتريا وفطر . ويؤدي نمو الطحالب ، إلى تكوين أحماض عضوية ، تساعد على التحول التدريجي للصخور ، إلى وسط صالح لنمو النباتات الأرقى . وبذلك فإن الطحالب تقوم بالخطوات الأولى ، في تحويل الصخور إلى تربة زراعية

البروتوزوا Protozoa

أكثر أنواع البروتوزوا تواجدا بالأراضى ، هى الأميبات ، والسوطيات . وتنتشر البروتوزوا بالطبقة السطحية من التربة ، ويناسبها توفر الرطوبة ، والمادة العضوية ، وتصل أعدادها إلى ٢١٠ / جم تربة . كما توجد البروتوزوا بكثرة فى الأراضى المسماة بالأراضى المريضة Sick soil ، وهى أراضى غدقة ، سيئة الصرف .

تتغذى البروتوزوا إما على المواد العضوية ، أو على إلتهام البكتريا وبعض المجهرية الأخرى ، كالفطريات والفطريات . لذلك ، يعتبر وجود البروتوزوا ، فى بعض الحالات ، عاملا محندا لإنتشار البكتريا بالأراضى ، وبذلك ، فإن البروتوزوا ، تلعب دورا فى عملية التوازن الميكروبي بالتربة .

الفيروسات Viruses

تصل فيروسات البكتريا والنبات والحيوان للتربة ، مع إضافة المخلفات النباتية والحيوانية ، كما أن أحياء التربة تحلل الكثير من الفيروسات .

وجود فيروسات البكتريا (بكتريوفاج) بالتربة ، قد يكون من العوامل المؤثرة ، على إنتشار بعض أنواع البكتريا الهامة ، مثل الأنواع المثبتة للنتروجين الجوى ، كالرايزوبيا ، والسيانوبكتريا ، والأزوتوباكتر . كما تسبب الفيروسات النباتية ، أمراضا عديدة للنبات .

Rhizosphere**الرايزوسفير**

تسمى المنطقة من التربة ، الملاصقة لجذور النبات ، والمتأثرة بها ، منطقة الرايزوسفير ، أى منطقة مجال المجموع الجذرى . وتمتاز هذه المنطقة ، بأن محتواها الميكروبي ، ونشاطها الفسيولوجى ، على وحول الجذور ، عالى جدا ، وقد تصل أعداد الميكروبات بمنطقة الرايزوسفير ، إلى مئات المرات ، إذا ما قورنت بأعداد المحتوى الميكروبي الموجود بالتربة ، البعيدة عن تأثير الجذور .

تتأثر الميكروبات الموجودة فى منطقة الرايزوسفير ، بما تفرزه جذور النباتات ، من مواد مغذية ، وسكريات ، وأحماض عضوية وأمينية ، وفيتامينات ، وبما يتخلف عن النباتات ، من جذور متقطعة ، وخلايا ممزقة . كما يتأثر نمو النباتات ، بنواتج التمثيل الغذائى للميكروبات ، الموجودة بمنطقة الجذور .

من الميكروبات التى توجد ، بأعداد عالية ونشاط كبير ، فى منطقة المجموع الجذرى ، الميكروبات التى تقوم بمعدنة المواد العضوية ، والمحللة للسليولوز ، والتى تقوم بعملية النشطرة ، وتيسير الفوسفور ، وأكسدة الكبريت .

العلاقات المتبادلة بين ميكروبات الأراضي**Interactions among soil microorganisms**

يتضمن النظام البيئى الميكروبي بالتربة Microbial ecosystem ، كلا من الأحياء المعجهرية ، بأعدادها وأنواعها المتعددة ، والتربة ، بخواصها وظروفها المختلفة . فهذا النظام البيئى ، هو محصلة علاقات مكونات التربة الحية ، وغير الحية ، Biotic and abiotic components .

توجد الميكروبات فى التربة ، كمجتمع خليط ، بأعداد وفيرة ، وأنواع متعددة ، تنشأ بينها وبين بعضها ، العديد من العلاقات المتبادلة ، بعضها مفيد Beneficial associations ، والأخر ضار Detrimental . وتسبب هذه العلاقات ، تغيرات مستمرة بين المجموعات الميكروبية ، وتؤدى فى النهاية ، إلى الإنزان البيولوجى Biological equilibrium ، الناتج من علاقات التعاون والتضاد .

من أمثلة العلاقات المفيدة بين الميكروبات ، مايلي

١- المعايشة أو المنفعة لطرف واحد Commensalism

في المعايشة ، يستفيد أحد النوعين (النوع الأول) من النوع الثاني، بينما لا يستفيد ، النوع الثاني من النوع الأول .
ويحدث ذلك ، على سبيل المثال ، عند تحلل المواد العضوية المعقدة ، كالسليولوز واللجنين ، بواسطة بعض الفطريات ، فيستفيد من نواتج التحلل (من جلوكوز وأحماض عضوية) ، ميكروبات أخرى ، غير قادرة على تحليل هذه المواد المعقدة . كما أن بعض الميكروبات ، تعتمد في نموها ، على ماتفرزه ميكروبات أخرى ، من فيتامينات ومواد مشجعة للنمو .

٢- المشاركة أو التبادل Mutualism

في هذه العلاقة ، يستفيد كل نوع من النوع الآخر ، ولكن التعاون بينهما ليس إجباريا ، فغياب أحد النوعين ، لا يؤثر على وجود الآخر .
مثالا على ذلك ، ما يحدث من تبادل للعناصر الغذائية ، بين الأزوتوبياكتر والمجهرات المحللة للنشا ، وبين السيانوبكتريا (الطحالب الخضراء المزرقية) ، وما يحيط بها من بكتريا . وتسمى حالة التعاون ، التي يحدث فيها تبادل للعناصر الغذائية بين الميكروبات ، باسم التغذية المتبادلة .
Syntrophism

٣- التكافل Symbiosis

هنا يستفيد كل نوع من النوع الآخر ، ويعتمد عليه ، والعلاقة بين النوعين ، وثيقة ومتخصصة . مثل ذلك ، العلاقة بين الريزوبيا والنباتات البقولية ، والفراكتريا والنباتات غير البقولية ، والميكوريزا في جنود بعض النباتات ، وطحلب الأنابينا مع سرخس الأزولا .

من أمثلة العلاقات الضارة بين الميكروبات

Competition

١- التنافس

وفيها يتنازع النوعين ، على نوع واحد من الغذاء ، أو الأكسجين ، أو المكان ، مما يؤدي إلى سيادة النوع الأكثر تأقلمًا ، على النوع الآخر ، كما يحدث بين كثير من بكتريا التربة وفطر *Fusarium oxysporum* ، من منافسة على مصدر النتروجين ، عندما تكون كميته قليلة ، فتفوز البكتريا .

Antagonism


٢- التضاد

يحدث ذلك ، نتيجة إنتاج نوع من الميكروبات ، أحماضًا ضارة ، تؤثر على نمو الميكروبات الحساسة للحموضة ، أو تفرز موادًا سامة ، أو مضادات حيوية ، كنواتج للتمثيل الغذائي ، فتؤثر على نمو الميكروبات الأخرى ، وقد تقضى عليها . وتعتبر الأكتينومييسيتات ، من أكثر الكائنات المجهرية ، إفرازًا للمضادات الحيوية بالتربة ، التي تحد من انتشار الميكروبات الممرضة للنبات . وقد إستفاد الإنسان من تلك الخاصية ، بإنتاجه للمضادات من الأكتينومييسيتات ، ومن غيرها من الميكروبات ، وإستخدامها فى علاج الكثير من الأمراض كالتيفود ، والسل .


Parasitism and predation

٣- التطفل والإفتراس

تعرض الكائنات المجهرية بالتربة ، للتطفل والإفتراس (شكلى ٥-٢ و ٥-٣) ، وهذا يحد من نشاطها ، أو قد يقضى عليها . فتتطفل الفيروسات على مجهرات التربة ، وقد تؤدي إصابة الرايزوبيا بالفاج ، إلى نقص عدد الرايزوبيا ، وعدم تكوين عقد بكتيرية على جذر النبات ، كما يتطفل على البكتريا ، بكتريا واوية سالبة لجرام هي *Bdellovibrio bacteriovorus* ، توجد بالأرض ومياه المجارى ، وتسبب تحلل خلايا البكتريا وموتها . كما توجد أنواع من الفطريات ، تتطفل على فطريات أخرى ، وعلى الطحالب والبروتوزوا والنيماتودا . من حيث الإفتراس ، تعتبر البكتريا من أكثر الأحياء الدقيقة بالتربة ، تعرضًا للإفتراس . فتقوم البروتوزوا ، والفطريات اللزجة *Myxomycetes* بالتهام البكتريا . كما تتغذى البكتريا اللزجة *Myxobacteria* على البكتريا الأخرى ، بإذابة خلاياها ، بما تفرزه البكتريا اللزجة من إنزيمات خارجية محللة ، ثم تمتص المواد المتحللة ، وتتغذى عليها .



شكل ٥-٢ : صورة بالمجهر الإلكتروني ، توضح اختراق البديلوفبريو لجدار بكتريا E. coli (٨٤.٠٠٠ ×)



البداية

٢ ساعة

٤ ساعة

شكل ٥-٢ : تحلل السيانوبكتريا (خيوط نوستوك) بواسطة الميكسوباكتريا خلال عدة ساعات .

Cycle of elements

دورات العناصر

الدور الذى تلعبه ميكروبات الأراضى فى التحولات الأرضية Biogeochemical rôle of soil microorganisms البيوكيميائية

تقوم ميكروبات الأراضى ، بتحويل المواد العضوية المعقدة ، إلى مركبات معدنية بسيطة . وتسمى هذه العملية بالمعدنة Mineralization . وتوفر هذه العملية ، العناصر الغذائية للميكروبات ، والنبات ، والحيوان ، والإنسان .

تصل المواد العضوية إلى التربة ، من مصادر عديدة ، منها المخلفات النباتية (وهى أهم تلك المصادر) ، والمخلفات الحيوانية ، والتسميد العضوى ، والمخلفات الميكروبية . وتتعرض تلك المواد العضوية ، لنشاط الميكروبات الهتروتروفية ، التى تقوم بما تفرزه من إنزيمات ، بتحليل تلك المواد العضوية ، للحصول على الطاقة وبناء خلاياها ، مع تحول نسبة كبيرة من كربون المادة العضوية ، إلى ثانى أكسيد الكربون .

ونتيجة لتحلل المواد العضوية ، تختفى المواد السريعة التحلل أولاً ، ثم يبطئ التحلل تدريجياً بعد ذلك ، وتختفى الأنسجة النباتية والحيوانية ، ويتبقى فى نهاية التحلل ، المواد الصعبة التحلل ، التى تكون مع المخلفات الميكروبية وبعض معادن الطين ، مادة معقدة التركيب ، بطيئة التحلل ، لونها غامق ، هى الدبال ، التى تؤثر على خواص التربة الفيزيائية ، والكيميائية ، والبيولوجية .

وبذلك ، فإنه يحدث اثناء معدنة المواد العضوية ، بتأثير ميكروبات الأراضى ، عدة عمليات فى وقت واحد . الأولى ، اختفاء الأنسجة النباتية والحيوانية من المواد العضوية المضافة ، والثانية ، تكون أنسجة جديدة وخلايا ميكروبية ، والثالثة ، تكون الدبال من المواد الصعبة التحلل ، والرابعة ، تكون نواتج نهائية لعملية التحلل .

ويتضح الدور الذى تلعبه ميكروبات الأراضى ، فيما تقوم به فى التربة ، من تحولات بيوكيميائية ، كما فى دورات الكربون ، والنيتروجين ، والكبريت ، والفوسفور ، وغيرها من العناصر . وهذه الدورات ، لها تأثيرها الكبير على إنتاجية الأراضى ، وعلى ما حولنا من ظروف بيئية .

Carbon cycle**دورة الكربون****Carbon dioxide fixation****تثبيت ثاني أكسيد الكربون**


المصدر الأساسي في الطبيعة ، لكربون المركبات العضوية الكربونية، هو ثاني أكسيد الكربون ، الموجود في الهواء الجوى ، أو العذاب في الماء. ورغم أن النباتات والطحالب ، هي العوامل الأساسية لتثبيت ثاني أكسيد الكربون ، وتحويله بالإختزال الى مواد عضوية ، فإن البكتريا ، قادرة أيضا على تكوين المواد العضوية ، من ثاني أكسيد الكربون ، كما يتضح مما يلى

١- البكتريا الأوتوتروفية

يعتبر CO_2 الجو ، مصدر الكربون الوحيد للبكتريا الأوتوتروفية . ونتيجة للإختزال ، فإنه يتحول إلى كربوهيدرات ، حسب المعادلة العامة)

**٢- البكتريا الهتروتروفية**

تثبيت CO_2 ، عملية شائعة بين البكتريا الهتروتروفية ، ومصدر الكربون هنا هو المواد العضوية ، كما يتضح من المعادلة الآتية



حامض بيروفيك

حامض أكسال أسيتيك

تحلل المواد العضوية الكربونية**Organic carbon compounds degradation**

. تتعرض المواد العضوية الكربونية ، التى تصل إلى التربة ، للتحلل بتأثير النشاط الميكروبي ، مع تكون غاز ثاني أكسيد الكربون (وهو من النواتج النهائية للتحلل) ، الذى يتصاعد الى الجو ، كما ينتشر بالتربة . وتختلف المواد العضوية فى سرعة تحللها ، فمعناها السريع ، كالمكونات الذاتية والسكريات البسيطة ، يليها النشا والسليلوز ، ومنها البطيء ، مثل اللجنين والشموع والراتنجات .



والناتج النهائي لتحلل المواد الكربونية ، تحت الظروف الهوائية هو CO_2, H_2O ، نتيجة الأكسدة الكاملة . أما تحت الظروف اللاهوائية ، فإن الأكسدة تكون غير كاملة ، فنتج كحولات ، كإيثانول والبروبانول والبيوتانول ، وأحماض عضوية ، مثل الخليك والفورميك والبيوتيريك واللاكتيك ، وغازات مثل ، $CO_2, H_2, CH_4, H_2S, NH_3$... وغيرها .

السليلوز Cellulose

من أمثلة المواد العضوية الكربونية ، التي تتعرض للتحلل بالتربة ، السليلوز . ويعتبر السليلوز ، المكون الأساسي بالمخلفات النباتية ، حيث تصل نسبته ، إلى حوالي ٦٠ ٪ ، من تركيب تلك المخلفات ، وهو مادة كربوهيدراتية معقدة ، يتركب من وحدات عديدة من الجلوكوز ، مرتبطة بروابط جليكوزيدية ، من نوع بيتا ١ - ٤ . وهي يلي السكريات البسيطة والنشا ، من حيث سرعة التحلل ، بواسطة ميكروبات الأراضي .

يتحلل السليلوز في التربة ، بواسطة الميكروبات ، بما تفرزه من إنزيمات ، تسمى في مجموعها *Cellulases* ، فيتحلل تدريجياً ، حتى يصل إلى السيللوبيوز *Cellobiose* ، وهو وحدتين من الجلوكوز ، ثم إلى جلوكوز ، الذي يستخذه الميكروب ، كمصدر للكربون والطاقة . ويتحلل الجلوكوز هوائياً إلى CO_2, H_2O ، أو لاهوائياً إلى مركبات وسطية ، وذلك حسب ظروف الميكروب .

ويمكن تلخيص عمليات التحلل في الخطوات الآتية



Enzyme system of organisms

glucose \longrightarrow CO₂ , H₂O , and other, end products

الميكروبات النشطة فى تحليل السليلوز (شكل ٥-٤) ، هى البكتريا الهوائية واللاهوائية ، والفطريات . وتسود البكتريا والأكتينومييسيتات ، فى الأراضى المتعائلة والمائلة للقلوية ، بينما تسود الفطريات ، فى الظروف الحامضية .


Cytophage , Bacillus , Clostridium	من أجناس البكتريا المحللة
Micromonospora , Nocardia , Streptomyces	ومن أجناس الاكتينومييسيتات
Alternaria , Aspergillus , Chaetomium , Penicillium	ومن الفطريات

ونظرا لأن الحيوانات ، غير قادرة على إفراز الإنزيمات المحللة للسليلوز ، فإن البكتريا المحللة للسليلوز ، الموجودة بمعدة الحيوانات آكلة العشب ، تعتبر المستولة ، عن تحلل المواد السليلوزية الموجودة بالعليقة .

المخلفات العضوية الأخرى

تتعرض المخلفات العضوية الأخرى ، كالنشا ، والهيميسليلوز ، والبكتين ، والكيتين ، والصمغ ، واللجنين ، للتحلل الميكروبي ، كما حدث فى حالة السليلوز ، الذى سبق الكلام عنه ، مع اختلاف الإنزيمات ، والميكروبات المحللة ، حسب نوع المخلفات ، وظروف التربة .


أ - الستيوفاجا



ب- الاكتينومييسيتات



Nocardia .



Streptomyces



Micromonospora


ج - الفطريات



Aspergillus



Penicillium



Fusarium

شكل ٤-٥ : بعض الميكروبات المحللة للسليوز من سيتوفاجا ،
وأكتينومييسيتات ، وفطريات .

تكون وأكسدة غاز الميثان

Production and oxidation of methane

يتكون غاز الميثان ، تحت الظروف اللاهوائية ، من تحلل المواد العضوية القابلة للأكسدة . ويحدث ذلك بالتربة المغمورة بالمياه ، وفي قاع البرك والمستنقعات ، وفي كرش الحيوانات المجترة .


يقوم بإنتاج غاز الميثان ، مجموعة من البكتريا اللاهوائية المتخصصة ، تسمى البكتريا المنتجة لغاز الميثان *Methanogenic bacteria* ، مثل *Methanococcus* ، *Methanobacterium* ، *Methanospirillum* . ومصائر الكربون الملائمة لهذه البكتريا ، هي الأحماض العضوية ، والكحولات ، وغاز CO_2 ، التي تنتجها الميكروبات الأخرى ، التي تحلل الكربوهيدرات لاهوائيا .

ينتج غاز الميثان ، بواسطة البكتريا المتخصصة ، بمجموعة من التفاعلات ، من أمثلتها ، المعادلات العامة التالية



إذا أصبحت الظروف هوائية ، فإن البكتريا المؤكسدة للميثان *Methylotrophic bacteria* ، وهي هوائية حتما ، مثل *Methylococcus* ، *Methylomonas* ، علاوة على بعض الفطريات ، تقوم بأكسدة الميثان ، وأكسدة مجموعة الميثايل ، واستخدامهما كمصدر للكربون . وتوجد هذه الميكروبات في التربة جيدة التهوية ، وعلى سطح مياه الأراضي المغمورة ، حيث تستفيد من الميثان المتكون ، في الأعماق البعيدة عن الأكسجين ، أو في مسام التربة الضيقة .

ويوضح الشكل (0-0) دورة الكربون في الطبيعة



شكل ٥-٥ : دورة الكربون في الطبيعة

دورة النتروجين Nitrogen cycle

يعتبر النتروجين ، حجر الأساس فى جزىء البروتين ، المكون لبروتوبلازم جميع الخلايا الحية . وتعتمد الحياة ، على استمرار سد النقص فى المركبات النتروجينية ، التى تعتبر من أكثر المركبات فى الطبيعة ، تعرضا للتحويلات البيولوجية ، بما فى ذلك من تفاعلات الأكسدة والإختزال . وتسمى هذه التحويلات مجتمعة ، بدورة النتروجين . ويقوم بتلك التحويلات ، العديد من الميكروبات ، بما تفرزه من إنزيمات .

يضاف النتروجين للتربة ، على هيئة أسمدة معدنية ، أو فى صورة عضوية ، تشمل المخلفات النباتية ، والحيوانية ، والميكروبية ، والأسمدة العضوية .

وتشمل التحويلات البيولوجية للنتروجين ما يلى

أولا : معدنة النتروجين العضوى Organic nitrogen mineralization

يأخذ النبات معظم إحتياجاته من النتروجين ، فى صورة معدنية (أمونيا و نترات) . لذلك ، فإن معدنة المواد العضوية النتروجينية ، ومنها البروتين ، والأحماض النووية ، والسكريات الأمينية ... وغيرها ، تعتبر عملية أساسية لدورة النتروجين ، وخصوبة الأراضى .

وتتضمن عملية المعدنة ، خطوتين أساسيتين هما : النشطرة Ammonification ، وهى عبارة عن تحلل النتروجين العضوى حتى يكون الأمونيا، والتأزوت (النترنة) Nitrification ، وهى عبارة عن أكسدة الأمونيا إلى نترات.

١- النشطرة

تقوم أعداد ضخمة من ميكروبات الأراضى ، بما تفرزه من إنزيمات خارجية محللة للبروتين ، بتحليل البروتين إلى أحماض أمينية . ومن الميكروبات النشطة ، فى تحليل البروتينات

البكتريا الهوائية واللاهوائية مثل

Bacillus , Proteus , Pseudomonas , Clostridium sporogenes

Streptomyces

والأكتينومييسيتات مثل

Alternaria , Aspergillus , Penicillium

والفطريات مثل

تحت الظروف الهوائية ، تكون نواتج تحلل البروتين النهائية ، هي

الأمونيا ، و H_2O ، H_2S ، CO_2 .


أما تحت الظروف اللاهوائية ، فإنه يصحب التحلل ، تكون روائح

كريبه ، لحدوث تعفن Putrefaction ، حيث تكون النواتج النهائية ، أمونيا ،

أمينات ، أحماض عضوية ، أحماض أمينية ، H_2S ، CO_2 ، ومركبات كبريتية

كالمركبتان ، والسكانول .

يتحلل البروتين على خطوات



الأحماض الأمينية الناتجة من التحلل ، جزء منها تستخدمه الميكروبات

الهتروتروفية ، كمصدر للنيتروجين والكربون ، والجزء الباقي ، يتحلل بتأثير

بعض الميكروبات .


تتعرض الأحماض الأمينية ، للتحلل الميكروبي بطرق عديدة ، وذلك

حسب ظروف التربة ، والميكروبات ، حيث يتم نزع جزيء الأمين Deamination ،


أو نزع جزيء الكربوكسيل Decarboxylation ، ويتم ذلك بطرق عديدة ، تمثلها

المعادلات العامة التالية


Deamination (Oxidative)



Decarboxylation



Hydrolysis



الأمونيا المتكونة ، قد تتطاير ، أو تذوب بالتربة وتكون NH_4^+ ، أو تتأكسد إلى نترات ، حيث تستعمل الأمونيا أو النترات ، فى تغذية النبات والميكروبات، أو تتعرضان للفقد .

٢- التآزوت (النترتة)

تقوم ميكروبات الأراضى ، بتحويل الأمونيا المتجمعة ، إلى نترات بالأكسدة . ويتم ذلك على مرحلتين ، لكل مرحلة ، مجموعة البكتريا المتخصصة لها ، وكلها بكتريا هوائية ، أوتوتروفية حتما ، سالبه لصبغة جرام ، ذات أشكال مورفولوجية متعددة ، بطيئة النمو ، توجد فى التربة والمياه ، وفى مياه المجارى . وتحصل هذه البكتريا على الطاقة اللازمة لها، من عملية الأكسدة

أ- أكسدة الأمونيا إلى نترت ، بواسطة البكتريا المؤكسدة للأمونيا مثل *Nitrosomonas* , *Nitrosococcus* , *Nitrosovibrio* ، وتقوم هذه البكتريا بالتفاعل التالى



ب- أكسدة النيتريت إلى نترات ، بواسطة البكتريا المؤكسدة للنيتريت مثل *Nitrobacter* , *Nitrococcus* ، وتقوم هذه البكتريا بالتفاعل التالى



يلاحظ ان النترت المتكون فى الخطوة الأولى ، سام للنبات ، ولكنه لايتراكم بالتربة ، فبمجرد تكوينه ، يتأكسد إلى نترات ، مفيد للنبات .

عملية التآزوت ، عملية بيولوجية هامة بالأراضى ، حيث أن النترات المتكون ، هو أفضل صورة لإمتصاص المواد النتروجينية ، فى أغلب النباتات .

Nitrogen loss from soil

ثانياً: فقد النتروجين من التربة


يفقد النتروجين من التربة ، إما بطريقة بيولوجية ، كما يحدث فى عملية انطلاق (تحرير) النتروجين Denitrification ، واختزال النترات Nitrate reduction ، أو بطريقة غير بيولوجية ، بالتطاير ، وفى مياه الصرف.

فقد النتروجين ، عملية غير مرغوبه زراعياً ، والظروف البيئية التى تسمح بالفقد البيولوجى ، هى : وجود ظروف لاهوائيه ، توفر المواد العضوية القابله للأكسدة ، ارتفاع حرارة التربة (من ٢٥ إلى ٦٥°م) ، والوسط المتعادل ، أو المائل للقلوية .

ويحدث الفقد ، بواسطة انواع كثيرة من البكتريا ، الأوتوتروفية والهتروتروفية ، بما تفرزه من إنزيمات ، فى سلسلة من التفاعلات البيوكيميائية ، حيث ، أنه فى غياب الأكسجين ، تعمل النترات كمستقبل للإيدروجين ، لهذه البكتريا .

- انطلاق النتروجين

فى هذه العملية ، تختزل النترات اختزالاً كاملاً ، إلى نتروجين غازى .



- اختزال النترات

فى هذه العملية ، تختزل النترات إلى أمونيا ، وهو عكس عملية التآزوت.



من أجناس البكتريا التى تقوم بهذه التفاعلات :

Achromobacter , *Alcaligenes* , *Bacillus* , *Chromatium* , *Hyphomicrobium* , *Pseudomonas* , *Thiobacillus* and *Vibrio*

ومما يذكر ، أن البكتريا التي تقوم بهذه التفاعلات ، غير متخصصة ، فكثير منها فى الظروف العانية ، يقوم بعمليات النشرة ، وغيرها من التفاعلات الحيوية . ولكنها تقوم بعمليات الإختزال وإنتلاق النتروجين ، عند ما تسود بالتربة الظروف البيئية ، المشجعه لهذه التحولات .

ثالثا : تثبيت النتروجين الجوى Nitrogen fixation , Diazotrophy

المقصود بعملية التثبيت الحيوى للنتروجين الجوى ، هو تحويل النتروجين الجوى ، بواسطة الميكروبات ، إلى أمونيا ، حيث يستخدم لبناء خلاياها . وتوجد مجموعة كبيرة من الكائنات ، بدائية النواه (بروكاريوتا) ، لها القدرة على استخدام النتروجين الغازى ، كمصدر للنتروجين ، لاحتوائها على انزيم النيتروجيناز Nitrogenase ، المثبت لنتروجين الهواء الجوى ، والذي يقوم بالتفاعل التالى ، لإنتاج الأمونيا



الأمونيا المثبتة داخل جسم الميكروب ، تمثل لبناء مواد بروتينية



البكتريا المثبتة للنتروجين الجوى مجموعتان (جدول ٥-١)

١- بكتريا لاتكافليه Non-Symbiotic

وهى تثبت النتروجين ، أثناء معيشتها الحرة بالتربة Free-living diazotropha .

٢- بكتريا تكافلية Symbiotic

وهى تثبت النتروجين ، عندما تعيش تكافليا مع النبات (غالبا فى جذور النبات) Symbiotic diazotropha .

جدول ٥-١ : بعض أجناس وأنواع البكتيريا الهامة ، المثبتة للنيتروجين الجوى

A: Free - living Diazotrophs

B: Symbiotic diazotrophs

A 1: Heterotrophs

1- Rhizobium on legumes

Azospirillum lipoferum محب للهواء بكمية قليلة

2- Frankia on non-legumes

Azotobacter chroococcum هوائى

3- Anabaena on Azolla

Beijerinckia indicum هوائى

Bacillus polymyxa لختيارى للهواء

Enterobacter aerogenes لختيارى للهواء

Escherichia coli لختيارى للهواء

Clostridium pasteurianum لاهوائى

A 2 : Autotrophs

1- Oxygenic photobacteria (Cyanobacteria)

Gloeocapsa وحيد الخلية

Anabaena خيطى يكون متبروست

Nostoc خيطى يكون متبروست

Oscillatoria خيطى لا يكون متبروست

Plectonema خيطى لا يكون متبروست

2- Anoxygenic photobacteria

Chlorobium thiosulfatophilum

Chromatium vinosum

Rhodospirillum rubrum

3- Chemosynthetic bacteria


Thiobacillus sp.

التثبيت اللاتكافلي Non-symbiotic fixation

تقوم انواع عديدة ، من البكتريا الهتروتروفية والاوتوتروفية ، بتثبيت النتروجين الجوى لاتكافليا . وتتراوح كمية النتروجين المثبتة عادة ، ما بين ١٠ - ٢٥ كجم نتروجين / فدان سنويا ، وذلك حسب ظروف التربة . وبالإضافة إلى قدرة هذه الميكروبات ، على تثبيت النتروجين ، فإنها تفرز الكثير من المواد المنشطة للنمو ، مثل إندول حامض الخليك ، وبعض الفيتامينات ، التي تساعد على زيادة انتاج المحصول المنزرع .

والأنواع الهتروتروفية للكثيرة الانتشار بالتربة ، هي

Azotobacter spp. (شكل ٦-٥) ، وهي هوائية ، كروية إلى بيضاوية ، غالبا في أزواج ، سالبة لصبغة جرام .
Clostridium pasteurianum (شكل ٧-٥) ، وهي لاهوائية ، عصوية متجرثمة ، موجبة لصبغة جرام .



Az. agilis

Az. chroococcum

شكل ٦-٥ : بكتريا الأزوتوباكترا بمجهر تباين الأطوار الضوئى (X ١.٢٠٠)

الأنواع الأوتوتروفية ، التي تلعب دورا هاما في تثبيت النتروجين الجوى ، فى الأراضي المنزرعة أرزا ، هى البكتريا الممثلة للضوء الأكسوجينية (السيانوبكتريا) ، ومن أجناسها الواسعة الانتشار : *Nostoc* , *Anabaena* (شكل ٨-٥) ، وهى خيطية وتكون هتيروسست *Heterocyst* ، وهذه ، عبارة عن خلايا خاصة ، توجد على مسافات بطول خيط البكتريا ، وهى مكان تثبيت النتروجين بهذه السيانوبكتريا .



Cl. pasteurianum

شكل ٧-٥ : بكتريا لاهوائية مثبتة للنتروجين الجوى (x ١٠٠٠)



شكل ٨-٥ : خيط سيانوبكتريا نوستوك عمره ١٠ أيام (x ١.٢٠٠)

التثبيت التكافلي Symbiotic fixation

تقوم أنواع من البكتريا ، والأكتينوميسيتات ، وبعض السيانوبكتريا ، بتثبيت النتروجين الجوى داخل النباتات ، بالإشتراك مع بعض النباتات ، مغطاة ، ومعراة البذور .

من صور التثبيت التكافلي

١- التكافل بين الرايزوبيا والنباتات البقولية

Rhizobium - legume symbiosis

فى هذه المعيشة التكافلية ، تقوم بعملية التثبيت ، بكتريا العقد الجدرية Root-nodule bacteria ، التابعة لجنسى Bradyrhizobium و Rhizobium ، وذلك بداخل العقد الجذرية Root-nodules ، حيث تعيش هذه البكتريا معيشة تكافلية ، مع النباتات البقولية مثل البرسيم ، والبسلة ، والفاصوليا ، والفل ، وفول الصويا .

وفى هذه العلاقة التكافلية ، فإن النبات يمد البكتريا ، بما تحتاجه من سكريات ، ومصادر للطاقة ، ومواد عضوية ، وغير عضوية ، بينما تمد البكتريا ، النبات ، بالمواد النتروجينية المثبتة .

وهناك نوع من التخصص بين البكتريا العقدية ، والنبات البقولى العائل . فلكل نبات بقولى ، أو مجموعة من النباتات البقولية ، نوع ، أو سلالة معينة من الرايزوبيا ، التى تستطيع ان تكون عقدا على جذور ذلك النبات ، وتثبت بالعقدة النتروجين ، بينما لاتستطيع تلك سلالة أخرى .
مثالا على ذلك ، فإن البكتريا R. meliloti ، تكون عقدا فعالة ، قادرة على تثبيت النتروجين ، بجذور نباتات مجموعة البرسيم الحجازى ، وهى البرسيم الحجازى ، والحلبه ، والحنديق ، بينما لاتستطيع أن تكون تلك العقد ، أو تكون عقدا كاذبة غير مثبتة للنتروجين ، بالبرسيم العادى ، والمجموعة التابعة له ، لأن مجموعة البرسيم العادى ، تصيبها البكتريا من نوع R. trifolii ... وهكذا .

وحتى بالنسبة للنوع الواحد من النبات البقولى ، فإنه توجد سلالات فعالة من الرايزوبيا ، التى تصيبه بكفاءة ، عن سلالات أخرى .

لذلك ، تقسم البكتريا العقدية ، حسب مجموعة العوائل النباتية ، التى تصيبها ، إلى سبعة مجاميع ريزوبيا رئيسية ، هى

R. meliloti (Alfalfa group)	Br. japonicum (Soybean group)
R. trifolii (Clover group)	Br. lupini (Lupine group)
R. leguminosarum (Pea group)	Br. sp. (Cowpea group).
R. phaseoli (Bean group)	


والبكتريا العقدية هوائية ، وعندما توجد فى الحالة الحرة بالتربة، تكون عصوية الشكل ، غير قادرة على تثبيت النتروجين . وعند زراعة النبات البقولى ، فإن البكتريا العقدية - اذا كانت من النوع المتخصص للنبات المنزوع - تغزو المجموع الجذرى ، وتدخل من طرف الشعيرات الجذرية ، وتنمو مكونة خيط العدوى infection thread (وهو مكون من البكتريا العقدية، محاطة بأنبوبة من السليلوز) .

يمتد خيط العدوى باخل الشعيرة الجذرية ، حتى يصل إلى خلايا القشرة بالجذر ، أو البريسيكل فى بعض النباتات ، حيث يتفرع بالخلايا ، ثم يختفى خيط العدوى المغلف للبكتريا ، وتتكاثر البكتريا تكاثرا سريعا ، وتتنبه خلايا القشرة (أو البريسيكل) ، فتنشط ، وتتكاثر ، وتتضخم ، وبذلك تتكون العقدة الجذرية ، التى تتصل بالحزم الوعائية للجذر، وتعيش البكتريا العقدية ، فى خلايا العقدة ، حيث تثبت النتروجين ، وتتم عملية تبادل المنفعة .

تأخذ البكتريا وهى فى العقدة أشكال TLYXV . (شكل ٥-٩) ، ويسمى ذلك طور البكتيرويد Bacteroid ، وهو طور البكتريا العقدية ، الموجود بالعقد الجذرية ، المحتوى على انزيم النيتروجيناز ، المثبت لنتروجين الهواء الجوى.

شكل وحجم العقد الجذرية ، يختلف باختلاف العائل ، وتتكون العقدة على الجذر ، فى مدة لاتقل عن أسبوعين من بدء الإصابة ، وتستمر البكتريا بالعقدة مدة حوالى سبعة أسابيع ، ثم تنفجر العقدة ، وتخرج منها البكتريا لتعيش حرة فى التربة ، لتغزو شعيرات جذرية أخرى .

أهمية البكتريا العقدية كبيرة ، بالنسبة لكل من النبات البقولى ، والتربة الزراعية . فالنبات البقولى ، يجد حاجته من النتروجين المثبت ، كما أن الزائد عن حاجته ، وما يتخلف بالتربة بعد حصاده ، من عقد غنيه بالمواد النتروجينية ، تفيد المحصول التالى .




شكل ٩-٥ : نماذج لأشكال بكتريا الرايزوبيا فى طور البكتيرويد بداخل عقده جنرية (x ١.٢٠٠) .

مقدار ما تثبته البكتريا العنقية من نتروجين ، يختلف بإختلاف النبات وظروف التربة ، وقد تصل فى حالة البرسيم الحجازى إلى ١٠٠ كجم نتروجين للغدان سنويا .

وتعتبر عملية تلقيح بنور البقوليات (أو التربة) عند الزراعة ، بالبكتريا العنقية ، عملية زراعية مفيدة ، خاصة فى الأراضى حديثة الاستصلاح ، التى قد تكون خالية من البكتريا العنقية المتخصصة . وتحتوى التحضيرات التجارية من اللقاح ، على سلالات البكتريا العنقية المتخصصة ، محملة على حامل مناسب ، حيث تحفظ تحت ظروف ملائمة ، لحين استعماله ، كلقاح للبنور أو التربة .

ويوضح شكل (٥-١٠) ، العقد الجذرية بنبات البسلة .



شكل ٥-١٠: التثبيت التكافلي في عقدة جنثرية لنبات بقولي

- أ - جنثر نبات البسلة عليه عقد
 ب - قطاع في عقدة جنثرية تامة التكوين
 ج - قطاع في خلية مملوءة بالرايزوبيا
 د - بكتريا في طور البكتيريود بدخل الخلية
 هـ - اختراق بكتريا العقد لطرف الشعيرة الجنثرية ، وتكون خيط العنوى

٢- التكافل فى النباتات غير البقولية

Symbiotic nitrogen fixation on non-leguminous plants.

بعض النباتات غير البقولية ، سواء مغطاة ، أو معراه البنور ، تكون عقدا جذرية قادرة على تثبيت النتروجين الجوى . ومعظم هذه النباتات ، عبارة عن أشجار خشبية معمرة ، منتشرة فى أماكن كثيرة من العالم ، فى أراضى فقيره فى عنصر النتروجين ، مما يبين أهمية عملية تثبيت النتروجين لهذه الأشجار .

من النباتات مغطاة البنور ، المثبتة للنتروجين ، نبات الألباناس *Alnus glutinosa* ، وهو خشب جيد للأثاث ، والكانورينا *Casuarina* وهو مصدر جيد للرياح . ومن معراه البنور ، نبات السيكاس *Cycas* .

كمية النتروجين المثبتة بهذه النباتات ، تختلف حسب النبات ، وظروف التربة ، وهى تتراوح من ١٢ إلى ٢٠٠ كجم نتروجين / هكتار سنويا . وقد يصل حجم العقدة الجذرية فى بعض الأشجار الخشبية ، مثل نبات الألباناس ، إلى حجم كرة التنس .

بالنسبة لأشجار الألباناس والكانورينا ، فإن البكتريا المثبتة للنتروجين بالعقدة ، تتبع جنس *Frankia* التابع لمجموعة الأكتينومييسيتات . وتتشابه عملية غزو الجذور ، وتكوين العقد البكتيرية الجذرية ، مع ما يحدث بين الرايزوبيا والبقوليات . وتسمى النباتات غير البقولية ، المكونة لعقد جذرية ، تكافليا مع الأكتينومييسيتات (الفرانكيا) ، تسمى بإسم *Actinorrhizal plants* .

بالنسبة لأشجار السيكاس ، فقد وجد أن جذورها ، تحتوى على خيوط من البكتريا الخضراء المزرققة *Anabaena cycadeae* ، المثبتة للنتروجين ، فى منطقة بين القشرة الخارجية ، والداخلية للجذور .

٣- التكافل بين السيانوبكتريا والأزولا *Anabaena - azolla symbiosis*


تستطيع السيانوبكتريا من جنس *Anabaena azollae* ، تثبيت النتروجين تكافليا ، مع نبات الأزولا . والأزولا سرخس مائى ، يوجد ناميا بكثرة على سطح المياه ، خاصة بالمناطق الإستوائية . ويعيش الأنايبينا تكافليا ، داخل

Sulfur cycle

دورة الكبريت

يتعرض الكبريت ، مثل الكربون والنتروجين ، لمجموعة من التحولات ، تتم فى نورة (شكل ٥-١٢) ، تقوم بها الكائنات المجهرية . فبعض المجهريات ، يستطيع أكسدة المركبات الكبريتية ، بينما يستطيع البعض الآخر ، القيام بعملیات الإختزال .

وتتشابه التحولات ، التى تقوم بها الميكروبات فى دورة الكبريت (من حيث المعننه والأكسدة والإختزال) ، مع تلك التى تقوم بها الميكروبات ، فى دورة النتروجين .



شكل ٥-١٢ : دورة الكبريت

ويمكن تلخيص بعض التحولات البيوكيميائية ، التى تقوم بها الميكروبات ، فى دورة الكبريت ، فى الآتى

١- تقوم بعض أنواع البكتريا ، بأكسدة الكبريت المعدنى ، وهو صورة غير صالحة لتغذية النبات والحيوان ، إلى كبريتات ، وهى الصورة الصالحة للتغذية ، كما يتضح من المعادلة التالية




من البكتريا التى تقوم بهذا التفاعل ، Thiobacillus thiooxidans ، وهى بكتريا هوائية ، أوتوتروفية ، مؤكسدة للكبريت ، ومقاومة للحموضة .


كما تستطيع البكتريا الأخرى المؤكسدة للكبريت ، مثل Thiobacillus spp. , Beggiatoa , Thiothrix ، أكسدة مركبات الكبريت المختزلة (H_2S , SO_3^{2-}) ، مع تكوين كبريت ، وكبريتات



٢- تتحول الكبريتات ، بالتمثيل الغذائى ، الميكروبى والنباتى والحيوانى ، إلى أحماض أمينية كبريتية ، تسخل فى تركيب البروتين . وتقوم كثير من الميكروبات الهتروتروفية ، بمعدنة الكبريت العضوى ، فى عملية تشابه عملية النشطرة فى دورة النتروجين ، حيث تقوم الميكروبات ، بما تفرزه من إنزيمات ، بتحليل البروتين ، مع إنفراد الأحماض الأمينية ، ومنها الكبريتية ، التى تتحلل ، وينفرد منها الكبريت ، كما يتضح من المثال التالى



٣- كما تختزل الكبريتات إلى كبريتيد الإيدروجين ، بواسطة ميكروبات الأراضى ، كما يتضح من المعادلة التالية




البكتريا التى تقوم بإختزال ، بكتريا لاهوائية ، مختزلة للكبريتات ، حيث تستخدم الكبريتات كمستقبل للإلكترونات ، لأكسدة المواد العضوية



من هذه البكتريا :

الأنواع التابعة لجنس *Desulfotomaculum* ، وهو عصى متجرثم ، وايضا *Desulfovibrio desulfuricans* ، وهو واوى غير متجرثم (شكل ٥-١٣) .




شكل ٥-١٣ : صورة بالمجهر الإلكتروني لبكتريا *Desulfovibrio desulfuricans* (١٨.٥٠٠ X) .

يظهر نشاط البكتريا المختزلة للكبريتات ، بشكل واضح فى طين قاع البرك والبحيرات ، حيث يتكون FeS ، نتيجة لإختزال الكبريتات ، ويصبح لون طين القاع ، أسودا مزرقا .

والدور الذى تلعبه البكتريا فى إختزال الكبريتات ، يتشابه مع إختزال النترا فى نورة النتروجين .

٤- كما يتأكسد كبريتور الإيدروجين ، الناتج من اختزال الكبريتات ومن تحلل الأحماض الأمينية الكبريتية ، إلى كبريت . ويقوم بهذا التفاعل ، بكتريا الكبريت اللاهوائية الممثلة للضوء : الخضراء Chlorobium ، والأرجوانية Chromatium ، باستخدامها كبريتيد الإيدروجين ، كمانح للإلكترونات ، لإختزال CO₂ .



التحولات البيوكيميائية للعناصر الأخرى

بالإضافة إلى ما تقوم به ميكروبات الأراضى ، من تحولات فى دورات الكربون ، والنيتروجين ، والكبريت ، فإن العناصر الأخرى الموجودة بالتربة، تتعرض أيضا لمجموعة من التحولات البيوكيميائية ، من بناء وهدم ، بتأثير الميكروبات .

فنتيجة للنشاط الميكروبي بالتربة ، وإفرازها للعديد من الأحماض ، فإن الميكروبات المذيبة للفوسفات ، من بكتريا وأكتينومييسيتات وفطريات ، تحول الفوسفور غير الميسر . المرتبط بأملح الكالسيوم والحديد والألومنيوم ، إلى فوسفور ميسر للنبات

كما ينسب الفوسفور من المركبات العضوية ، مثل الاحماض النووية والفوسفوليبيدات ، بتأثير الميكروبات الهتروتروفية ، نتيجة لمعدنة تلك المواد العضوية . كما تلعب الميكوريزا ، دورا ملموسا ، فى إمداد النباتات المتعايشة معها ، بالفوسفور الميسر .

وإضافة إلى ذلك ، فإن البكتريا ، تحول الأكاسيد غير الذائبة للحديد والمنجنيز ، إلى أملاح حديدوز ومانجنوز ذائبة ، وقد يحدث العكس أيضا، نتيجة لظروف التربة .

Biodegradation of pesticides

تحلل مبيدات الآفات

المبيدات أنواع عديدة ، منها ما يستخدم لمقاومة الحشرات ، أو الفطريات ، أو النيماتودا ، أو الحشائش ، أو غير ذلك من الآفات . وأغلب المبيدات ، عبارة عن مركبات كيميائية عضوية ، قد تحتوى على مركبات حلقيه ، أو يدخل فى تركيبها الهالوجينات ، الكبريت ، الفوسفور ، أو النتروجين .

تتجمع المبيدات بالتربة الزراعية ، فإذا لم تتعرض للتحلل ، فإنها تؤثر سلبا على ميكروبات الأراضى ، وتسبب أضرارا للعمليات الحيوية الهامة ، المرتبطة بخصوبة التربة ، كما أنها تسبب تلوثا للبيئة .

تتعرض المبيدات للتحلل الميكروبي ، مع معدنتها وفقد لسميتها . وهى تختلف كثيرا فى معدل تحللها ، فبعضها سريع التحلل ، وبعضها بطيء التحلل جدا ، ويقاوم تأثير الميكروبات لعدة سنوات ، مثل مركبات الهيدروكربون الكلورية Chlorinated hydrocarbons . والتي منها الـ د.د.ت. والجمكسان . وهذه المركبات قد منع استخدامها دوليا ، نتيجة لمقاومتها للتحلل ، مما يؤدى إلى تراكمها بالتربة لفترات طويلة .

وتتوقف أيضا سرعة تحلل المبيد الواحد ، على قوام التربة ، وظروفها البيئية ، من حرارة ورطوبة وتهوية و pH ، مع ملاحظة أن تأثير الميكروبات ، على تحلل المبيدات ، ليس دائما فى صالح تقليل سمية المبيد ، فقد يؤدى النشاط الميكروبي ، إلى زيادة سمية المبيد المستخدم .

تتأثر ميكروبات الأراضى بدرجات مختلفة ، من المبيدات المستعملة . ويتوقف ذلك ، على نوع المبيد ، والمجموعة الميكروبية ، وظروف التربة . فقد وجد ، أن لبعض المبيدات تأثير منشط على ميكروبات الأراضى ، ومنها ما وجد له تأثير مثبط ، والبعض الآخر كان تأثيره محدود . غير أن من أكثر العمليات الحيوية ، التى تتأثر من استعمال المبيدات ، هى عملية التآزوت ، وعملية تثبيت النتروجين تكافليا ، لما لطبيعة الميكروبات التى تقوم بهذه العمليات ، من حساسية لتغير الظروف البيئية ، مقارنة بعمليات أخرى ، مثل النشدة ، التى تقوم بها أنواع عديدة من الميكروبات ، بعضها حساس ، وبعضها قليل الحساسية .

لذلك ، فإنه قبل انخراط مبيد جديد فى التطبيق الزراعى ، يجب دراسة مدى آثاره على النشاط البيولوجى ، ومدى مقاومته للتحلل ، ومدى تأثيره على تلوث الوسط البيئى .

الأسمدة الحيوية Biofertilizers

تعتبر كل الإضافات ذات الأصل الحيوى ، التى تعد للنبات النامى بإحتياجاته الغذائية ، تسميدا حيويا Biofertilization ، وتسمى هذه الإضافات ، بالأسمدة الحيوية ، أو باللقاحات الميكروبية Microbial inoculants .

والأسمدة الحيوية ، مصادر غذائية للنبات ، رخيصة الثمن ، اذا ما قورنت بالأسمدة المعدنية . وهى تنتج من الكائنات المجهرية ، وذلك بإختيار الميكروب المطلوب ، وإكثارة فى مزارع ملائمة ، ثم نقل النمو ، إلى حامل مناسب Carrier ، حيث يحفظ تحت ظروف تخزين ملائمة ، لحين استعماله كلقاح للبنور ، أو التربة .

ومن أمثلة الأسمدة الحيوية ، ذات الأهمية الإقتصادية الكبيرة ، على الإنتاج الزراعى

١- اللقاحات المثبتة للنيتروجين الجوى ، ومنها

لقاحات الرايزوبيا للبقوليات ، ولقاح الأزوتوباكتر ، ولقاح الآزوسبيريلوم للنجيليات ، ولقاح الفرانكيا لغير البقوليات ، ولقاحات السيانونبكتريا والأزولا لمزارع الأرز .
يجرى منذ سنوات طويلة ، تسويق بعض هذه اللقاحات ، على نطاق تجارى ، فى بلاد عديدة .

٢- اللقاحات المعدنية للفوسفات

تلعب هذه اللقاحات ، دورا هاما فى تيسير فوسفور التربة للنبات ، ومن هذه اللقاحات

لقاح البكتريا Bacillus megatherium var. phosphaticum المذيب للفوسفات (ويسمى هذا اللقاح عادةً ، فسفوباكترين Phosphobacterin) ، ولقاح فطريات الميكوريزا ، التي تفيد الكثير من المحاصيل ، خاصة في المناطق الحارة ، التي تعاني تربتها من نقص شديد ، في محتواها من الفوسفات الميسر .

وبالإضافة إلى ماتقوم به اللقاحات السابقة ، من إغناء للتربة بالنتروجين ، أو تيسير للفوسفات ، فإنها تفرز مواداً منشطة لنمو النبات ، من اكسينات ، وفيتامينات ، ومواد شبيهه ، تساعد على إنبات البذور ، ونمو الجذور ، كما أنها تفرز الكثير من المواد المثبطة ، للفطريات المرضية .



Biogas Production

إنتاج الغاز الحيوى - البيوجاز

الغاز الحيوى ، أحد الوسائل الهامة ، الممكن استخدامها كبديل لمصادر الطاقة التقليدية ، خاصة في المناطق الريفية ، فهو يعتبر ، بالإضافة إلى الطاقة المستمدة ، من الشمس والرياح والأمواج ، من الطاقات البديلة المتجددة ، كما يعتبر الغاز الحيوى أيضاً ، أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة ، المستعملة في تدوير recycling المخلفات العضوية .

وينتج الغاز الحيوى بواسطة الميكروبات ، اثناء نشاطها وتحليلها للمواد العضوية ، من مخلفات أمية وحيوانية ونباتية . والغاز الناتج نتيجة التخمر ، هو خليط من غاز الميثان القابل للإشتعال (حوالى ٦٠%) ، وثانى أكسيد الكربون الغير قابل للإشتعال (حوالى ٤٠%) ، مع نسبة قليلة من غازات أخرى (لاتزيد عن ٥%) ، من الإيدروجين ، وكبريتور الإيدروجين ، والنتروجين ، وأول أكسيد الكربون ، وثانى أكسيد الكبريت .

يتم انتاج الغاز الحيوى ، فى وحدات خاصة (شكل ٥-١٤) ، تقام قرب أماكن توفر المخلفات العضوية . وتتكون الوحدة من هاضم Digester ، وهو الجزء الأساسى بالوحدة ، ويبنى تحت سطح الأرض ، بحجم مناسب ، وفيه توضع المخلفات ، وتتم عملية التخمر الميكروبية . وتتجمع الغازات الناتجة من الهاضم ، فى مخزن لتجميع الغازات Gas-holder ، ومن هذا المخزن ، يوجه الغاز إلى أماكن الإستعمال .



Digester and gas holder

Digester and gas holder

شكل ١٤-٥ : مقطع في الهاضم ومخزن تجميع الغازات

قد يقام مجمع الغازات ، فوق سطح الأرض ، كما فى النظام الهندى ، أو تحت سطح الأرض ، كما فى النظام الصينى .

قد تصل مدة التخمر إلى أسبوعين ، أو أكثر ، وهى تتوقف على مجموعة من العوامل ، منها طبيعة المخلفات المضافة ، ودرجة التخفيف ، والتقليب ، ومدى توفر الظروف المناسبة لنشاط الميكروبات ، من حرارة ، وتركيز إيدروجين ، وظروف لاهوائية ... الخ .

وينتج الغاز الحيوى من المخلفات العضوية ، نتيجة لتعايش ، وتتابع مجموعة كبيرة من الميكروبات ، وتبدأ خطوات التحلل الأولى ، تحت ظروف هوائية ، فتنحلل المواد العضوية المعقدة ، إلى مواد بسيطة ، مثل السكريات ، والأحماض الأمينية ، والدهون ، والجليسرول . وباستمرار التحلل ، يقل الأكسجين بالوسط تدريجياً ، وتنشط البكتريا الإختيارية ، ثم اللاهوائية ، مثل

Bacillus , Clostridium , Bacteroides , Ruminococcus ...

وتتكون أحماض عضوية قصيرة السلسلة ، مثل الفورميك ، والخليك ، والبروبيونيك ؛ وكحولات بسيطة ، مثل الإيثانول ، والميثانول ، والبروبانول ؛ وغازات ، مثل الإيدروجين ، وثانى أكسيد الكربون ، والأمونيا .

وبسيادة الظروف اللاهوائية ، تنشط البكتريا المنتجة لغاز الميثان *Methanogenic bacteria* ، كتلك التابعة لأجناس

Methanobacterium , Methanomicrobium , Methanococcus , Methanospirillum

فتحلل المركبات الوسطية السابق تكونها ، وينتج خليط من غاز الميثان وثانى أكسيد الكربون ، المعروف بالغاز الحيوى .

يستعمل الغاز الحيوى الناتج ، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية ، فى الإنارة والطهى ، والتدفئة ، وتوليد الكهرباء . ويستفاد من مخلفات التخمر الصلبه والسائلة ، كسماد عضوى للأراضى ، لأنها مخلفات غنية فى محتواها من النتروجين ، والغوسفور ، والعناصر الأخرى .

وإضافة إلى ذلك ، فإن تجميع المخلفات النباتية ، والحيوانية ، والآنمية ، وتخميرها لإنتاج البيوجاز ، يؤدي إلى رفع المستوى الصحى ، خاصة فى الأرياف . ويحدث ذلك ، نتيجة التخلص الصحى من المخلفات ، الذى يوقف انتشار الذباب والبعوض ، ويحد من التلوث الميكروبي ، ويمنع إنتشار الأمراض .

المراجع

سعد على زكى محمود ، عبد الوهاب محمد عبد الحافظ ، محمد الصاوى محمد مبارك (١٩٨٨) . ميكروبيولوجيا الأراضى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة .

References

- Alexander, M. (1977). Introduction to soil microbiology. 2nd Ed., John Wiley and Sons Inc., New York.
- Brock, T.D.; D.W. Smith and M.T. Madigan (1984). Biology of microorganisms. 4th Ed., Printice-Hall Inc., London.
- Gray, T.R.G. and D. Parkinson (eds.) (1968). The ecology of soil bacteria. Toronto Univ. Press, Toronto, Canada.
- Subba Rao, N.S. (ed.) (1982). Advances in agricultural microbiology. Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, India.