

الْمُرْشِدُ الزَّرَاعِيُّ فِي:

الحديث في تربية النحل

وَطُرُقُ مَعْرِفَةِ غِشِّ الْعَسَلِ

مهندس
محمد أحمد الحسيني

مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير

٧٦ شارع محمد فريد - جامع الفتح - مصر الجديدة - القاهرة ت : ٦٣٧٩٨٦٣ - ٦٣٨٩٣٧٢ فاكس : ٦٣٨٠٤٨٣

IBN SINA BOOKSHOP Printing - Publishing - Distributing - Exporting

76 Mohamed Farid St., Heliopolis, Cairo Tel. : (202) 6379863 - 6389372 - Fax : (202) 6380483

اسم الكتاب : الحديث فى تربية النحل وطرق معرفة غش العسل
اسم المؤلف : م. محمد الحسنى
اسم الناشر : مكتبة ابن سينا
تصميم الغلاف : إبراهيم محمد إبراهيم
رقم الإيداع : ٢٠٠٣ / ١٠٥٩٧
الترقيم الدولى : 977-271-633-X

جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو اقتباس أى جزء من الكتاب أو تخزينه بأية وسيلة ميكانيكية أو إلكترونية بدون إذن كتابى سابق من الناشر.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission of the publisher.

تطلب جميع مطبوعاتنا بالملكة العربية السعودية من وكيلنا الوحيد مكتبة الساعى للنشر والتوزيع

الرياض - هاتف : ٤٣٥٣٧٦٨ - ٤٣٥١٩٦٦ فاكس ٤٣٥٥٩٤٥ جلة هاتف : ٦٥٣٢٠٨٩ - ٦٥٢٤٠٩٥ فاكس : ٦٥٢٤١٨٩

طبع بمطابع ابن سينا القاهرة ت : ٣٢٠٩٧٢٨

Web site : www.ibnsina-eg.com E-mail : info@ibnsina-eg.com

مقدمة



تعتبر تربية النحل من المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية ، إذا تم استغلال هذه الحشرة استغلالا اقتصاديا ، وألم المربى بكل جوانب التربية والمحافظة على الطائفة من الأمراض والآفات الفتاكة.

بل اعتبرت عملية النّحالة من العمليات الفنية الدقيقة والتي لا يجوز ارتجالها ، فلها أصول وقواعد يجب الإلمام بها جيداً مع الاستمتاع بممارستها حتى لا تصاب بالملل والتقصير فى عمليات النحالة مما يؤدي إلى تدهور المنحل ..

ويعتبر مناخ مصر وتعدد أنواع ومواسم الزراعة بها من أصلح مناطق العالم لتربية النحل .. والاستفادة منه سواء فى زيادة غلة محاصيل الحقل والخُضر والفاكهة ، فهى من أفضل الحشرات الملقّحة أو للاستفادة مما ينتجة المنحل من محصول العسل والشمع والطرود وملكات النحل وغيرها من منتجات المنحل ..

وقد اهتمت وزارة الزراعة بالمناحل وأعطتها اهتمامها عن طريق أقسام بحوث النحل بالدقى والمحافظات لتلقى أى شكاوى أو فحص أى إصابات بالأمراض وصرف العلاج اللازم لها .. وأوصت بعدم إدخال ملكات النحل من الخارج حفاظاً على الثروة النحلية فى مصر لمنع انتشار الأمراض المنتشرة فى الخارج ، مثل مرض

الأكارين وأمراض الحضنة والتي تسبب خسائر كبيرة فى الخارج، حيث إنها من الأمراض المعدية ، كما خصصت الوزارة بقسم الإرشاد الزراعى وظيفه "رئيس قسم نشاط النحل " فى كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون مهمته الأولى الإشراف على المناحل فى كل إدارة يتولى متابعتها إرشادياً للوصول مع المربين لأفضل النتائج، ويتولى إرشاد المربين الجُدد إلى طرق الحصول على الأدوات اللازمة والخلايا والطرود والملكات . كما يمكن تأخير بعض الأدوات مثل الفراز والمنضج بأسعار رمزية .

ومن خلال هذه النشرة نصاحبك فى رحلة شائقة خطوة بخطوة حتى تصبح من منتجى العسل وتستطيع التحكم فيما يدور داخل الخلية وسهولة القيام .. بعمليات التربية المختلفة طوال شهور العام.. ولكى تحصل على إنتاجها من أجل الغذاء والشفاء والصحة بعد أن دخل هذه المهنة بعض المنتجين للعسل غير الطبيعى والذي جعل المستهلك العادى يحجم عن شراء العسل من السوق دون الرجوع إلى مصدره ..

ويمكن اعتبارها صناعة زراعية لا تحتاج لرأس مال كبير وفى نفس الوقت تدر ربحاً مستمراً يعود على المربى بأعظم الفوائد

والله ولى التوفيق ”

محمد أحمد الحسينى

شروط نجاح وإنشاء منحل



● الاستعداد الشغوى والرغبة فى العمل داخل المنحل مما يحفز العامل أو الإدارى بالمنحل على تتبع النحل وسلوكه ويقوم على خدمته ورعايته فى أوقاته لنجاح المنحل ..

● يجب الإلمام بالمعلومات الكافية عن هذه المهنة وعن طباع وسلوك النحل وأنواع النباتات المنتشرة حولك ، والتى سيتولى النحل جمع رحيق أزهارها وحبوب اللقاح منها .. واكتساب الخبرة اللازمة عن طريق الاطلاع على الكتب والمجلات عن النحل مع حضور تمرين عملى لمدة كافية فى أحد المناحل القريبة منك وخاصة فى موسم نشاط النحل لتقوم بعمليات الفحص الدورية ، ويمكن الاستعانة بقسم بحوث النحل بوزارة الزراعة أو مفتشى إرشاد النحل بالإدارات الزراعية ..

● البداية لابد أن تكون بعدد محدود من الخلايا بحيث لا تزيد عن 4-6 خلايا بطوائفها وخاصة فى العام الأول لاكتساب الخبرة اللازمة ولدراسة المنطقة ويمكن التوسع تدريجياً .. إلا إذا استعنت بأحد الفنيين له خبرة فى إنشاء المناحل . أو الاستعانة بنحال أمين يتم إشراكه معك بجزء من الإنتاج مقابل رعاية للمنحل ..

● اختيار المكان أو المنطقة التى سيقوم عليها المنحل يتوقف عليها نجاح المنحل فيجب أن تتوافر النباتات المزهرة حول المكان وبالمساحة المناسبة لعدد الخلايا وكلما كانت المحاصيل به متعاقبة طول الموسم كان ذلك أفضل لإنتاج المنحل المستمر مثل الموالح . والبرسيم . القطن ..

كما أن قرب مصادر الرحيق وحبوب اللقاح من المنحل يساعد النحل فى سرعة الجمع وتوفير الجهد فى الطيران لمسافة طويلة تكون على حساب عمر الشغالة وإنتاجها ..

وفى حالة عدم توافر مكان دائم للمنحل يتوافر مصدر غذائى دائم طوال العام وخلال فصول السنه المختلفه .


وقد ينقل المنحل لعدة أماكن خلال السنة حتى يظل النحل مشغولاً بشكل دائم فى جمع الغذاء وتوفير العسل المخزون ..

● الابتعاد بقدر الإمكان عن وسائل الإزعاج ، فالنحل يميل للعمل فى هدوء وأى إزعاج يؤثر فى المحصول ..

● يفضل ابتعاد الموقع عن مباحل الآخرين وخاصة فى المباحل التجارية الكبيرة تفادياً لظاهرة السرقة .

● وضع الخلايا تحت أشجار متساقطة الأوراق شتاء لإمدادها بالشمس شتاء والظل صيفاً أو حمايتها بعمل مظلات تحميها حرارة الصيف والمطر شتاء .

● توضع الخلايا بحيث تكون واجهتها باتجاه الجهة الشرقية أو الجنوبية ليتمكنها الحصول على كمية كافية من حرارة الشمس فى الصباح الباكر ويكون عليها الظل فى الأوقات الحارة ..



مساكن النحل



قال الله سبحانه وتعالى ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل : ٦٨ - ٦٩] .




ومن الآيات الكريمة عرفنا وعرف النحل بيوته ومسكنه في الطبيعة من قديم الزمان ، حيث كانت تسكن جحور الجبال وجذوع الأشجار المجوفة وعلى فروع الأشجار والشجيرات ، وما زال النحل حتى يومنا هذا رغم تدخل الإنسان في طريقة معيشه مازال يسكن هذه الأماكن في الكثير من مناطق العالم بل ويخرج منها عسلاً من أكثر أنواع العسل شهرة ، والذي يعتبر ذا قيمة طبية ومازال في مصر كثير من النحالين يستخدمون خلايا أنبوبية من الطين والقش أو التبن المتخمّر وهي طويلة (١٣٠ سم) وقطرها ٢٠ سم وترمى هذه الخلايا الطينية بعضها فوق بعض في شكل هرمي مع عمل قرصين للأجناب وفي أحدهما فتحة للدخول والخروج ، ويبنى النحل الأقراص المستديرة داخل هذه الأسطوانات .. وهذا النوع من الأقراص لا يحتاج إلى رعاية مستمرة وفحص دائم كالخلايا الخشبية ..

وللحصول على عسلها . تعصر الأقراص لإخراج العسل منها غير أنها تعطى إنتاجاً أقل من الخلايا الخشبية .

الخلايا الخشبية :

تعتمد الخلايا الحديثة في بنائها على أساس المسافة النحلية ، وهى المسافة التى تترك حول الأقراص بحيث تسمح للنحل بالمرور والعمل بينهما ، وإذا قلت المسافة النحلية بين الإطارات فإن النحل يملؤها بمادة البروبلس بما لا يتيح للنحل تحريكها ، وعند دفع الإطارات لفحصها يسحق النحل الموجود بينهما ، أما إذا زادت المسافة النحلية $\frac{5}{16}$ من البوصة وخاصة بين قمة الإطارات والغطاء الداخلى فإن النحل يبني أقراصاً شمعية غير منتظمة بين الأقراص يصعب إخراجها عند الفحص ..

والخلايا الخشبية تتميز بالآتى :



- إجراء عمليات النحالة بسهولة .

- استخدام الأساس الشمعى مما يوفر على النحل مجهوداً كبيراً فى إعدادة .

- زيادة الإنتاج ، حيث يصل إلى حوالى ٢٠ كجم فى الخلية الواحدة .

- جودة العسل الناتج

ونظافته لسهولة نظافة الخلايا وعلاج الأمراض التى تصيب الخلية ..

أجزاء الخلية :

تصنع أجزاء الخلية من الخشب السويدى أو "اللتزانة" الذى يتحمل الظروف الجوية المختلفة ولا تدهن أجزاؤها الداخلية بأى دهانات زيتية ، ويمكن دهانها

من الخارج بالألوان الزيتية التي تعكس أشعة الشمس ولا تمتص الحرارة مثل اللون الرمادي أو الفضي ..

١- حامل الخلية (كرسي) :

وتتكون من أربعة أرجل بارتفاع ٢٠-٢٥ سم على مقدمة الحامل يثبت لوحة مائلة من الخشب تسمى لوحة الطيران لسهولة حركة النحل في الدخول والخروج .

٢- قاعدة الخلية (الطليية) :

لوحة من الخشب لوضعها فوق حامل الخلية ، ولها ارتفاعان أحدهما أكبر لفصل الصيف ، والآخر أصغر لفصل الشتاء ، وللحصول على الارتفاع المطلوب تقلب الطبلية .. ليظهر ارتفاع الحاجر المطلوب ومهمتها استقبال مخلفات الخلية.

٣- صندوق التربية :

وهو صندوق مفرغ ليس له قاعدة ولا سقف يوجد على قمته العليا إفريزان
يعلق عليهما الاطارات أو البراويز ويوضع فوق قاعدة الخلية .

وقد يسمى صندوق الحضنة مقاساته الداخلية $٤٨,٥٨ \times ٢٧,٢ \times ٢٤,٢٧$ سم ويتسع إلى ١٠ إطارات .

٤- صندوق العسل (العسلية) :

وهو صندوق يشبه صندوق التربة والذي يستخدم في تخزين العسل بأقراص ويسع ١٠ إطارات وقد تستخدم صناديق (عمق ١٢,٢ سم) أقل ارتفاعاً وبها أقراص شمعية قصيرة تستخدم لإنتاج العسل بسرعة لقلّة سطحها وتضاف في موسم الفيض أكثر من عاسلة واحدة وقد تستخدم للتهوية صيفاً .

٥- غطاء الخلية الداخلي :

وهو لوح من الخشب مساو لمساحة صندوق التربية وبه من المنتصف فتحة (٢×١٠ سم) يوضع عليها صارفُ النحل عند بداية تخزين العسل وتستخدم أيضاً في وضع الفذايات والتهوية .. واللوح له إطار خشبي مرتفع لتحديد المسافة النحلية اللازمة عن سطح الاطارات ..

٦- غطاء الخلية الخارجي :


وهو غطاء من الخشب يغطي الخلية بحيث تسقط أجنابه على جانبي صندوق

التربة أو العاسلة ويقطى من أعلى بغطاء من الزنك أو الصاج لحماية الخلية من الأمطار والشمس ، ولة ثقبان للتهوية .. ويمكن الاستغناء عن الغطاء الداخلى ويكتفى بالغطاء الخارجى ..


٧- باب الخلية ،

عبارة عن قطعة من الخشب بها فتحتان إحداهما واسعة ٩,٥ - ١١,٥ سم والثانية تستعمل شتاء بطول ٢,٥ - ٣ سم .

٨- الإطارات :



والإطارات عبارة عن براويز مستطيلة الشكل تستخدم لتثبيت الأساسات الشمعية داخل هذه البراويز والتي يستخدمها النحل لوضع البيض وتخزين العسل ..



أدوات المنحل



• أدوات الفحص :



واستخدام تلك الأدوات فى إدارة المنحل مهمة جداً للسيطرة على النحل وتوفير العناية اللازمة له حتى يمكن تحقيق المنفعة التى من أجلها تم إنشاء المنحل .

١- بدلة أو أفرول النحال :


وهى من القطن ، حيث إن الصوف يزيد ميل النحل للّسع وتكون من قطعة واحدة ومحكمة القفل من الأكمام والأرجل ويستخدم لها أربطة مع ارتداء حذاء طويل لحماية القدم ..

٢- قناع الوجه :

ويتكون من سلك شبكى أمام الوجه ونسيج قطنى ويكون طويلاً بحيث يغطى الرأس وأطرافه تغطى الرقبة وحتى الكتف ويتصل القناع بالبدلة عن طريق الأربطة .



قناع فوق الأفرول ويتصل بالبدلة عن طريق الأربطة



الدواسة

قناع من السلك الشبكى والقماش شبكى من القطن

٣- المدخن :

والمدخن عبارة عن أسطوانة من الصاج وغطاؤها مخروطية ويتصل بها منفاخ من الجلد ويتم استخدامه بوضع أى مواد مثل قوالح الذرة أو القماش أو الخيش فى الأسطوانة الصاج مع إشعالها ، وعند استخدام المنفاخ فيندفع الهواء على الأسطوانة فيخرج الدخان من الفوهة - ويستخدم المدخن فى وضع رأسى حتى يظل مشتعلاً فترة طويلة - وعندما يقابل النحل الدخان يحس بأن هناك خطراً من حوله فيمأل حوصلته بالعسل فيثقل وزنه وتقل حركته ، ويفقد الميل للسمع - إلا فى حالة زيادة التدخين مما يثيره .

٤- العتلة :

قطعة حديد تستخدم فى فصل أدوار الخلية وفصل الأقراص بعضها عن بعض وتنظيف قمة الإطارات وقاعدة الخلية .

٥- القفاز :

يصنع القفاز من قماش قطنى سميك وله أكمام طويلة وقد يصنع أحياناً من الجلد الخفيف والأكمام من القطن وهو مهم للنحال المبتدئ ويتم التخلص منه تدريجياً لأنه يعيق العمل ..

٦- فرشاة النحل :

وتصنع فرشاة النحل من شعر ناعم ، وتستخدم لإبعاد النحل عن الأقراص الشمعية التى تحتوى على العسل أو الحضنة ، وخاصة فى موسم قطف العسل ويجب نظافتها باستمرار عند استعمالها ..

• أدوات تثبيت شمع الأساس :

يستخدم سلك رفيع مجلفن (نمرة ٢٤) لتسليك الإطارات الفارغة لتثبيت الأساسات الشمعية عليها .. باستخدام الأدوات الآتية :

١- عجلة التثبيت (الدواسة) :

وتتركب من يد خشبية بنهايتها عجلة معدنية مسننة الحواف ، والتسنين مزدوج ، بينهما تجويف يستقر فيه السلك .. ويتم تسخين الدواسة قبل الاستعمال فى حمام مائى .

٢- لوحة التثبيت :

وهى قطعة من الخشب مقاسها ٨×١٧ بوصة (حجمها مساو لحجم الإطار من الداخل) وتغطى بقطعة من القماش تبلل عند الاستعمال حتى لا يلتصق الشمع بها أثناء عملية التثبيت .

٣- إبريق الشمع :

يستخدم فى صهر الشمع المستخدم فى تدعيم شمع الأساس عن طريق تسخينه بنظام الحمام المائى ، حيث يحتوى الإبريق على جدارين يوضع الشمع بداخل الإبريق والماء بين الجدارين .

٤- أساسات شمعية :

وهى عبارة عن أفخر تصنع من شمع النحل النقى وتستعمل لتوفير الجهد الذى يبذله النحل فى بناء الشمع وحتى يتفرغ لجمع الرحيق ومطبوع على اللوح من جهتيه قواعد وبداية جدران العيون السداسية لبيوت الشفالات ويتولى النحل بعد ذلك استكمالها لتكوين العيون السداسية ..



ويباع الشمع فى علب من الكرتون زنة العلبة ٢ ك ..

ملحوظة : الأساسات الشمعية التى تستخدم لابد من شرائها من مصدر موثوق به حتى يكون شمع الأساس من الشمع النقى الذى يقبل عليه النحل ولا يعمل على تفتيته أو بناء شمع جديد بدلا منه ..

تثبيت شمع الأساس



يُثبت السلك في الإطار أولاً عن طريق الثقوب في جوانب الإطار كما في الشكل التالي .. ويتم إدخال شمع العسل الأساس في الأخدود الطولي الموجود في الضلع العلوي للإطار ويثبت فوق لوحة التثبيت بعد أن تبلل القماش بحيث تكون الأسلاك إلى أعلى وتسخن الدواسة في الماء الساخن وتمرر على السلك حتى يغوص إلى منتصف الأساس الشمعي ويوقف التسخين حتى يتصلب الشمع مرة أخرى . ويقلب الإطار على قمته ويوضع شمع منصهر في الفراغ بين الشمع والأخدود حتى يتصلب حوله .



خطوات استخدام شمع أساس مقوى بأسلاك وتثبيت داخل الأفيز

شراء النحل واسكانه



قبل شراء النحل بوقت كافٍ لابد أن تكون قد درست المنطقة التي حولك وتعرفت على مجموعة النحالين والهواة في المنطقة بتبادل المعلومات والأدوات باستمرار واكتساب الخبرة .. وأثناء هذا التعارف مع هؤلاء المنتجين اطلب شراء نواة من النحل على أن تصلك في نهاية شهر مارس أو بداية إبريل على الأكثر .. وهناك حالتان لكل مبتدئ .

● في حالة وجودك في المناطق المنعزلة والمخصصة لتربية النحل الكرتيولي مثل المنزل - دمياط وبرج العرب والوادي الجديد - يستدعى شراء نويات نقية حتى لا يحدث خلط ..


● في حالة ما إذا كانت منطقة النحل بعيدة عن هذه المناطق فيمكنك شراء النحل الهجين ، فثمنه أرخص وإنتاجه عالٍ ويصلح في حالة البداية ويمكن في السنة التالية أو بعد نجاح المشروع في الفترة الأولى شراء بعض الملكات النقية وإدخالها على نويات ناتجة من منحلّك حتى يمكن تحسين السلالة باستمرار وإذا لم تتمكن من شراء ملكات نقية يمكنك شراء ملكات هجين أول .. وتصلك النويات بحيث تحتوى كل نواة على خمسة أقراص مغطاة بالنحل منها ٢ أقراص حضنة والباقي تحتوى على عسل وحبوب لقاح .

- ويصل النحل في عدة صور ، منها :

١- النواة وصندوق السفر ..

وعادة ما يحتوى صندوق السفر على طرد النحل أو النواة ، وعند وصوله يوضع على قاعدة الخلية في المنحل المستديم ولا يفتح إلا عند الغروب حتى يتمكن النحل من الخروج عند فتح باب الخروج .. ليعتمد على المكان .. وبعد حوالى ٢٤ ساعة يمكنك فتح الغطاء المثبت بالمسامير ونقل الأقراص إلى صندوق الخلية مع التأكد من وجود الملكة ويراعى وضع أقراص الحضنة في الوسط وأقراص العسل وحبوب

اللقاح على الجانبين وبعد نقل الأقراص إلى الخلية الجديدة يهذ صندوق السفر فوق الخلية لنقل ما تبقى من نحل داخل الصندوق ويضاف "يرواز" به أساس شمعى بين الحضنة والعسل على جانبين وتغذى الخلية بالمحاليل السكرية.



صندوق السفر

٢- شراء خلايا جاهزة بطوائف النحل .


وتعتبر هذه الطريقة أقل تكلفة من الشراء خلايا جديدة وإسكانها بالنويات أو الطوائف وتعتبر بداية لمنحل جديد حسب قوة هذه الخلايا ..

٣- شراء النحل المرزوم وإسكانه .

ويباع النحل المرزوم بالوزن وهو أقل تكلفة ويحتوى

الطرد على عدة شغالات ومعها ملكة ملحقمة والغذاء اللازم له .

طائفة النحل



الذكور ٥٨

الملكة ٤٣

الشغالة ٥٤

يعيش نحل العسل فى مجاميع تسمى كل منها بالطائفة وتتكون أفراد هذه الطائفة من :

● الملكة :

ووظيفتها فى الخلية وضع البيض بعد إخصابها من الذكر حيث تضع فى اليوم الواحد حوالى ١٨٠٠ بيضة .. وتختلف الكمية حسب الغذاء ووفرة وإعتدال الجو ، ونوع السلالة وجودتها . وكل خلية بها ملكة واحدة تنتج الشفالات والذكور والملكات .. وتحول البيضة إلى ذكر بعد حوالى ١٥ يوماً

● الذكور :

وهذه تنتج من بيض غير مخصب وتحول البيضة إلى ذكر بعد حوالى ٢٤ يوماً ويوجد منها عدد قليل لتلقيح الملكات العذراء فقط .

● الشفالات :

وتنتج من بيض مخصب حيث تستغرق تحول البيضة إلى شفالة بعد ٢١ يوماً ويوجد بالطائفة عدة آلاف حيث تقوم الشفالة بجميع أعمال الطائفة الداخلية مثل تغذية الملكة واليرقات وإفراز الشمع والنظافة والحراسة .. والأعمال الخارجية ، مثل جمع الرحيق وحبوب اللقاح والماء والبروبلس .

● الأمهات الكاذبة :


عند فقد الملكة ولعدم وجود بيض ملقح أو يرقات صغيرة (أقل من ٣ أيام) والتي يمكن استبدال ملكة جديدة منها ، ونظراً لأن الشفالات قد حرقت من الحضنة التي تغذيها بالغذاء الملكى الذى تنتجه الغدد البلعومية فإنها تتناول هذا الغذاء الملكى مما يؤثر على المبايض ويجعلها تنمو نمواً غير طبيعى ، ونتيجة لهذا الخلل تقوم الشفالات بوضع بيض فى داخل الميون السداسية ولكن هذا البيض يختلف عن بيض الملكات فى الآتى :

١- بيض غير ملقح ينتج ذكوراً فقط صغيرة ولها قابلية للتزاوج .


٢- عدم انتظام البيض داخل الميون ووجود أكثر من بيض داخل أو خارج الميون .

٣- انتشار الحضنة بدون نظام .

وتختلف شغالات النحل فى ميلها للقيام بوضع البيض وتحولها إلى أمهات كاذبة حسب السلالة ، فبعضها يميل بشدة إلى هذه العادة مثل النحل المصرى والسورى .



إطار ملكة جيدة



خلايا ذكور كثيرة ذات أغطية محدبة بارزة ومنتشرة بدون نظام مقارنة بين إطارين الأول للملكة جيدة ، والثانى للأمهات الكاذبة .

التخلص من الأمهات الكاذبة ..

يجب التخلص من الأمهات الكاذبة قبل إدخال الملكة الجديدة ، حيث تقوم بقتل أى ملكة جديدة . ويمكن ضم هذه الطائفة إلى طائفة أخرى قوية بعد أن يتخلص نحل الطائفة القوية من الأمهات الكاذبة ويمكن بعد ذلك إعادة تقسيمها .

اختيار وقت الفحص يجب أن يكون في الأوقات المشمسة ذات الجو المعتدل الخالية من الرياح والأمطار أو الحرارة الشديدة وهي الأوقات التي تثير النحل .. ويتم فحص الطوائف خلال موسم الفيض ونشاط النحل على فترات متقاربة كل ١٠ أيام على الأكثر ..

بينما تتباعد تلك المدة خلال الشتاء فتصبح من ٢٠ - ٣٠ يوماً .

يتم إعداد المدخن بحيث يعطى دخاناً فقط بدون أى لهب أو يخرج منه صوت ، ويتم ارتداء أدوات الفحص كاملة فى أول زيارة لك ، وتقف بجانب الخلية وبمعيداً عن بابها حتى لا تعيق دخول وخروج النحل السارح فتسبب له الهياج . ويجب أن تكون هادئ الطبع خفيف الحركة أثناء الفحص ، حيث إن أى حركة عصبية .. تسبب صدمة .. تسبب هياج النحل .. كما يجب أن يكون التدخين برفق لأن التدخين الشديد أو السريع يعمل على هياج النحل .. واتباع الخطوات التالية عند فحص الخلية .

● التدخين يبدأ عند مدخل الخلية ثم بعد رفع الفطاء الخارجى يستمر التدخين على النحل .



● تفصل الأقراص بعضها عن بعض بواسطة العتلة .

● يبدأ النحال برفع أحد الأقراص الجانبية ثم يستمر في فحص باقي الأقراص واحداً واحداً ولا داعي للبحث عن ملكة كل مرة ، بل يكفي برؤية البيض للتأكد من وجودها ..

● يتم فحص الأقراص فوق صندوق الخلية خوفاً من سقوط الملكة وفقدانها بأرضية المنحل ..

● استمرار التخلص من بيوت الملكات التي قد توجد على الأقراص والتي يزوايا الأقراص .

● إجراء عملية الفحص بسرعة ودقة .



طريقة فحص الإطار بحيث يكون عمودياً طوال الوقت .

• الفرض من الفحص :

- التأكد من وجود الملكة وسلامتها من الأمراض وسلامة أعضائها ويمكن التأكد من وجودها برؤية البيض .

٢- التأكد من وجود الغذاء الكافى للطائفة من العسل وحبوب اللقاح مع إعادة ترتيب الأقراص بحيث توضع أقراص العسل وحبوب اللقاح على جانبى أقراص الحضنة والتي يكون موضعها الوسط .

٣- إعدام بيوت الملكات المتكونة وإعدامها لمنع الطائفة من التطريد وإحلال الملكات .. وكذلك الأمهات الكاذبة حضنة الذكور غير المرغوب فيها .

٤- التأكد من عدم وجود أى مظاهر مرضية بالخلية على أفراد الطائفة .

٥- إضافة أقراص فارغة عند حاجة الطائفة لوضع البيض وتضاف بين الحضنة والعسل .

٦- إضافة أدوار عليا عند امتلاء الأدوار السفلى يرفع ٤ أقراص بحضنتها ونحلها للدور الجديد ويوضع بدلاً منها أقراص فارغة ..

٧- إجراء عمليات الفرز أو التشتية أو التهوية ..

التغذية



يحتاج المربى إلى تغذية النحل تغذية صناعية وخاصة فى الأوقات التى فيها الرحيق وحبوب اللقاح حول الخلية أو لزيادة انخفاض درجة الحرارة ، ولا يتمكن النحل من مغادرة الخلية .. وتختلف طرق التغذية من موسم لآخر ومن منطقة لأخرى ومن بلد لآخر .

وللتغذية غرضان :

١- تشجيع الملكات على وضع البيض .

٢- عدم هلاك الطائفة من الجوع .

ويمكن الاستدلال على مدى حاجة الخلية ، للتغذية ، حيث تشاهد قلة العسل وحبوب اللقاح المخزونة فى الأقراص وعند دفع الخلية من الخلف يلاحظ أن وزنها أقل . أو وجود ذكور النحل التى تخلصت منها الشفالات ملقاة خارج الخلية وتوقف الملكة عن وضع البيض .

■ التغذية ببديل حبوب اللقاح .


حبوب اللقاح غذاء بروتينى مهم للنحل فى بناء جسمه ولتحفيز الملكة على إنتاج البيض ، ولذلك تستخدم مصائد حبوب اللقاح والتي توضع أمام مدخل الخلية فى موسم توافر حبوب اللقاح وتجمع حبوب اللقاح وتجفف وتخزن بعد إضافة ١ كجم سكر لكل ٢ كجم من حبوب اللقاح لحين الاستعمال ، حيث يخلط بالماء الدافئ لتفكيك حبيباتها .. وتوضع فى العيون السداسية وقد يضاف إليها بعض المكونات ، مثل :

اجزاء حبوب لقاح مطحونة + ٢ جزء من مسحوق فول الصويا + ٢ جزء محلول سكرى (١ : ١) وتخلط هذه الكميات ويؤخذ منها طبقة رقمية توضع فوق قمة الإطارات .

■ التغذية بالكاندى .

وهو عبارة عن محلول سكرى مركز جداً يخلط بسكر البودرة حتى يتشبع جداً، ويصبح المحلول لزج القوام ، ويمكن تشكيله إلى أجزاء صغيرة (٤ جزء سكر + ١ جزء ماء) على شكل أقراص توضع فوق قمة الأقراص .. وخاصة فى الشتاء .

غذاية بطيئة



غذاية دومي من الخشب المعاكس وتوضع مع الإطارات

التشتية



وهى عبارة عن إعداد النحل وتهيئته لقضاء فصل الشتاء بنجاح . والإقبال على فصل الربيع بقوة ونشاط .

- وبقدر ما يبذل من جهد فى فصل الشتاء .. بقدر ما نحصل على طوائف ممتازة فى أوائل الربيع .

وتتلخص أعمال التشتية فى التالى :

١- يجب توافر الغذاء من العسل الناضج وحبوب اللقاح ، فإن لم يوجد فى الخلية ما يكفى النحل من الغذاء فيستعار لها من خلية أخرى قوية بها فائض عن حاجتها وإن لم يتسن ذلك فيفذى النحل بالمحلول السكرى فى أواخر الخريف وقبل حلول فصل الشتاء .

٢- ينصح بضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات ، لأنه كلما احتوت الخلية على عدد كبير من الشفالات صغيرة السن أمكنها رفع درجة الحرارة داخل الخلية ، وبالتالي نجاح التشتية ..

٣- ترفع الأقراص الفارغة وكذلك الأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل وتخزن الأقراص داخل صناديق بعد تبخيرها بفاز ثانى أكسيد الكبريت الناتج من حرق "الكبريت العمود" ويمكن تكرارها من ٢ - ٣ مرات بينها ١٠ أيام ، أو استعمال مادة البارادكس مع وضعها أعلى الأقراص التى يتم حفظها داخل صناديق الخلايا ..

٤- ترتيب الأقراص داخل الخلية بحيث تكون الحضنة فى الوسط والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين مع وضع الحاجز الرأسى إذا قل عدد الأقراص عن عشرة .. ثم تغطى الأقراص من أعلى بقطعة من القماش الكهنة أو الخيش التنظيف .

٥- تعدل وضع القاعدة (الطبلية) على الارتفاع الشئوى وكذلك باب الخلية يعدل على الفتحة الضيقة .

٦- يجب أن يقلل من فتح الخلايا بقدر الإمكان على أن يجرى الفحص فى الأيام المشمسة القليلة الرياح ويكتفى بالاطمئنان على وجود الملكة وكمية الغذاء ليكون الفحص سريعاً ويجب أن ننظف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى الديدان الشمع إن وجدت .

السرققة



السرققة من الصفات السيئة التى قد تنتشر بين النحل ، حيث يهاجم النحل من طائفة ما طائفة أخرى لسرققة ما بها من عسل مما يؤدي إلى هلاك عدد كبير من الخلايا وإضعافها نتيجة للقتال بين الطائفتين .. وتختلف السلالات فى ميلها لهذه الصفة ، ولذلك يميل المربي دائما للابتعاد عن تربية تلك السلالات، مثل النحل الطليانى .

● أسباب السرققة :

- ترك الخلايا مكشوفة لمدة طويلة أثناء الفحص أو عدم إحكام غلقها .
- اختلاف فى قوة الطوائف بالمنحل .
- تغذية النحل خلال النهار وترك الفذايات بالمحلول السكرى لمدة طويلة .

● علامات السرققة :


- مشاهدة اشتباك النحل السارق مع نحل الخلية أمام لوحة الطيران .
- تشابك مجموعات من النحل السارق على هيئة عناقيد عند الفتحات، ويطير خارجًا من الخلية على شكل قوس لامتلأة بكمية من العسل المسروق .
- مشاهدة كميات كبيرة من فتات الشمع فى قاع الخلايا المسروقة نتيجة قرصه .

● الوقاية من السرققة :

- التوازن بين الطوائف وتوفير الغذاء عند قلة مصادر الرحيق .
- تضيق مداخل الخلية بعد موسم الفيض ليتمكن النحل الحارس من حمايتها .
- إحكام غلق الخلية .

■ عند حدوث سرقة للخلية فتغلق مداخلها ويرش النحل السارق بمحلول ملحي يخفف مع تغطية لوحة الطيران بخرقه مبللة بـفنيك مخفف لطرد النحل، وفى حالة استمرار قدوم النحل للخلية تنقل من مكانها مع تغطيتها ويوضح مكانها خلية أخرى بها إناء به عسل .

وتفتح الخلية المنقولة تدريجياً فى اليوم التالى بعد سدها بالحشائش الخضراء .



يصاب النحل من كثير
من الأعداء الذين
يحيطون بالطوائف
فتصيب النحل أو أطواره
المختلفة من الحضنة
واليرقات أو العسل أو
الشمع ..


قرص مصاب بدودة الشمع

١- دودة الشمع..

فراشة دودة الشمع حشرة ليلية لا تظهر إلا في المناحل المهملة ، حيث تدخل الطوائف الضعيفة وتضع بيضها على الأقراص غير المغطاة بالنحل ثم يفقس البيض وتخرج اليرقات وتتغذى على الشمع فتعمل أنفاقا قرب قاع العيون السداسية وتغطي الأنفاق بخيوط حريرية لحمايتها من النحل ، وهذه الخيوط تعطل حركات النحل وعند زيادة الإصابة بهجر النحل الخلية ..

• الوقاية :

- الطوائف قوية وأجزاء الخلية محكمة .
- تنظيف الخلايا أثناء الفحص من اليرقات والعدارى وبقايا الشمع .
- ضم الطوائف الضعيفة .
- عدم إلغاء قطع الشمع على أرضية المنحل .
- رفع الأقراص الفارغة من الخلية وتبخيرها وحفظها باستعمال مادة البارادكس .
- إعدام الأقراص القديمة كلما أمكن ذلك ؛ لأن الحشرة تفضلها عن غيرها عند وضع البيض .



دبور البلع

٢- "دبور" البلع الأحمر..

من أخطر الآفات فى مصر لازدياد نشاطه بين الطوائف خلال شهر أكتوير وهو الوقت الذى تصل فيه الطائفة إلى أقصى قوتها، ولكن نظراً لأن هذه الفترة يقل فيها وضع البيض مما يؤدي إلى عدم إمكان تعويض الفاقد من النحل وتهاجم الدبابير النحل فى

غدوه ورواحه للخلية أو على مداخلها فتقتصم أعدادا كبيرة من النحل وقد يقتصم الملكات أثناء طيرانها للتخليق وقد يهاجم الخلايا الضعيفة .. ويحاول الدخول للخلية .

وتعيش حشرة الدبور معيشة اجتماعية مشابهة لحياة النحل ، حيث تقوم الملكة ببناء أعشاشها فى بداية فصل الربيع بين الشقوق وجسور الترع وتصنعها من الطين والأوراق المضغوطة واللعب وتظهر العشوش بكثرة فى شهر يوليو حتى تظهر العيون السداسية مشابهة لأقراص النحل غير أنها فى اتجاه واحد لأسفل من القرص وتخرج الحشرة الكاملة بعد حوالى ٣٠-٤٠ يوماً من وضع البيض ويخرج من البيض كمية كبيرة من الشغالات التى تقوم بدورها فى اصطياد النحل ..

مقاومة الدبور:

- مراقبة الملكات التي تظهر خلال شهرى مارس وإبريل واصطيادها وقتلها مما يقلل من عدد الطوائف ..
- تقوية الطوائف بالمنحل حتى يمكنها مقاومة الدبور .
- البحث عن أعشاش الدبابير حول المنحل ، ثم رشها قبيل المغرب ، ورشها بأى مبيد أو حرق أصابع كبريت داخل العش .
- استعمال مصائد الدبابير حتى تساعد فى تخفيف الهجوم على الخلية .

٣- قمل النحل ..

وهو عبارة عن طفيل خارجى يوجد غالباً على الملكة والنحل صغير السن، وهذا الطفيل يضايق النحل فى عمله ويستهلك غذاءه وتزداد الإصابة فى فصل الشتاء وخلال فترة الركود وخمول الشغالة ..

الوقاية :

تقوية طوائف النحل - العناية بنظافة الخلايا - تدخين الطوائف المصابة بالطباق أو التبغ .

٤- الوروار (أكل النحل) :

وهو طائر يسبب خسارة كبيرة للمناحل ويوجد منه أنواع كثيرة أخطرها على النحل النوع الأوربى الذى يأتى إلى مصر مهاجراً فى رحلتى الربيع والخريف، وتظهر فى أسراب ، حيث يلتهم السارح بشراهة عجيبة مما يسبب خسائر كبيرة فى أفراد الشغالة ويمكن إبعاد هذه الطيور أو تخويفها بإحداث أصوات عالية كالأعيرة النارية أو الخبط على الصفائح ..

٥- النمل ..

يعيش النمل معيشة اجتماعية فى أعشاش كثيرة تحت الأرض ويتسلق للخلايا عن طريق أرجله حتى يصل إلى الخلايا وخاصة الضعيفة فيسبب لها أضراراً بإتلاف الأساسات الشمعية ويفتك بالحضنة ويتغذى على العسل .

المقاومة :

- النظافة حول الخلايا .
- وضع أرجل الخلايا فى أوانٍ مملوءة بالماء لتقطع عليه طريق التسلق أو يوضع مغلوطاً من الرمل والسولار تحت أرجل الخلايا . مع إعدام أعشاش النمل .


٧- ذنب النحل

وهو عبارة عن حشرة صغيرة الحجم (أصفر من دبور البلح) لون البطن أصفر، ويتركز وجوده فى المناطق الصحراوية ، حيث يبني أعشاشه فى الأرض الرملية ويقاوم باصطياده بواسطة الشباك ثم يعدم .

أمراض النحل



١- مرضى الفاروا



طفيل الفاروا يصيب النحل حيث تتسبب أنثى الحيوان فى الضرر ، وهى أكبر قليلاً من قمة النحل (القمل الأعمى) ولونها بنى محمر ، وفمها مزود بزوج من الفكوك القوية التى تمكنها من

دورة حياة طفيل الفاروا

ثقب جسم اليرقات والعذارى وامتصاص عصارة الجسم ، كذلك تتطفل على شغالات النحل بأن تثقب الأعشيش ودور الذكر هو تلقيح الأنثى ثم يموت .

● دورة الحياة :

- ١- الأنثى البالغة المخضبة تتغذى على دم الشغالات لحوالى أسبوع .

- ٢- تدخل عينا سداسية لوضع البيض بحيث يكون بها يرقه كاملة .
- ٣- تتغذى على غذاء النحل ٤- وتثقب جسم اليرقة لتتغذى على عصارة الجسم ٥- تضع البيض بعد غلق العين السداسية بـ ٦٠ ساعة ٦- يفقس البيض (٤-٦) ويعطى يرقات ٧- الحشرة الكاملة بعد ٨ أيام من الفقس .
- ٨- يتم التزاوج مع طور العذارى ٩- يخرج من البيض عدة إناث تخرج من الخلية وتتطفل على النحل ويبقى الذكور والأفراد غير الناضجين
- ١٠- اتصال الطفيليات بالنحل من خلال الأغشية بين حلقات الأغشية بين حلقات جسم النحلة .

أعراض المرض :


- تظهر الحشرات الكاملة وهى ملتصقة بجسم اليرقات الكاملة النمو والعذارى عند إزالة عطاء العيون السداسية .
- الأفراد الناتجة من الحضنة المصابة تكون قرمزية مشوهة . تزحف على الأرض .
- الحشرة الكاملة المصابة تصبح عصبية ويقل حجمها وتضعف وتموت سريعاً وتشاهد على لوحة الطيران وهى تترنح وتدور حول نفسها محاولة التخلص من الطفيل .

انتقال العدوى :

- أثناء عمليات النحالة مثل الضم والتقسيم ونقل الأقراص والتطريد والطرود .
- أثناء التقاء الشغالة الجامعة للرحيق فى المرعى .
- عن طريق الطوائف المستوردة من مناطق مصابة .



الطفيل على طور غير بالغ



إلى اليمين : شغالة عادى
إلى اليسار : شغالة مشوهة

■ المقاومة والعلاج

١- استخدام المواد الكيميائية:

● شرائط الأبيستان - تستخدم من أول سبتمبر وحتى آخر يناير حيث يستخدم من نصف إلى نصفين للشريط حسب قوة الطائفة وتعلق بين الأقراص.. حيث يستعمل لمدة ٢٤-٣٠ يوماً فقط (وشرائط البايغول تستخدم بنفس الأسلوب مع مضاعفة الكمية) .

● الفاروتيك .. وهو حامض لاكتيك ٤٠% ويستعمل رشاً في صورة ضباب على النحل مباشرة مع تكرار استعماله ٤-٥ مرات بين كل منها ٤ أيام ويعاد استعماله بعد حوالي شهر أو شهرين عند اللزوم ..

- (يجب أن يكون الرش في صورة ضباب وليست رذاذاً حتى لا يبلل النحل وتموت نسبة منه) .

- عدم استخدام هذه المواد أثناء موسم الفيض حتى لا يتلوث العسل ويسبب أضرارا للمستهلك .

٢- استخدام المواد الطبيعية :

المواد المحتوية على زيوت طيارة مثل (أوراق النعناع . الكافور . الشيح البلدى)
حيث توضع هذه المواد أو خليط منها فى المدخن ويدخن على الطوائف المصابة
ثم يسد مدخل الخلية لمدة (١٠ - ١٥) دقيقة بعدها تفتح للتهوية ويراعى عند
إجراء هذه العملية أن تتم فى المساء ، حيث يكون النحل السارح قد عاد إلى
خلياه .

ويوضع فرخ من الورق العادى أو البلاستيك مدهوناً بطبقة رقيقة من الشحم أو الفازلين لتلتصق بها أفراد الطفيل التى تسقط نتيجة المعاملة .

٣- مرض الأكاريين :

يسبب هذا المرض نوعا من الأكاروس يصيب النحلة عن طريق فتحات الثغور التنفسية ليصيب الزوج الأمامي من القصبات الهوائية الصدرية فيمتص جسم

النحلة خلال جدر هذه القصبات . وتضع الإناث المخصبة بيضها داخل القصبات فيفقس وتخرج منه أفراد مشابهة للأبوين . وتؤدي الإصابة إلى ازدحام . القصبات الهوائية بهذه الأفراد ، مما يؤدي إلى حدوث انسداد جزئي بها واختناق النحل المصاب الذي يعجز عن الطيران وتتهدل أجنحته ويشاهد زاحفاً على الأرض حيث تموت منه أعداد كبيرة . ويخرج الأكاروس من الثغور التنفسية للنحل الميت ليصيب أفراداً جديدة .

ويتم الفحص الميكروسكوبى بإزالة رأس النحلة وحافة الحلقة الصدرية الأولى فيظهر الزوج الأمامى من القصبات الهوائية داكن اللون ، بينما القصبات السليمة تكون براقّة اللون .

المقاومة والعلاج :

تستخدم المواد الطبيعية مثل زيت النعناع والبردقوش وأفضلها الشيح البلدى حيث توضع كمية من أوراق الشيح المسحوقة فى صرة صغيرة بداخل الخلية المصابة وتجدد كلما زالت الرائحة المميزة للشيخ ..

٤- مرض النوزيما :


من أكثر الأمراض انتشاراً فى العالم وتشتد الإصابة به فى أواخر الشتاء وأوائل الربيع وتقل الإصابة تدريجياً عند زيادة نشاط النحل .

يسبب المرض حيوان أولى طفيلى وحيد الخلية وفى طوره النهائى يتحوصل ليقاوم ظروف البيئة الخارجية غير المناسبة وتنتقل العدوى للنحل السليم عن طريق الحويصلات التى تصل معدة وأمعاء النحل عن طريق الغذاء والماء الملوث بالحويصلات وعند الظروف المناسبة تخرج كميات من الجراثيم لتتخرق الجسم وتتكاثر .

تأثير المرض على النحل والطوائف :

تؤدي الإصابة وخاصة للشغالات إلى إضعافها وعدم قدرتها على العمل ، ومع شدة الإصابة تضمر غد الغذاء الملكى فيؤدي لعجز الشغالة عن تغذية الحضنة وعندما تصاب الملكة فإن قدرتها على وضع البيض تقل .

يشاهد النحل المصاب منتفخ البطن ويتساقط كلما حاول الطيران ويزحف على جدران الخلايا . مع خروج براز لا إرادياً من المستقيم على الأقراص . مما يلوث غذاء الأفراد السليمة .



تأثير مرض النوزيما على الأمعاء في النحل

الوقاية والعلاج

- يجب نظافة الأدوات المستعملة جيداً ، ويمكن تبخير الأدوات الملوثة والأقراص الشمعية والخلية بوضع قطعة قطن مشبعة بحامض خليك مركز فوق الأقراص ، وتغلى الخلية وتغلق مدخلها وتترك لمدة أسبوع واحد تفتح بعده وتترك لمدة يومين للهواء الحيوى . قبل استعمالها .
- قد تستخدم السلفا والبنسلين مع المحاليل السكرية المقدمة لتغذية النحل .
- استخدام الشيع البلدى المغلى بإضافة للمحلول السكرى بواقع ١٠ جم لكل طائفة ، ويكرر العلاج أسبوعياً من ٤ . ٥ مرات .

٥. مرض الأميبا :

يسبب هذا المرض حيوان أولى يصيب أنابيب مليبيجي فى شغالة نحل العسل حيث يتكاثر فيها ويسبب تلفها وهو يوجد غالبا مصاحبا لمرض النوزيما ويعالج بنفس الطريقة .

٦. مرض الدوسنتاريا :

ينتج هذا المرض عند تعرض النحل للبرد الشديد أو عند تغذيته على أعسال أو محاليل سكرية متخمرة ويعالج النحل بتدفئته وتغذيته على مواد نظيفة سهلة الهضم .

٧. الشلل :


يسبب هذا المرض فيروس لا يرى بالميكروسكوب ويسبب انتفاخ بطن النحلة المصابة كما تصبح الشغالات ذات لون أسود لامع لتساقط الشعر من عليها كما يلاحظ ارتعاش الأرجل وتهدل الأجنحة . ويقاوم المرض بتغيير الملكات وتعرض الطائفة لأشعة الشمس وتقوية الملكات المصابة حتى تتخلص الشغالات من النحل المصاب وبذلك تغلب الطائفة على الإصابة تدريجيا .

ضم الطوائف



حتى يكون المنحل ناجحاً فيجب أن تكون جميع الخلايا فى قوة واحدة ولا يوجد بينها خلايا ضعيفة حتى لا تتعرض هذه الخلايا للهلاك عن طريق السرقة أو البرودة أو مهاجمتها "بالدبور" ما دام أنها قليلة فى عدد الشغالات القائمة على خدمة الخلية وصناعة العسل للخلية .. وقد يكون ضعف الخلية ناتجا من فقد الملكة أو تقدمها فى العمر أو ظهور الأمهات الكاذبة .

ولذلك يلجأ المربي إلى ضم الخلايا الضعيفة إلى طائفة ذات ملكة قوية "بباضة" على أن يراعى الآتى :



الضم باستخدام ورق الجرائد

وترفع أقراص الطائفة الضعيفة بعد التدخين عليها وبما عليها من نحل، وتوضع بالتبادل مع أقراص الخلية الأخرى .. ويلصق بعضها ببعض بعد تمام النقل - ويوضع قفص الملكة بين قمتي الإطارين داخل الخلية وتغلق ، وتوضع الخلية في مكان جديد بين المكانين الأصليين - ويتم فحصها بعد يومين ويفرج عن الملكة .

٢، الضم مع التعفير بالدقيق :

يستخدم بدل التدخين التعفير بالدقيق حيث يكون التعفير على الأقراص والمدخل ، فيهدأ النحل لا نشغاله بتنظيف نفسه حتى يتمود على رائحة الطائفة الأخرى .


٣. الضم باستخدام ورق الجرائد :

وهذه أفضل الطرق حيث لا ينتج عنها أى إضرار للنحل ، حيث يتم رفع غطاء الخلية القوية عند حلول المغرب ووضع غطاء من ورق الجرائد فوق صندوق التربية بحيث يتم ثقبه بثقوب صغيرة بقطر ١,٥ مم على الأكثر .

- يرفع صندوق خلية التربية من الطائفة الضعيفة بالتدخين ، وتعود الملكة الضعيفة بها وتوضع فوق صندوق التربية المغطى بورق الجرائد المثقب وتغطى الخلية فى مكان وسط بين الخليتين .

وبعد نجاح عملية الضم بإحدى الطرق السابقة يجب على النحال ترتيب أقراص الخلية ورفع الأقراص الزائدة ثم يغذى الطائفة .

التطريد



التطريد ظاهرة طبيعية لتكاثر النحل ، حيث تخرج الملكة من خليتها مصاحبة بعض الشغالات لاتخاذ مكان جديد وتكوين طائفة جديدة، بينما تترك فى خليتها جزءا من أفراد الطائفة مع بعض الملكات العذارى أو بيوت الملكات .

● أسباب التطريد :

١. قوة الطائفة ووصول النحل داخل الخلية إلى حد الزحام .

٢. ضيق الخلية ووجود إضاءة أقراص أو عاسلات جديدة فى الوقت المناسب..

٣. إهمال النحال فى إعدام بيوت الملكات عند الفحص .

٤. وجود عوامل وراثية فى بعض السلالات تكون أكثر ميلا للتطريد .

• ظواهر التطريد :

أ. داخلية :

١ . كثرة بيوت الملكات .

٢ . كثرة الحضنة .

٢ . امتناع الملكة عن وضع البيض وتحركها على الأقراص حركة سريعة غير عادية .

٤ . ازدحام الخلية بالنحل ، إذ يقل "سروح" النحل قبيل التطريد ويتراكم داخل الخلية وعلى لوحة الطيران .

ب. خارجية :

١. يلاحظ تجمع الشغالات أمام المدخل فى مجموعات كبيرة ، مع إحداث طنين مزعج غير عادى وطيران عدد من النحل .

٢. وقوع عدد من الشغالات على الأرض أثناء الطيران ، حيث تتزود الشغالات وتملأ بطونها بالعسل قبل مبارحة الخلية ويلاحظ أن النحل المطرد لا يميل للسمع..

٣. اتجاه النحل للمكان الذى اختاره على شكل كتلة يختلف حجمها حسب قوة الطائفة التى خرج منها ، وحسب نوع الطرد إذا كان رئيسياً أو ثانوياً .. فإذا كانت الملكة الأم على رأس الطرد يسمى طرداً رئيسياً ، وقد يتلوه عدة طرود صغيرة ثانوية تصحبها عذراء أو أكثر ..

• طرق منع التطريد وإيقافة :

إذا لوحظ الطرد أثناء طيرانه فيمكن رشه برذاذ من الماء ، وذلك لتبليل أجنحته فيضطر النحل للوقوف في أقرب مكان ثم يعامل الطرد كالاتى :

يؤخذ الطرد بعد قطع فرع الشجرة الموجود عليها إذا كان هذا الفرع صغيرا أما إذا كان فرعا سميكاً فيهز بشدة فوق صندوق سفر به بعض أقراص الحضنة والعسل وحبوب اللقاح وينصح بعدم إسكان الطرد في خليته القديمة ، وبعد يومين يفحص الطرد للتأكد من وجود الملكة ويستحسن تغذية بالمحاليل السكرية بعد ذلك .

• علاج التطريد :


(١) فحص الخلايا دوريا للتأكد من خلو الطوائف من بيوت الملكات الزائدة وهدم هذه البيوت إن وجدت ، وخصوصا خلال فترات انتشار التطريد ، وغالبا (نصف إبريل وحتى أول أسبوع فى يونيو) .

(٢) الاتجاه إلى تربية السلالات غير الميالة للتطريد .


(٣) إضافة أقراص فارغة أو أساسات شمعية أو أدوار عليا إذا احتاجت الطائفة ..

(٤) تهوية الخلايا بتوسيع مدخل الخلية وإضافة صناديق تربية فارغة فى قمة الخلية عند ارتفاع الحرارة .

(٥) عكس الصناديق .. فى الخلايا التى تحتوى على طابقتين للحضنة بعكس وضع الطوابق بحيث يوضع الطابق الأول مكان الطابق الثالث المزدحم بالحضنة، وفى أوائل الربيع تتجه الملكة لوضع البيض فى الطابق الثانى ، ويتوافر مكان فى الجزء العلوى والأكثر دقئاً مما يحفزها على نقل العسل إلى الطابق العلوى . وذلك يقلل نسبة التطريد .



عكس الصناديق



(٦) تشجيع النحل على التكاثر بالتقسيم بنقل الأقراص المغطاة بالحضنة والعسل من الطوائف المزدحمة إلى خلية جديدة على أن تزود هذه الخلية ببيت ملكي ناضج ..

تقسيم الطوائف



تجرى عملية تقسيم الطوائف بفرض مقاومة التطريد ، كما أنها فى نفس الوقت يلجأ إليها المربي لزيادة عدد الطوائف فى المنحل .. أو يلجأ إليها المربي لعمل طرود للبيع وبذلك تحقق لك عائداً جديداً ..

أفضل أوقات التقسيم :

● أوائل الربيع وقبل موسم فيض العسل وتأخير هذه العملية الحيوية حتى منتصف الموسم يُعيق النحل عن إنتاج العسل ..

وكما ذكرنا فى طرق تلافى التطريد وعند وصول الطائفة إلى الازدحام الكامل للأقراص بالحضنة ، فيمكن رفع بعض الأقراص المحتوية على الحضنة والشفالة ووضع أقراص فارغة أو أساسات شمعية بدلاً منها وعن طريق الأقراص المرفوعة يشكل منها نويات جديدة .

ولنجاح التقسيم يجب الاهتمام بعدة عمليات قبل التقسيم :

١. تحتاج الملكة لإعداد جيد لتنشيط وضع البيض ، فيتم الاهتمام بالتغذية للطائفة .
 ٢. يحتاج المربي للمكات جديدة ومن سلالات مختارة .
 ٣. يحتاج أيضا لخلايا خالية وأقراص شمعية وأساسات لإضافتها .
- طرق التقسيم : ١. تكوين نواة جديدة من طائفة واحدة ،



تربية الملكات



تقوم طوائف النحل بتربية الملكات طبيعيا في ثلاث حالات هي .

١. الرغبة فى التطريد .
٢. الرغبة فى إحلال الملكات .
٣. الطوارئ عند فقد الملكة.

غالبا ما يكون عدد بيوت الملكات فى جميع هذه الحالات زائدا عن حاجة الطائفة وبالتالي يمكن الاستفادة ببعضها لتغيير الملكات المسنة أو لإدخالها على الطوائف الجديدة الناتجة من التقسيم ..

وعند اختيار البيوت الملكية فتختار من الطوائف المعروفة بالملكة الممتازة كما ينتخب منها البيوت الكبيرة الحجم التى بناها النحل حول يرقات حديثة الفقس وتهدم البيوت الملكية الصغيرة .



١. استعمال بيوت الملكات الطبيعية ..

ويمكن اتباع الآتى :-

(١) اختيار الذكر والذى تنتقل صفاته إلى جميع الأفراد بوضع إطار به شريط من شمع الأساس للعيون السداسية الواسعة ، ويوضع بجانبه عش حضنة فتكمله الشفالات بخلايا سداسية واسعة .

(٢) اختيار الملكة .. وذلك باختيار إحدى الطوائف الممتازة من إحدى السلالات النقية واختبار بعض أقراصها المحتوية على بيض مخصب و يرقات حديثة ، وهذه يتم استخدامها لبناء البيوت الملكية ..

وثانيا يتم اختيار الطائفة التى تقوم بالتربية والتى يجب أن تكون قوية مزدهمة بالشفالات الحاضنة والمسل وحبوب اللقاح مع مراعاتها بالتغذية . وينتج من ذلك يرقات شفالة حديثة الفقس عمرها أقل من ٢ أيام ، ولتربيتها يتم الآتى :-



يجهز إطار بدون سلك بفرخ شمع أساس جديد على أن يقطع على شكل مثلثات ويوضع فى خلية بها طائفة قوية والملكة من سلالة ممتازة . بعد أسبوع ارفع الإطار وأزل بعض الأطراف الخارجية للمثلثات الشمعية بواسطة سكين حاد حتى تظهر اليرقات صغيرة السن قريبة من الحواف .

وبوضع الإطار فى الخلية التى ستقوم ببناء البيوت الملكية على أن ترفع ملكتها أولاً فتتولى الشغالات بناء البيوت الملكية حول أطراف القرص المثلث الشكل بعد


١٠ أيام يصل عدد البيوت الملكية الناتجة ما بين ٣٠ - ٤٥ بيتا ، وللحصول على بيوت ملكية جيدة يمكن فصلها بسهولة دون إصابتها هو إعدام يرقتين أو بيضتين وترك واحدة لهما .

٢. إنتاج الملكات تجاريا عن طريق التطعيم (الكئوس الشمعية) :

وفى هذه الحالة يتدخل المربي فى اختيار اليرقات التى ستربى عليها الملكات وتتبع عند الحاجة إلى إنتاج عدد كبير من الملكات ..

(١) تجهيز أدوات التربية ، وهى عبارة عن : براويز ذات سدابات عرضية تلتصق عليها كعوب أو قواعد خشبية على مسافات ثابتة تبلغ حوالى نصف بوصة .

(٢) يجرى عمل الكئوس الشمعية وتلتصق بالقواعد الخشبية بواسطة الشمع المنصهر . ولعمل الكئوس الشمعية تستخدم أقلام من الخشب الجامد (الذى لا ينتفخ عند وضعه فى الماء) ذات قمة مستديرة قطرها عند الطرف ٦ . ٧ ملليمترات . ويحضر الشمع الأبيض النظيف الذى يصهر فى حمام مائى ، حيث يغمس طرف القلم فى الشمع المنصهر وتكرر العملية عدة مرات حتى يتكون الكأس من طبقة شمعية كافية ثم يبرد فى الماء لكى يتجمد ، ويمكن نزعها عن القلم بحركة التفاف خفيفة .




(٣) يوضع بالكؤوس الشمعية قليل من الغذاء بالماء .

(٤) يؤتى بقرص حضنة من إحدى الطوائف المرغوب فى الإكثار منها .

(٥) تنقل اليرقات حديثة الفقس (عمر ١٢ . ٣٦ ساعة) باحتراس بواسطة إبرة تطعيم خاصة ، وتوضع فوق الغذاء الملكى الموجود بالكؤوس الشمعية ويجب أن تتم هذه العملية بسرعة مع مراعاة وضع اليرقة داخل الكؤوس بنفس وضعها الذى كانت عليه فى العين السداسية ويمكن التطعيم بدون وضع غذاء ملكى فى العين السداسية ويسمى التطعيم الجاف ..

(٦) بعد الانتهاء من تطعيم جميع الكؤوس بوضع البرواز فى طائفة قوية يتيمة تم عزل الملكة منها بشرط أن تحتوى على كمية كبيرة من النحل الحاضن مع مراعاة مولاتها بالغذاء السكرى وبدائل حبوب اللقاح .

(٧) بعد عشرة أيام من بدء التربية يتم توزيع هذه البيوت على النوايات المحتاجة أو يمكن حجزها داخل أقفاص نصف كرة لحين فقسها داخل الخلية ثم توزع العذارى الناتجة حسب الحاجة ..



بناء بيوت الملكات

ولابد أن يكون ذلك عندما تشاهد نشاط النحل في الربيع وبداية الصيف ،
 أى خلال فترة الفيض التى يختلف ميعادها من منطقة لأخرى ، وفى اعتقادى
 أن إضافة العاسلة يرتبط بموسم الفيض فى منطقتك أو موسم إزهار المحاصيل
 الرئيسية ، وهى فى مصر الموالح والبرسيم والقطن .. ويمكن جمع العسل مرتين
 أو ثلاثة ..

● المرة الثانية خلال شهر يونيو والتي جمع النحل غسلها من أزهار البرسيم خلال شهر مايو .

● المرة الثالثة خلال شهر أغسطس وأوائل سبتمبر والتي جمع النحل عسلها من أزهار القطن .. خلال شهر يوليو وأغسطس ، لذلك يجب التنبه إلى وقت الإزهار من حولك ونوع الأزهار التي سيجتمع منها النحل رحيقه حتى يمكن أن تباشر عملك دون تأخير .

(١) وعندما تصل إلى بداية موسم الفيض أضف العاسلة الأولى والتي يفضل أن يكون بها ٩ أقراص فقط حتى تكون هناك مسافة «لمط» العيون السداسية لتخزين العسل بها وتغطيتها بالشمع .. عند ذلك ارفع من صندوق التربية

(٢) وعند امتلاء العاسلة الأولى بالعسل ارفعها وضع مكانها عاسلة جديدة فارغة فوق صندوق التربية ، ثم أعد وضعها فوق العاسلة الجديدة عند امتلاء العاسلة الثانية ووجدت حاجة لإضافة عاسلة ثالثة يمكن إضافتها بنفس الطريقة.

(٤) إذا وجدت أقراصا بها يرقات فى وجه والوجه الآخر حضنة مقفلة بيدل اتجاه الأقراص ، حيث تكون الأوجه التى بها الحضنة المفتوحة متجهة إلى الداخل ، وسط الطائفة .

(٦) ويجب إجراء الفحص كل أسبوع لمنع حدوث التطريد مع ضم الطوائف الضعيفة وإضافة الأقراص الفارغة باستمرار والعمل على تسليك الإطارات الخشبية وتثبيت الأساس الشمعى وإضافتها عند اللزوم للطوائف المحتاجة إلى أقراص فارغة ..

فرز العسل




لكى يتم استخراج العسل من الأقراص الشمعية ، لابد أن يتم ذلك داخل حجرة خاصة محكمة ، حيثُ إن النحل بمجرد أن يشم رائحة العسل ممكن أن يكون سببا فى المضايقة أثناء الفرز .

أدوات الفرز


● تجهيز الأدوات المستعملة فى الفرز بعد غسلها بالماء والصابون ثم تجفف جيداً .

● يراعى عند استخراج الأقراص التامة النضج أن يزال ما عليها من نحل بواسطة فرشاة ناعمة واستخدام وقود فى المدخن عديم الرائحة .. ثم تجمع الأقراص فى صناديق سفر إلى حجرة الفرز .


● تفرز الأقراص الفاتحة اللون والتامة النضج ، أى المغطاة عيونها العسلية بالشمع بعضها مع بعض لإنتاج عسل ممتاز (درجة أولى) ، حيث يباع بسعر عالٍ . والأقراص التى بها أجزاء غير ناضجة أو الداكنة اللون يفرز بعضها مع بعض لإنتاج عسل (درجة ثانية) وهو أقل جودة وأرخص سعراً من السابق ويستحسن استهلاكه بسرعة لقابليته للتخمر ، نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة به .



تتم عملية الكشط من أسفل لأعلى بحركة منشارية مع مراعاة ألا يكشط إلا الطبقة الشمعية الرقيقة المغطاة للعيون السداسية فقط .



بعد الكشط توضع الأقراص فى الفراز ويدار ببطء أولاً ثم تزداد السرعة تدريجياً (حتى لا تتكسر الأقراص) إلى أن يتم فرزها تماماً ، ثم تستبدل بأقراص أخرى ، ثم ينقل العسل من الفراز إلى المنضج ويحسن أن يربط بأسفل مصفاة المنضج قطعة من الشاش (الموسلين) لحجز فتات الشمع ويترك العسل بالمنضج حوالى أسبوع ليتم فيها إنضاجه ، ثم يعبأ العسل داخل عبوات إما من الصفيح غير القابل للصدأ أو برطمانات زجاجية حسب الطلب ، وقد يسوق العسل على شكل قطاعات عسلية وفى هذه الحالة يكون سعره مرتفعاً عن العسل السائل ..



مصفاة (خشتان) ومصفاة من القماش والمنضج

وسائل غش العسل والشمع والتعرف عليها ..



إن أكبر ما يسيء إلى مربي النحل والمستهلك فى صناعة العسل ، هو سهولة غش العسل ، وصعوبة اكتشاف الغش فيه ، وليس أهون من أن يضيف أى تاجر غاش إلى العسل شيئاً من الجليكوز مثلاً فيصبح مفسوشاً ويصعب جداً اكتشاف غشه ، وأصبح الآن المستهلك يعتقد أن جميع العسل فى السوق مفسوش وصعوبة إثبات ذلك ..

لذلك أصبح كل عسل نقى وخالٍ من الغش يمكن أن يكون موضعاً لسوء الظن وكل عسل مفسوش يمكن أن يكون موضع ثقة لا يستأهلها ، وهذا ما يجعل مربي النحل على شىء من القلق والانزعاج ..

ويلجأ بعض التجار إلى خلط أنواع العسل بعضها مع بعض باستعمال أنواع من العسل الرخيصة الثمن مثلاً مع أنواع أخرى ذات رائحة مطلوبة أو ذات نوعية من العسل أحدهما نسبة الرطوبة فيه عالية مع عسل آخر تكون نسبة الرطوبة به منخفضة .

مع العلم بأن معالجة العسل لتسويقه يمكن أن تؤثر على نشاط المضادات الحيوية فيه ، وكذلك فإن تعرض العسل للضوء ودرجات الحرارة العالية التى يلجأ لها بعض التجار للتقلب على تجمد العسل تنقص من فاعليته ، بل إن عينات من العسل من نفس الخلية يمكن أن تختلف فى نشاط المضادات الحيوية باختلاف طريقة المعالجة والتعبئة والتخزين .

طرق غش العسل :

عسل النحل الطبيعى تتغير مكوناته الكيماوية ومواصفاته الفيزيائية عندما تضاف إليه مادة أو أكثر من المواد التالية ، حيث يعرف أنه عسل مفسوش ، مثل :

- غش العسل بالعسل الأسود .
- غش العسل بالنشا .
- غش العسل بإضافة الماء .
- غش العسل بإضافة السكر .
- غش العسل بعسل الجلوكوز .
- العسل الصناعي ..

التعرف على العسل المغشوش



كثيراً ما يتساءل الناس عن كيفية التعرف على العسل السليم من العسل المغشوش .. ويمكن تلخيص ذلك في ثلاث طرق :

١. عن طريق التحليل الكيماوى - ضمان ٩٥ ٪ .
٢. عن طريق الخبرة بالعسل والذوق - ضمان ٧٥ ٪ .
٣. عن طريق بعض الطرق الشائعة - ضمان ٦٠ ٪ .

ومن هذه الطرق الشائعة :

١- **استخدام القلم الكويبا** ، وهذا القلم لا يترك أى أثر إلا بوجود الماء ، فإذا وضع فى العسل وكان خالياً من السكر المعقود بالماء لا يترك أثراً ، وإذا كان العسل ممزوجاً ظهر أثر الكويبا فيه ..

٢- **الحل بالماء** : ضع حوالى ٥٠ جراماً من العسل فى كوب زجاجى والصق من الداخل ورقة بفرة بحيث يترك ثلث الورقة زائداً فوق حافة الكوب الزجاجى ، ويصب الماء على الجزء الزائد من الورقة برفق لينساب الماء ويعلو فوق العسل حتى يملأ الكأس ولا يعكسه ، وبعد ربع ساعة تذوق الماء ، فإذا كان فى العسل سكر بدا طعمه فى الماء وإذا لم يكن الماء حلواً ، فالعسل يكون خالياً من السكر .. وسبب ذلك أن العسل لا يذوب . بل ينحل انحلالاً ولا يظهر طعمه فى الماء إلا إذا حركته .

٣- الفش بالجلوكوز:

ويحضر الجلوكون التجاري بغلى النشا الناتج من (الذرة أو الأرز أو البطاطا أو الباطاطس) مع حمض مخفف حتى يتم تحويله . ثم يعادل الحمض الزائد ويبرد لإنتاج الجلوكون بصورة مسحوق صلب أو سائل سميك القوام والمعروف بعسل الجلوكون - وقد يباع هو نفسه كعسل نحل مع إضافة بعض النكهة المطلوبة وهو المعروف بالعسل الصناعي .

عند زيادة الجلوكوز في العسل يسهل اكتشافه من كثافته ، وقوة تماسكه ، إذ يشتد اشتداداً غير طبيعي ، وعند رفعه بأصبعك ويترك ليتساقط فإنه يكون متصلاً ولا ينقطع ويكون لونه فاتحاً في الغالب وطعمه خفيف الحلاوة .

وهناك اختبار معملى بسيط حيث يخفف العسل بمثل وزنه من الماء ، ثم يعامل بمحلول يودور البوتاسيوم ، فإذا تكون لون أحمر أو بنفسجى دل على وجود الدكسترين الناتج من الجلوكوز التجارى .

٤ - الغش غير المباشر..

العسل هو الإفرازات السكريه الحلوة الخارجة من النباتات والتي تظهر غالبا في الأزهار وتجهزها الحشرات ، أى أن رحيق الأزهار لا يصبح عسلا إلا بعد تجهيزه في معدة العسل في النحلة الشغالة ..

وقد يقدم للنحل محلول سكري بدلاً من الرحيق فتحوله إلى عسل . وهذا يعتبر عسلاً غير مغشوش من الناحية العملية - "سكر أحادي محول سهل التمثل" - إلا أنه يفقد مكونات العسل الطبيعي ، ولذلك يدخل تحت العسل المغشوش .

٥ - العسل الصناعي :

يحضر العسل الصناعى دون تدخل النحل ، حيث يستخدم غالبا السكر الجلوكوز (سكر عنب) مع خلطه بسكر الفواكه (فركتوز) وبعض المواد الطيارة، ولوحظ أن الرماد المتبقى منه يختلف عن رماد العسل الطبيعى فى خلوه من حمض الفوسفوريك .

ويصنع منه عدة أنواع حسب المحلول السكري المستخدم ، مثل - عسل الشمام - عسل البطيخ - عسل القرع - عسل البلح .

دليلك الموسمى فى تربية النحل وأهم عمليات النحالة خلال أشهر السنة

يناير



١. يستحسن عدم فتح الخلايا إلا للتأكد من كمية ونوع الغذاء المخزون (عسل وحبوب اللقاح) ، وكذلك الاطمئنان على حالة الحضنة والملكة وعلى عدم وجود أمراض ، على أن يكون الفحص فى اليوم المشمس عديم الرياح والأمطار ، وأن تتم هذه العملية بسرعة وتحاشياً لحدوث السرقة .

٢. قد تحتاج الطوائف للتغذية بالمحاليل السكرية المركزة بنسبة ٢ سكر : ١ ماء ، وكذلك لتنشيط الملكات على وضع البيض ، وذلك فى المناطق التى تزرع فيها مساحات كبيرة من الموالح .

٣. على مربى النحل أن ينتهى خلال هذا الشهر من ترميم صناديق الخلايا المحتاجة للإصلاح واستكمال النقص من الأدوات اللازمة استعداداً للموسم الجديد .

٤. التأكد من وجود مادة (البارادكس) بكمية كافية فى صناديق حفظ الأقراص الشمعية الموجودة بالمخزن .

٥. إذا كنت مضطراً لنقل منحللك إلى مكان آخر فيجب أن تنتهى من هذه العملية خلال هذا الشهر .

فبراير



١. الاستمرار فى تغذية الطوائف على المحاليل السكرية لتنشيط الملكات على وضع البيض .

٢. يبدأ نشاط النحل خصوصاً الوجه القبلى ، لذلك يجب الفحص المستمر كل عشرة أيام مع إعدام بيوت الملكات وإضافة أقراص شمعية فارغة وأساسات حسب حاجة الطوائف .

٣. يمكن البدء فى تربية الملكات وتقسيم الطوائف لإنتاج نويات جديدة ، كما يمكن تغيير بعض الملكات المسنة خلال هذا الشهر .

٤. عند الرغبة فى إنشاء منحل جديد خلال هذا الموسم أن يبدأ فى التنفيذ، وذلك بإقامة المظلات فى المكان المنتخب ، وبعد تسوية الأرض وإعداد الأدوات اللازمة استعداداً لاستقبال نويات النحل .

مارس



١. يبدأ تزهير الموالح ، ولذا يجب أن يتم الفحص كل أسبوع على الأكثر مع إعدام بيوت الملكات منعا من التطريد وإضافة أقراص فارغة أو أساسات شمعية حسب حاجة الطوائف .

٢. يمكن إجراء عمليات تربية الملكات والتقسيم وإنتاج النويات ، وذلك فى الطوائف القوية والتي أمضت فصل الشتاء بنجاح .

٣. فى المناطق الفقيرة فى مصادر الرحيق تستمر التغذية على المحاليل السكرية لتقوية الطوائف مع ملاحظة أن ملكات دبور البلح قد تظهر فى بعض المناحل ، لذا يجب اصطياها وإعدامها ، فإعدام إحداها معناه إعدام عش كامل فى المستقبل .

٤. على مربى النحل المبتدئ والذى استقبل النويات (الطرود) خلال هذا الشهر الاستمرار فى عملية التغذية مع إضافة الأساسات الشمعية تدريجياً وحسب حاجة النحل .

إبريل



١. فى المناطق المنزرع بها مساحات كبيرة من الموالح يتم فرز غسل الموالح، ويراعى عدم التأخير فى عملية الفرز والتي يجب أن تجرى قبل انتهاء التزهير حتى لا يرتد النحل على ما جمعه من العسل مرة أخرى وحتى تتم كذلك عملية الفرز بنجاح دون التعرض لهجوم النحل السارح .

٢. إذا كان بالمنطقة مساحات قليلة من الموالح وكمية العسل التى جمعها النحل قليلة فيمكن ترك ما جمعه النحل لتنشيط الطوائف بدلا من تفذيتها على المحاليل السكرية ، وبذلك يمكنها الدخول على موسم تزهير البرسيم بالقوة المطلوبة .

٣. فى المناطق التى ليس بها موالح تستمر عملية التغذية لتنشيط الملكات على وضع البيض استعدادا لتقوية الطوائف والدخول على موسم تزهير البرسيم الذى هو أحد المحاصيل الرئيسية لجمع العسل فى مصر .

٤. يراعى التشديد فى مواصلة اصطياد ملكات دبور البلع التى يزداد ظهورها خلال هذا الشهر كما يظهر أيضا طائر الوروار وهو النوع الأوربي الذى يصل إلينا مهاجرا فى مجموعات تهاجم المناحل ، ويمكن مقاومته بإزعاجه حتى يضطر إلى الهجرة أو ضربه بالأعيرة النارية .

مايو



١. يتم خلال هذا الشهر تزهير نبات البرسيم والذى يعتبر المحصول الرئيسى بالنسبة للعسل ، لذلك يجب الاهتمام الدورى كل أسبوع مع إعدام بيوت الملكات وإضافة الأقراص الشمعية الفارغة على أن توضع حول الحضنة وليس فى وسطها .

٢. يمكن تغيير بعض الملكات المسنة أو غير الميالة لجمع العسل ، ويعرف ذلك من طريقة وضعها للبيض وشكل حضنتها ، كما يتم التخلص من الأقراص الشمعية القديمة وإحلال الأساسات الشمعية بدلا منها ثم القيام بصهرها ثم التصرف فيها على هيئة شمع خام .

٣. يجب العناية بتظليل المنحل مع رش أرضية المنحل دائما بالماء والاستمرار فى الاصطياد والقضاء على ملكات دبور البلع ، وإعدامها وكذلك شغالات (دبور البلع) التى قد تظهر خلال هذا الشهر .

يونيو



١. يمكن فرز عسل البرسيم فى أوائل هذا الشهر أو النصف الأول منه حسب ظروف المنطقة وقبل انتهاء التزهير تماما حتى لا يحدث هجوم أو سرقة للنحل .

٢. تستخرج الأقراص التامة النضج ، وتفضل الأقراص الجديدة ذات اللون الفاتح لفرزها مع ترك الأقراص الشمعية القديمة غير الناضجة لتغذية النحل عليها .

٣. يجب الانتهاء من فرز الأقراص التى تجمع فى نفس يوم رفعها من الخلايا على أن توزع على الطوائف بعد فرز العسل منها مباشرة .

٤. بعد يومين من إعادة الأقراص المفروزة إلى الطوائف تجرى عملية تعديل بين أقراص الطائفة وكذلك للاطمئنان على وجود الملكات عن طريق وجود البيض من عدمه لأن بعض الملكات قد تفقد أثناء هذه العملية وذلك بفرض إعداد الطوائف لاستقبال محصول القطن .

٥. يلاحظ خلال هذا الشهر زيادة أعداد دبور البلع التى تهاجم الطوائف ، ولذا يجب العمل على جمعها بواسطة المصايد أو قتلها بواسطة الصبىة ، وكذلك البحث عن أعشاشها ورشها أو تعفيرها عند الغروب ببعض المبيدات الحشرية .

يوليو



فى هذا الشهر يكون محصول القطن قد وصل إلى أعلى درجات التزهير، وبالتالي يكون النحل فى أعلى درجات النشاط لجمع محصول العسل ، ولكن أصبح استعمال المبيدات الحشرية على نطاق واسع فى مقاومة آفات القطن يؤثر على قوة الطوائف بسبب موت نسبة كبيرة من النحل السارح ، ولذلك ينصح بمراعاة الآتى :

١. عدم المغالاة فى التقسيم أثناء الموسم بل تترك الطوائف قوية حتى يتسنى لها أن تجتاز فترة استعمال المبيدات دون إضعافها أو إهلاكها ليتمكن الحصول على كمية من عسل القطن .
٢. استمرار عملية رش أرضية المنحل بالماء خصوصا فى الوجه القبلى .
٣. الاهتمام بمقاومة دبور البلع بسبب ازدياد أعداده وشدة مهاجمته للطوائف فى بعض المناحل وضرورة التعرف على أعشاشه ورشها أو تعفيرها بالمبيدات .


أغسطس



ويمكن لبعض مربى النحل فى بعض المناطق من فرز عسل القطن خلال هذا الشهر مع مراعاة أن لا يتم الفرز إلا للأقراص الشمعية التامة النضج مع ترك الأقراص غير الناضجة ، وكذلك ذات اللون الداكن لكي يتغذى النحل على ما بها من العسل مع اتباع الاحتياطات التى اتخذت عند فرز عسل الموالح والبرسيم مع ملاحظة ترك كمية كافية من العسل فى الطائفة لا تقل عن ١٠ . ٥ كيلو ليتغذى عليها نحل الطائفة أثناء فترة الشتاء .

١. يفضل الكثير من مربى النحل حاليا ونظرا لتأثير الطوائف بعملية استعمال المبيدات الحشرية على القطن ترك ما تجمعه طوائف النحل من عسل القطن

أكتوبر




١. إذا ما لاحظ النحال نقصا في كمية العسل المخزون يمكن نقل أقراص من العسل من الخلايا التي بها ما يزيد على حاجتها وإلا فتبدأ التغذية بمحلول سكري مركز (٢ سكر : ١ ماء) لتعويض النقص في كمية العسل ولتتمكن الطوائف من تخزين ما يلزمها لفترة الشتاء .
٢. إذا لوحظ نقص في كمية حبوب اللقاح فيمكن نقل الأقراص المملوءة بحبوب اللقاح من الطوائف التي يزيد ما بها من حبوب اللقاح عن حاجتها إلى الطوائف التي يقل فيها حبوب اللقاح .
٣. في نهاية هذا الشهر يتم رفع الأقراص الزائدة عن حاجة الطائفة ولا يترك في الخلية إلا أقراص الحضنة والعسل وحبوب اللقاح والتي يغطيها النحل من الجانبين .
٤. الاستمرار في مقاومة دبور البلع .
٥. مقاومة الفاروا بالمعالج الذي تنصح به وزارة الزراعة .

نوفمبر



١. الاهتمام بتشتية الطوائف وخاصة أن الجو يأخذ في البرودة وذلك برفع الأقراص الفارغة الزائدة عن الحاجة والتي لا يغطيها النحل ، ويجب أن تتم عمليات الفحص على فترات متباعدة للاطمئنان على حالة الطائفة والتأكد من وجود الملكة وهل هي في حاجة إلى التغذية من عدمه . وأن يكون الفحص في الأيام الصحوه عديمة الرياح ، ويجب الإسراع في الفحص لتفادي برودة الحضنة .
٢. رفع أغطية المظلات حتى تتعرض الخلايا لأشعة الشمس .
٣. الاهتمام بمعالج الفاروا في هذه الفترة التي تقل فيها الحضنة .



١. عدم فتح الخلايا إلا على فترات متباعدة وذلك للاطمئنان على وجود الحضنة وكمية النحل بالخلية والغذاء المخزون من عسل وحبوب اللقاح .
٢. على مربى النحل أن ينتهز فرصة قلة العمل بالمنحل ويقوم بترميم وإصلاح صناديق الخلايا والأدوات واستكمال النقص فيها .
٣. على من يفكر فى تربية النحل وإنشاء منحل فى الموسم الجديد عليه أن يحدد من هذا الشهر مكان المنحل والنحال الذى سيتدرب معه وكذلك المصدر الذى سيشتري منه نويات النحل والطرود ومكان شراء الأدوات النحلية وشمع الأساس على أن يستعين بأحد ممن له الخبرة والمران ومعروف بالأمانة والنزاهة ليوجهه إلى الأماكن التى تصنع أو تنتج أدوات النحالة طبقا للمواصفات الفنية .
٤. ضرورة التركيز على علاج طفيل الفاروا فى هذه الفترة قبل بدء وجود الحضنة فى الطائفة .



٣	 مقدمة
٥	 شروط نجاح وإنشاء منحل
٧	 مساكن النحل
١١	 أدوات المنحل
١٤	 تثبيت شمع الأساس
١٥	 شراء النحل وإسكانه
١٦	 طائفة النحل
١٩	 فحص الطوائف
٢١	 التغذية
٢٤	 التشتية
٢٥	 السرقة
٢٦	 أعداء النحل
٢٩	 أمراض النحل
٣٤	 ضم الطوائف
٣٧	 التطريد
٤١	 تقسيم الطوائف
٤٣	 تربية الملكات
٤٧	 إعداد الطوائف لموسم الفيض
٤٩	 فرز العسل
٥٢	 وسائل غش العسل والتعرف عليها
٥٣	 التعرف على العسل المغشوش
٥٥	 دليلك الموسمي في تربية النحل