

جدول (١ - ١)

الاختبار	علمي	أدبي
التكرار f	6	4

ونرمز للتكرار بالحرف f .

ويسمى هذا الترتيب للمعلومات التي جمعناها توزيعاً تكرارياً. فهو يوضح كيف تتوزع الأجوبة العشرة بين الاختيارين المطروحين: علمي، أدبي.

مثال (١ - ٢)

يتضمن الجدول (١ - ٢) قياس مستوى الهيموغلوبين في الدم لتسعين عاملاً ممن يعيشون في مناطق ترتفع ارتفاعاً شاهقاً عن سطح البحر، والقياسات كما وردت في الجدول تمثل بياناً إحصائياً انتظمت فيه القياسات وفقاً لترتيب الحصول عليها أثناء إجراء البحث الإحصائي. فالقياس الأول 18.5 هو مستوى الهيموغلوبين عند أول عامل تناولته التجربة، والقياس الثاني 23.3 هو مستوى الهيموغلوبين عند العامل الثاني الذي تناولته التجربة، وهكذا. ولنفرض أن مما نهتم به في تجربة كهذه، معرفة نسبة العمال الذين يقل مستوى الهيموغلوبين لديهم عن 17. فسيكون الحصول على هذه النسبة من البيان الإحصائي الخام كما ورد في الجدول (١ - ٢)، أمراً يستهلك الكثير من الوقت والجهد. وأول ما يخطر بالبال هو تنظيم عرض هذه القياسات بحيث يسهل ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر. ولهذا الغرض يمكن إقامة جدول كالجدول (١ - ٣)، حيث وضعنا في العمود الأول أعداداً متسلسلة تمثل الرقمين الأولين لقياس (مبتدئين من اليسار) وفي العمود الثاني وضعنا الرقم الثالث (وهو الرقم الأخير) لكل قياس حذاء العدد المناسب، وبحيث تمتد، كما يوضح الجدول، في سطر أفقي، وذلك حسب ترتيب ورودها في البيان. وفي العمود الثالث وضعنا عدد القياسات التي انتظمت أو اصطفت في سطر واحد. وسنطلق على هذه العملية عملية تصفيف البيان الإحصائي الوارد في الجدول (١ - ٢).

جدول (١ - ٢) قياسات مستوى الهيموغلوبين في الدم لتسعين عاملاً

18.5	16.3	23.2	19.4	19.5	20.6	22.0	17.8	16.2
23.3	19.7	21.6	24.2	21.4	20.8	19.7	21.1	23.0
21.7	18.4	22.7	20.9	20.5	16.1	16.9	24.8	12.2
17.4	17.8	19.3	17.3	18.3	17.8	17.1	18.4	19.7
17.8	19.0	19.2	15.5	26.2	19.1	20.9	18.0	21.0
20.2	18.3	19.2	17.2	19.8	19.5	20.0	18.4	15.9
19.9	16.4	18.4	17.8	23.0	19.4	20.3	18.2	13.1
20.3	18.5	24.1	14.3	17.8	19.9	23.5	19.7	19.3
20.6	18.3	20.8	17.6	18.1	19.7	19.1	19.5	23.5
18.5	20.0	22.4	18.8	16.2	15.6	15.5	18.5	19.0

جدول (١ - ٣) تصنيف القياسات الواردة في الجدول (١ - ٢)

التعداد	الرقم الثالث	الرقمان الأول والثاني
1	2	12
1	1	13
1	3	14
4	5 6 5 9	15
6	8 4 2 1 9 2	16
11	4 8 8 3 2 8 6 8 8 1 8	17
15	5 5 4 3 5 3 4 8 3 1 4 0 4 2 5	18
21	9 7 0 3 2 2 4 5 8 1 5 4 9 7 7 1 7 5 7 3 0	19
12	2 3 6 0 8 9 5 6 8 9 0 3	20
5	7 6 4 1 0	21
3	7 4 0	22
6	3 2 0 5 0 5	23
3	1 2 8	24
0		25
1	2	26

ونلاحظ أن عملية التصنيف هذه هي ، في الواقع ، عملية فرز وتوزيع القياسات إلى فئات طول كل منها يساوي عشرة أمثال الواحد في المنزلة العشرية الأخيرة من قياسات البيان . أي أن طولها يساوي الواحد الصحيح إذا كانت القياسات معطاة لرقم عشري واحد وطولها واحد في العشرة ، إذا كانت القياسات معطاة لرقمين عشريين ،

وطولها عشر وحدات إذا كانت القياسات أعدادا صحيحة، وهكذا*.

وقد أصبح الجواب على التساؤل الذي طرحناه سهلا وميسورا، فنظرة إلى الجدول (١ - ٣) تبين أن ثلاثة عشر عاملا من بين التسعين عاملا، يقل مستوى الهيموغلوبين عندهم عن 17. وتكون النسبة المطلوبة $\frac{13}{90}$.

والجدير بالملاحظة أن كل ما خسرناه من المعلومات الواردة في البيان الأصلي (الخام) الوارد في الجدول (١ - ٢)، كنتيجة للتصنيف، هو الترتيب الزمني للحصول على القياسات. وقد لا يهمنا هذا في شيء أي أننا، عمليا، لم نخسر شيئا. ولكن وقفة تأمل هنا توضح لنا أن عملية التصنيف في بيانات تتضمن قياساتها أكثر من ثلاثة أرقام معنوية ستحتاج إلى جهود كبيرة، وكذلك ستكون الجهود كبيرة في حالة بيانات تتضمن عددا كبيرا من القياسات، مما يجعل التصنيف عملية غير رابحة في مثل تلك البيانات. فالجهود التي نبذلها في التصنيف قد لا تقل، بل قد تفوق، الجهود التي نحتاجها للإجابة على التساؤلات المطروحة مستخدمين البيان الأصلي مباشرة. وتبقى عملية التصنيف مقبولة فقط في بيانات من الحجم المتوسط، كالبيان المعطى في الجدول (١ - ٢) أو أصغر حجما، وفي مثل هذه البيانات، ونظرا لكبر عدد الفئات، تبقى إمكانية ظهور فئة خالية لا تتضمن أي قياس إمكانية قائمة، وهو أمر غير مستحسن.

وربما كان المثال السابق كافيا لتوضيح الفكرة التي نريد تقديمها، وهي أننا نحاول اختزال البيان الإحصائي الخام بطريقة تسمح لنا الإجابة عن تساؤلات، أو فهم نواح معينة مهمة من البيان الإحصائي، بسرعة وسهولة. وذلك لقاء فدية نقدمها، إذ نضحى ببعض المعلومات التي كان البيان الأصلي يوفرها لنا، ولكن البيان المختزل لم يعد قادرا على توفيرها. وستقدم الآن اتجاهها عاما ومفيدا لاختزال بيان إحصائي فيما يسمى بجداول التوزيع التكرارية.

* تسمى هذه الطريقة في التصنيف طريقة «الجدع والورقة»

مثال (١ - ٣)

قدمنا خمسين مستجدا من طلبة الجامعة اختبارا لقياس «حاصل الذكاء» وكانت درجاتهم كما يلي:

جدول (١ - ٤). قياسات حاصل الذكاء لخمسین مستجداً

97	110	105	96	109	94	108	117	107	110	82	99	93
116	126	124	108	90	118	116	124	114	101	112	120	113
110	101	103	115	107	102	123	106	105	106	120	100	107
119	120	112	92	103	88	104	97	101	109	105		

إذا قمنا بتصنيف قياسات هذا البيان فسنجد الجدول (١ - ٥).

جدول (١ - ٥). تصنيف القياسات الواردة في الجدول (١ - ٤)

الرقمان الأول والثاني	الرقم الأخير	التعداد
08	2 8	2
09	3 9 4 6 7 0 7 2	8
10	7 8 9 5 1 8 7 0 6 5 6 2 7 3 1 5 9 1 4 3	20
11	0 7 0 3 2 4 6 8 6 5 0 2 9	13
12	0 4 4 6 0 3 0	7

توزعت القياسات على الفئات الخمس في الجدول (١ - ٥) فكان نصيب الفئة الأولى 2، وهي تتضمن جميع القياسات التي تنتمي إلى الفترة (80, 90)، وكان نصيب الفئة الثانية 8، وهي تتضمن جميع قياسات البيان الإحصائي التي تنتمي إلى الفترة (90, 100). وكان نصيب الفئة الثالثة 20، وهي تتضمن جميع قياسات البيان التي تنتمي إلى الفترة (100, 110). وكان نصيب الفئة الرابعة 13، وهي تتضمن جميع قياسات البيان التي تنتمي إلى الفترة (110, 120). وكان نصيب الفئة الخامسة والأخيرة 7، وهي تتضمن جميع قياسات البيان الإحصائي التي تنتمي إلى الفترة (120, 130).

بصورة عامة، لماذا لا نختار طول الفئة وبالتالي عدد الفئات بالشكل الذي نراه مناسباً للحالة المدروسة بدلاً من أن تُفرض علينا كما هو الحال هنا؟ ولماذا لا نزيد من مقدار التضحية بمعلومات البيان الأصلي، ذات النفع البسيط للنواحي التي يتركز عليها اهتمامنا لقاء مزيد من توفير الجهود وسهولة العرض والحساب؟ فنحن مثلاً قد لا نحتاج إلى الاحتفاظ بمفردات البيان الإحصائي، وإنما يقتصر اهتمامنا على معرفة كيفية توزيعها على فئات نحددها سلفاً تحديداً لا لبس فيه.

وإن أول ما تجدر معرفته هو مدى تغير القياسات في البيان الإحصائي. وباستعراض بسيط للقياسات نجد أن أصغر قياس هو 82، وأن أكبر قياس هو 126. ونقول إن مدى البيان الإحصائي هو الفرق بين أكبر قياس وأصغر قياس فيه، أي:

$$\text{المدى} = 126 - 82 = 44$$

لنقسم هذا المدى إلى عدد من الفئات نختاره بصورة كيفية. ولنأخذ هنا، مثلاً، تسع فئات طول كل منها خمسة، فتكون الفئات كما يلي:

$$82 - 86, 87 - 91, 92 - 96, \dots, 117 - 121, 122 - 126$$

ولنرتب جدولاً مثل الجدول (١ - ٦). حيث نضع في العمود الأول حدود الفئات، وفي العمود الثاني، وسميناه عمود الفرز، نضع حذاء الفئة خطأ مائلاً في مقابل كل قياس في البيان ينتمي إلى هذه الفئة. ولسهولة التعداد تظهر كل حزمة من خمسة خطوط على حدة، ويقطع الخط الخامس الخطوط الأربعة السابقة له. ويسمى عدد القياسات التي تنتمي إلى الفئة i ، مثلاً، تكرار الفئة i ، ونرمز له عادة بـ f_i . (تكرار الفئة الأولى، f_1 ، تكرار الفئة الثانية، . . . ، وهكذا). وتظهر هذه التكرارات في العمود الثالث، وهي ناتجة عن تعداد الخطوط المقابلة للفئة في عمود الفرز. ونجد في العمود الرابع، التكرار النسبي، وهو يساوي التكرار مقسوماً على العدد الكلي للقياسات $n = 50$. ونلاحظ أن مجموع عمود التكرار يجب أن يساوي 50، وأن مجموع عمود التكرار النسبي يجب أن

يساوي الواحد تماما . وإذا كان عمود التكرار يعطي عدد القياسات في البيان الإحصائي التي تنتمي إلى الفئة المقابلة فإن عمود التكرار النسبي هو تعبير آخر عن الفكرة نفسها، إذ يُقدّم ذلك العدد على شكل نسبي (منسوبا إلى عدد القياسات الكلي) وسنلمس فيما بعد فائدة التعبير عن التكرار بالشكل النسبي .

جدول (١ - ٦) . التوزيع التكراري لقياسات حاصل الذكاء لخمسين مستجدا

حدود الفئات	الفرز	التكرار f_i	التكرار النسبي
82 - 86	/	1	1/50
87 - 91	//	2	2/50
92 - 96	///	4	4/50
97 - 101	/// //	7	7/50
102 - 106	/// ///	9	9/50
107 - 111	/// ////	10	10/50
112 - 116	/// //	7	7/50
117 - 121	//// /	6	6/50
122 - 126	////	4	4/50
المجموع		50	1

وترتيب القياسات كما في الجدول (١ - ٦) يسمى توزيعا تكراريا للقياسات . وبصورة عامة، التوزيع التكراري هو أي ترتيب للبيان الإحصائي يظهر توزع قياساته على فترات معرفة بصورة اختيارية تسمى «فئات» .

وقد اختيرت الفئات بصورة كيفية . ومن أجل البيان الإحصائي نفسه يمكن أن يختلف جدول التوزيع التكراري باختلاف تعريف الفئات وعددها، وليس هناك جدول يمكن القول إنه صحيح وما عداه من الجداول التي كان يمكن الوصول إليها غير

صحيحة ، ولكن بعض هذه الجداول أفضل من بعض من حيث مقدرتها على تبيان النواحي المهمة في البيان الإحصائي دون الاحتفاظ بكثير من التفاصيل .

وبصورة عامة ، يستحسن ألا يقل عدد الفئات عن خمس ولا يزيد على عشرين ، تفادياً لظهور فئات خالية عند استكمال عملية الفرز، ذلك لأننا قد نخسر أكثر مما يجب من المعلومات إذا قل عدد الفئات عن خمس ، وقد نحتفظ بها لا ضرورة له من التفاصيل عندما يزيد عدد الفئات على عشرين .

ويجب تعريف حدود الفئات بصورة واضحة لا تترك أي لبس في عملية الفرز، وتضمن انتهاء كل قياس في البيان الإحصائي إلى فئة واحدة وواحدة فقط .

(١ - ٢) أنواع البيانات الإحصائية

تنقسم البيانات الإحصائية العددية إلى نوعين ، أحدهما منفصل وتكون قياساته ناتجة عن عملية عد أو تعداد ، مثل عدد حوادث المرور اليومي خلال فترة زمنية محددة ، أو العدد السنوي لحالات الولادة ، أو الزواج ، أو الوفاة ، أو الطلاق ، في بلد معين ، وتكون مثل هذه القياسات ، دائما ، أعدادا صحيحة . والنوع الآخر هو النوع المتصل (أو المستمر) ، وتكون قياساته ناتجة عن استخدام جهاز أو أداة للقياس ، مثل بيانات تتضمن قياسات طول ، أو وزن ، أو درجة حرارة ، أو مستوى التحصيل الدراسي ، أو حاصل الذكاء ، الخ .

وفي البيانات المستمرة ، نفهم من العدد المقدم لنا شيئين ، أولهما تصور عن مقدار الشيء المقيس ، وثانيهما درجة الدقة التي سمح بها جهاز القياس المستخدم . والقول بأن طول شخص هو 167.5 سم ، يعطينا فكرة عن ارتفاع قامته الشخص ، ويعطينا أيضا أن القياس جرى بدقة تصل إلى أقرب ملليمتر . أي أن آخر رقم معطى على اليمين ، هو رقم مشكوك فيه . ولو أننا استخدمنا جهازا أكثر دقة ، لحصلنا على قياس واقع في مكان ما بين 167.45 و 167.549 . وأينما وقع هذا القياس فسيؤدي التدوير إلى الرقم العشري

الأول إلى العدد 167.5 سم . وللسهولة جرت العادة على القول بأن عددا مثل 167.5 سم يعني أي شيء بين 167.45 و 167.55 سم .

ولأسباب عدة، نأخذ في الغالب، الحدود المضبوطة للفئة بعين الاعتبار، ونسميها «الحدود الحقيقية للفئة» أو «نهاية الفئة». لنأخذ الفئة 86 - 82 في الجدول (١ - ٦)، فالقياس 82 يعني أي شيء بين 81.5 و 82.5، ويعني الـ 86، أي شيء بين 85.5 و 86.5. وهكذا يتراوح المدى الحقيقي للفئة بين 81.5 و 86.5. ويسمى هذان العددان «الحدان الحقيقيان للفئة» أو «نهاية الفئة». وتجدر ملاحظة أن تطابق نهاية فئة مع بداية الفئة التي تليها، لا يؤدي إلى أي التباس في عملية الفرز، فالعدد 86.5 الذي يشكل حدا أعلى للفئة الأولى وحدا أدنى للفئة الثانية لا يمكن أن يظهر كقياس في البيان الاحصائي الأصلي ما دامت القياسات جميعها أعدادا صحيحة.

وهناك طرق أخرى يمكن استخدامها للتعبير عن حدود الفئة فمثلا يمكن، في المثال (١ - ٢ - ٣)، كتابة الفئات على الشكل:

82-, 87-, 92-, 97-, 102-, 107-, 112-, 117-, 122-

ونقصد بـ 82- جميع الأعداد الواقعة ضمن الفترة (82-87)، أي الأعداد بدءا من 82 إلى أقل من 87، وهكذا.

أو يمكن كتابتها على الشكل:

-87, -92, -97, -102, -107, -112, -117, -122, -127

ونقصد بـ 92- جميع الأعداد الواقعة ضمن الفترة (87-92)، أي الأعداد بدءا من 87 إلى أقل من 92. وهكذا.

وسنستخدم في هذا الكتاب الحدود الحقيقية للفئات في جميع البيانات سواء أكانت مستمرة أم منفصلة. واستخدامها في البيانات المنفصلة يضمن استمرارية

الأشكال التي تمثل الجدول التكراري بيانيا كما سنرى في الفقرة التالية، وهذا أمر مستحسن. كما سنستفيد منه في أكثر من مكان في الفصول المقبلة.

ونلاحظ بوضوح أن طول الفئة مساو للفرق بين حديها الحقيقيين. أما مركز الفئة فهو منتصف المسافة بين حديها، ولحساب قيمته نأخذ نصف مجموع الحدين، ولو استخدمنا الحدود (87-82)، [87-92] الخ. فإن مركز الفئة الأولى سيكون 84.5 والثانية 89.5 الخ. وعند استخدام الحدود الحقيقية [81.5-86.5]، [86.5-91.5] الخ. فإن مركز الفئة الأولى سيكون 84 والثانية 89 الخ. واستخدام الحدود الحقيقية إلى جانب أنه يعالج مشكلة وجود فراغات بين الفئات المتتالية ويضمن تطابق نهاية فئة مع بداية الفئة التي تليها بطريقة منطقية وعادلة، فإنه يؤدي أيضا إلى حسابات أكثر دقة بصورة عامة.

وإذا أضفنا طول الفئة إلى مركز الفئة الأولى حصلنا على مركز الفئة الثانية التي تليها وهكذا. وسنتصور وجود فئة على يسار الفئة الأولى، وبالطبع سيكون تكرارها مساويا للصفر ولذلك سنسميها الفئة الصفرية على اليسار، كما سنتصور وجود فئة على يمين الفئة الأخيرة، وبما أن تكرارها صفر فنسُميها أيضا الفئة الصفرية على اليمين.

ولقد ذكرنا أن تصنيف القياسات في فئات، يهدف إلى تيسير عرض البيانات، وسهولة القيام بحساب معايير إحصائية مفيدة في وصف وتحليل البيان الإحصائي، واستنتاج معلومات عامة منه. وننتقل في هذا من نوعين من الافتراضات المتعلقة بكيفية توزيع القياسات ضمن الفئة الواحدة.

(i) عند حساب بعض المعايير الإحصائية، أو عند استخدام الطرق البيانية لعرض معلومات إحصائية، نفترض أن القياسات الواقعة ضمن فئة واحدة تتوزع بانتظام على الفترة الممتدة بين نهايتي الفئة. وفي الجدول (١ - ٦)، مثلا، ينتمي عشر قياسات إلى الفئة 107-111. والفترة الممتدة بين نهايتي الفئة هي الفترة (106.5, 111.5). ونفترض أن القياسات العشرة تتوزع بانتظام فوق الوحدات الخمس التي تتألف منها الفئة. أي نفترض، كما يبين الجدول (١ - ٧)، قياسين بين 106.5 و 107.5، وقياسين بين 107.5 و 108.5، الخ.

جدول (١ - ٧). توزع القياسات بانتظام ضمن الفئة الواحدة

الفئة الجزئية	106.5-107.5	107.5-108.5	108.5-109.5	109.5-110.5	110.5-111.5
التكرار	2	2	2	2	2

(ii) والافتراض الثاني الذي نستخدمه عند حساب بعض المعايير الإحصائية هو اعتبار مركز كل فئة ممثلاً لجميع القياسات التي تنتمي إليها، أي نفترض أن كل قياس من القياسات التي تنتمي إلى فئة مساوٍ لمركز الفئة.

والجدير بالذكر أن هناك بيانات إحصائية غير عديدة تتضمن أصنافاً معبراً عنها على شكل كلمات وصفية أو رموز، (علمي، أدبي)، (ذكر، أنثى)، (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف) وبحيث ينتمي كل عنصر يخضع للتصنيف إلى صنف واحد منها فقط. ومثل هذه البيانات تسمى بيانات وصفية. وإذا أمكن تعريف ترتيب على هذه الأصناف أو الرموز يسمى البيان عندئذ بياناً ترتيبياً. فمثلاً، يمكن القول أن «ممتاز» يمثل الصنف الأعلى يليه «جيد جداً» يليه «جيد» إلخ. مما يجعل أي بيان يتضمن تقديرات ممتاز... إلى ضعيف بياناً ترتيبياً. ونلاحظ أن ذلك غير ممكن في التصنيف (علمي، أدبي) أو (ذكر، أنثى).


(١ - ٣) التمثيل البياني لتوزيع تكراري

يقدم لنا التمثيل البياني للمعلومات الإحصائية عوناً كبيراً، فهو يسمح بإدراك الخواص الأساسية للتوزيع التكراري، ومقارنة توزيع تكراري بآخر. والتمثيل البياني هو صورة هندسية لجملة القياسات. وفي العديد من الحالات يسهل رد مجموعة المعلومات الرقمية إلى صورة هندسية، فهم طبيعة المسألة الإحصائية، واستنباط الحلول المناسبة لها. وقد أصبح التمثيل البياني ممارسة شبه يومية في حياتنا. فالصحف والمجلات، والنشرات التجارية، وتقارير الأعمال والمشاريع، والدوريات العلمية المختلفة،

والتقارير الحكومية، تستخدم جميعها، وعلى نطاق واسع، التمثيل البياني. وهناك تفرعات كثيرة لوسائل التعبير البياني عن جملة من المعلومات الإحصائية، وسنقتصر هنا على ذكر أكثرها أهمية وفائدة في مجالات الاستقراء الإحصائي. ويمكن لمن أراد الاستزادة العودة إلى بعض المراجع المذكورة في نهاية الكتاب.

(١-٣-١) المدرج التكراري

لرسم المدرج التكراري، نتخذ المحور الإحداثي السيني لتمثيل الفئات، ونحدد عليه النقاط التي تمثل نهايات الفئات (حدودها الحقيقية). ونتخذ المحور الإحداثي الصادي لتمثيل التكرار f_i . ثم نرسم فوق الفترة الممتدة بين نهايتي كل فئة مستطيلاً يرتفع بمقدار التكرار المقابل لهذه الفئة. ونجد في الشكل (١-١) المدرج التكراري الموافق للتوزيع التكراري المعطى في الجدول (١-٦).



شكل (١-١). مدرج التكرار ومضلع التكرار لقياسات حاصل الذكاء لخمسين مستجدا

وتمثل المساحة تحت مدرج التكرار نوعاً من أنواع التمثيل الهندسي لجملة القياسات في البيان الإحصائي. فإذا نظرنا إلى تكرار كل فئة بأنه مساهمة الفئة في تركيبة

البيان الإحصائي، إذا جاز التعبير، فإن مساحة المستطيل المقام فوق الفئة يتناسب مع هذه المساحة. وكلما كان التكرار أكبر ارتفع المستطيل وزادت مساحته. ولو تساؤنا في المثال (١ - ٣) عن نسبة الطلبة الذين نالوا درجات أعلى من 111.5 لوجدنا أن هذه النسبة تساوي نسبة المساحة تحت مدرج التكرار الواقعة على اليمين من 111.5 (وهي مساحة المستطيلات الثلاثة الأخيرة المظللة في الشكل (١ - ١) إلى المساحة الكلية تحت مدرج التكرار. وما دامت الفئات جميعها بالطول نفسه، أي ما دامت قواعد المستطيلات المرسومة متساوية وتبقى ثابتة من فئة إلى أخرى، فإن مساحة كل مستطيل تتناسب مع ارتفاعه (مع تكرار الفئة) ونسبة المساحة المظللة إلى المساحة الكلية هي في الواقع نسبة مجموع التكرارات الموافقة للفئات الثلاث الأخيرة إلى العدد الكلي للقياسات، أي $\frac{17}{50}$ أو 34% وهي النسبة المطلوبة بالضبط.

ويمكن اللجوء إلى هذا المبدأ في تمثيل المدرج التكراري سواء أكانت أطوال الفئات متساوية أم لا. ففي حالة رسم مدرج تكراري لتوزيع تكراري لا تتساوى فيه أطوال الفئات، إما كنتيجة لطبيعة التفاصيل التي رؤي أن يحتفظ بها الجدول التكراري، أو نتيجة لدمج عدة فئات، تكراراتها صغيرة نسبياً، بعضها مع بعض لتشكل فئة واحدة؛ لا بد من القيام بتعديلات مناسبة تأخذ في الاعتبار أطوال الفئات، وتجعل المساحة المقامة فوق فئة، متناسبة مع تكرار هذه الفئة. ويكون رسم مستطيلات ارتفاعاتها مساوية لتكرار الفئة غير صحيح. وبذلك نتجنب رسم مدرج تكرار يعطي انطباعات مضللة إلى حد بعيد. ونوضح الفكرة وطريقة العمل من خلال المثال التالي.


مثال (١ - ٤)

فيما يلي جدول توزيع تكراري لأوزان 35 فأراً مقاسة إلى أقرب غرام. ارسم المدرج التكراري.

الرسم مبين في الشكل (١ - ٢) حيث عدلنا في ارتفاع المستطيل المقام فوق كل فئة بحيث نحفظ تناسب المساحة المرسومة فوق الفئة مع التكرار الموافق، والفئة الثانية والخامسة لهما أطوال مضاعفة ولذلك رسمنا فوق كل منها مستطيلاً ارتفاعه يساوي

جدول (١ - ٨): التوزيع التكراري لأوزان 35 فأرا

حدود الفئات	370-379	380-399	400-409	410-419	420-439
التكرار	1	8	9	11	6



شكل (١ - ٢). المدرج التكراري لأوزان 35 فأرا

نصف التكرار الموافق للفئة (4 في الفئة الثانية و 3 في الفئة الخامسة). إن المساحة الكلية للمدرج هي:


$$10 \times 1 + 20 \times 4 + 10 \times 9 + 10 \times 11 + 20 \times 3 = 350$$

ونسبة مساحة المستطيل الموافق لكل فئة إلى المساحة الكلية تساوي تماما نسبة تكرار الفئة إلى مجموع التكرارات. فمثلا نسبة مساحة المستطيل الثاني إلى المساحة الكلية هي $\frac{80}{350}$ وهي تساوي $\frac{8}{35}$.

(١-٣-٢) مدرج التكرار النسبي

لا تختلف طريقة رسم مدرج التكرار النسبي عن مدرج التكرار سوى أن المستطيل الموافق لكل فئة يرتفع الآن بما يساوي التكرار النسبي للفئة. ولكي نحافظ على ارتفاع ووضوح مناسبين للصورة الناتجة، لا بد أن تكون وحدة الطول على المحور الصادي أكبر بصورة مناسبة مما كانت عليه على المحور الصادي لمدرج التكرار. ولو كان لدينا n قياسا، وكبرنا وحدة الطول على المحور الصادي n مرة، لحصلنا على صورة لمدرج التكرار النسبي مطابقة تماما لصورة مدرج التكرار. وكل ما في الأمر أن التدرج 1 على المحور الرأسي أصبح الآن $\frac{1}{n}$ ، والتدرج 2 أصبح $\frac{2}{n}$ ، وهكذا. ونجد في الشكل (١-٣) مدرج التكرار النسبي لقياسات حاصل الذكاء لخمسين مستجدا.

تجدر ملاحظة أنه ليس من الضروري، عند رسم شكل بياني، أن تكون وحدة الأطوال نفسها على المحورين. وتتخذ وحدة الطول على كل من المحورين لتشغل الصورة الناتجة الحيز المخصص لها، وتتخذ موقعا مناسباً في الاتجاهين الأفقي والرأسي،



شكل (١-٣). مدرج التكرار النسبي لقياسات حاصل الذكاء لخمسين مستجدا

تماما كما نأخذ الصورة المخرجة في التلفزيون موقعها على الشاشة المخصصة لها، فلا هي منحازة إلى يمين الشاشة ولا إلى يسارها، ولا هي مرتفعة أو منخفضة أكثر مما ينبغي. وتكبير وحدة الطول على المحور السيني يؤدي إلى توسيع الصورة في الاتجاه الأفقي يمينا ويسارا. وتكبير وحدة الطول على المحور الصادي يؤدي إلى تمدد الصورة في الاتجاه الرأسي علوا وهبوطا. وأفضل ترتيب لوحدي الطول هاتين، هو ذلك الذي يكفل وضوح الصورة، ويخرجها بحيث تشغل الحيز المخصص لها بشكل مناسب.

ويبقى هذا كله صحيحا في حالة فئات غير متساوية أيضا، فصورة مدرج التكرار النسبي تتطابق مع صورة مدرج التكرار عندما نجعل التدرج 1 على المحور الصادي مساويا $1/n$ ، والتدرج 2 مساويا $2/n$ ، وهكذا. والشكل (١ - ٢)، يصبح صورة لمدرج التكرار النسبي للتوزيع التكراري لأوزان 35 فأرا المعطى في الجدول (١ - ٨)، إذا اعتبرنا التدرج 1 على المحور الصادي مساويا الآن لـ $1/35$ والتدرج 2 مساويا لـ $2/35$ ، إلخ.

ومع أن اهتمامنا المباشر، في المثال (١ - ٣)، ينصب على وصف القياسات الخمسين، إلا أننا نهتم أكثر بالمجتمع الذي أخذنا منه هذه القياسات. ويمكن النظر إلى القياسات الخمسين كعينة مأخوذة من مجتمع طلبة السنة الأولى في جامعة أو عدد من الجامعات. وفي جميع الأحوال، لو توفرت لنا قياسات حاصل الذكاء لعناصر المجتمع كلها، لأمكن، بالطريقة ذاتها، إقامة المدرج التكراري للمجتمع.

لندرس الآن مدرج التكرار النسبي في الشكل (١ - ٣) بتفصيل أكثر. فلو افترضنا أن طول الفئة (وهي تساوي خمس وحدات) أصبحت وحدة قياس جديدة، أي أن طول الفئة بالوحدة الجديدة هو الواحد، فستصبح مساحة المستطيل المقام فوق الفئة مساوية للتكرار النسبي الموافق لهذه الفئة، وستصبح المساحة الكلية تحت مدرج التكرار النسبي مساوية للواحد تماما. ولنسأل الآن، ما هي نسبة الطلاب الذين يزيد حاصل ذكائهم على 111.5 مثلا؟ بالعودة إلى مدرج التكرار النسبي نرى أن هذه النسبة تشمل كل الفئات على اليمين من 111.5. وبالاستفادة من الجدول (١ - ٦) نرى أن

سبعة عشر مستجدا حصلوا على أكثر من 111.5. أي أن النسبة المطلوبة هي 17/50 أو 34%. ونلاحظ أن هذه النسبة هي أيضا المساحة تحت مدرج التكرار النسبي في الشكل (١ - ٣) التي تقع على يمين 111.5.

(١ - ٣ - ٣) مضلع التكرار

نأخذ منتصفات القواعد العليا للمستطيلات في مدرج التكرار، ونصل بينها بخطوط مستقيمة، فنحصل على ما يسمى بمضلع التكرار، أي أننا لو حددنا من أجل كل فئة نقطة إحداثيها السيني هو مركز الفئة، وإحداثيها الصادي هو تكرار الفئة، ثم وصلنا بين هذه النقاط بقطع مستقيمة لحصلنا على مضلع التكرار. ويمكن رسم مدرج التكرار ومضلع التكرار على الشكل نفسه، أو في شكلين منفصلين. ونجد في الشكل (١ - ١) مضلع التكرار للتوزيع التكراري في الجدول (١ - ٦).

ويمكن إغلاق مضلع التكرار على الجانبين بوصل أول نقطة منه بمركز الفئة الصفريّة على اليسار، ووصل آخر نقطة منه بمركز الفئة الصفريّة على اليمين. (انظر الشكل (١ - ١) حيث رسمنا هاتين الوصلتين بخط منقط.)

ونلاحظ وجود فرق بسيط بين المساحة تحت مضلع التكرار والمساحة تحت مدرج التكرار ويتناقص هذا الفرق كلما ازداد عدد الفئات وصغر طول الفئة. هذا بصورة عامة، أما إذا كانت أطوال الفئات متساوية فالمساحتان متساويتان.

(١ - ٤) مضلع التكرار المتجمع الصاعد

من الخصائص المهمة للبيان الإحصائي معرفة العدد الذي تقل عنه نسبة معينة من القياسات، أو معرفة النسبة من القياسات التي تقل عن قيمة معينة، أو نسبة القياسات التي تتجاوز قيمة معينة. ففي بيان من الدرجات في مسابقة عامة، يمكن أن نعتبر العدد الذي يقل عنه تسعون بالمائة من القياسات الحد الفاصل بين تقدير الممتاز وما دون الممتاز. وفي بيان يمثل مستويات الهيموغلوبين في الدم تمثل نسبة القياسات، التي تقل عن قيمة معينة، نسبة المصابين بفقر الدم. وفي بيان يمثل

معدلات التوتر الشرياني (ضغط الدم) تمثل نسبة القياسات التي تزيد على قيمة معينة نسبة المصابين بمرض فرط التوتر الشرياني (ارتفاع معدل ضغط الدم).


لنعد إلى الجدول (١ - ٦) فما هو العدد الذي يقل عنه خمسون بالمائة من القياسات؟ أو ما هي النقطة التي يقع إلى اليسار منها خمس وعشرون بالمائة من القياسات؟ أو ما هي نسبة القياسات التي تقل عن 101.5؟ إلخ.

وللجواب على مثل هذه التساؤلات، بصورة تقريبية وسريعة، نقيم جدول التكرار المتجمع الصاعد كما في الجدول (١ - ٩)، حيث نضع في العمود الأول، وعنوانه «أقل من»، الحدود الحقيقية العليا للفئات، ونضع في العمود الثاني، وعنوانه «التكرار المتجمع الصاعد» عدد القياسات الموافق.

جدول (١ - ٩). جدول التكرار المتجمع الصاعد لقياسات حاصل الذكاء لخمسين مستجدا

أقل من	التكرار المتجمع الصاعد
86.5	1
91.5	3
96.5	7
101.5	14
106.5	23
111.5	33
116.5	40
121.5	46
126.5	50

ولتمثيل الجدول بيانيا نعتمد المحور السيني محورا للقياسات، والمحور الصادي محورا للتكرار المتجمع الصاعد. ونرسم لكل فئة نقطة في مستوى الإحداثيات، إحداثيها السيني هو الحد الأعلى الحقيقي للفئة، وإحداثيها الصادي هو التكرار المتجمع الصاعد المقابل. ثم نصل بين النقاط الناتجة المتتالية بقطع مستقيمة فنحصل على مضعل يدعى «مضعل التكرار المتجمع الصاعد». (انظر الشكل (١ - ٤)).



شكل (١ - ٤). مضع التكرار المتجمع الصاعد لقياسات حاصل الذكاء لخمسين مستجدا

وبالطريقة نفسها يمكن رسم مضع التكرار النسبي المتجمع الصاعد وذلك باستخدام المحور الصادي لتمثيل التكرارات النسبية المتجمعة . ولو أن العمود الأول في الجدول (١ - ٩) تضمن الحدود الحقيقية الدنيا للفئات وكان عنوانه «أكثر من» حصلنا على جدول تكرار متجمع نازل ، ورسمه البياني بالطريقة السالفة ذاتها سيعطي مضع التكرار المتجمع النازل . وستترك ذلك تمرينا للطالب .

ولإيجاد القياس الذي يقع على اليسار منه 50% من القياسات ، نحسب أولا رتبة القياس المطلوب $n \times \frac{50}{100}$ ، حيث n عدد القياسات ، فنجد :

$$\text{رتبة القياس المطلوب} = 50 \times \frac{50}{100} = 25$$

أي أن القياس المطلوب ينتمي إلى الفترة [106.5, 111.5].

وسنحسب القياس المطلوب مفترضين أن القياسات التي تنتمي إلى فئة تتوزع بانتظام فوق الفترة التي تمتد بين نهايتي الفئة، أو بعبارة أعم مفترضين أن العلاقة بين القياس والتكرار فوق الفترة [106.5, 111.5] هي علاقة خطية تتمثل في معادلة المستقيم الواصل بين النقطتين A و B .

من تشابه المثلثين ABC و ADE نجد:

$$\frac{AE}{AC} = \frac{ED}{CB}$$

$$\frac{AE}{5} = \frac{2}{10}$$

$$AE = \frac{5 \times 2}{10} = 1$$

ويكون القياس المطلوب، وهو الاحداثي السيني للنقطة D ، مساويا للإحداثي السيني لـ A مضافا إليه AE ، وهكذا نجد:


$$\text{القياس المطلوب} = 106.5 + 1 = 107.5$$

ويمكن القيام بهذه الحسابات معتمدين على جدول التكرار المتجمع الصاعد، ودون الحاجة إلى رسم مضع التكرار، حيث نتبع المحاكمة التالية:

نرى من جدول التكرار المتجمع الصاعد أن 23 قياسا من القياسات الخمسين أقل من 106.5، وأن 33 قياسا أقل من 111.5. وبتطبيق التناسب الطردي نقول إنه عندما زاد التكرار المتجمع بمقدار 10، (من 23 إلى 33) زاد القياس بمقدار 5، (من 106.5 إلى 111.5). فما هي قيمة الزيادة في القياس عندما يزداد التكرار المتجمع بمقدار 2 فقط (من 23 إلى 25)؟

زيادة التكرار المتجمع

زيادة القياس



$$(الزيادة المطلوبة في القياس) \quad x = \frac{2 \times 5}{10} = 1$$

ويكون القياس المطلوب :

$$106.5 + 1 = 107.5$$

وإذا توفر ورق ميليمتري نرسم عليه مضلع التكرار المتجمع الصاعد، فيمكن استخدام الرسم البياني لإيجاد القياس المطلوب، وهذا القياس ليس إلا الإحداثي السيني لنقطة على مضلع التكرار المتجمع الصاعد إحداثيها الصادي 25 . ولذلك نرسم من النقطة 25 على المحور الصادي خطاً أفقياً يقطع مضلع التكرار المتجمع الصاعد في نقطة ننزل منها عموداً على المحور السيني فيقطعه في النقطة المطلوبة، وهي على الشكل (٤ - ١) حوالي 107.5 .


وسنجد فيما بعد أن هذا القياس يسمى الوسيط . وقد لخصنا هنا الطريقتين الحسابية والبيانية للحصول على الوسيط . ومن الواضح أنه يمكن تطبيق الطريقة نفسها لحساب القياس الذي يقع على اليسار منه 25% من القياسات، وبصورة عامة القياس الذي يقع على اليسار منه p بالمائة من القياسات، حيث p أي عدد بين الصفر والمائة، ويسمى مثل هذا القياس المئين p .

ولعرفة نسبة القياسات التي تقل عن 101.5، مثلاً، نرفع من النقطة 101.5 على المحور السني عموداً يقطع مضلع التكرار المتجمع في نقطة نرسم منها موازياً للمحور السيني فيقطع المحور الصادي في النقطة 14، وتكون النسبة المطلوبة $28\% = \frac{14}{50}$.

(١ - ٥) منحني التكرار

لنعد إلى مضع الكرار في الفقرة (١ - ٣ - ٣). ولنفترض أننا صغرنا طول الفئة إلى نصف ما هو عليه. أي ضاعفنا عدد الفئات، ثم رسمنا مضعاً تكرارياً، فسيضعف عندئذ عدد رؤوس هذا المضع، وستترب رؤوس المضع بعضها من بعض. ولكن العدد البسيط من القياسات لا يسمح لنا بالمضي في مثل هذه العملية، لأنه قد يترك العديد من الفئات خالية وتكرارها صفر، مما يصيب المضع بانقطاعات في أكثر من مكان، الأمر الذي لا يخلق كثيراً عندما يصف المضع التكراري «مجتمعا» يتضمن عددا هائلا من القياسات. فلتتصور إذا، أن لدينا معينا لا ينضب من القياسات، أي لتتصور ظرفاً يمكننا معه جعل طول الفئة أصغر فأصغر، وفي الوقت ذاته، زيادة عدد القياسات التي تخضع للتصنيف لتصبح أكبر فأكبر، ولندفع الآن مثل هذا التصور إلى نهاياته القصوى ليصبح طول الفئة صغيراً بلا حدود، ويصبح معه عدد القياسات الكلي كبيراً بلا حدود، فنصل عندئذ إلى خط ناعم مستمر، لا انكسارات فيه ولا زوايا، يسمى منحني التكرار. وعندئذ يقابل كل قياس على المحور السيني إحداثي صادي يتناسب مع تواتر ظهور هذا القياس في المجتمع الذي يصفه منحني التكرار.

ولنفرض، على سبيل المثال، أن منحني التكرار في الشكل (١ - ٥) يصف ظاهرة توزع الطول في مجتمع من الذكور البالغين يتضمن عشرات الملايين، فالإحداثي الصادي للنقطة 170 سم، مثلاً، يمثل أو يتناسب مع تواتر ظهور الطول 170 سم في هذا المجتمع. وبصورة عامة، نعتمد منحنيات التكرار كنماذج رياضية (نظرية) لتمثيل ظواهر عامة في حياتنا العملية. وعلى سبيل المثال، سنعرض فيما يلي إحصائيات (Kendall and Stuart, 1977) لثلاث ظواهر مختلفة تتناول عدداً كبيراً من الأفراد. وسنجد أن مضع التكرار لكل ظاهرة يوحي بشكل معين لمنحني التكرار (أو النموذج) الذي يمكن اعتماده لوصف هذه الظاهرة. وستعرف في الفصل الرابع وما بعده على ما نقصده بكلمة «نموذج»، والدور الذي تلعبه النماذج في التطبيقات العملية للإحصاء.



شكل (١ - ٥). منحني التكرار لتوزيع الطول في مجتمع من الذكور البالغين


يبين الجدول (١ - ١٠) توزيع التكرار لأطوال 8585 ذكرا بالغا ممن ولدوا في المملكة المتحدة. وباعتبار أن دقة القياس كانت إلى أقرب $\frac{1}{8}$ من البوصة، فالحدود الحقيقية للفئات هي من $56\frac{15}{16} - 57\frac{15}{16}$ ، $57\frac{15}{16} - 58\frac{15}{16}$ ، وهكذا . . .

جدول (١ - ١٠). التوزيع التكراري لـ 8585 ذكرا بالغا ممن ولدوا في المملكة المتحدة

الطول (بدون حذاء)	التكرار	الطول (بدون حذاء)	التكرار
57 -	2	68 -	1230
58 -	4	69 -	1063
59 -	14	70 -	646
60 -	41	71 -	392
61 -	83	72 -	202
62 -	169	73 -	79
63 -	394	74 -	32
64 -	669	75 -	16
65 -	990	76 -	5
66 -	1223	77 -	2
67 -	1329		

مجموع التكرارات = 8585

وفي الشكل (١-٦) نجد مضلع التكرار، ومن الواضح أن هذا المضلع يقترح بقوة أن نموذجا على شكل الجرس (انظر الشكل (١-٥)) هو النموذج المناسب لتمثيل ظاهرة توزيع الطول في مجتمع من الذكور البالغين في بيئة معينة.



شكل (١-٦). مضلع التكرار للبيان الإحصائي في الجدول (١-١٠)
(القيم على محور السينات هي بدايات الفئات)


يبين الجدول (١-١١) توزيع التكرار لـ 301785 عقد زواج في استراليا بين 1907 و 1914، مصنفة وفقا لعمر العروس في فئات طول كل منها 3 سنوات.

والمضلع التكراري يقترح بوضوح نموذجا يعرف بنموذج «جاما» وهو منحنى تكرار غير متماثل يتزايد بسرعة إلى قمة ثم ينحدر منها بسرعة (سرعة التزايد وسرعة الانحدار تختلف من حالة إلى أخرى) ليتهادى بعد ذلك متناقصا باطراد تناقصا بطيئا مقتربا من محور السينات. ونقول عن نموذج كهذا أنه ملتو إلى اليمين أو موجب الالتواء [انظر الشكل (١-٧)]. ونجد في الشكل (١-٨) منحنى تكرار من النوع «جاما».


جدول (١ - ١١). التوزيع التكراري لـ 301785 عقد زواج في استراليا مصنفة وفق عمر العروس .

التكرار	مركز الفئات	التكرار	مركز الفئات
1655	55.5	294	16.5
1100	58.5	10995	19.5
810	61.5	61001	22.5
649	64.5	73054	25.5
487	67.5	56501	28.5
326	70.5	33478	31.5
211	73.5	20569	34.5
119	76.5	14281	37.5
73	79.5	9320	40.5
27	82.5	6236	43.5
14	85.5	4770	46.5
5	88.5	3620	49.5
		2190	52.5

مجموع التكرارات = 301785



شكل (١ - ٧). مضع التكرار للبيان الإحصائي في الجدول (١ - ١١)



شكل (١-٨). منحنى تكرار من أسرة النموذج جاما

تمريين

ارسم منحنيا ملتويا إلى اليسار.


يبين الجدول (١-١٢) توزيع التكرار لـ 213938 شخصا في المملكة المتحدة مصنفين وفقا لشرائح الدخل مقدرة بآلاف الجنيهات .

جدول (١-١٢). توزيع التكرار وفق فئات الدخل لـ 213938 شخصا في المملكة المتحدة


فئات الدخل بآلاف الجنيهات	التكرار (عدد الأشخاص)
2 -	101369
3 -	45532
4 -	23263
5 -	13475
6 -	13456
8 -	6419
10 -	3551
12 -	2926
15 -	2007
20 -	820
25 -	399
30 -	376
40 -	134
50 -	128
75 -	45
100 -	38

المجموع = 213938

ويقترح مضلع التكرار منحني تكرار مناسب لهذه الظاهرة (توزع فئات الدخل في المملكة المتحدة) من النوع J. وتسمى هذه الأسرة من النماذج بأسرة النماذج الأسية. وهي تبدأ بقممتها ثم تنحدر بسرعة متقاربة إلى محور السينات. ونجد في الشكل (١٠-١) منحني تكرار من أسرة النموذج الأسية.



شكل (١-٩). مدرج التكرار ومضلع التكرار للبيان الإحصائي في الجدول (١-٨)



شكل (١-١٠). منحني تكرار من أسرة النموذج الأسية

تمارين (١ - ١)

(١) تتغير أوزان خمسين طالبا مقاسة إلى أقرب «باوند» من 177 إلى 265. إذا أردت تصنيف هذه الأوزان في عشر فئات فاكتب حدود الفئات، والحدود الحقيقية للفئات؛ ومراكز الفئات. ما طول الفئة؟

(٢) كانت مراكز الفئات لتوزيع تكراري لمجموعة من قياسات درجة الحرارة مأخوذة إلى أقرب درجة مئوية، كما يلي:

16, 25, 34, 43, 52, 61

أوجد:

أ - حدود الفئات؛ ب - الحدود الحقيقية للفئات.

(٣) فيما يلي عدد الأميال التي قطعتها كل من أربعين سيارة إسعاف بجالون واحد من البنزين:

24.5	23.6	24.1	25.0	22.9	24.7	23.8	25.2	24.9
24.1	23.7	24.4	24.7	23.9	25.1	24.6	23.3	24.3
24.8	22.8	24.6	23.9	24.1	24.4	24.5	25.7	23.6
24.0	24.7	23.1	23.9	24.2	24.7	24.9	25.0	24.8
24.5	23.4	24.6	25.3					

أ - لخص هذا البيان الإحصائي في جدول توزيع تكراري متخذا الفئات:

22.5 - 22.9; 23.0 - 23.4, ..., 25.5 - 25.9

ب - ارسم مدرج التكرار، ومدرج التكرار النسبي، ومضلع التكرار.

ج - اكتب جدول التكرار المتجمع الصاعد.

د - ارسم مضلع التكرار المتجمع الصاعد.

- هـ - ما عدد القياسات التي هي أقل من 23.75؟ ، أكثر من 23.45؟ ، أقل من 24.3؟ ، وأقل من 25.2؟
- و - ما القياس الذي يقل عنه خمسون بالمئة من القياسات؟ خمس وعشرون بالمئة من القياسات؟ وخمس وسبعون بالمئة من القياسات؟

(٤) فيما يلي درجات 40 طالبا في اختبار ١٠٦ إحص :

42	88	37	75	98	93	73	62	96	80
52	76	66	54	73	69	83	62	53	79
69	56	81	75	52	65	49	80	67	59
88	80	44	71	72	87	91	82	89	79

أ - اكتب جدول التوزيع التكراري لهذا البيان الإحصائي مستخدما الفئات :

35 - 39; 40 - 44; ...

ب - ارسم مدرج التكرار، ومدرج التكرار النسبي، ومضلع التكرار، مستخدما ورقة بيانية.

ج - اكتب جدول التكرار المتجمع الصاعد وارسم مضلعه.

د - ما القياس المقابل لتكرار متجمع يساوي العشرين بالطريقتين الحسابية والبيانية؟

* (٥) يتولى الإشراف الصحي على عدد من مدارس تعليم البنات 44 وحدة صحية منتشرة في أنحاء المملكة. وفيما يلي عدد المدارس المرتبطة بكل من هذه الوحدات الصحية (لا يتضمن البيان مدارس الرياض وجدة والإحساء ومكة المكرمة) :

23,	46,	20,	30,	28,	12,	35,	50,	33,	65,	85,
24,	40,	50,	23,	40,	30,	50,	23,	20,	38,	68,
58,	15,	15,	100,	105,	6,	59,	36,	22,	89,	21,
35,	100,	42,	38,	58,	32,	62,	48,	32,	19,	56

* مأخوذ من التقرير الصحي السنوي الصادر عن وزارة الصحة لعام ١٤٠٦ هـ، ص ٢٨٧.

متخذة الفئات 6 - 17, 18 - 29, 30 - 41, ..., 78 - 89, 90 - 105

- أ - ارسم مدرج التكرار النسبي .
 ب - ارسم مضلع التكرار المتجمع الصاعد
 ج - أوجد حسابيا وبيانيا المئين 10 والمئين 90 .

(٦) عند تلخيص بيان إحصائي حصلنا على التوزيع التكراري التالي :

حدود الفئات	10 - 24	25 - 39	40 - 54	55 - 69	70 - 84	85 - 99
التكرار	15	25	42	50	38	30

- أ - اكتب التكرار النسبي معبرا عنه في نسبة مئوية .
 ب - اكتب جدول التكرار المتجمع الصاعد، والتكرار النسبي المتجمع الصاعد .
 ج - ارسم مضلع التكرار المتجمع الصاعد .

(٧) فيما يلي أوزان ستين فأرا (مقاسة إلى أقرب غرام) استخدمت في دراسة تجريبية تتعلق بنقص الفيتامين :

125	128	106	111	116	123	119	114	117	143
136	92	115	121	118	137	132	120	104	125
119	115	101	87	129	108	110	133	135	126
127	103	110	118	126	82	104	137	120	95
146	126	119	105	119	132	126	118	100	113
106	125	102	146	117	129	124	113	95	148

أ - لخص هذا البيان الإحصائي في جدول توزيع تكراري متخذة الفئات :

80 - 89; 90 - 99; ...; 140 - 149

- ب- ارسم مدرج التكرار، ومدرج التكرار النسبي، ومضلع التكرار.
 ج- اكتب جدول التكرار المتجمع الصاعد. والتكرار المتجمع الصاعد النسبي.
 د - ارسم مضلع التكرار المتجمع الصاعد مستخدماً ورقة بيانية.
 هـ - ما نسبة القياسات التي هي أقل من 109.5؟، أكثر من 89.5؟، أقل من 133؟، وأقل من 105؟
 و - ما هو القياس الذي يقل عنه ستون بالمئة من القياسات؟ خمس وثلاثون بالمئة من القياسات؟ خمس وعشرون بالمئة من القياسات؟ وخمس وسبعون بالمئة من القياسات؟

(٨) مستخدماً فئات طولها 2 مم، اكتب توزيع التكرار وتوزيع التكرار النسبي لسماكة الجلد المعطاة في البيان التالي. (القياسات تمثل سماكة الجلد بالمليمتر في منتصف عضلة الذراع لـ 121 ذكراً).

11.4	15.3	9.1	18.4	10.9	4.7	9.6	20.6	10.4	20.5	22.4	14.3
11.7	11.4	12.7	18.2	15.1	14.6	25.3	11.5	13.2	7.9	12.6	13.9
16.8	11.4	27.3	16.3	13.9	13.2	11.9	20.0	13.2	9.4	18.9	10.7
14.8	17.8	10.8	16.0	15.7	17.7	13.5	11.5	11.1	9.6	15.1	13.6
13.6	8.6	6.9	19.1	18.7	10.1	16.1	20.4	7.9	16.6	18.5	16.2
17.4	18.8	12.6	22.0	9.6	11.1	15.7	23.7	13.3	4.9	8.3	20.1
15.5	23.1	10.2	10.7	15.8	17.6	21.3	16.2	14.9	9.9	9.1	9.9
9.8	8.6	11.8	9.3	14.8	17.3	9.5	13.6	12.4	9.5	14.3	25.7
12.9	22.7	12.1	10.7	16.8	11.3	11.3	11.4	5.9	10.7	14.6	19.8
25.5	7.7	18.4	7.9	7.6	23.3	9.6	8.4	10.4	8.1	12.5	9.1
30.1											

(٩) بالعودة إلى المثال (١ - ٢)، استخدم الفئات 12.0 - 13.9، 15.9 - 14.0، . . . الخ. لوضع جدول توزيع تكراري لقياسات مستوى الهيموغلوبين في الدم لتسعين عاملاً يعيشون في مناطق ترتفع ارتفاعاً شاهقاً عن سطح البحر.

ارسم مدرج التكرار، ومضلع التكرار، ومضلع التكرار المتجمع الصاعد، واحسب النسبة من القياسات التي تقل عن 16.5.

(١٠) فيما يلي جدول توزيع تكراري لمستوى الهيموغلوبين في الدم لـ 122 عاملا ممن يعيشون في مناطق لا ترتفع كثيرا عن سطح البحر.

حدود الفئات	11.0-11.9	12.0-12.9	13.0-13.9	14.0-14.9	15.0-15.9	16.0-16.9	17.0-17.9
التكرار	6	21	29	43	19	3	1

أ- ارسم مدرج التكرار النسبي .

ب- ارسم مضلع التكرار النسبي المتجمع الصاعد .

ج- احسب النسبة من القياسات التي تقل عن 16.5 .

(١١) فيما يلي جدول توزيع تكراري للعمر عند الوفاة مقاسا إلى أقرب سنة لـ 302 من المرضى الذين توفوا وهم مصابون بالحمى القرمزية :

حدود الفئات	0 -	1 -	2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	15-20
التكرار	18	43	50	60	36	24	22	21	6	5	14	3

ارسم مدرج التكرار ومضلع التكرار. ما العمر الذي تقل عنه نسبة 90% من

حالات الوفاة؟

(١٢) فيما يلي جدول توزيع تكراري لحالات الوفاة بسرطان الدم عند الأطفال مصنفة وفقا للعمر مقاسا إلى أقرب سنة . (الولايات المتحدة عام ١٩٧٠ م).

حدود الفئات	0-0.5)	[0.5-1.5)	[1.5-2.5)	[2.5-3.5)	[3.5-4.5)	[4.5-9.5)	[9.5-14.5)
التكرار	68	82	98	137	196	684	434

ارسم مدرج التكرار النسبي .

(١٣) فيما يلي قياسات معدل الكولستيرول في الدم لخمسمائة رجل في الأربعينات من عمرهم (49 - 40) مقاسة بالميلليغرام لكل 100 ميليلتر:

289	385	306	278	251	287	241	224	198	287
275	301	249	288	337	263	260	228	190	282
368	291	249	300	268	283	319	284	205	294
257	256	294	253	221	241	372	339	292	294
327	195	305	253	251	229	250	348	280	378
282	311	193	242	304	270	277	312	264	262
268	251	333	300	250	234	264	291	271	284
322	381	276	205	251	270	254	299	273	252
280	411	195	256	387	241	245	325	289	306
232	293	285	250	260	316	352	309	229	261
272	196	317	188	215	265	266	217	223	354
169	278	188	252	264	314	246	335	377	305
249	318	270	261	324	289	215	228	315	253
262	250	361	304	248	202	284	291	305	261
292	259	369	289	320	287	230	259	321	268
208	386	298	325	262	326	265	281	262	214
277	248	314	279	279	223	202	188	276	261

318	272	245	285	301	234	420	299	255	285
271	283	260	300	308	319	226	235	318	304
291	388	242	277	235	262	176	226	289	247
389	349	210	241	230	260	324	214	296	279
256	260	250	308	294	320	343	312	224	259
305	286	264	209	233	167	272	274	316	291
289	288	175	260	334	248	287	247	222	300
307	269	311	275	273	272	309	307	233	258
263	293	211	263	281	248	349	225	226	388
332	223	186	190	256	321	297	262	380	337
309	227	164	275	283	268	329	259	247	311
246	253	257	328	242	224	283	249	189	207
312	271	277	311	273	316	360	252	243	311
288	226	329	174	248	305	247	309	323	299
174	215	299	183	187	260	268	293	324	325
282	283	324	284	274	285	299	270	354	290
222	280	210	243	199	262	300	218	224	360
293	221	203	386	282	270	277	227	287	226
262	281	319	279	324	279	178	218	246	274
237	239	251	245	337	249	234	202	341	264
281	243	280	346	245	262	213	312	281	312
261	279	356	329	216	326	269	290	300	338
253	284	306	274	277	353	291	333	280	346
270	289	296	296	269	269	275	217	220	351
260	336	323	246	295	296	285	280	330	258
233	219	225	220	210	308	340	319	217	195

262	219	255	278	359	264	273	238	268	301
260	253	237	271	251	226	281	252	338	310
373	217	204	263	246	334	184	222	294	213
331	354	286	291	223	197	324	367	317	253
367	330	315	260	231	266	286	216	286	353
324	315	271	313	306	287	267	274	290	172
275	262	329	283	300	296	238	325	256	244

لاحظ أن كل جزء من الأجزاء العشرة في هذا البيان يتضمن خمسين قياسا .

أ - اختر جزءا من الأجزاء العشرة وقم بتصنيفه . ثم ارسم له مدرج تكرار نسبي مستخدما الفئات 189 - 160 ، 219 - 190 ، . . . الخ .

ب - ليقم كل اثنين أو ثلاثة من طلاب الفصل بتنفيذ السؤال في جزء محدد من الأجزاء العشرة من البيان وبحيث يتم رسم مدرج تكرار نسبي لكل جزء منها .

ج - قم بضم نتائج الأجزاء العشرة بعضها إلى بعض وارسم مدرج تكرار نسبي للبيان بكامله ، ثم انظر نظرة مقارنة بين مدرجات التكرار النسبي للأجزاء ومدرج التكرار النسبي للبيان بكامله .

١٤) فيما يلي معدل الولادة الخام ومعدل الوفاة الخام في انكلترا وويلز بين 1926 إلى 1976 . وكذلك الفرق بين المعدلين ، ويسمى معدل الزيادة الطبيعية . اكتب جدول التوزيع التكراري لكل منها ، وارسم المصنع التكراري . انظر نظرة مقارنة بين المصنعات الثلاثة . (يمكنك أخذ تسع فئات طول كل منها 1 في معدلات الولادة ومعدلات الزيادة ، وخمس فئات طول كل منها 0.7 في معدلات الوفاة) .

معدل الولادة			معدل الوفاة			معدل الزيادة		
17.8	15.8	14.8	11.6	12.3	12.1	6.2	3.5	2.7
16.7	15.3	14.9	12.3	12.0	12.4	4.4	3.3	2.5
16.7	14.4	15.1	11.7	12.3	11.6	5.0	2.1	3.5
16.3	14.8	14.6	13.4	11.8	12.1	2.9	3.0	2.7
16.3	14.7	14.1	11.4	11.7	14.4	4.9	3.0	0.3
13.9	19.2	15.5	13.5	12.0	12.5	0.4	7.2	3.0
15.6	20.5	15.3	12.3	12.3	11.3	3.3	8.2	4.0
16.2	17.8	15.5	13.0	11.0	11.4	3.2	6.8	4.1
17.2	16.7	15.2	12.7	11.8	11.3	5.0	4.9	3.9
15.9	15.8	15.0	12.6	11.6	11.7	3.3	4.2	3.3
15.7	17.6	17.8	11.7	11.9	11.7	4.0	5.7	6.1
16.1	18.0	17.3	11.5	11.9	11.2	4.6	6.1	6.1
16.4	18.2	16.9	11.7	12.2	11.9	4.7	6.0	5.0
16.5	18.6	16.4	11.6	11.3	11.9	4.9	7.3	4.5
17.1	18.1	16.1	11.5	11.5	11.7	5.6	6.6	4.4
16.0	11.9		11.6	12.0		4.4	-0.1	
14.8			12.0			2.8		
13.7			11.8			1.9		
13.0			11.8			1.2		
12.2			11.7			0.5		

١٥) فيما يلي أوزان 18645 طفلا مولودا في جنوب غرب انكلترا (أحياء أو أموات) عام ١٩٦٥م مستخدما فئات طولها 1 باوند، اكتب التوزيع التكراري وتوزيع التكرار النسبي. ارسم مدرجا تكراريا ومضلعا تكراريا لتوضيح البيان.

أوزنة باوند	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	6	1	1	1	3	0	2	2	3	1	3	4	8	2	2	1
2	18	4	2	2	6	2	4	2	10	4	4	2	8	7	4	3
3	14	6	8	5	9	6	8	9	14	2	6	6	7	5	14	7
4	22	14	16	19	16	14	15	19	47	17	23	15	39	30	26	32
5	66	37	42	46	60	41	67	59	106	78	98	68	135	92	106	81
6	323	101	183	157	337	160	205	172	504	215	299	222	496	256	315	228
7	914	225	390	286	697	311	417	291	817	289	369	279	626	246	330	236
8	920	195	292	220	508	200	230	166	485	147	198	110	288	122	146	78
9	395	83	118	72	142	53	69	45	145	35	42	22	91	18	25	10
10	88	12	26	9	23	11	6	4	18	8	7	2	16	4	2	4
11	17	1	3	2	3	1	0	2	2	0	4	1	2	0	1	0
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

١٦) تم تنفيذ برنامج استئصال للملاريا في إحدى القرى . وفيما يلي جدول توزيع يعطي النسبة المئوية لقياس الهيموغلوبين في عينة من سكان هذه القرية قبل تنفيذ برنامج الاستئصال . وفي البيان الإحصائي قياسات الهيموغلوبين في عينة أخذت بعد تنفيذ برنامج الاستئصال . اكتب توزيعاً مماثلاً للبيان الإحصائي الخاص بعينة ما بعد تنفيذ البرنامج . استعن بالرسوم التي تجدها مناسبة .

المجموع	100-109	90-99	80-89	70-79	60-69	50-59	40-49	30-39	نسبة الهيموغلوبين
45	0	2	2	8	10	14	7	2	التكرار
99.9	0	4.4	4.4	17.8	22.2	31.1	15.6	4.4	التكرار النسبي (مئويًا)

البيان الإحصائي لعينة ما بعد تنفيذ البرنامج

43	63	63	75	95	75	80	48	62	71	76	90	51	61	74
103	93	82	74	65	63	53	64	67	80	77	60	69	73	76
91	55	65	69	84	78	50	68	72	89	75	57	66	79	85
70	59	71	87	67	72	52	35	67	99	81	97	74	61	72

١٧) استدعت الدراسات التفصيلية لأحد الأمراض في إحدى القرى إجراء حصر شامل للسكان. وفيما يلي التوزيع التكراري لعدد الذكور مصنفيين وفقا لشرائح العمر في هذه القرية:

العمر	عدد الذكور	النسبة المئوية %
0 - 4	154	18.6
5 - 9	135	16.3
10 - 14	107	12.9
15 - 19	72	8.7
20 - 29	112	13.5
30 - 39	97	11.7
40 - 49	67	8.1
50 - 59	47	5.7
60 - 79	39	4.7
المجموع	830	100.2

أ- ارسم مدرج التكرار النسبي لهذا التوزيع.

ب- اكتب جدول التكرار النسبي المتجمع الصاعد. وارسم مضلعه.

ج- من الرسم البياني حدد العمر الذي يقسم المجتمع بنسبة 50 - 50. أي ما العمر الذي يمكن القول أن 50% من المجتمع أعمر منه؟

* (١٨) فيما يلي عدد الأطباء العاملين وعدد الأسرة في كل من واحد وعشرين من المستشفيات في منطقة الرياض:

* مأخوذ عن التقرير الصحي السنوي الصادر عن وزارة الصحة لعام ١٤٠٦هـ، صفحة ٧٤.

عدد الأطباء	59	85	44	12	12	18	85	51	34	16	28	50
عدد الأسرة	200	266	263	200	160	124	230	205	187	30	72	222

عدد الأطباء	32	34	25	35	43	33	15	30	24
عدد الأسرة	130	115	45	124	146	110	15	100	31

أ - اكتب جدول توزيع تكراري لعدد الأطباء متخذا الفئات 12 - 26, 27 - 41, . . . ,
 و جدول توزيع تكراري لعدد الأسرة متخذا الفئات 15 - 64, 65 - 114,
 ب - ارسم مدرج التكرار لكل منهما .

(١ - ٦) استخدام بعض الرموز الإحصائية

إن استخدام الرموز للتعبير عن بيان إحصائي ، ومعرفة القواعد التي تخضع لها هذه الرموز، يساعد على التعبير باختصار عن خصائص مهمة للبيان الإحصائي ، واستنباط خطوات العمل الحسابي للوصول إلى القيم العددية لهذه الخصائص . والرمز الأكثر استخداما في الإحصاء هو رمز المجموع Σ [انظر البند (٥) من الملحق]. والقياسات في بيان إحصائي هي ، بصورة عامة ، قيم عددية لمتغير نعبر عنه بحرف x أو y أو z أو أي حرف آخر، وهو يقيس الصفة أو الخاصية التي يدور حولها البيان الإحصائي ، كأن نقيس ، مثلا ، وزنا أو طولا، أو نسجل عمرا أو معدلا، أو عدد مرات وقوع شيء معين خلال فترة معينة إلخ، ويمكننا التعبير رمزيا عن بيان إحصائي لم نحصل عليه بعد، وإنما نخطط للحصول عليه ، بحروف x_1, x_2, \dots, x_n حيث n عدد القياسات التي نريد الحصول عليها، و x_1 هو رمز لأول قياس سنحصل عليه، و x_2 رمز للقياس الثاني، وهكذا . . . ، بينما x_n هو رمز لآخر قياس سنسجله . ولو حصل

أن كان العدد الأول الذي نسجله (عند تنفيذ التجربة أو جمع البيان الإحصائي) 181، مثلا، فعندئذ نقول إن $x_1 = 181$ ، وهكذا . . . ، ومن الطبيعي أن يتكرر حصولنا على القيمة نفسها أكثر من مرة. فلو فرضنا، مثلا، أن $x_1 = x_3 = x_6 = 181$ ، لقلنا إن القيمة 181 مكررة ثلاث مرات. وتجنبنا للالتباس يمكن أن نستخدم حرفا آخر y ، مثلا، للدلالة على القيم المختلفة التي ورد ذكرها في البيان، ونكتب في هذه الحالة $y_1 = 181$ ، ونقول إن y_1 مكررة ثلاث مرات.

وكما نعلم فإن التوزيع التكراري هو أي ترتيب للبيان الإحصائي يظهر توزيع قياساته على فترات معرفة بصورة اختيارية تسمى «فئات». وإذا كان كل عدد من الأعداد المختلفة في بيان إحصائي يمثل فئة بحد ذاته، فنستعمل إننا في حالة «بيان مرتب» وفيما عدا ذلك سنقول للتمييز إننا في حالة «بيان مصنف» أو «بيان مبوب». وإذا قمنا بترتيب جملة من القياسات فستأخذ بعد الترتيب الشكل التالي:

جدول (١-١٣) بيان مرتب

y_i (القيم المختلفة)	y_1	y_2	y_m
f_i (التكرار)	f_1	f_2	f_m

أي أن هناك m قيمة مختلفة فقط في البيان الإحصائي الذي يتضمن n قيمة ($n > m$). ومن الواضح أنه يمكن التعبير عن مجموع قيم البيان الإحصائي بشكلين متكافئين:

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{j=1}^m f_j y_j$$

والطرف الأيمن تعبير عن عمليات جمع مكرر للعدد نفسه. فإذا كان القياس 181 مكررا ثلاث مرات، فسيكون من الأسر، عند حساب مجموع القياسات، كتابة 3×181 بدلا من $181 + 181 + 181$. وبصورة عامة، إذا كان أحد القياسات في الطرف الأيسر مكررا r

مرة، فقد رمزنا لهذا القياس المكرر بـ z_j وبدلاً من جمع z_j عدداً من المرات يساوي f_j ، كتبنا في الطرف الأيمن $z_j f_j$.

أما البيان المصنف فسيأخذ، لأغراض حسابية، الشكل التالي :

جدول (١ - ١٤). بيان مصنف

y_i (مركز الفئة)	y_1	y_2	y_m
f_i (التكرار)	f_1	f_2	f_m

وهذا يشير إلى أننا صنفنا (أو بوبنا) قيم البيان الإحصائي في m فئة، واعتبرنا مركز كل فئة ممثلاً لجميع القياسات التي تنتمي إلى هذه الفئة، وبذلك استعضنا عن f_j قياساً في الفئة الأولى بمركز الفئة y_1 واعتبرناه مكرراً f_1 مرة واستعضنا عن f_2 قياساً في الفئة الثانية بمركز هذه الفئة y_2 واعتبرناه مكرراً f_2 مرة . . . وهكذا. وعلى سبيل المثال، لو عدنا إلى الجدول (١ - ٦)، وهو جدول التوزيع التكراري لقياسات حاصل الذكاء لخمسين مستجداً، وأخذنا القياسات الفعلية السبعة ضمن الفئة الرابعة 101 - 97، لوجدنا أنها:

97, 99, 101, 101, 100, 97, 101

ومجموعها الفعلي هو 696. ولكن الجدول (١ - ٦) تلخيص للبيان الإحصائي يغنينا عن العودة إلى مفرداته، حتى في الحسابات العددية. وإذا أردنا حساب مجموع القياسات ضمن هذه الفئة فإننا نتخذ مركز الفئة، وهو هنا 99، ممثلاً لجميع القياسات السبعة، أي نفترض القياسات السبعة في هذه الفئة كأنها:

99, 99, 99, 99, 99, 99, 99

ونعتبر مجموع الفئة مساويا لـ $693 = 7 \times 99$. ونلاحظ أننا ارتكبنا خطأ بالنقصان قدره 3، وهو الثمن الذي ندفعه في مقابل كفاءة العرض وسهولة وسرعة الحسابات. ومن حسن الحظ أن الأخطاء في الفئات المختلفة لا تكون، عادة، في اتجاه واحد، فلا تكون جميعا أخطاء بالنقصان أو أخطاء بالزيادة، بل تكون في بعض الفئات أخطاء بالنقصان، وفي بعضها الآخر أخطاء بالزيادة، وبذلك يعدل بعضها بعضا، ويكون الخطأ الإجمالي تافها بالمقارنة مع الوفرة الكبير الذي حققناه في عملية تصنيف أو تلخيص البيان في هيئة توزيع تكراري، ناهيك عن وضوح العرض وكفاءته سواء في جدول التوزيع التكراري نفسه، أم فيما ينبثق عنه من جداول ورسوم بيانية.

وينبغي أن يكون هذا كافيا لإيضاح نقطة، وهي أن جدولا كالجدول (١ - ١١)، نعتمده لحساب خصائص معينة لبيان إحصائي لا يعطي قيم هذه الخصائص بالضبط، كما لو كنا استخدمنا في الحسابات مفردات البيان نفسه، وإنما يعطي تلك القيم بصورة تقريبية، وبفارق زهيد يمكن إغفاله. وفي الجدول (١ - ١١) لو رمزنا بـ $\sum_{j=1}^n x_j$ لمجموع قياسات البيان الإحصائي الأصلي (قبل التصنيف)، فسيكون المجموع $\sum_{i=1}^m f_i y_i$ ، كما نأخذه من الجدول، قيمة تقريبية للقيمة المضبوطة $\sum_{j=1}^n x_j$.

تمرين

احسب مجموع القياسات الخمسين في الجدول (١ - ٤) وقارنه مع المجموع الناتج عن استخدام التوزيع التكراري في الجدول (١ - ٦).

(١ - ٧) مقاييس النزعة المركزية

لا شك في أن الطرق البيانية مفيدة للغاية عند تقديم المعلومات الإحصائية، وأنها تنقل وصفا عاما وسريعا لتلك المعلومات، مما يتفق مع المثل القائل بأن صورة

واحدة تساوي ألف كلمة . إلا أن هناك حدودا، على أي حال، لاستخدام الطرق البيانية في مجال وصف وتحليل المعلومات . وعلى سبيل المثال، لنفرض أننا نرغب في مناقشة البيان الإحصائي أمام مجموعة من الناس، وأنه ليس لدينا طريقة أخرى غير الطريقة الشفهية، مما يجعل عرض المصطلح التكراري غير ممكن، ويضطرنا لاستخدام مقاييس وصفية أخرى يمكنها أن تنقل إلى المستمعين صورة ذهنية عن المصطلح التكراري . والأمر الثاني الذي يضع حدا لاستخدام الطرق البيانية هو صعوبة الاستفادة منها في مجال الاستقراء الإحصائي . وربما اقتصر فوائدها الاستقرائية على أن يقدم المصطلح التكراري لعينة من القياسات نقوم بتلخيصها، تصورا عن شكل المصطلح التكراري للمجتمع من القياسات الذي جاءت منه العينة .

وإذا كنا أمام جملة من القياسات فإن أول ما تجدر معرفته هو القيمة التي تتمركز عندها القياسات . ومن الملاحظ، مثلا، أنه في كثير من الظواهر السلوكية والاجتماعية تنزع معظم القياسات إلى التمركز حول قيمة وسطية، فأولئك الذين يتصفون بحدة شديدة في المزاج هم قلة وفي المقابل نجد ذوي المزاج المفرط في برودته قلة أيضا وذلك قياسا على الجمهرة من الناس التي تقع بين بين . وأولئك الذين يتصفون بالنعافة الشديدة يقابلهم أولئك المتصفون بسهانة مفرطة هم قليلون بالقياس إلى عامة الناس التي تحتل مواقعها بين بين . والملاحظة نفسها نجدها سائدة في مجال توزيع الأطوال بين عمالقة وأقزام . فمعظم الناس في مجتمع بشري معين تمثل أطوالها إلى اتخاذ موقع وسط، وقس على ذلك . ولو طبقنا اختبارا لقياس حاصل الذكاء على طلاب الجامعة بأسرهم لوجدنا أن المتفوقين الموهوبين قلة والمبتلين بالبلادة قلة، وينزع حاصل الذكاء عند معظم الطلبة إلى التمركز حول الوسط .

وفي حياتنا اليومية، كثيرا ما نستخدم كلمة «في المتوسط» فتحدث عن الرجل «متوسط الدخل»، والشاب «متوسط الثقافة» . وقد يقول أحدهنا: «نادرا ما أصل متأخرا إلى مقر عملي ونادرا ما أصل إليه مبكرا، وفي المتوسط يتفق موعد وصولي تقريبا مع بداية الدوام الرسمي» . كما نقول: «إن استهلاكنا اليومي من القهوة (أو الشاي) هو في المتوسط كذا» إلخ . وهذه الاستخدامات الشائعة لكلمة متوسط تعبر عن شعور

داخلي معين يحسه ويفهمه كل منا ولا يستطيع ترجمته بدقة . ومقاييس النزعة المركزية هي محاولة لترجمة هذا الشعور بطريقة دقيقة ومحددة تماما .

وفي لغة الإحصاء يعبر مقياس النزعة المركزية عن القيمة (أو الموضع أو النقطة) التي يتمركز عندها التوزيع التكراري لجملة من القياسات . وعادة ما تحتشد بقية القياسات أكثر ما تحتشد حول ذلك الموضع . وإذ نهتم عادة بمقياس نزعة مركزية لمجتمع من القياسات نلجأ في الغالب إلى عينة من المجتمع ونحسب قيمة ذلك المقياس من أجل قياسات العينة ثم نعتبر هذه القيمة التي حصلنا عليها تقديرا أو تخميننا لقيمة المقياس التي نجهلها والخاصة بالمجتمع الذي جاءت منه العينة . وسنستعرض هنا ثلاثة أشكال لقياس النزعة المركزية لجملة من القياسات هي المتوسط والوسيط والمنوال .

(١ - ٧ - ١) المتوسط (الوسط الحسابي)

والمقياس الأكثر فائدة والأكثر استخداما للنزعة المركزية لجملة من القياسات هو معدلها الحسابي . ويشار إليه غالبا بالوسط الحسابي أو المتوسط .

تعريف المتوسط

متوسط n من القياسات x_1, x_2, \dots, x_n هو مجموع هذه القياسات مقسوما على عددها . وبصورة رمزية نكتب :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

وإذا لم يكن هناك خشية التباس يمكن كتابة هذه العلاقة على الشكل :

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{1}{n} \Sigma x$$

حيث Σx يعني مجموع القيم التي يأخذها المتغير x كافة وعددها n .

مثال (١-٥)

احسب متوسط القيم 1, 12, 14, 6, 3

الحل

$$\bar{x} = \frac{1 + 12 + 14 + 6 + 3}{5} = 7.2$$

ونلاحظ من التعريف مباشرة أن:

$$\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$$

وفي حالة بيان مرتب نعبر عن مجموع القياسات على الشكل: (انظر الجدول ١-١١).

$$f_1 y_1 + f_2 y_2 + \dots + f_m y_m = \sum_{i=1}^m f_i y_i$$

وتصبح العلاقة المذكورة في التعريف السابق للمتوسط كما يلي:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^m f_i y_i}{\sum_{i=1}^m f_i}$$

أما في البيانات المصنفة (أو المبوبة) فنفترض أن جميع القياسات التي تنتمي إلى فئة مساوية لمركز هذه الفئة. والخطوات الحسابية ليست إلا تطبيقاً للعلاقة الأخيرة من أجل بيان مرتب حيث y_i الآن هي مركز الفئة i ، و f_i التكرار الموافق لهذه الفئة. وللتوضيح نأخذ المثال التالي:

مثال (١-٦)

احسب متوسط حاصل الذكاء في المثال (١-٣) مستخدماً جدول التوزيع التكراري (١-٦).

الحل

حساب المتوسط ننظم الجدول التالي :

جدول (١-١٥). حساب متوسط البيان المصنف في الجدول (١-٦)

مركز الفئة y_i	التكرار f_i	$f_i y_i$
84	1	84
89	2	178
94	4	376
99	7	693
104	9	936
109	10	1090
114	7	798
119	6	714
124	4	496
المجموع	50	5365

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^9 f_i y_i}{\sum_{i=1}^9 f_i} = \frac{5365}{50} = 107.30$$

لاحظ أنك عندما تحسب المتوسط من البيان الإحصائي الأصلي في الجدول (١-٤)

ستجد :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{50} x_i}{50} = \frac{5364}{50} = 107.28$$

والفرق بين النتيجتين لا يذكر في مقابل الوفرة في الجهود الحسابية اللازمة .

(١-٧-٢) خواص المتوسط

١ - مجموع انحرافات جملة من القياسات عن متوسطها يساوي الصفر.

ولبيان ذلك لنرمز بـ d_i للانحراف $x_i - \bar{x}$ أي انحراف القياس x_i عن المتوسط \bar{x} . ولنحسب مجموع الانحرافات $\sum d_i$ فنجد :

$$\sum_{i=1}^n d_i = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x} = n\bar{x} - n\bar{x} = 0$$

وهذه الخاصة توضح الدور المركزي الذي يلعبه المتوسط .

٢- يكون مجموع مربعات انحرافات القياسات عن قيمة a أصغر ما يمكن *

عندما يكون $a = \bar{x}$.

لنأخذ مجموع مربعات انحرافات القياسات عن قيمة a ، أي $\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$ ،

فيمكن كتابة :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x} + \bar{x} - a)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - a)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n 2(x_i - \bar{x})(\bar{x} - a) + \sum_{i=1}^n (\bar{x} - a)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + 2(\bar{x} - a) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) + n(\bar{x} - a)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - a)^2 \geq \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{aligned}$$

* البرهان للقراءة فقط .

ذلك لأن $n(\bar{x} - a)^2$ كمية غير سالبة. أي أن مجموع مربعات الانحرافات عن قيمة ما (a) هو دائماً أكبر من مجموع مربعات الانحرافات عن المتوسط \bar{x} أو يساويه.

مثال (١-٧)

في المثال (١-٥) احسب مجموع الانحرافات عن المتوسط و $\sum_{i=1}^5 (x_i - 7)^2$ و $\sum_{i=1}^5 (x_i - 7.3)^2$ ثم تحقق من الخاصتين ١ و ٢.

الحل

ننظم جدولاً كما يلي:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - 7)$	$(x_i - 7)^2$	$x_i - 7.3$	$(x_i - 7.3)^2$
1	-6.2	38.44	-6	36	-6.3	39.69
12	4.8	23.04	5	25	4.7	22.09
14	6.8	46.24	7	49	6.7	44.89
6	-1.2	1.44	-1	1	-1.3	1.69
3	-4.2	17.64	-4	16	-4.3	18.49
المجموع	0	126.80	1	127	-0.5	126.85

ونلاحظ أن مجموع العمود الثاني صفر بما يتفق مع الخاصية ١، وأن كلا من مجموعي العمودين الخامس والسابع أكبر من مجموع العمود الثالث بما يتفق مع الخاصية ٢.

٣- لنأخذ العلاقة:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^m f_i y_i}{\sum_{i=1}^m f_i}$$

ولنكتب، للاختصار، n بدلا من $\sum_{i=1}^m f_i$. فيمكن إعادة كتابة هذه العلاقة كما يلي:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m f_i y_i = \frac{f_1}{n} y_1 + \frac{f_2}{n} y_2 + \dots + \frac{f_m}{n} y_m \\ &= \omega_1 y_1 + \omega_2 y_2 + \dots + \omega_m y_m \\ &= \sum_{i=1}^m \omega_i y_i \end{aligned}$$

حيث $\omega_i = \frac{f_i}{n}$. ويسمى ω_i الوزن الموافق للقياس الـ i ، ومجموع هذه الأوزان يساوي الواحد تماما لأن:

$$\sum_{i=1}^m \omega_i = \sum_{i=1}^m \frac{f_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m f_i = \frac{1}{n} \times n = 1$$

ومن الواضح أن كل قياس قد أعطي وزنا يتناسب مع تكرار ظهوره في البيان الإحصائي. ويسمى مثل هذا المتوسط «المتوسط المرجح». ومنه التعريف التالي:

تعريف المتوسط المرجح

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات. ولتكن $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ أعدادا موجبة مجموعها الواحد تماما. فعندئذ يسمى المقدار

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \omega_i x_i$$

المتوسط المرجح لهذه الجملة من القياسات. ويسمى ω_i الوزن الموافق للقياس x_i .

مثال (١-٨)

لنفرض أن درجات طالب في الشهادة الثانوية (الفرع العلمي) منسوبة إلى 100 كانت كما يلي: التربية الإسلامية 87، واللغة العربية 94، واللغة الإنكليزية 97،

والرياضيات 94، والفيزياء 92، والكيمياء 97، والأحياء 98. وأن لكل من التربية الإسلامية والرياضيات ثلاثة أمثال، أما اللغة العربية فلها مثلان، ولكل من المواد الباقية مثل واحد. فاحسب المعدل العام لهذا الطالب؟

الحل

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{3 \times 87 + 2 \times 94 + 1 \times 97 + 3 \times 94 + 1 \times 92 + 1 \times 97 + 1 \times 98}{3 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1} \\ &= \frac{3}{12} \times 87 + \frac{2}{12} \times 94 + \frac{1}{12} \times 97 + \frac{3}{12} \times 94 + \frac{1}{12} \times 92 + \frac{1}{12} \times 97 + \frac{1}{12} \times 98 \\ &= 92.92 \end{aligned}$$

والأوزان $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ هي، علي الترتيب، $\frac{3}{12}, \frac{2}{12}, \frac{1}{12}, \frac{3}{12}, \frac{1}{12}, \frac{1}{12}, \frac{1}{12}$ وبمجموعها الواحد.

وتجدر ملاحظة أن تعريف المتوسط هو حالة خاصة من تعريف المتوسط المرجح، حيث الأوزان متساوية، وكل منها يساوي $\frac{1}{n}$ ، ومن الواضح عندئذ أن:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} x_i = \sum_{i=1}^n \omega_i x_i$$

حيث $\omega_i = \frac{1}{n}$ وبمجموع الأوزان هو:

$$\sum_{i=1}^n \omega_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = n \times \frac{1}{n} = 1$$

٤- ليكن \bar{x}_1 متوسطا لمجموعة من n_1 قياسا، و \bar{x}_2 متوسطا لمجموعة من n_2 قياسا، ...، و \bar{x}_m متوسطا لمجموعة من n_m قياسا. ولنحسب المتوسط العام لهذه القياسات بعد دمجها في مجموعة واحدة. ولهذا الغاية نطبق تعريف المتوسط فنقول إن المتوسط العام هو مجموع كل القياسات مقسوما على عددها. وإذا لاحظنا أن مجموع المجموعة الأولى هو $\bar{x}_1 n_1$ وبمجموع المجموعة الثانية هو $\bar{x}_2 n_2$ ، ...، وبمجموع المجموعة الأخيرة هو $\bar{x}_m n_m$ ، يكون:

$$\bar{x} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2 + \dots + n_m \bar{x}_m}{n_1 + n_2 + \dots + n_m} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m n_i}$$

وهو نوع من المتوسط المرجح حيث $\omega_i = \frac{n_i}{\sum_{i=1}^m n_i}$. ونلاحظ أن الوزن المعطى لكل متوسط يتناسب مع حجم المجموعة التي يمثلها .

وفي الحالة الخاصة التي يكون فيها $n_1 = n_2 = \dots = n_m = n$ نجد :

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{n \bar{x}_1 + n \bar{x}_2 + \dots + n \bar{x}_m}{mn} \\ &= \frac{n(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \dots + \bar{x}_m)}{mn} \\ &= \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \dots + \bar{x}_m}{m} \end{aligned}$$

وهو متوسط المتوسطات .

واللجوء إلى متوسط المتوسطات عند حساب متوسط عام ، هو خطأ شائع ، ولا يصح إلا في حالة واحدة ، هي عندما يكون كل منها متوسطا للعدد نفسه من القياسات .

مثال (١ - ٩)

يتألف مقرر الإحصاء من ثلاث شعب . وقد حسبنا متوسط عدد أيام الغياب خلال شهر رجب فكان كما يلي :

الشعبة	الأولى	الثانية	الثالثة
المتوسط	4	5	3

إذا علمت أن أعداد الطلاب في الشعب الثالث كان 36 في الأولى، و26 في الثانية، و34 في الثالثة، فاحسب متوسط عدد أيام الغياب في مقرر الإحصاء بشعبه الثالث؟

الحل

مجموع عدد أيام الغياب في الشعبة الأولى = $4 \times 30 = 120$ يوما،
مجموع عدد أيام الغياب في الشعبة الثانية = $5 \times 26 = 130$ يوما،
مجموع عدد أيام الغياب في الشعبة الثالثة = $3 \times 34 = 102$ من الأيام.

$$\text{المتوسط العام لكافة الشعب} = \frac{120 + 130 + 102}{30 + 26 + 34} = \frac{352}{90} = 3.91 \text{ يوما.}$$

ونلاحظ أن متوسط المتوسطات $\frac{3+5+4}{3} = 4$ أيام وهو جواب غير صحيح.

(١-٧-٣) أثر الانسحاب وتغيير سلم القياس في المتوسط

١- لكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات، متوسطها \bar{x} . إذا أضفنا لكل قياس فيها عددا ثابتا c فإن المتوسط يصبح $\bar{x} + c$. ولبيان ذلك نرمز لـ $c + x_i$ بـ y_i ، فيكون متوسط القياسات y_i حسب التعريف:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i + c) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c \\ &= \bar{x} + \frac{nc}{n} = \bar{x} + c \end{aligned}$$

(كتبتنا سهيلا للطباعة $\sum_{i=1}^n$ بدلا من $\sum_{i=1}^n$). ومنه $\bar{x} = \bar{y} - c$. وتسمى مثل هذه العملية أي إضافة عدد ثابت c (قد يكون موجبا أو سالبا) إلى كل قياس، عملية انسحاب [انظر البند (٨) من الملحق ١].

٢- لتكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات متوسطها \bar{x} . إذا ضربنا كل قياس بعدد ثابت c فإن المتوسط يضرب بالعدد نفسه. ولييان ذلك، نرمز للعدد $y_i = cx_i$ فيكون متوسط القياسات y_i حسب التعريف:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n c x_i}{n} = \frac{c \sum_{i=1}^n x_i}{n} = c \bar{x}$$

ومنه $\bar{y} = \frac{\bar{x}}{c}$. وتسمى عملية ضرب كل قياس بعدد ثابت، عملية تغيير في سلم القياس [انظر الفقرة (٨) من الملحق ١].

٣- لتكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات متوسطها \bar{x} . إذا خضعت هذه القياسات لتحويل وفق العلاقة الخطية:

$$y_i = a x_i + b$$

أي خضعت لعملية تغيير في سلم القياس (الضرب بعدد ثابت a)، ولعملية انسحاب (إضافة عدد ثابت b)، [انظر البند (٨) من الملحق ١]، فالعلاقة نفسها تربط بين المتوسط \bar{x} والمتوسط الجديد \bar{y} أي

$$\bar{y} = a \bar{x} + b$$

ولييان ذلك يكفي أن نكتب:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (a x_i + b)}{n} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n a x_i + \sum_{i=1}^n b}{n} = \frac{a \sum_{i=1}^n x_i}{n} + \frac{n b}{n} \\ &= a \bar{x} + b \end{aligned}$$

وتستخدم عمليتا الإنسحاب والتغيير في سلم القياس لتسهيل الحسابات. ونوضح الفكرة بالمثال التالي:

مثال (١ - ١٠)

يبين الجدول التالي عدد العمال والأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه العامل في مستشفى بالريال .

الأجر الأسبوعي	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
عدد العمال	6	6	4	9	5	3	3	2	1

احسب متوسط الأجر الأسبوعي للعامل في هذا المستشفى .

الحل

إرمز للأجر الذي يدفعه المستشفى بـ x_i وقم بالتحويل التالي من x_i إلى y_i :

$$y_i = \frac{x_i - 1000}{200} = \frac{1}{200} x_i - 5$$

تحصل على الجدول التالي:

x_i الأجر الأسبوعي	التكرار f_i	$y_i = \frac{x_i - 1000}{200}$	$f_i y_i$
400	6	-3	-18
600	6	-2	-12
800	4	-1	-4
1000	9	0	0
1200	5	1	5
1400	3	2	6
1600	3	3	9
1800	2	4	8
2000	2	5	10
المجموع	40		4

التوزيع الوصفي لجملة من القياسات

$$\bar{y} = \frac{\sum f_i y_i}{\sum f_i} = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0.1$$

ولحساب المتوسط المطلوب نطبق العلاقة:

$$\bar{y} = \frac{\bar{x} - 1000}{200}$$

فنجد:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 200 \bar{y} + 1000 \\ &= 20 + 1000 = 1020\end{aligned}$$

تمارين (١-٢)

(١) احسب المتوسط لكل مما يلي:

أ - 5, 2, 0, -3, -1

ب - 0.004, -0.002, 0.003, 0.001

ج - 2, 2, 3, 7, 10, 100 (لاحظ أثر القيمة 100 على المتوسط).

(٢) * فيما يلي عدد المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات التي أقيمت في المملكة

في كل من الأعوام الثلاثة عشر بين ١٣٩١ هـ و ١٤٠٣ هـ: 4, 14, 36, 47, 26, 92,

127, 48, 31, 67, 79, 11, 22 احسب المتوسط للسنة الواحدة.

(٣) متوسط 23 قياسا يساوي 14.7 فما هو مجموع هذه القياسات؟

(٤) ابتعنا ستة أنواع من الحاجيات اليومية لمستشفى من كل من ثلاثة مخازن:

أ، ب، ج. (الحاجة نفسها من كل مخزن) وكانت الأسعار كما يلي:

* مأخوذ من كتاب منجزات خطط التنمية الصادر عن وزارة التخطيط في المملكة. ص ٢٥٤.

الحاجة	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة	السادسة
المخزن أ	16.00	33.75	65.75	23.00	27.75	38.50
المخزن ب	15.00	40.50	66.75	27.50	29.50	40.25
المخزن ج	19.25	34.00	68.00	24.50	31.50	41.25

ما المخزن الذي توصي إدارة المستشفى بالتعامل معه؟

٥) ثلاث مجموعات من القياسات لها متوسطات $\bar{x}_1 = 25$ ، $\bar{x}_2 = 20$ ، $\bar{x}_3 = 22$. وهي تتضمن 20 ، 25 ، و 30 قياسا ، على الترتيب .

ما هو متوسطها بعد ضمها في مجموعة واحدة؟

٦) معدل أجر الساعة وعدد المستخدمين في مستشفى عند كل من خمس مستويات للأجور كانا كما يلي :

مستوى الأجر	1	2	3	4	5
معدل أجر الساعة	4.5	5	5.5	6	6.5
عدد العمال	5	10	15	20	25

ما معدل أجر الساعة للعامل في هذا المستشفى؟

٧) في المثال (١ - ٦) اطرح من مركز كل فئة y_i العدد 107 ، أي اكتب عمودا جديدا $z_i = y_i - 107$. احسب المتوسط \bar{z} ثم تحقق أن $\bar{z} + 107 = \bar{y}$.

لاحظ أن طرح 107 من مركز كل فئة جعل العمليات الحسابية أسهل، ويسمى العدد الذي نطرحه «المتوسط الافتراضي». اتخذ العدد 97 متوسطا افتراضيا وأعد العمليات نفسها مستخدما 97 بدلا من 107. هل تجد أنه كلما كان المتوسط الافتراضي أقرب إلى المتوسط الفعلي أصبحت الحسابات أسهل؟

٨) إذا أضفنا 1.4 لكل من القياسات في التمرين ١ فما أثر ذلك على المتوسط؟ أحسب المتوسط الجديد

٩) إذا ضربنا كل قياس في التمرين ١ (ب) بألف فما أثر ذلك على المتوسط؟ أحسب المتوسط الجديد.

١٠) المعلومات التالية مأخوذة من سجل لغياب العاملين في عدد من المؤسسات الصحية خلال شهر شعبان:

عدد أيام الغياب y_i	0	1	2	3	4	5	6	7
التكرار f_i	5	15	23	22	17	10	6	3

احسب متوسط عدد أيام الغياب للعامل الواحد.

١١) فيما يلي السجل الدراسي لأحد الطلاب المستجدين في نهاية العام الدراسي ١٤٠٣ - ١٤٠٤ هـ.

١٠٢ اسلم	١٥١ اريض	١٢١ اريض	١٠١ احين	١٠١ اريض	١٠٢ اعرب	١٠١ احص	١٠١ اسلم	١٠١ افيز	١٠١ اكيم	المقرر
2	3	3	4	3	2	3	2	4	4	عدد
4.5	3.5	4	3	3	3	4.5	3.5	4	2.5	التقدير

احسب المعدل التراكمي لهذا الطالب .

١٢) فيما يلي جدول التوزيع التكراري لأعمار خمسين عاملا في إحدى المستشفيات إلى أقرب سنة .

حدود الفئات	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
التكرار	8	11	25	4	2

احسب متوسط العمر للعمال الخمسين في هذا المستشفى .

١٣) في كل من التمارين ٣ إلى ١٧ من مجموعة التمارين (١ - ١) ، احسب المتوسط .

١٤*) تناولت أنشطة فحص الدم لطفيل الملاريا لعام ١٤٠٦ هـ ثمان عشرة منطقة في أنحاء المملكة وكان عدد العينات الإيجابية في كل منها كما يلي :

401, 119, 36, 779, 88, 80, 386, 180, 535,
64, 531, 565, 576, 64, 248, 246, 4331, 81

احسب متوسط عدد العينات الإيجابية للمنطقة الواحدة .

١٥)** فيما يلي عدد المراكز الصحية وعدد الأطباء في كل من المناطق الأربع عشرة في المملكة .

عدد المراكز	232	69	55	90	72	101	26	157	214	45	104	119	69	78
عدد الأطباء	613	234	156	193	145	293	44	355	317	95	180	306	81	130

* مأخوذة من التقرير الصحي السنوي الصادر عن وزارة الصحة لعام ١٤٠٦ هـ، ص ٢٠٣ .

** مأخوذة من التقرير الصحي السنوي الصادر عن وزارة الصحة لعام ١٤٠٦ هـ، ص ٤٤ .

- أ - احسب لكل منطقة متوسط عدد الأطباء في المركز الواحد.
 ب - احسب متوسط عدد المراكز للمنطقة الواحدة.
 ج - احسب متوسط عدد الأطباء للمنطقة الواحدة.
 د - احسب متوسط عدد الأطباء للمركز الواحد على مستوى المملكة.

(١ - ٧ - ٤) الوسيط

نلاحظ من دراستنا للمتوسط أنه إذا كان أحد قياسات البيان الإحصائي كبيرا جدا، أو صغيرا جدا، بالمقارنة مع بقية القياسات، تأثر المتوسط كثيرا بهذه القيمة القاصية، ومال إليها، مما يفقد المتوسط الموقع المركزي الذي يفترض أن يشغله. وبالإضافة إلى ذلك فقد رأينا في ختام الفقرة (١ - ٢)، أن بعض البيانات يمكن أن تكون وصفية أو ترتيبية ولا يوجد أي معنى لكلمة متوسط، كما عرفناها، في مثل هذه البيانات. وسنعرف الآن مقياسا للنزعة المركزية يمكن حسابه في كل من البيانات العددية والترتيبية، ومع وجود قيمة قاصية في بيان عددي يمكن أن لا يتأثر أبدا، وفي حال وجود أثر فإنه يكون أثرا طفيفا. ويسمى هذا المقياس الوسيط.

فوسيط n من القياسات هو القياس الواقع في الوسط عند ترتيب هذه القياسات. أي القياس الذي رتبته $\frac{n+1}{2}$ إذا كان عدد القياسات n فرديا، ومتوسط القياسين اللذين رتبتهما $\frac{n}{2}$ و $\frac{n}{2} + 1$ إذا كان عدد القياسات زوجيا.

ملاحظة

في بيان ترتيبية يكون الوسيط هو الصفة المقابلة للقياس الذي رتبته $\frac{n+1}{2}$ في حالة n فردي، أما إذا كان n زوجيا وكان للقياسين اللذين رتبتهما $\frac{n}{2}$ و $\frac{n}{2} + 1$ الصفة نفسها فهذه الصفة هي الوسيط، وإذا كانا من صفتين مختلفتين، مثلا أحدهما جيد والذي يليه مقبول، قلنا اصطلاحا إن الوسيط هو بين الجيد والمقبول.

مثال (١ - ١١)

ما هو وسيط القياسات

8, 4, 10, 16, 9, 2, 7

الحل

نرتب هذه القياسات فنجد :

2, 4, 7, 8, 9, 10, 16

والوسيط هو القياس الذي رتبته $4 = \frac{7+1}{2} = \frac{n+1}{2}$. أي القياس الرابع . ولكن القياس الرابع في القياسات المرتبة أعلاه هو 8 ، وبالتالي تكون قيمة الوسيط المطلوبة 8 .

ونلاحظ أن 8 يتوسط مجموعة القياسات ، إذ يقع من القياسات على اليمين منه بقدر ما يقع منها على اليسار . كما نلاحظ أننا لم نحتاج لأي عمليات حسابية ، إذ قمنا بعملية ترتيب تلتها عملية اختيار .

مثال (١ - ١٢)

في فصل يتضمن 9 طلاب كانت التقديرات في أحد الاختبارات كما يلي :

جيد ، ضعيف ، مقبول ، جيد ، جيد جدا ، ممتاز ، مقبول ، جيد ، جيد جدا ، محاسب الوسيط .

الحل

نرتب التقديرات فنجد :

ضعيف ، مقبول ، مقبول ، جيد ، جيد ، جيد ، جيد جدا ، ممتاز

والتقدير المقابل للقياس الذي رتبته $5 = \frac{9+1}{2}$ ، أي للقياس الخامس هو جيد ، وهكذا يكون الوسيط في هذا البيان «جيد» .

مثال (١ - ١٣)

لدينا القياسات 25, 22, 25, 26, 37, 16, 32, 26 . ما الوسيط؟

الحل

نرتب هذه الأعداد فنجد :

16, 22, 25, 25, 26, 26, 32, 37

وبما أن عدد القياسات $n = 8$ زوجي، نأخذ متوسط القياسين اللذين رتبتهما $4 = \frac{8}{2}$ و $5 = 4 + 1$. أي العدد الرابع والعدد الذي يليه وهو الخامس. ولكن العدد الرابع هو 25 والعدد الخامس 26، فقيمة الوسيط تساوي:

$$\frac{25 + 26}{2} = 25.5$$

ولحساب الوسيط في حالة بيان مصنف، ولنرمز للوسيط بـ M ، نتبع الخطوات التالية بعد كتابة جدول التكرار المتجمع الصاعد:

١ - نحسب رتبة الوسيط $\frac{n}{2}$ ، وذلك سواء أكان عدد القياسات n زوجياً أم فردياً.

٢ - نحدد رتبة الوسيط الفئة التي ينتمي إليها. ونسميها الفئة الوسيطة، كما نحدد بالطبع الفئة السابقة للفئة الوسيطة، ونسئمها اختصاراً الفئة السابقة.

٣ - لنرمز بـ F_M للتكرار المقابل للفئة الوسيطة في جدول التكرار المتجمع الصاعد، وبـ F_P للتكرار المقابل للفئة السابقة. وبـ ω لطول الفئة، وبـ L للحد الأعلى الحقيقي المقابل للفئة السابقة. فنجد بعملية تناسب طردي بسيط أن:

زيادة التكرار	زيادة القياس
$F_M - F_P$	ω
$\frac{n}{2} - F_P$?

$$\text{زيادة القياس المطلوبة لبلوغ الوسيط} = \frac{\frac{n}{2} - F_P}{F_M - F_P} \times \omega$$

ويكون الوسيط إذا:

$$M = L + \frac{\frac{n}{2} - F_p}{F_M - F_p} \times \omega$$

وتجدر ملاحظة أن تصنيف بيان إحصائي يتضمن نوعاً من الترتيب لعناصره. ومع أن هذا الترتيب لا يتناول كل قياس بمفرده، إلا أن هناك نوعاً من الترتيب الفئوي، إذا صح التعبير. فكل قياس ينتمي إلى فئة هو حتماً أصغر من أي قياس ينتمي إلى فئة لاحقة، وأكبر من أي قياس ينتمي إلى فئة سابقة.

(مثال ١ - ١٤)

احسب وسيط البيان الإحصائي المصنف المعطى في الجدول (١ - ٣).

الحل

نكتب جدول التكرار المتجمع الصاعد فنجد (انظر الجدول ١ - ٥).

أقل من	التكرار المتجمع الصاعد
86.5	1
91.5	3
96.5	7
101.5	14
الفئة السابقة 106.5	23
الفئة الوسيطة 111.5	33
116.5	40
121.5	46
126.5	50

وتسير الخطوات الحسابية كما يلي :

١ - رتبة الوسيط هي $25 = \frac{50}{2} = \frac{n}{2}$ وأول فئة يزيد التكرار المتجمع المقابل لها على 25 تكون الفئة الوسيطة.

٢ - نطبق قاعدة التناسب الطردي فنكتب :

زيادة التكرار	زيادة القياس
33-23	5
25-23	?

$$\text{الزيادة المطلوبة لبلوغ الوسيط} = \frac{2}{10} \times 5 = 1$$

$$M = 106.5 + 1 = 107.5 \text{ (الوسيط)}$$

أو نطبق الصيغة التي استخرجناها للوسيط فنجد من الجدول أن :
 $L = 106.5$ ، $w = 111.5 - 106.5 = 5$ ، $F_p = 23$ ، $F_M = 33$.

وبالتعويض نجد :

$$M = 106.5 + \frac{25 - 23}{33 - 23} \times 5 = 106.5 + 1 = 107.5$$

لاحظ أن الحساب من بيان مصنف هو دائما تقريبي ، ولذلك ترانا تجاوزنا الدقة التامة في حساب رتبة الوسيط فاتخذناها على الدوام $\frac{n}{2}$ سواء أكان n زوجيا أم فرديا . وذلك توخيا للاقتصاد في الجهود الحسابية .

وتجدر ملاحظة أننا إذا رسمنا مضلع التكرار المتجمع الصاعد ومضلع التكرار المتجمع النازل فإن الإحداثي السيني لنقطة تقاطعها سيكون الوسيط .

تمرين

ارسم على الورقة البيانية نفسها مضلعي التكرار المتجمع الصاعد والنازل للبيان الإحصائي المصنف المعطى في الجدول (١ - ٣) واستنتج الوسيط بيانيا .

(١ - ٧ - ٥) المنوال

رأينا أن المتوسط لا يمكن حسابه إلا من بيانات عددية وأن الوسيط يمكن حسابه من بيانات عددية أو بيانات ترتيبية . وسنعرف الآن مقياسا للترعة المركزية يمكن

حسابه في جميع أنواع البيانات سواء أكانت عددية أم ترتيبية أم وصفية . وهذا المقياس يعرف بالمنوال . فالمنوال هو القياس الأكثر تكرارا في جملة من القياسات .

مثال (١-١٥)

في تصنيف تناول 2000 من المستجدين في الجامعة حصلنا على البيان الإحصائي

التالي :

	يدخن	لا يدخن
يشرب القهوة	389	1483
لا يشرب القهوة	27	101

ما هو المنوال؟

الحل

المنوال هو «يشرب القهوة ولا يدخن» . فهي الصفة السائدة في هذه الجملة من القياسات لأن تكرارها 1483 أعلى من تكرار كل من الصفات الثلاث الأخرى .

مثال (١-١٦)

احسب المنوال في المثال (١-١٢) .

الحل

المنوال هو تقدير «جيد» باعتباره القياس الأكثر تكرارا .

ملاحظات مهمة

١ - المنوال هو الصفة الغالبة في بيان وصفي أو ترتيبي . والصفة الغالبة تعني أنها الصفة التي تتحقق في عدد من العناصر التي نصنفها يفوق عدد العناصر المحققة لأية صفة أخرى . ولا تعني بالضرورة أنها الصفة التي تتحقق في أغلبية العناصر أي في أكثر من 50% منها . وقد لا يكون هناك أي صفة تتحقق في أغلبية العناصر .

٢- المنوال هو الصفة أو الصنف الأكثر تكرارا وليس تكرار ذلك الصنف .

٣- التكرار الأعلى لا يعني التكرار الذي يقع بتواتر أكبر ولكن الصفة ذات التكرار الأعلى هي التي تقع بتواتر أكبر.

٤- قد يوجد في بيان وصفي أو ترتيب صفتان أو وصفان لهما أعلى تكرار (تكرارهما متساويان وكل منهما يمثل التكرار الأعلى بالنسبة إلى بقية الصفات أو الأصناف) فعندئذ يمثل كل منهما منوالا، ونقول إن البيان الإحصائي ثنائي المنوال . والبيان الذي يتضمن منوالا فريدا يسمى وحيد المنوال . وقد يكون هناك ثلاثة أو أربعة منوال الخ . إلا أنه إذا كان لكل صفة أو صنف التكرار نفسه فنقول عندئذ بعدم وجود منوال ولا نقول إن كل صفة أو صنف هي في حد ذاتها منوال .

وعندما توجد في بيان إحصائي عددي مصنف فئة تتمتع بتكرار أعلى من تكرار أي فئة أخرى و يتناقص التكرار، أو يبقى ثابتا، من فئة إلى أخرى من الفئات السابقة أو اللاحقة لها، نقول إن هذه الفئة هي الفئة المنوالية، ونعتبر مركزها منوالا للبيان الإحصائي . * كما نقول عن التوزيع التكراري لهذا البيان إنه وحيد المنوال أو أحادي المنوال . والمنوال بهذا المعنى هو قمة فريدة في مدرج التكرار موافقة لفئة غير الفئة الأولى وغير الفئة الأخيرة . ومن المستحسن ألا نتحدث عن المنوال باعتباره مقياسا للنزعة المركزية إلا في هذه الحالة . وقد يتضمن المدرج التكراري عدة قمم نسبية . (كل فئة يزيد تكرارها على تكرار الفئة السابقة لها مباشرة، وعلى تكرار الفئة اللاحقة لها مباشرة، تشكل قمة نسبية) وفي حالة وجود قمتين نقول إن التوزيع التكراري ثنائي المنوال . وتكون الفئة الموافقة للقمة الأعلى الفئة المنوالية الرئيسة، ومركزها المنوال الرئيس . وتسمى الفئة الأخرى الفئة المنوالية الثانوية، ومركزها هو المنوال الثانوي . ولا يلعب المنوال، بصورة عامة، دورا كبيرا في علم الإحصاء . ويهتم بالمنوال عادة أصحاب الأعمال

* توجد في بعض الكتب طرق حسابية وصفية لحساب المنوال في مثل هذه الحالة . ولكن حساسيته للتغير في عدد الفئات أو حدودها لا يترك مسوغا قويا لتلك الطرق .

التجارية، والتسويق والدعاية، والقيمة الأكثر تكرارا لها مغزى خاص بالنسبة إليهم فالنوع الأكثر رواجاً في صناعة معينة يجذب اهتمام أصحاب هذه الصناعة زيادة في إنتاجه ومزيدها من الدعاية له. كما يهتم به أحيانا الباحثون في العلوم السلوكية باعتباره قابلاً للحساب في جميع أنواع البيانات.

مثال (١ - ١٧)

احسب منوال البيان الإحصائي المصنف في الجدول (١ - ٦).

الحل

نلاحظ أن أكبر تكرار، وهو 10، يقابل الفئة [107-111]. وأن التكرار يتناقص عندما نبتعد عن هذه الفئة في كلا الاتجاهين. فهذه الفئة هي إذا الفئة المنوالية، ومركزها 109 هو المنوال.

(١ - ٧ - ٦) مقارنة بين المتوسط والوسيط والمنوال


في كل من هذه المقاييس الثلاثة محاولة للتعبير عن الموضع الذي يتمركز عنده التوزيع التكراري، ولذلك سميت مقاييس النزعة المركزية. ويتضح من تعريف المتوسط أن قيمة كل قياس من قياسات بيان إحصائي تسهم في تشكيل قيمة متوسط هذا البيان. ولذلك فقد يتأثر تأثيراً بالغاً بالقيم المتطرفة. أما الوسيط فيتحدد من خلال المواقع النسبية للقياسات بعضها من بعض، أي أنه يتحدد من خلال رتب هذه القياسات. ولتأخذ، على سبيل المثال، القياسات 1, 2, 3, 4, 5 فمتوسطها ووسيطها 3، وإذا أضفنا إليها قياساً سادساً كبيراً جداً بالمقارنة مع بقية القياسات، وليكن، مثلاً، 69، نجد أن المتوسط أصبح $14 = \frac{84}{6}$ ، بينما أصبح الوسيط 3.5. فالوسيط زاد بمقدار نصف في حين زاد المتوسط بمقدار 11، والجدير بالذكر أن إضافة القياس السادس لن تزيد الوسيط إلا بمقدار نصف، مهما كانت قيمته، ولكن زيادة المتوسط ستصبح أكبر فأكبر كلما زادت قيمة القياس السادس الذي أضفناه. أما المنوال فلا يتحدد من خلال قيم القياسات، ولا من خلال رتبها، ولكنه يتحدد من خلال تكرار ظهورها في البيان الإحصائي.

لنرسم مدرج التكرار بعناية على ورق مقوى متجانس ، ولنرسم خطا رأسيا من النقطة التي تمثل المتوسط ، ثم لنقص الورقة بدقة على طول محيط المدرج التكراري . ولو أسندنا القطعة الناتجة ، وعلى طول الخط الرأسي المرسوم من المتوسط ، إلى حرف مستقيم وحاد كحرف سكين لتوازنت . وهذا يعني أن المتوسط هو مركز ثقل التوزيع . ولو رسمنا من القيمة المقابلة للوسيط خطا رأسيا لقسم المساحة الواقعة تحت المدرج التكراري إلى نصفين .

وإذا كان المدرج التكراري متناظرا ، (متماثلا) تطابقت المقاييس الثلاثة ، المتوسط والوسيط والمنوال . وبهذا المعنى يكون اختلافها البيّن كاشفا عن عدم تناظر أو التواء حاد في مدرج التكرار أو في مضع التكرار . وعلى الوجه الآخر، يشير اقترابها من بعضها إلى درجة عالية من التناظر في التوزيع التكراري .

والسؤال الوجيه هنا أي المقاييس الثلاثة نختاره للتعبير عن الموضع الذي يتمركز عنده التوزيع التكراري في حال اختلافها عن بعضها؟ والجواب يتوقف على نوع البيان الإحصائي وعلى شكل التوزيع وعلى الاستخدام الذي نبغيه للمقياس . ففي حالة بيان وصفي ليس لدينا إلا المنوال كما ذكرنا سابقا . وفي بيانات ترتيبية يمكن أن نختار بين المنوال والوسيط أما في البيانات العددية فيمكن اختيار أي من المقاييس الثلاثة . وإذا كان التوزيع التكراري متناظرا ووحيد المنوال [انظر الشكل (١ - ١١)أ]، فلا توجد مشكلة لأن المقاييس الثلاثة متطابقة . أما إذا كان التوزيع متناظرا وثنائي المنوال كما في الشكل (١ - ١١)ب، فمن الأفضل أن نقدم عند وصف البيان الإحصائي كلا من المنوالين، فقد يحجب تقديم القيمة المشتركة للمتوسط والوسيط نواح مهمة من البيان الإحصائي . فلنفرض مثلا أننا سألنا 26 من ذوي الدخل المحدود عن الحجم الأمثل الذي يتمناه لأسرته (عدد الأطفال مضافا إليهم الوالدان)، وقد حصلنا على الجدول التالي :

الحجم الأمثل للأسرة	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
التكرار	1	2	6	3	2	1	2	6	2	1



شكل (١-١١) أنواع من التوزيعات

ونجد هنا أن المتوسط $\bar{x} = 5.58$ ، وأن الوسيط $M = 6$. وهما تقريبا متساويان وإذا قلنا إن الحجم الأمثل هو في المتوسط ، فإننا نحجب بذلك وجود تيارين بارزين بين المستجيبين الستة والعشرين الذين سألناهم ، يمثلها المتوالان فقيمة أحد المتوالين 3 وقيمة المتوال الآخر 8 . والتياران الرئيسان ينقسمان بين من يريد طفلا واحدا وبين من

يريد عددا من الأطفال يبلغ ستة . وهاتان الناحيتان لا تفصح عنهما القيمة 6 (أي أربعة أطفال) . ولا توجد مشكلة في حالة بيان متناظر ليس له منوال كما في الشكل (١١ - ج)، فالمنوال غير موجود والمتوسط والوسيط متطابقان .

وفي حالة توزيعات ملتوية نجد أن القياسات في البيان الإحصائي يمتد بعضها إلى جانب بعض في جانب من المتوسط وتنتشر بعيدا على شكل ذيل في الجانب الآخر منه . ويكون اتجاه الذيل هو اتجاه الالتواء ، فإذا كان الذيل على اليسار قلنا إن التوزيع ملتو إلى اليسار كما في الشكل (١ - د) . وإذا كان الذيل على اليمين قلنا إن التوزيع ملتو إلى اليمين كما في الشكل (١ - هـ) . وفي التوزيعات الملتوية يقع الوسيط دائما بين المنوال والمتوسط . وبما أن المنوال بالطبع عند القمة فالمتوسط يأخذ موقعه في الجانب الآخر أقرب إلى الذيل . وهذا يرشح الوسيط مقياسا أكثر استقرارا وأفضل تعبيراً عن الموقع الذي يتمركز عنده التوزيع . فالمتوسط كما رأينا شديد الحساسية للقيم المتطرفة ، ولذلك نراه مائلا إلى اتجاه الذيل . أما المنوال فهو دائما في جانب القمة وشديد الحساسية ، في البيانات المصنفة ، للتغير في عدد الفئات أو حدودها مما يجعله أيضا خارج الاعتبار . وهكذا نفضل الوسيط في البيانات التي تتصف بالتواء واضح . ولتوضيح هذه الميزة للوسيط لنفرض أن مؤسسة تدفع رواتب سنوية لموظفيها ومستخدميها بالريال كما يلي :

180000, 72000, 30000, 18000, 3000, 3000, 3000, 3000

فنجد في هذا البيان أن المتوسط = 39000 ريال ، وأن الوسيط = 10500 ريال ، وأن المنوال = 3000 ريال . ومن الواضح أن الأرقام الثلاثة بتعبيرها عن متوسط الرواتب السنوية في هذه المؤسسة تقدم انطباعات مختلفة تماما . وأن كلا من المنوال والمتوسط لا يعبران بموضوعية عما يجري في المؤسسة . ولو أن مراقبا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أراد أن يظهر المؤسسة بمظهر الذي يدفع رواتب متدنية جدا في المتوسط لاختار المنوال مقياسا للنزعة المركزية . وفي المقابل فإن مدير المؤسسة سيختار المتوسط وهو 39000 ريال ليثبت أن رواتب الشركة مرتفعة . أما الباحث الاجتماعي الذي يرغب في التعبير

بموضوعية أكثر عما يجري فعلا في الشركة فسيختار الوسيط وهو 10500 ريال مقياسا للنزعة المركزية . وهذا المثال يوضح أيضا سبب قولنا إن الاختيار بين المقياس الثلاثة يتوقف أحيانا على الغرض الذي نريده من المقياس .

وإلى جانب هذه الميزة للوسيط في التوزيعات المتلوية يمكن أن نضيف أنه بصورة عامة سهل الحساب وغير حساس للقيم المتطرفة ويبقى حسابه ممكنا في بيانات ناقصة سقطت منها قيم بعض المفردات المتطرفة التي نعرف مواقعها النسبية . وعلى سبيل المثال ، لنأخذ البيان التالي عن درجات سبعة طلاب :

71, 68, - , 75, - , 77, -

ففي هذا البيان ثلاث درجات غير معروفة. ولكن لنفرض أننا نعلم عن الطلاب الثلاثة الذين لا نعلم بالتحديد درجاتهم أن أحدهم راسب ، والآخر ناجح بتقدير مقبول ، والثالث ناجح بتقدير ممتاز . فيمكننا معرفة الوسيط ، ويمكن ترتيب معلوماتنا كما يلي :

ممتاز, 77, 75, 71, 68, مقبول , راسب

واستنتاج أن الوسيط هو 71 . لا بل أكثر من ذلك لو علمنا أن ثلاثة منهم بين راسب ومقبول وثلاثة نالوا «جيد مرتفع» أو أفضل ، وأن أحدهم نال 71 ، لكانت هذه المعلومات كافية لاستنتاج أن الوسيط 71 .

ويبقى المتوسط مقياسا للنزعة المركزية يتمتع بخصائص مهمة تجعله مستخدما على نطاق واسع في علم الإحصاء وستتضح هذه النقطة للقارئ عبر هذا الكتاب ، ولو أخذنا عينات مختلفة بالحجم نفسه من مجتمع وحسبنا لكل عينة المتوسط والوسيط لوجدنا أن التغير من عينة إلى أخرى هو أقل في قيم المتوسط منه في قيم الوسيط ، ونعبر عن ذلك بقولنا إن المتوسط أكثر استقرارا من الوسيط عبر عينات متكررة نسحبها من مجتمع معين .

تمارين (١ - ٣)

(١) أوجد الوسيط لكل من المجموعات التالية من القياسات :

- أ - 6, 4, -1, 5, 1, 2
 ب - 17.2, 16.9, 17.5, 16.4, 17.1
 ج - 2, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1

(٢) في التمرين ٩ من مجموعة التمارين (١ - ٢)، احسب الوسيط والمنوال لعدد أيام الغياب .

(٣) في التمرين ١١ من مجموعة التمارين (١ - ٢)، احسب الوسيط والمنوال لأعمار العمال الخمسين في المستشفى . أي المقاييس الثلاثة تفضل؟

(٤) صنفتنا عينة من محصول التفاح وفقا لوزن التفاحة مقاسا بالأونزة، فحصلنا على التوزيع التكراري التالي :

الوزن	0.21-0.30	0.31-0.40	0.41-0.50	0.51-0.60	0.61-0.70
التكرار	31	45	36	23	11

احسب المتوسط والوسيط والمنوال . أيهما تفضل للتعبير عن النزعة المركزية؟

(٥) احسب المتوسط والوسيط إذا علمت توزيع التكرار النسبي التالي :

الفئة	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
التكرار النسبي	0.24	0.36	0.28	0.12

(٦) يبين الجدول التالي توزيع فترة الإقامة في المستشفى لأطفال تحت سن الخامسة عشرة

من العمر ممن أجروا عمليات استئصال اللوز والزوائد الأنفية، وذلك في كل من أربع مجموعات من المستشفيات .

احسب المتوسط والوسيط والمنوال لطول فترة الإقامة في كل مجموعة من المستشفيات .

مجموعة المشافي	فترة الإقامة (بالأيام)											المجموع
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	-	-	16	113	36	5	4	2	1	-	1	178
B	-	1	1	2	2	-	27	-	-	-	-	33
C	-	-	12	33	20	28	35	7	1	4	6	146
D	-	97	6	2	6	28	11	27	2	1	4	184

٧) يبين الجدول على الصفحة التالية جزءاً من دراسة لحجم رد الفعل لاختبار الليرومين في ثلاث جماعات من الأطفال، وقد أعطي الأطفال في الجماعة الأولى لقاح الـ B.C.G. عند ولادتهم عن طريق الفم، وفي الجماعة الثانية أعطي الأطفال اللقاح عن طريق أدمة الجلد، ولم يعط أطفال الجماعة الثالثة لقاح الـ B.C.G.

احسب لكل جماعة المتوسط، الوسيط والمنوال لقياسات نصف قطر رد الفعل .

٨) حشرات من نوع العت تتغذى على فئران مصابة بدودة الفيلاريا . وقد أخذت هذه الحشرات بعد فترة وأحصي عدد الميكروفيلاريا في كل عت . ويمثل البيان التالي نتائج التعداد لخمسين عتاً . احسب المتوسط، الوسيط، والمنوال لهذه القياسات وعلق على الفروق بين هذه المقاييس الموضعية الثلاثة .

7	12	3	3	1	8	0	7	2	0
10	15	3	19	1	2	2	15	3	4
7	0	9	0	18	4	6	6	10	1
1	9	14	3	7	5	7	5	14	20
6	1	2	14	3	3	5	1	4	3

٩) فيما يلي مستوى السكر في الدم مأخوذاً في الصباح قبل تناول الفطور لعشرة أطفال:

56, 62, 63, 65, 65, 65, 68, 70, 72

احسب الوسيط والمنوال .

١٠) يبين الجدول التالي التكرار النسبي المتجمع لعمر العروس وفي أربع عينات من النساء مأخوذة من أربع جماعات، تاريخ الميلاد في الجماعة الأولى يعود إلى ما قبل 1925، وفي الثانية بين 1925 إلى 1934، وفي الثالثة من 1935 إلى 1944، وفي الرابعة من 1945 إلى 1954.

ارسم مضلع التكرار النسبي المتجمع الصاعد لكل من العينات الأربع، وقدر العمر الوسيط للعروس في كل جماعة.

نصف قطر رد الفعل (بالميليمتر)	عدد الأطفال		
	B.C.G. عن طريق الفم	B.C.G. تحت الجلد	لم يعط B.C.G.
1	-	2	7
2	-	3	2
3	36	53	39
4	22	22	-
5	29	42	9
6	18	15	2
7	10	4	-
8	8	4	2
9	3	-	-
10	3	2	-
11	-	-	-
12	3	-	-
13	-	-	-
14	2	1	-
15	1	-	-
16	1	-	-
المجموع	136	150	61

العمر عند الزواج	قبل 1925 N = 61	1925-1934 N = 83	1935-1944 N = 90	1945-1954 N = 106
	%	%	%	%
9-10	3.4	6.0	5.6	9.6
11-12	6.9	13.3	18.0	21.1
13-14	39.7	27.7	38.2	39.4
15-16	58.6	56.2	68.5	73.1
17-18	63.8	74.7	77.5	90.3
19-20	74.1	80.7	85.4	98.8
21-22	79.3	86.7	89.9	99.0
23-24	82.8	88.0	95.5	100
25-26	87.9	90.4	97.7	
27-28	89.7	92.8	97.7	
20-30	93.1	96.4	98.8	
> 30	100	100	100	

١١) فيما يلي أوزان عشرة حيوانات تجريبية وذلك بعد مداخلة جراحية (مقاسة بالكغ):

13.2, 15.4, 13.0, 16.6, 16.9, 14.4, 13.6, 15.0, 14.6, 13.1

احسب الوسيط .

١٢) فيما يلي المسافة (إلى أقرب ميل) التي قطعها كل من خمسة عشر مريضا حتى وصلوا إلى أقرب مستوصف:

5, 9, 11, 3, 12, 13, 12, 6, 13, 7, 3, 15, 12, 15, 5

ما وسيط المسافة التي يقطعها المريض حتى يصل إلى أقرب مستوصف؟

١٣) كانت فترة الإقامة بالأيام لأول أحد عشر مريضاً أدخلوا إلى جناح للأمراض النفسية افتتح حديثاً في أحد المستشفيات كما يلي :

29, 14, 11, 24, 14, 14, 28, 14, 18, 22, 14

احسب الوسيط والمنوال لعدد أيام الإقامة في المستشفى .

١٤) فيما يلي جدول توزيع تكراري يلخص بيانا إحصائياً عن درجة تلوث الهواء (مقاسة بالميكروجرام في المتر المكعب) في 57 مدينة كبيرة .

الفئات	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
التكرار	5	19	10	13	4	4	2

احسب المتوسط والوسيط والمنوال .

١٥) في كل من التمارين ٣ إلى ١٧ من مجموعة التمارين (١ - ١)، احسب الوسيط .

١٦) بعد افتتاح مركز حديث للتسوق قرب ضاحية معينة، ازدادت حركة المرور فيها، وقد حددت إدارة المرور السرعة القصوى في شارع الضاحية بـ 35 كم/سا . وبعد شكاوي عن عدم التزام السيارات بهذا الحد قامت دورية مرور خلال 15 دقيقة من المراقبة برصد سرعات 25 سيارة مرت من ذلك الشارع . وحصلت على البيان التالي :

15, 40, 47, 25, 37, 23, 20, 38, 29, 40,

35, 28, 37, 38, 35, 37, 27, 36, 30, 38,

40, 43, 25, 20, 42

أ - إذا كنت من سكان الضاحية الذين يرغبون في استخدام هذا البيان لإثبات أن السيارات بصورة عامة لا تتقيد بحد السرعة المفروض، فهل تستخدم المنوال، أم الوسيط أم المتوسط؟

ب- إذا كنت ممن يعارضون فرض حد للسرعة وتريد استخدام هذا البيان لدعم وجهة نظرك بأن السيارات ملتزمة بصورة عامة بلوحة المرور، أي المقاييس تختار؟

(١٧) تهتم شركة بمعرفة مدى استخدام موظفيها للهواتف في مكالمات شخصية. وفي أحد الأيام راقبت عدد المكالمات الشخصية التي قام بها كل موظف فحصلت على البيان التالي:

عدد المكالمات الشخصية	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
عدد الموظفين	1	1	0	0	11	8	6	23	112	65	273

أ - أوجد متوسط المكالمات الشخصية للموظف الواحد في ذلك اليوم.

ب - آخذنا في اعتبارك أولئك الذين استخدموا الهاتف لأغراض شخصية فقط، ما المقياس الذي تجده أفضل تعبيراً عن النزعة المركزية؟ احسب هذا المقياس.

(١٨) في التمرين ٥ من مجموعة التمارين (١ - ١)، احسب المتوسط والوسيط والمنوال. أي المقاييس الثلاثة تفضل ولماذا؟

(١٩) في التمرين ١٨ من مجموعة التمارين (١ - ١)، احسب مقياس النزعة المركزية الذي تعتقد أنه مناسب في كل من بيان الأطباء وبيان الأسرة. وأوضح أسباب تفضيلك.

(٢٠) في التمرين ١٣ من مجموعة التمارين (١ - ٢) احسب الوسيط. أيهما تفضل المتوسط أم الوسيط ولماذا؟

(٢١) فيما يلي بيان بعدد الزيارات التي قام بها المراجعون للعيادات الخارجية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق الأربع عشرة في المملكة، وذلك خلال عام ١٤٠٦هـ، بآلاف المراجعين:

11169, 4330, 4870, 3029, 2050, 4802, 1577,
6375, 6034, 1480, 3876, 3465, 2826, 1794.

احسب المتوسط والوسيط أيهما تعتقد أنه الأفضل لقياس النزعة المركزية ولماذا؟


(١ - ٨) مقاييس التشتت

ناقشنا في الفقرات السابقة معايير موضوعية تهدف إلى تحديد الموضع الذي تتمركز عنده جملة من القياسات الإحصائية. ولكنها لا تكفي وحدها لتشكيل صورة ذهنية متكاملة عن التوزيع التكراري للبيان الإحصائي. وإلى جانب المكان الذي يشكل مركز التوزيع نحتاج إلى معرفة كل ما يمكن معرفته عن خاصية التغير من قياس إلى آخر ضمن البيان الإحصائي، وعن مواقع القياسات بالنسبة إلى مركزها. فالقياسات 1, 2, 3, 4, 5 لها متوسط يساوي 3 وهو بالذات متوسط للقياسات 209, 602, 4, 200, 600. - ولكن شتان ما بين المجموعتين من القياسات من حيث درجة تجمعها حول المركز المشترك لكل منها وهو 3. ومن المعروف أنه لا يمكن لقياسات بيان إحصائي أن تكون متساوية. ولو قسنا، مثلا، أطوال مجموعة من أوراق نبات معين، لاختلف القياس من ورقة إلى أخرى، ولو كان الشخص نفسه هو الذي يكرر قياس ظاهرة معينة مستخدما الجهاز نفسه في كل مرة، فسيختلف القياس الذي يحصل عليه من محاولة إلى أخرى. والتغير ظاهرة ملازمة لكل بيان إحصائي، وإذا كان التوزيع التكراري للبيان الإحصائي يتمركز عند المتوسط الحسابي، فهو ينتشر على جانبي هذا المتوسط، وكلما كان التغير كبيرا من قياس إلى آخر، اتسع انتشار القياسات حول متوسطها. وبصورة عامة. فإن القياسات التي تحتشد وتتجمع حول متوسطها، وقريبا منه، يكون تشتتها صغيرا. بينما يكون تشتت القياسات المبعثرة التي تنتشر بعيدا على جانبي المتوسط، تشتتا كبيرا. وسنحاول فيما يلي تقديم معايير كمية لقياس شدة تبعثر القياسات في بيان إحصائي، أو لقياس درجة انتشار وتشتت القياسات حول متوسطها. وسنبدا بتعريف المدى.

(١ - ٨ - ١) تعريف المدى

مدى بيان إحصائي هو الفرق بين أكبر قياس وأصغر قياس في البيان الإحصائي .

ومن الواضح أن المدى يعطي فكرة واضحة عن المسافة على محور الأعداد التي يتوضع فيها البيان الإحصائي . وإذا استثنينا القيمتين المتطرفتين في البيان الإحصائي فإن المدى بمفرده عاجز عن تقديم أية معلومات عن أسلوب انتشار بقية القياسات حول المتوسط . وعلى سبيل المثال ، إذا كان لدينا عشرة قياسات متوسطها 5.5 وأحدها 1 وأكبرها 10 . فيمكن تصور هذه القياسات العشرة بأشكال عديدة تختلف اختلافا شديدا في درجة تبعثرها وتشتتها حول المتوسط ، ونجد في الشكل (١ - ١٢) تصويرين مختلفين . ففي الشكل (١ - ١٢) أ، نجد القياسات 1, 1, 2, 2, 2, 2, 9, 9, 9, 10, 10 وفي الشكل (١ - ١٢) ب، نجد القياسات 1, 5, 5, 5, 5.5, 5.5, 6, 6, 6, 10 ومع أن للمجموعتين المدى نفسه وهو $9 = 10 - 1$ ، إلا أن الفارق كبير بين درجة تركز كل منهما حول المتوسط المشترك 5.5 :



شكل (١-١٢)

وإذا كان المدى يضم بين طرفيه جميع قياسات البيان الإحصائي فلماذا لا نفكر بمدى أكثر تواضعا يضم بين طرفيه نسبة عالية من القياسات (ثمانين بالمائة منها مثلا) بدلا من أن يضمها جميعها . ولو عرفنا مثلا ، القياس الذي يقل عنه 10% من القياسات ، وسنسميه المئين عشرة ، والقياس الذي يقل عنه 90% من القياسات ، وسنسميه المئين تسعين ، فبين المئين عشرة والمئين تسعين يقع ثمانون بالمائة من القياسات . ولو حسبنا هذين القياسين ووجدناهما قريبين من بعضهما ، فسيعطينا ذلك تصورا مفيدا تماما عن واقع انتشار أو تشتت البيان الإحصائي . وسنعرف فيما يلي المئينات باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير عن تشتت بيان إحصائي .

(١-٨-٢) تعريف المئينات

ليكن r أي عدد صحيح بين الصفر والمائة، نعرف المئين r لبيان إحصائي بأنه العدد الذي يقل عنه r بالمائة من قياسات البيان الإحصائي .

ونلاحظ من هذا التعريف أن المئين r ، وسنرمز له بـ P_r ، هو القياس المقابل لتكرار متجمع يساوي $n \times \frac{r}{100}$ ، حيث n عدد القياسات . ومن الواضح أن P_{50} هو الوسيط باعتباره القياس المقابل لتكرار متجمع يساوي $n \times \frac{50}{100}$ أو $\frac{n}{2}$. ويسمى P_{25} (المئين 25) الربع الأدنى ، باعتباره يحصر إلى اليسار منه ثلاثة أرباع القياسات وسنرمز له بـ Q_1 . كما يسمى P_{75} (المئين 75) الربع الأعلى باعتباره يحصر إلى اليسار منه ثلاثة أرباع القياسات وسنرمز له بـ Q_3 . والمسافة بين هذين القياسين ، أي الفرق بين الربع الأعلى والربع الأدنى ، تسمى المدى الربيعي .

$$\text{المدى الربيعي} = Q_3 - Q_1$$

ويضم المدى الربيعي بين طرفيه 50% من القياسات . ويعتبر نصف المدى الربيعي $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$ أحد معايير التشتت .

وتجدر ملاحظة أن أكبر قياس في البيان الإحصائي هو المئون 100 (P_{100}) وأن أصغر قياس هو المئون صفر (P_0) . وأن المدى هو $P_{100} - P_0$.

ولقد أوضحنا عمليا طريقة حساب أي مئين في الفقرة (١-٤) ، ولحساب (P_r) ، بصورة عامة ، نكتب أولا جدول التكرار المتجمع الصاعد ، ثم نحسب رتبة المئين r وهي $n \times \frac{r}{100}$ ، حيث n عدد القياسات في البيان الإحصائي . وتحدد رتبة المئين الفئة التي ينتمي إليها المئون وسنسميها فئة المئين ، كما تحدد بالطبع الفئة السابقة لها . لنرمز الآن بـ F_p للتكرار المقابل لفئة المئين في جدول التكرار المتجمع الصاعد ، وبـ F_b

للتكرار المقابل للفئة السابقة، وب w لطول الفئة، وب L للحد الأعلى الحقيقي المقابل للفئة السابقة. فنجد بعملية تناسب طردي بسيط أن:

زيادة القياس زيادة التكرار

$$F_p - F_b \qquad w$$

$$\frac{nr}{100} - F_b \qquad ?$$

ومنه:

$$\text{زيادة القياس المطلوبة لبلوغ المئين } r = \frac{\frac{nr}{100} - F_b}{F_p - F_b} \times w$$

ويكون المئون r المطلوب:

$$P_r = L + \frac{\frac{nr}{100} - F_b}{F_p - F_b} \times w$$

مثال (١-١٨)

احسب Q_1 (الربيع الأدنى)، و Q_3 (الربيع الأعلى) للتوزيع التكراري في الجدول (١-٣) واحسب نصف المدى الربيعي.

الحل

$$١ - \text{رتبة الربيع الأدنى هي } 12.5 = 50 \times \frac{25}{100} = n \times \frac{25}{100}$$

وأول فئة يزيد التكرار المتجمع المقابل لها على 12.5 تكون فئة الربيع الأدنى.

٢ - نطبق قاعدة التناسب الطردي فنكتب:

نكتب جدول التكرار المتجمع الصاعد وتسير الخطوات الحسابية كما يلي :

	أقل من	التكرار المتجمع الصاعد
	86.5	1
	91.5	3
— الفئة السابقة	96.5	7
— فئة الربيع الأدنى	101.5	14
	106.5	23
— الفئة السابقة	111.5	33
— فئة الربيع الأعلى	116.5	40
	121.5	46
	126.5	50

زيادة التكرار

$$14 - 7$$

$$12.5 - 7$$

زيادة القياس

$$5$$

$$?$$

$$\text{الزيادة المطلوبة لبلوغ الربيع الأدنى} = \frac{12.5 - 7}{14 - 7} \times 5 = 3.93$$

$$Q_1 = 96.5 + 3.93 = 100.43$$

ولحساب الربيع الأعلى (Q_3) نجد بصورة مماثلة أن رتبة الربيع الأعلى هي $50 \times \frac{75}{100} = 37.5$

زيادة التكرار

$$40 - 33$$

$$37.5 - 33$$

زيادة القياس

$$5$$

$$?$$

$$\text{الزيادة المطلوبة لبلوغ الربيع الأعلى} = \frac{37.5 - 33}{40 - 33} \times 5 = 3.21$$

$$Q_3 = 111.5 + 3.21 = 114.71$$

أو نطبق الصيغة العامة التي استخرجناها من أجل المئينات فنجد من الجدول ، في حالة الربيع الأدنى أن $\omega = 5$ ، $L = 96.5$ ، $F_p = 14$ ، $F_b = 7$ ، $r = 25$ ثم نعوض في العلاقة :

$$P_r = L + \frac{\frac{nr}{100} - F_b}{F_Q - F_b} \times \omega$$

وفي حالة الربع الأعلى يكون $\omega = 5$, $L = 96.5$, $F_p = 14$, $F_b = 7$, $r = 25$.

وأخيرا:

$$\text{نصف المدى الربيعي} = \frac{114.71 - 100.43}{2} = \frac{14.28}{2} = 7.14$$

ولكن لماذا لا نبحث عن مقياس للتشتت يساهم في تشكيله كل قياس من قياسات البيان الإحصائي بدلا من أن يقتصر على مئينين أو على أكبر قياس وأصغر قياس؟ ومن الواضح أن التشتت يعود في الأساس إلى قرب أو بعد القياسات عن متوسطها. فلنحاول إذا التعبير عن التشتت بدلالة انحراف كل قياس عن المتوسط، أي بدلالة $d_i = x_i - \bar{x}$. ونعلم من خواص المتوسط أن مجموع هذه الانحرافات يساوي الصفر مما لا يترك مجالاً للتفكير في متوسط هذه الانحرافات كمقياس للتشتت. ولكن حل هذه المشكلة سهل طالما أنه يعود إلى وجود انحرافات موجبة وانحرافات سالبة، فلماذا لا نحسب متوسط القيم المطلقة للانحرافات؟

(١-٨-٣) تعريف متوسط الانحراف

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات متوسطها \bar{x} . نعرف متوسط الانحراف لهذه القياسات، ونرمز له بـ D ، بأنه متوسط القيم المطلقة لانحرافات القياسات عن متوسطها.

$$D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |d_i|$$

وتلافياً للتعقيدات التي يسببها وجود القيمة المطلقة عند استخدام المعيار D في التحليل الإحصائي، يمكن اللجوء إلى حل آخر لمشكلة الانحرافات الموجبة والانحرافات السالبة، وذلك بأخذ مربعات الانحرافات بدلا من قيمها المطلقة، مما يؤدي إلى تعريف مقياس للتشتت يسمى التباين.

(١ - ٨ - ٤) تعريف التباين

تباين مجتمع من القياسات يتضمن N قياسا x_1, x_2, \dots, x_N هو متوسط مربعات انحرافات القياسات عن متوسطها. وسنرمز له بـ σ^2 ، وبصورة رمزية نكتب:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

وتجدر ملاحظة أن التباين موجب دوماً لأنه ناشئ عن مجموع مربعات ، أي مجموع كميات موجبة . ويكون التباين صفراً إذا فقط إذا كانت القياسات جميعها متساوية .

(١ - ٨ - ٥) الانحراف المعياري لمجتمع

الانحراف المعياري σ هو الجذر التربيعي الموجب للتباين

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

ويقاس الانحراف المعياري بوحدة القياس نفسها المستخدمة في البيان الإحصائي .

ملاحظة

الرمز المستخدم σ هو الحرف الأبجدي سيجما في الأبجدية اليونانية بالخط الصغير ويكتب بالخط الكبير على الشكل Σ .

وكما ذكرنا سابقا إذا كان لدينا مجتمع من القياسات وتباينه σ^2 غير معروف أو غير متوفر فيمكن أخذ عينة من هذا المجتمع حجمها n ، مثلا ، وحساب تباينها ثم اعتبار هذا التباين تقديرا أو تخميना لتباين المجتمع الذي نهله . ومن الطبيعي أن يكون تباين العينة ، وفقا لتعريف التباين ، مساويا لمتوسط مربعات انحرافات القياسات الـ n في العينة عن متوسطها . ولكن يبرهن في الإحصاء الرياضي أن تباين العينة سيكون تقديرا أفضل لتباين المجتمع إذا قمنا بتعديل طفيف جداً في صيغة التعريف . وهذا التعديل

هو أن نقسم مجموع مربعات الانحرافات عن المتوسط $\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]$ على $(n-1)$ بدلا

من قسمتها على (n) . وهكذا سنرمز لتباين عينة بـ S^2 ، تمييزا له عن σ^2 تباين المجتمع ، ونعرفه كما يلي :

(٦-٨-١) تعريف تباين عينة

تباين عينة من القياسات x_1, x_2, \dots, x_n هو :

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

حيث \bar{x} متوسط العينة .

(٧-٨-١) تعريف الانحراف المعياري لعينة

الانحراف المعياري لعينة من القياسات x_1, x_2, \dots, x_n هو الجذر التربيعي الموجب لتباين العينة .

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

وفيا تبقى من هذا الفصل سنتبر تباين أي جملة من القياسات تباين عينة ، ونطبق لحساب التباين التعريف (٦-٨-١) وحيثما وردت كلمة التباين أو الانحراف المعياري ، فيما بقي من هذا الفصل ، فسنعني بها تباين العينة (S^2) كما عرفناه في (٦-٨-١) ، والانحراف المعياري لعينة (S) كما عرفناه في (٧-٨-١) ، إلا إذا ذكرنا ما يخالف ذلك .

مثال (١٩-١)

لتكن جملة القياسات $4, 2, 1, 7, 5$ ، احسب متوسط الانحراف ، والتباين ، والانحراف المعياري .

$$\bar{x} = \frac{19}{5} = 3.8$$

الحل

ننظم الجدول التالي بعد حساب المتوسط \bar{x} . ثم نطبق التعريف مباشرة لنجد :

	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
	5	1.2	1.44
	7	3.2	10.24
	1	-2.8	7.84
	2	-1.8	3.24
	4	0.2	0.04
المجموع	19	0	22.8

$$D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \quad (\text{متوسط الانحراف})$$

$$= \frac{1}{5} (1.2 + 3.2 + 2.8 + 1.8 + 0.2) = \frac{9.2}{5} = 1.84$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{22.8}{4} = 4.56 \quad (\text{التباين})$$

$$S = \sqrt{4.56} = 2.14 \quad (\text{الانحراف المعياري})$$

والتطبيق المباشر للتعريف يتطلب جهدا حسابيا لا مسوغ له . (يتضمن $2n + 1$ عملية حسابية) ويعاني، في الغالب، من نقص في الدقة . وإذ نحسب قبل كل شيء المتوسط \bar{x} ، نبدأ بعملية تقسيم، وإذا كانت عملية التقسيم غير منتهية فسيؤثر ذلك على دقة النتائج اللاحقة . وسنقدم الآن صيغة مختزلة لحساب التباين تختصر الجهود الحسابية وتعطي التباين بدقة أكبر.

(١-٨-٨) صيغة مختزلة لحساب التباين

باستخدام خواص الرمز Σ المذكورة في البند (٥) من الملحق (١)، ومن تعريف

المتوسط يمكن أن نكتب ما يلي :

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) \\
&= \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n 2\bar{x}x_i + \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 \\
&= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2 \\
&= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} (n\bar{x}) + n\bar{x}^2 \\
&= \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2 \\
&= \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}
\end{aligned}$$

ومنه :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n} \right]$$

ولم نعد نستهل العمل الحسابي بعملية تقسيم، بالإضافة إلى أن هذه العبارة

تتضمن $(n+6)$ عملية حسابية مما يوفر $(n-2)$ عملية حسابية. وهي بذلك أسرع وأدق من التطبيق المباشر للتعريف.

ونكتب العبارة المختزلة السابقة، أحيانا، على الشكل :

$$s^2 = \frac{1}{n(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right]$$

وهي تتضمن عملية تقسيم واحدة تشكل خاتمة العمل الحسابي . ومع ما يبدو للوهلة الأولى من تعقيد في كتابة الصيغة المختزلة ، إلا أن كل ما نحتاجه لتطبيقها هو مجموع القياسات ومجموع مربعاتها وعددها .

مثال (١ - ٢٠)

احسب تباين القياسات في المثال (١ - ٦) بتطبيق الصيغة المختزلة .

الحل

ننظم الجدول المبين جانبا ثم نطبق الصيغة المختزلة فنجد :

	x_i	x_i^2
	5	25
	7	49
	1	1
	2	4
	4	16
المجموع	19	95

$$s^2 = \frac{1}{4} \left[95 - \frac{(19)^2}{5} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left(95 - \frac{361}{5} \right) = 4.56$$

(١ - ٨ - ٩) حساب التباين في بيانات مصنفة

لنعد إلى الفقرة (١ - ٥) ، وبخاصة إلى الجدولين (١ - ٦) و (١ - ٧) ، ولنحاول تطبيق التعريف (١ - ٨ - ٦) فالمطلوب إذا هو حساب انحراف كل قياس y_i عن المتوسط \bar{y} ، ثم أخذ مجموع مربعات هذه الانحرافات . وإذا كان القياس y_1 ، مثلا ، مكررا f_1 مرة ، فسيتضمن مجموع مربعات الانحرافات حدودا متطابقة ومكررة مثل :

$$\underbrace{(\cdot y_1 - \bar{y})^2 + (y_1 - \bar{y})^2 + \dots + (y_1 - \bar{y})^2}_{\text{مكرر } f_1 \text{ مرة}}$$

ومن الأفضل بالطبع، كتابة مجموع حدود مطابقة لبعضها مثل هذه الحدود، على الشكل

$$f_1 (y_1 - \bar{y})^2$$

والأمر نفسه في بقية الحدود، وهكذا تتخذ العلاقة الواردة في تعريف تباين العينة، الصيغة التالية من أجل بيان مرتب:

$$S^2 = \frac{1}{\sum_1^m f_i - 1} \left[\sum_1^m f_i (y_i - \bar{y})^2 \right]$$

حيث:

$$\bar{y} = \frac{\sum_1^m f_i y_i}{\sum_1^m f_i}$$

وتصبح الصيغة المختزلة لحساب التباين كما يلي:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_1^m f_i y_i^2 - \frac{\left(\sum_1^m f_i y_i \right)^2}{n} \right]$$

$$\cdot n = \sum_1^m f_i \text{ حيث}$$

مثال (١-٢١)

قذفنا حجر نرد مائة مرة فكانت تكرارات النتائج الست الممكنة كما يلي:

جدول (١-١٦)

y_i	1	2	3	4	5	6
f_i	19	15	15	20	14	17

والمطلوب حساب تباين هذا التوزيع التكراري وانحرافه المعياري .

الحل

لحساب التباين ننظم الجدول التالي

جدول (١ - ١٧)

	y_i	f_i	$f_i y_i$	$f_i y_i^2$
	1	19	19	19
	2	15	30	60
	3	15	45	135
	4	20	80	320
	5	14	70	350
	6	17	102	612
المجموع		$100 = \sum f_i$	$346 = \sum f_i y_i$	$1496 = \sum f_i y_i^2$

والتباين المطلوب (S^2) هو:

$$S^2 = \frac{1}{99} \left[1496 - \frac{(346)^2}{100} \right] = 3.02$$

والانحراف المعياري (S) هو

$$S = \sqrt{3.02} = 1.74$$

ولحساب تباين بيان مصنف (أو مبوب) نعتبر أن جميع القياسات التي تنتمي إلى فئة مساوياً لمركز هذه الفئة والخطوات الحسابية هي بالضبط كما في حالة بيان الرتب، حيث هي الآن مركز الفئة، و f_i التكرار الموافق لهذه الفئة. وللتوضيح نأخذ المثال التالي.

مثال (١ - ٢٢)

احسب التباين والانحراف المعياري للتوزيع التكراري في الجدول (١ - ٦).

الحل

ننظم الجدول التالي :

جدول (١-١٨)

	y_i مركز الفئة	f_i التكرار	$f_i y_i$	$f_i y_i^2$
	84	1	84	7056
	89	2	178	15842
	94	4	376	35344
	99	7	693	68607
	104	9	936	97344
	109	10	1090	118810
	114	7	798	90972
	119	6	714	84966
	124	4	496	61504
المجموع		$50 = \sum f_i$	$5365 = \sum f_i y_i$	$580445 = \sum f_i y_i^2$

ويكون التباين المطلوب (S^2) هو

$$\begin{aligned}
 S^2 &= \frac{1}{49} \left[580445 - \frac{(5365)^2}{50} \right] \\
 &= \frac{1}{49} [580445 - 575664.5] \\
 &= \frac{4780.5}{49} = 97.56
 \end{aligned}$$

والانحراف المعياري (S) هو

$$S = \sqrt{97.56} = 9.88$$

والجددير بالذكر أننا لو حسبنا الانحراف المعياري من البيان الأصلي المعطى في الجدول (١-٤) مباشرة لحصلنا على $S = 10.05$.

(١-٨-١٠) أثر الانسحاب وتغيير سلم القياس في التباين

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات، متوسطها \bar{x} ، وتباينها S_x^2 . إذا أضفنا العدد نفسه، b مثلاً، إلى كل قياس، فينبغي ألا يؤثر ذلك على التباين. وإذا تعتمد قيمة التباين على الفروق بين القياسات، فإن الفرق بين أي قياسين لن يتغير

عندما نضيف إلى كل منهما العدد نفسه [انظر البند (٨) من الملحق ١]. أما إذا ضربنا كل قياس بعدد، a مثلاً، فسيُضرب التباين بمربع هذا العدد، a^2 ، ويضرب الانحراف المعياري بالقيمة المطلقة للعدد a . ويمكن بيان ذلك في المحاكمة البسيطة التالية:

لنرمز بـ y_i للقياس الناتج عن ضرب x_i بـ a ثم إضافة b إلى الناتج، أي لنفرض أن:

$$y_i = ax_i + b ; i = 1, 2, \dots, n$$

فنعلم من خواص المتوسط (الفقرة ١-٧-٢) أن:

$$\bar{y} = a\bar{x} + b$$

حيث يرمز \bar{y} للمتوسط الجديد. ومن تعريف التباين وخواص المجموع Σ [انظر البند (٥) من الملحق (١)] يمكن أن نكتب:

$$\begin{aligned} s_y^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{n-1} [(ax_i + b) - (a\bar{x} + b)]^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [a(x_i - \bar{x})]^2 = a^2 \times \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = a^2 s_x^2 \end{aligned}$$

وبأخذ الجذر التربيعي الموجب للطرفين نجد:

$$s_y = |a| s_x$$

وهذا يعني أن عملية الانسحاب لا تؤثر في التباين كما توقعنا، ولكن عملية تغيير سلم القياس لها أثر كبير في التباين. وعلى سبيل المثال، إذا كانت القياسات x_i مقاسة بالسنتيمتر، وغيرنا وحدة القياس إلى المليمتر، أي ضربنا كل قياس بـ 10 ، فإن التباين سيضرب بمائة، وسيضرب الانحراف المعياري بعشرة.

(١-٩) حساب المتوسط والانحراف المعياري من خلال تحويل البيان الإحصائي

سنقدم فيما يلي طريقة لحساب المتوسط والانحراف المعياري توفر الكثير من الجهود الحسابية، وذلك في حالة بيان مصنف أطوال الفئات فيه متساوية. وهي طريقة عامة وسهلة التطبيق، فلنفرض أن طول الفئة ω ، وأن y_0 مركز الفئة الواقعة في الوسط تماماً إذا كان عدد الفئات فردياً، أو مركز إحدى الفئتين الواقعتين في الوسط إذا كان عدد الفئات زوجياً. ولنطبق على مراكز الفئات التحويل:

$$Z_i = \frac{y_i - y_0}{\omega}$$

أي نطرح من مركز كل فئة العدد y_0 ثم نقسم الناتج على ω . ومن علاقة التحويل نستنتج أن:

$$y_i = \omega Z_i + y_0$$

وكما نعلم فإن:

$$\bar{y} = \omega \bar{Z} + y_0$$

و

$$S_y^2 = \omega^2 S_z^2, S_y = |\omega| S_z = \omega S_z$$

ω هنا موجبة دوما باعتبارها طول فئة.

وسنجد أن المقادير Z_i أعداد صحيحة متناظرة حول الصفر. وفي حالة تسع فئات، مثلا، سنجد المقادير Z_i على الشكل 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 - وبالطبع فإن التعامل مع هذه الأعداد أسهل كثيرا. والآن نعتبر هذه الأعداد مراكز للفئات وننجز الحسابات تماما كما في الفقرة السابقة (١-٨-٣) فنحصل على \bar{Z} و S_z^2 و S_z بسهولة، ومنها نستنتج المتوسط والتباين والانحراف المعياري للبيان الأصلي قبل التحويل من خلال العلاقات:

$$\bar{y} = \omega \bar{Z} + y_0, S_y^2 = \omega^2 S_z^2, S_y = \omega S_z$$

مثال (١-٢٣)

بالعودة إلى المثال (١-٢٢)، احسب المتوسط والانحراف المعياري بطريقة تحويل البيان الإحصائي.

الحل

لدينا تسع فئات، والفئة الواقعة في الوسط هي الفئة الخامسة ومركزها $y_0 = 104$. وطول الفئة $\omega = 5$. وبإجراء التحويل:

$$Z_i = \frac{y_i - 104}{5}$$

تصبح مراكز الفئات

$$Z_1 = \frac{y_1 - 104}{5} = \frac{84 - 104}{5} = -4$$

$$Z_2 = \frac{y_2 - 104}{5} = \frac{89 - 104}{5} = -3$$

وهكذا.

وبدلاً من الجدول (١٨-١) ننظم الجدول (١٩-١)، التالي:

جدول (١٩-١)

مركز الفئة y_i	التكرار f_i	Z_i	$f_i Z_i$	$f_i Z_i^2$
84	1	-4	-4	16
89	2	-3	-6	18
54	4	-2	-8	16
99	7	-1	-7	7
104	9	0	0	0
109	10	1	10	10
114	7	2	14	28
119	6	3	18	54
124	4	4	16	64
المجموع	50		33	213

$$\bar{Z} = \frac{33}{50} = 0.66$$

$$S_z^2 = \frac{1}{49} \left[213 - \frac{(33)^2}{50} \right] = \frac{191.22}{49}$$

ومنه

$$\bar{y} = \omega \bar{Z} + 104 = 5 \times 0.66 + 104 = 107.3$$

$$S_y^2 = \omega^2 S_z^2 = 25 \times \frac{191.22}{49} = 97.56 ; S_y = 9.88$$

وهي الأجوبة ذاتها التي حصلنا عليها في المثال (١-٢٢).

(١٠ - ١) حول الأهمية العملية للمتوسط والانحراف المعياري

من الطبيعي أن نتساءل عن مدى نجاح التباين S^2 في التعبير عن خاصية التغير في جملة من القياسات . وسنجد الجواب الصريح عن هذا التساؤل في نقطتين نعرضهما فيما يلي :

١ - لنأخذ مجموعة القياسات 1, 2, 3, 4 ، ولنحسب تباينها :

$$S^2 = \frac{1}{3} \left[(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) - \frac{(1+2+3+4)^2}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{3} [30 - 25] = \frac{5}{3}$$

ولنحسب ، على الوجه الآخر، الفروق بين كل قياس والقياسات الباقية، كما في الجدول (١ - ٢٠)، ثم لنحسب متوسط مربعات هذه الفروق فنجد $\frac{40}{12} = \frac{10}{3}$. أي أن متوسط مربعات الفروق الموجودة بين القياسات كافة يساوي $2S^2$.

جدول ١ - ٢٠

	1	2	3	4
1	0	-1	-2	-3
2	1	0	-1	-2
3	2	1	0	-1
4	3	2	1	0

مبصورة عامة

إذا كانت x_1, \dots, x_n عينة من القياسات، متوسطها \bar{x} وتباينها S^2 ، فإن عدد الأزواج المختلفة من القياسات التي يمكن تشكيلها هو $n(n-1)$. ومتوسط مربعات الفروق بين العددين في كل زوج منها هو:

* للقراءة فقط .

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{n(n-1)} \sum_i^n \sum_j^n (x_i - x_j)^2 \\
&= \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(x_i - \bar{x}) - (x_j - \bar{x})]^2 \\
&= \frac{1}{n(n-1)} \sum_i^n \sum_j^n [(x_i - \bar{x})^2 + (x_j - \bar{x})^2 - 2(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})] \\
&= \frac{1}{n(n-1)} \sum_i^n [n(x_i - \bar{x})^2 + (n-1)S^2 + 0] \\
&= \frac{1}{n(n-1)} [n(n-1)S^2 + n(n-1)S^2] = 2S^2.
\end{aligned}$$

وهذا يوضح أن التباين S^2 يلخص بأمانة كافة التغيرات من قياس إلى آخر التي يتضمنها البيان الإحصائي . وبالتالي فإنه يشكل تعبيراً ناجحاً عن خاصية التغير ضمن البيان الإحصائي .

٢ - هناك متباينة مشهورة تسمى متباينة تشيبيشيف ، ويمكن التعبير عنها بطريقة مبسطة كما يلي :

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات متوسطها \bar{x} وانحرافها المعياري S .
ولیکن t عدداً أكبر من الواحد أو يساويه ، فالنسبة من هذه القياسات التي تقع ضمن الفترة $(\bar{x} - ts, \bar{x} + ts)$ لا تقل عن $1 - \frac{1}{t^2}$.

لنختار الآن بعض القيم لـ t ، ولنحسب النسبة $1 - \frac{1}{t^2}$ فنجد :

جدول (١ - ٢١)

t	1	2	3
$1 - \frac{1}{t^2}$	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{8}{9}$

فالمتبينة لا تقدم أية معلومات من أجل $t = 1$. ولكنها تقول، في حالة $t = 2$ ؛ أن ثلاثة أرباع القياسات، على الأقل، واقع ضمن فترة تمتد ضعف الانحراف المعياري على جانبي المتوسط . أي تقع ضمن الفترة $(\bar{x} - 2S, \bar{x} + 2S)$ وتقول في حالة $t = 3$ ، أن ما لا يقل عن ثمانية أتساع القياسات (89% تقريبا) واقع ضمن فترة تمتد بمقدار ثلاثة انحرافات معيارية على جانبي المتوسط ، أي تقع بين العدد $\bar{x} + 3S$ والعدد $\bar{x} - 3S$.

مثال (١ - ٢٤)

لنعد إلى البيان الإحصائي في الجدول (١ - ٤) ، فقد حسبنا في المثال (١ - ٦) متوسطه فوجدناه $\bar{x} = 107.3$ وحسبنا في المثال (١ - ٢٢) الانحراف المعياري فوجدناه $S = 9.88$. ولدينا

$$\bar{x} - 2S = 107.3 - 2 \times 9.88 = 87.54$$

$$\bar{x} + 2S = 107.3 + 2 \times 9.88 = 127.06$$

ولو تفقدنا القياسات الخمسين في الجدول (١ - ٥) ، لوجدنا أن 49 منها واقع بين 87.54 و 127.06 ، وهي تشكل نسبة $\frac{49}{50} = 98\%$ من القياسات .

ومما تقدم نستنتج بوضوح أن التباين S^2 يشكل مقياسا كميًا ناجحا تماما للتعبير عن خاصية التغير ضمن بيان إحصائي . وأصبح واضحا الآن أن متوسط بيان إحصائي \bar{x} ، وانحرافه المعياري S ، يلخصان بصورة جيدة قياسات ذلك البيان . ومن خلالها ، يمكن تشكيل صورة ذهنية جيدة للغاية عن التوزيع التكراري للبيان دون أن نعلم مفردات البيان .

وعلى سبيل المثال ، لو قيل لنا أن درجات فصل يتألف من 40 طالبا في مادة الإحصاء ، لها متوسط يساوي 72 ، وانحراف معياري يساوي 8 ، لأمكننا باستخدام هذين الرقمين فقط ، تقديم الوصف التالي لتوزيع الدرجات ، دون أن تكون لدينا أية معلومات أخرى عن واقع الدرجات نفسها :

تتمركز الدرجات في هذا الفصل حول القيمة 72 ، وما لا يقل عن ثلاثين طالبا حصلوا على درجات تتراوح بين $72 - 2 \times 8 = 56$ و $72 + 2 \times 8 = 88$. وما لا يقل عن

36 طالباً من الطلاب الأربعين حصلوا على درجات تتراوح بين $72 - 3 \times 8 = 48$ و $72 + 3 \times 8 = 96$.

ويجدر الانتباه إلى عبارة «ما لا يقل» فمتباينة تشيبيشيف متحفظة، وفي معظم الحالات تكون النسبة الفعلية أكبر من $1 - \frac{1}{f}$ خاصة إذا كان البيان الإحصائي قريباً من التناظر.

(١١ - ١) معامل التغير

رأينا أن التباين يعبر بنجاح عن خاصية التغير في بيان إحصائي. ومن الطبيعي أن يكون البيان الإحصائي أكثر تجانساً كلما كانت قياساته أقل تغيراً من أحدها إلى الآخر. وكلما زاد التباين استنتجنا أن البيان الإحصائي أقل تجانساً، ولكن هب أننا نريد مقارنة بيانين إحصائيين من حيث أيهما أكثر تجانساً من الآخر، فهل يمكن الاعتماد على مقارنة تباينيهما وإعطاء حكم في هذه المسألة؟ لقد وجدنا في الفقرة (١ - ٨ - ٣) أن مقدار التباين يعتمد على وحدة القياس المستخدمة في البيان الإحصائي مما يجعله غير صالح للمقارنة بين عييتين من القياسات من حيث درجة التجانس في كل منهما. وهناك عامل آخر، إذ بالرغم من استخدام وحدة القياس نفسها في البيانين اللذين نريد مقارنتهما، إلا أن طبائع الأمور قد تجعل أرقام البيان الأول كبيرة، وأرقام البيان الثاني صغيرة. كأن يتضمن البيان الأول أوزان مجموعة من العجول بالكيلوغرام، ويتضمن البيان الثاني أوزان مجموعة من الفراريج بالكيلوغرام أيضاً. ونوضح بالمثال التالي:

مثال (١ - ٢٥)

في مزرعة خمسة عجول، وعشرون فروجا، سجلنا الأوزان ضمن كل مجموعة بالكيلوغرام فحصلنا على البيانين التاليين:

العجول :	285.50;	280.40;	283.00;	280.75;	281.40;		
الفراريج :	1.50;	1.40;	0.95;	1.35;	1.45;	1.05;	1.05;
	0.99;	1.45;	1.50;	1.35;	1.45;	1.00;	1.10;
	1.25;	1.35;	1.10;	1.45;	1.00;	1.20;	

احسب المتوسط والتباين والانحراف المعياري لكل منها .

الحل

	المتوسط	التباين	الانحراف المعياري
العجول	282.21	4.37	2.09
الفراريج	1.26	0.036	0.19

ولو استخدمنا ، في المثال السابق ، الانحراف المعياري للمقارنة والحكم على درجة تجانس كل من البيانيين ، لاستنتجنا خطأ أن مجموعة الفراريج أكثر تجانسا من مجموعة العجول ، لأن انحرافها المعياري ، وبالتالي تباينها ، أصغر بكثير. ولكن صغر الانحراف المعياري للفراريج ، يعود إلى صغر أوزان الفراريج بالمقارنة مع أوزان العجول ، وليس لكونها أكثر تجانسا .

وسنعرف الآن مقياسا يسمى معامل التغير ، وهو لا يعتمد على وحدة القياس المستخدمة ، ولا يتأثر بكون القياسات كبيرة أو صغيرة ، مما يجعله صالحا لمقارنة درجتي التجانس في عينتين من القياسات ، وذلك بصرف النظر عن طبيعة هذه القياسات أو عن وحدات القياس المستخدمة في كل منهما .

تعريف معامل التغير

معامل التغير ، ونرمز له بـ $c.v$ ، لجملة من القياسات متوسطها \bar{x} ، وانحرافها المعياري S ، هو بالتعريف :

$$c.v = \frac{S}{\bar{x}}$$

ونعلم من خواص المتوسط وخواص التباين أنه إذا ضربنا كل قياس في جملة من القياسات بعدد معين ، فإن كلا من المتوسط \bar{x} والانحراف المعياري S ، سيضرب

بالعدد نفسه ، (أو يقسم على العدد نفسه) وبالتالي ستبقى النسبة $\frac{S}{\bar{x}}$ بدون تغيير. وإذا كانت أرقام أحد البيانيين كبيرة بطبيعتها وأرقام الآخر صغيرة ، فإن قسمة S على \bar{x} يعطينا الانحراف المعياري لكل وحدة قياس ، مما يخلص معامل التغير من أي أثر لحجم القياسات .

مثال (١ - ٢٦)

في المثال السابق (١ - ٢٥) ، أحسب معامل التغير لكل من جملتي القياسات وقارنهما من حيث درجة التجانس ضمن كل منهما .

الحل

$$c.v. (\text{للعجول}) = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{2.09}{282.21} = 0.007$$

$$c.v. (\text{للفراييج}) = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{0.19}{1.26} = 0.15$$

ويتضح الآن أن مجموعة العجول أكثر تجانسا بكثير من مجموعة الفراييج ، فمعامل تغيرها 0.007 ، بينما معامل تغير الفراييج 0.15 ، وهو أكبر من معامل تغير العجول بما ينوف على إحدى وعشرين مرة .

(١ - ١٢) القيمة المعيارية

وسنتقل الآن إلى مشكلة أخرى ، فلنفرض أن لدينا جملتين من القياسات ، فكيف يمكن ، عند الحاجة ، مقارنة قياس من الجملة الأولى بقياس من الجملة الثانية ؟

وعلى سبيل المثال

لنفرض أن الجملتين من القياسات هما درجات طلاب الفصل في مادة الرياضيات ، ودرجاتهم في مادة اللغة العربية ، ونريد مقارنة درجتي طالب معين في المادتين ، وإذا فرضنا أن درجته في الرياضيات كانت 70 ، وأنها في اللغة العربية 60 ،

فهل يعني ذلك أن تحصيله في الرياضيات أفضل من تحصيله في اللغة العربية؟ المسألة هنا نسبية، فقد يكون معظم طلاب الفصل نالوا درجات أعلى من 70 في الرياضيات، ولكن قليلا منهم فقط نال درجات تزيد على الستين في اللغة العربية. وفي مثل هذه الحالة تنعكس الآية فنقول، على عكس ما يوحيه الرقمان، إنه كان من المتفوقين في اللغة العربية، ومن المقصرين في الرياضيات. والطريقة التي تسمح لنا بمراعاة الواقع النسبي، واتخاذ الحكم الصحيح، هي حساب متوسط كل جملة وانحرافها المعياري. ثم نرد كل درجة إلى ما يسمى بقيمتها المعيارية، بأن نطرح منها المتوسط ثم نقسم الناتج على الانحراف المعياري. وبذلك نحسب كم انحرافا معياريا تبعد الدرجة عن متوسط الدرجات؟ أو بعبارة أخرى، نقيس الفرق بين الدرجة والمتوسط بوحدة قياس هي الانحراف المعياري للدرجات. ولنفرض في مثالنا هنا أن متوسط درجات طلاب الفصل في مادة الرياضيات كان 75 بانحراف معياري يساوي 5، وأن متوسط درجات الطلاب في مادة اللغة العربية كان 52، بانحراف معياري يساوي 6. فالدرجة المعيارية في الرياضيات هي $1 - \frac{70-75}{5}$ والدرجة المعيارية في اللغة العربية هي $1.33 = \frac{60-52}{6}$. وهي أكبر من -1، أي أن تحصيله في اللغة العربية أفضل.

تعريف القيمة المعيارية

إذا كان \bar{x} و s متوسط جملة من القياسات وانحرافها المعياري، على الترتيب. فنعرف القيمة المعيارية لأي قياس x ، من هذه الجملة، بأنها:

$$\frac{x - \bar{x}}{s}$$

ونلاحظ أن رد جملة من القياسات إلى الشكل المعياري، أو معايرة جملة القياسات، يجعل متوسطها مساويا للصفر، وانحرافها المعياري مساويا للواحد الصحيح. ولييان ذلك نكتب:

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n جملة من القياسات متوسطها \bar{x} وانحرافها المعياري s . ووفقا لتعريف المعايرة يمكن أن نكتب:

$$Z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

حيث رمزنا بـ Z_i للقيم المعيارية. لنحسب الآن: \bar{Z} متوسط القيم المعيارية و S_z^2 انحرافها المعياري فنجد:

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{S} = \frac{1}{nS} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

$$\begin{aligned} S_z^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S} \right)^2 \\ &= \frac{1}{S^2(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{S^2}{S^2} = 1 \end{aligned}$$

وهذا يعني أن معايرة جملتين من القياسات تردهما إلى جملتين لهما المتوسط نفسه، وهو الصفر، والانحراف المعياري نفسه، وهو الواحد.

بقيت ملاحظة أخيرة، وهي أنه إذا كانت Z_1, Z_2, \dots, Z_n القيم المعيارية لجملة من القياسات فإن

$$\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = (n-1) S_z^2 = (n-1) \times 1 = n-1$$

وبما أن $\bar{Z} = 0$ ، فإن

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 = n-1$$

أي أن مجموع مربعات القيم المعيارية لجملة من القياسات يساوي عدد القياسات n مطروحا منه الواحد. وسنستفيد من هذه الخاصية في الفقرة القادمة.

تمارين (١ - ٤)

(١) فيما يلي الأطوال بالسنتيمتر لعشرة أوراق من نبات منزلي:

10.0; 10.2; 6.5; 7.0; 7.8; 10.8; 6.1; 5.9; 8.9; 10.0

احسب المدى، ومتوسط الانحراف، والتباين، والانحراف المعياري.

٢) استخدمنا سبعة موازين حرارة لقياس درجة حرارة جسم بالتدريج المثوي . فكانت النتائج كما يلي :

$$- 4.12, - 4.09, - 4.10, - 4.08, - 4.09, - 4.13, - 4.10$$

احسب التباين والانحراف المعياري .

٣) ماذا يمكن القول عن مجموعة قياسات تباينها يساوي الصفر؟ وإذا حسب تباين جملة من القياسات فوجدته سالبا فماذا تستنتج؟

٤) في كل مما يلي أحسب المدى والانحراف المعياري :

أ - 4, 2, 8, 1, 4, 5, 8, 10, 3

ب - 2, - 8, 3, - 4, - 1, 3, - 5

ج - 1, - 3, 3, 0, 3, 2, 1

تحقق في (أ) أنك إذا أخذت متوسط مربعات انحرافات كل قياس عن بقية القياسات فإن النتائج يساوي ضعف التباين .

٥) فيما يلي التوزيع التكراري لعدد القطع المعيبة التي وجدت في 404 صناديق من القطع المصنعة .

عدد القطع المعيبة	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
عدد الصناديق	53	110	81	58	35	20	18	12	9	3	1	2	1

١ - احسب المتوسط والتباين ومعامل التغير .

ب - احسب الوسيط والمنوال .

٦) إذا كان تباين عينة تتضمن مائة قياس هو 15 ، فاحسب مجموع مربعات انحرافات القياسات عن متوسطها .

(٧) تباين عينة من القياسات يساوي 20 . كم يصبح التباين :

أ - إذا ضربنا كل قياس بـ 5 ؟

ب - إذا قسمنا كل قياس على 5 ؟

(٨) أخذنا عيقتين من مجتمعين فأعطنا النتائج التالية :

العينة الأولى

$$\sum_{i=1}^{30} x_i = 270$$

$$\sum_{i=1}^{30} x_i^2 = 2691$$

العينة الثانية

$$\sum_{i=1}^{50} y_i = 400$$

$$\sum_{i=1}^{50} y_i^2 = 3984$$

أ - احسب تباين كل عينة .

ب - أيهما أكثر تجانساً ؟

ج - إذا دمجنا العيقتين في عينة واحدة فاحسب متوسط العينة الجديدة ومعامل تغيرها .

(٩) احسب نصف المدى الربيعي ومعامل التغير في كل من التمارين ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من مجموعة التمارين (١ - ١) .

(١٠) احسب التباين في كل من التمرينين ٩ ، ١١ من مجموعة التمارين (١ - ٢) .

(١١) احسب الانحراف المعياري ومعامل التغير لسماكة الجلد في التمرين ٨ من مجموعة التمارين (١ - ١) ثم تحقق من أن 95% تقريبا من القياسات واقع في حدود انحرافين معيارين عن يمين ويسار المتوسط .

(١٢) بالإشارة إلى التمرين ٧ من مجموعة التمارين (١ - ٣) ، احسب التباين والانحراف المعياري لنصف قطر رد الفعل لاختبار الليبرومين في كل من التوزيعات الثلاثة .

١٣) احسب الانحراف المعياري ومعامل التغير لكل من البيانات المعطاة في التمارين ٦، ٧، ١٠ من مجموعة التمارين (١ - ١).

١٤) فيما يلي بيانات تتعلق بمنطقة معينة لعامي ١٩٥٩ و ١٩٦٠. احسب لكل بيان، المدى، والانحراف المعياري، ومعامل التغير. أي البيانات الثلاثة أكثر تجانساً؟

الشهر	معدل سقوط المطر (بالبوصة)	متوسط درجة الحرارة (بالفهرنهايت)	متوسط الرطوبة النسبية عند التاسعة صباحاً (%)
يناير	1.45	72.1	78
فبراير	1.44	72.5	78
مارس	2.69	72.1	78
أبريل	5.15	72.6	77
مايو	7.46	73.3	79
يونيو	0.73	73.2	85
يوليو	0.51	72.8	72
أغسطس	5.17	71.9	78
سبتمبر	4.20	71.4	78
أكتوبر	4.08	71.7	78
نوفمبر	6.68	71.6	78
ديسمبر	2.77	71.6	79

١٥) في تجربة لتقدير فائدة مضاد للتسمم في معالجة الكزاز، قورنت مجموعة تناولت المضاد مع مجموعة لم تتناوله. وقد تم تخصيص المرضى للمجموعتين بطريقة عشوائية، وفيما يلي بيان بأعمار المرضى. ارسم مضع التكرار النسبي المتجمع الصاعد لكل من المجموعتين على حدة واستخدمهما لتقدير العمر الوسيط ونصف المدى الربيعي لكل مجموعة.

١٦) احسب نصف المدى الربيعي ومعامل التغير في التمرين (٥) من مجموعة التمارين (١ - ٣).

تناول مضاد للتسمم (A)		لم يتناول مضاد للتسمم (N)	
41	16	18	33
28	28	24	20
35	27	19	39
40	20	12	36
30	17	29	30
27	12	14	60
50	12	18	17
30	16	18	27
9	20	50	33
40	10	16	14
30	11	14	10
18	20	52	60
31	50	16	12
14	29	40	24
25	24	30	12
27	14	40	10
16	17	40	60
36	25	27	27
25	10	20	8
40	24		
22			

(١٧) إذا علمت توزيع التكرار النسبي التالي :

الفئة	19.5 - 39.5	39.5 - 59.5	59.5 - 79.5	79.5 - 99.5
التكرار النسبي	0.12	0.28	0.36	0.24

فاحسب المتوسط ، الوسيط ، المنوال ، Q_1 ، Q_3 ، σ^2 .

١٨) كان متوسط معدلات الطلبة المتقدمين لإحدى الجامعات 20.4 بانحراف معياري 3.1 ، ومتوسط معدلات الطلبة المتقدمين لجامعة أخرى 21.1 بانحراف معياري 2.8 . إذا تقدم طالب معدله 25 إلى كل من الجامعتين ففي أيهما ستكون فرصة قبوله أفضل؟

١٩) في دراسة قام بها مركز للأغذية تبين أن متوسط مقدار فيتامين B في عدد من شرائح الخبز هو 0.26 ملغم . بانحراف معياري قدره 0.005 ملغم . استخدم هذه المعلومات لإكمال العبارات التالية :

- ما لا يقل عن 25/36 من هذه الشرائح يحتوي على مقدار من فيتامين B واقع بين (. . .) و (. . .) .
- ما لا يقل عن 63/64 من هذه الشرائح يحتوي على مقدار من فيتامين B واقع بين (. . .) و (. . .) .

٢٠) إذا علمت أن معامل تغير بيان إحصائي يتضمن ثمانين قياساً هو 0.1 وأن مجموع قياساته 800 ، فاحسب مجموع مربعات القياسات $\sum x_i^2$.

٢١) قمنا بدراسة زمنية لتحديد الوقت الذي يستغرقه إنجاز عملية معينة في مؤسسة صحية . وقد قسنا الزمن الضروري لإنجاز هذه العملية لكل من 40 عاملاً ، ووجدنا أن المتوسط يساوي 12.8 وحدة زمن بانحراف معياري يساوي 1.7 وحدة زمن . والمطلوب إعطاء وصف للبيان الإحصائي مستخدماً متباينة تشيبيشيف .

٢٢) لديك المعلومات التالية عن أسعار مجموعة من مطاعم الدرجة الأولى في مدينة معينة :

الانحراف المعياري S	متوسط الكلفة	الوجبة
1.50	24.25 ر.س	لحم
0.94	13.72 ر.س	دجاج
1.13	33.65 ر.س	سمك

وأحد هذه المطاعم ويسمى «مطعم التوفير» يقدم وجبة اللحم في مقابل 28 ريالاً، ووجبة الدجاج في مقابل 17 ريالاً، ووجبة السمك في مقابل 36 ريالاً، هل تعتقد أن هذا المطعم يستحق الاسم الذي يدّعيه؟ ولماذا؟

(١ - ١٣) الارتباط

(١ - ١٣ - ١) مقدمة

لدينا مجموعةⁿ من الأشخاص، ولنفرض أننا قمنا بقياس ظاهرتين لدى كل شخص منها، ورمزنا لقياس إحداهما بـ x ، ولقياس الأخرى بـ y (مثلاً، x ترمز للطول، y ترمز للوزن). فحصلنا بذلك على n من أزواج الأعداد، (x_1, y_1) لأول شخص، (x_2, y_2) للشخص الثاني، . . . ، وأخيراً (x_n, y_n) للشخص الأخير.

لنرتب القيم x_i من الأصغر إلى الأكبر، ثم لنضع أمام كل قيمة لـ x قيمة y الموافقة لها. ولنفرض أننا وجدنا قيم y مرتبة أيضاً من الأصغر إلى الأكبر، فأصغر قيمة لـ x قابلتها أصغر قيمة لـ y (أي أن الشخص ذا الطول الأصغر كان أيضاً ذا الوزن الأصغر بين الأشخاص الـ n الخاضعين للتجربة)، والقيمة بعد الصغرى لـ x قابلتها القيمة بعد الصغرى لـ y ، . . . ، وأخيراً مقابل أكبر قيمة لـ x كان بين قيم y أكبرها.


ففي مثل هذه الحالة نقول بوجود ارتباط إيجابي كامل بين المتغيرين x و y ، أو بين الظاهرتين اللتين تقيسانهما. وإذا وجدنا عند ترتيب القيم أن أصغر قيمة لـ x قابلتها أكبر قيمة لـ y ، والقيمة بعد الصغرى لـ x قابلتها القيمة قبل العظمى لـ y ، . . . ، وأخيراً أكبر قيمة لـ x قابلتها أصغر قيمة لـ y . فعندئذ نقول بوجود ارتباط سلبي كامل بين المتغيرين x و y ؛ أو بين الظاهرتين اللتين تقيسانهما. وبين هاتين الحالتين المتطرفتين يمكن أن نتصور ترتيبات تمثل درجات مختلفة من الارتباط في الاتجاه الإيجابي أو في الاتجاه السلبي. ولو أننا سجلنا قيم y على n ورقة صغيرة، وطويناها ثم خلطناها جيداً في جعبة صغيرة، وسحبنا عشوائياً ورقة منها ثم سجلنا القيمة المذكورة فيها أمام أصغر قيمة لـ x ، وسحبنا ورقة ثانية عشوائياً وسجلنا القيمة المذكورة فيها أمام القيمة بعد الصغرى لـ x ، وهكذا. . . ، حتى نصل إلى آخر ورقة بقيت في الجعبة فنسجل القيمة

المذكورة فيها أما أكبر قيمة لـ x ، فيمكن القول، مع مثل هذا الترتيب أو التقابل بين قيم x وقيم y ، بعدم وجود أي ارتباط بين الظاهرتين. ويمكن تحري وجود صلة بين المتغيرين برسم أزواج القياسات (x_1, y_1) ، (x_2, y_2) ، . . . ، (x_n, y_n) بيانيا، حيث قيمة x هي الإحداثي السيني، وقيمة y المقابلة هي الإحداثي الصادي. ونحصل بذلك على n نقطة في مستوى الإحداثيات ونسمي الشكل الحاصل «مخطط الإنتشار». والنظر إلى مخطط الإنتشار يولد نوعا من الانطباع البدهي عن درجة الصلة أو الارتباط القائمة بين المتغيرين.

والشكل (١ - ١٣ - ١) يمثل حالة ارتباط إيجابي مرتفع، ونلاحظ فيه أن النقاط تحدد اتجاهها واضحا وفق خط مستقيم إلى حد كبير. ولو وقعت النقاط بالضبط على استقامة واحدة، لكان الارتباط إيجابيا تاما. والشكل (١ - ١٣ - ب) يمثل ارتباطا إيجابيا منخفضا إذ يكشف المخطط عن نزعة تأخذ، إلى حد ما، شكل الحزمة الخطية. أما الشكل (١ - ١٣ - ج) فيمثل حالة عشوائية، ولا تكشف عن أية نزعات أو اتجاهات واضحة، إذ لا يبدو فيها أي نزوع لاقتزان قيم عالية لـ x بقيم عالية لـ y ، وقيم منخفضة لـ x بقيم منخفضة لـ y . أو العكس، أي قيم عالية لـ x بقيم منخفضة لـ y وقيم منخفضة لـ x بقيم عالية لـ y . ويمثل الشكل (١ - ١٣ - د) ارتباطا سلبيا مرتفعا إلى حد ما، وهنا أيضا، لو وقعت النقاط على استقامة واحدة لكان الارتباط سلبيا تاما. ومن الواضح أنه بين الحالتين المتطرفتين، حالة ارتباط سلبي تام وحالة ارتباط إيجابي تام. يوجد ما لا حصر له ولا عد من إمكانات ترتيب النقاط التي تمثل ما لا حصر له ولا عد من درجات الارتباط الممكنة بين المتغيرين.

ولا بد من التمييز بوضوح بين وجود ارتباط مرتفع بين ظاهرتين وبين وجود علاقة سببية بينهما. فوجود ارتباط مرتفع لا يعني بالضرورة أن إحدى الظاهرتين هي سبب للأخرى؛ إذ قد يكون الارتباط المرتفع بينهما نتيجة لتأثر كل منهما بظاهرة ثالثة لم تدخل في الحساب.

فمثلا، من المعروف أن هناك ارتباطا مرتفعا بين ظاهرة الابتلاء بعادة التدخين والإصابة بمرض سرطان الرئة. وهناك أيضا ارتباط مرتفع بين ظاهرة الابتلاء بعادة



شكل (١-١٣)

التدخين وتلون أو اصفرار الأسنان . ولو حصل أن أخذنا بيانا إحصائيا يتضمن درجة تلوّن الأسنان ونسبة الإصابة بسرطان الرئة ، وكان هذا البيان في غالبيته من أفراد تلوّنت أسنانهم بفعل التدخين فسنجد ارتباطا مرتفعا بين ظاهرة تلوّن الأسنان وظاهرة الإصابة بسرطان الرئة . وهذا لا يعني بالطبع أن اصفرار الأسنان يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة أو العكس ، وقد لا يوجد أي ارتباط إحصائي فعلي بين الظاهرتين ، فالارتباط المرتفع كان نتيجة لوجود عامل ثالث خفي هو عادة التدخين .

وسنستعرض الآن إمكانية إيجاد معيار كمي للتعبير عن درجة الارتباط بين متغيرين نسميه معامل الارتباط .

(١ - ١٣ - ٢) معامل بيرسون للارتباط

هناك أكثر من صيغة للتعبير عن معامل الارتباط بين متغيرين x و y ؛ ولكنها تعرّف جميعها لتأخذ قيمها بين -1 تعبيرا عن ارتباط سلبي تام ، (وعندئذ تقع جميع النقاط (x, y) على خط مستقيم تتناقص معه قيم y عندما تزداد قيم x ، وتزيد y عندما يتناقص x) وبين +1 تعبيرا عن ارتباط إيجابي تام . (وعندئذ تقع جميع النقاط (x, y) على خط مستقيم يزداد وفقا له أحد المتغيرين مع زيادة الآخر ويتناقص مع تناقصه) أما القيمة صفر فتعني عدم وجود أي ارتباط أو نزعة أثر أو تأثير بين قيم أحد المتغيرين وقيم المتغير الآخر. ومقياس الارتباط الأكثر استخداما هو معامل بيرسون، ونرمز له عادة بـ R .

تعريف معامل بيرسون

لتكن $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ جملة من n من أزواج القياسات. ولنفرض أن \bar{x} و S_x هما متوسط قيم المتغير x وانحرافها المعياري، وأن \bar{y} و S_y هما متوسط قيم المتغير y وانحرافها المعياري. نعرف معامل بيرسون للارتباط بين قيم المتغير x وقيم المتغير y بأنه:

$$R = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i Z'_i$$

حيث

$$Z'_i = \frac{y_i - \bar{y}}{S_y} \quad Z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_x}$$

وقد رأينا في ختام الفقرة السابقة أن معايرة جملة من القياسات تجعل متوسطها صفرا، وتباينها الواحد، وأن مجموع مربعات القيم بعد معايرتها يساوي عدد القياسات في الجملة مطروحا منه الواحد. وهكذا يمكننا كتابة:

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 = \sum_{i=1}^n Z_i'^2 = n-1$$

لنأخذ الآن الحالة الخاصة التي يكون فيها $Z_i = Z'_i$ ، فعندئذ تقع النقاط $(Z_1, Z'_1), \dots, (Z_n, Z'_n)$ على خط مستقيم هو منصف الربع الأول، ويكون الارتباط في هذه الحالة إيجابيا وتاما. لنحسب R فنجد:

$$R = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i Z'_i = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i^2 = \frac{n-1}{n-1} = 1$$

وإذا أخذنا الحالة الخاصة المتطرفة المقابلة حيث Z_i و Z'_i متساويان في القيمة المطلقة ومختلفان في الإشارة، فعندئذ تقع النقاط $(Z_1, Z'_1), \dots, (Z_n, Z'_n)$ على خط مستقيم هو منتصف الربع الثاني، ويكون الارتباط في هذه الحالة سلبيا وتاما، أما قيمة R فهي -1، ذلك لأن:

$$R = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i Z'_i = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i (-Z_i) = -\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i^2 = -\frac{(n-1)}{n-1} = -1$$

ويمكن البرهان، بصورة عامة، أن معامل بيرسون للارتباط يأخذ قيميا بين -1 و +1. ويكون +1 في حالة ارتباط إيجابي تام و -1 في حالة ارتباط سلبي تام.

مثال (١-٢٧)

لتكن أزواج القياسات التالية:

x	1	2	3	4	5
y	11	13	15	17	19

احسب معامل بيرسون للارتباط R .

الحل

نظم الجدول التالي:

جدول (١- ٢٢)

x_i	y_i	$Z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_x}$	$Z'_i = \frac{y_i - \bar{y}}{S_y}$	$Z_i Z'_i$
1	11	-1.2649	-1.2649	1.60
2	13	-0.6325	-0.6325	0.40
3	0	0	0	0
4	17	0.6325	0.6326	0.40
5	19	1.2649	1.2649	1.60

حيث $S_y = 3.1623$, $\bar{y} = 15$, $S_x = 1.5811$, $\bar{x} = 3$

$$\sum_{i=1}^5 Z_i Z'_i = n-1 = 4$$

$$R = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 Z_i Z'_i = \frac{4}{4} = 1$$

والجددير بالذكر أن $y = 2x + 9$ وأن النقاط الخمس :

$(1, 11)$, $(2, 13)$, $(3, 15)$, $(4, 17)$, $(5, 19)$ تقع على استقامة واحدة. ونلاحظ أن $Z_i = Z'_i$

(١- ١٣- ٣) حساب معامل الارتباط R

عند حساب معامل الارتباط يشكّل رد القياسات إلى شكلها المعياري جهدا

حسابيا مطولا لا مسوغ له. ويمكن تطوير الصيغة المعطاة في تعريف معامل بيرسون

بعمليات تعويض بسيطة بحيث تأخذ أشكالا مختلفة.

١- بالتعويض عن Z_i ، نجد:

$$R = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n Z_i Z'_i = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{S_x} \frac{y_i - \bar{y}}{S_y}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1) S_x S_y}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

وأخيرا

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2 \sum_{i=1}^n Y_i^2}}$$

حيث $X_i = x_i - \bar{x}$ ، $Y_i = y_i - \bar{y}$. ويمكن استخدام العلاقة الأخيرة في الحسابات .

مثال (٢٨-١)

لدينا أزواج القياسات التالية :

x	1	7	2	3	4	12	11	5	10	5
y	2	5	6	4	1	5	8	2	6	1

احسب معامل بيرسون للارتباط بين x و y .

الحل

ننظم الجدول التالي :

جدول (١ - ٢٣). حساب معامل الارتباط باستخدام الانحرافات عن المتوسط

	x_i	y_i	X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	$X_i Y_i$
	5	1	-1	-3	1	9	3
	10	6	4	2	16	4	8
	5	2	-1	-2	1	4	2
	11	8	5	4	25	16	20
	12	5	6	1	36	1	6
	4	1	-2	-3	4	9	6
	3	4	-3	0	9	0	0
	2	6	-4	2	16	4	-8
	7	5	1	1	1	1	1
	1	2	-5	-2	25	4	10
المجموع	60	40	0	0	134	52	84

ولدينا بالتعريف :

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i Y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \sum_{i=1}^{10} Y_i^2}}$$

وبالتعويض من السطر الأخير في الجدول (١ - ٢٣) نجد :

$$R = \frac{84}{\sqrt{134 \times 52}} = 0.58$$

*٢- ومن المفضل، في الغالب، استخدام صيغة حسابية أخرى تعتمد على القياسات

x_i, y_i نفسها. وفي الحقيقة، نجد بسهولة أن :

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i y_i - \bar{x} y_i - x_i \bar{y} + \bar{x} \bar{y})$$

* التفاصيل للقراءة فقط .

التوزيع الوصفي لجملة من القياسات

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \bar{x} \bar{y} \\
 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} - n \bar{y} \bar{x} + n \bar{x} \bar{y} \\
 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} \\
 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n^2} \\
 &= \frac{1}{n} \left[n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) \right]
 \end{aligned}$$

ونعلم أنه يمكن كتابة (انظر الفقرة ١-٨-٨):

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{n} = \frac{1}{n} \left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right]$$

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{n} \left[n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right]$$

وبالتعويض في الصيغة الحسابية السابقة نجد:

$$R = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{\left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right] \left[n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right]}}$$

ومع أن مظهر الصيغة معقد، إلا أن جدول الحسابات الضروري لتطبيقها يتضمن خمسة أعمدة فقط، وهي تعتمد كلياً على القياسات نفسها، وأسهل صيغة للتطبيق عند توفر آلة حاسبة.

مثال (١-٢٩)

احسب معامل الارتباط R لأزواج القياسات المذكورة في المثال (١-٢٦) مستخدماً الصيغة التي تعتمد على القياسات مباشرة.

الحل

ننظم الجدول التالي:

وبالتعويض في الصيغة الحسابية التي يمكن أن نكتبها باختصار كما يلي:

$$R = \frac{n \Sigma x y - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{[n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}}$$

$$R = \frac{10 \times 288 - 60 \times 40}{\sqrt{(10 \times 494 - 60^2)(10 \times 212 - 40^2)}}$$

$$= \frac{480}{\sqrt{1340 \times 520}} = 0.58$$

(١-١٣-٤) معامل سيرمان لارتباط الرتب

ذكرنا في المقدمة أنه إذا كان لمتغيرين x ، y ترتيبان متوازيان أي إذا اتفق ترتيب قيم x مع ترتيب قيم y المقابلة اتفاقاً تاماً كنا في حالة ارتباط إيجابي تام وإذا كان لهما ترتيبان متعاكسان تماماً (أصغر قيمة لـ x قابلتها أكبر قيمة لـ y ، والقيمة بعد الصغرى لـ x قابلتها القيمة قبل العظمى لـ y)، وهكذا حتى نصل إلى أكبر قيمة لـ x وفي مقابلها أصغر قيمة لـ y) قلنا إن الارتباط سلبي تام. ومعامل سيرمان لارتباط الرتب يترجم بأمانة هذه الفكرة.

جدول (١ - ٢٤): حساب معامل الارتباط باستخدام القياسات نفسها

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
5	1	25	1	5
10	6	100	36	60
5	2	25	4	10
11	8	121	64	88
12	5	144	25	60
4	1	16	1	4
3	4	9	16	12
2	6	4	36	12
7	5	49	25	35
1	2	1	4	2
المجموع	60	494	212	288

لنفرض الآن عينة من قيم x تتضمن n قياسا، فكيف نحدد رتب هذه القياسات؟ نكتب في عمود أول الأرقام المتسلسلة من 1 إلى n ، وفي عمود مجاور نرتب قيم x من الأصغر إلى الأكبر، وفي عمود ثالث نكتب أمام كل قيمة لـ x رتبة تساوي الرقم المتسلسل المقابل لها. ولكن إذا تكررت إحدى قيم x أكثر من مرة فهل نعطي القيمة نفسها رتبا مختلفة؟ وإذا بدا مثل هذا الأمر غير مقبول، وهو في الحقيقة كذلك، فكيف نتصرف؟ والجواب واضح بالبداية، ففي مثل هذه الحالة نعتبر رتبة كل تكرار لتلك القيمة مساوية للمتوسط الحسابي للأرقام المتسلسلة المقابلة لها. فلنفرض، مثلا، أن الأرقام المتسلسلة 4، 5، 6، 7 في العمود الأول، قابلها في العمود الثاني 70، 70، 70، 70، فتكون الرتبة التي نعطيها لكل من هذه القياسات الأربعة المتساوية هي:

$$\frac{4+5+6+7}{4} = 5.5$$

مثال (١ - ٣٠)

لتكن مجموعة القياسات 4، 7، 8، 3، 12، 8، 4، 21، 35، 21، 15، 18، 17، 28، 17، 21. والمطلوب ترتيب هذه القياسات وتحديد رتبة كل منها.

حدول (١ - ٢٥)

الرقم المتسلسل	قيم x مرتبة	رتبة x
1	3	1
2	4	2.5
3	4	2.5
4	7	4
5	8	5.5
6	8	5.5
7	12	7
8	15	8
9	17	9.5
10	17	9.5
11	18	11
12	21	13
13	21	13
14	21	13
15	28	15
16	35	16

وبالطريقة نفسها نرتب قيم y ، وكل رتبة لقيمة من قيم x يوافقها رتبة لقيمة y المقابلة. لنفكر الآن نرتب قيم x بترتيب قيم y المقابلة لها. فلقد كتبنا ترتيب x وفق التسلسل الطبيعي ومن الأصغر إلى الأكبر، فما هو الحال بالنسبة إلى تسلسل ترتيب y ؟ هل حققت ترتيباً موازياً، أي تسلسلاً طبيعياً مطابقاً لتسلسل ترتيب x أم طرأ فساد ما على التسلسل الطبيعي لترتيب y ؟ وما هي درجة أو مدى فساد التسلسل الطبيعي هذا؟ وستقيس درجة أو مدى فساد التسلسل بالعدد $\sum d^2$ ، حيث d هي رتبة x مطروحا منها رتبة y المقابلة.

وهكذا يمثل Σd^2 مجموع مربعات الفروق بين رتب x ورتب y المقابلة لها . ومن الواضح أن هذا المقياس لدرجة فساد التسلسل الطبيعي في رتب y سيكون صفرا إذا ، فقط إذا تطابقت رتب x مع رتب y المقابلة لها ، وعندئذ نكون في حالة ارتباط إيجابي تام . وعندما يكون تسلسل رتب y الناتج بحيث يبدأ بالأكبر وينتهي بالأصغر ، أي عكس التسلسل الطبيعي تماما ، فإن Σd^2 سيكون أكبر ما يمكن . وهذه الحالة كما أسلفنا هي حالة ارتباط سلبي تام .

ونحتاج الآن إلى تعريف لمعامل ارتباط يعطي القيمة +1 في الحالة الأولى ، والقيمة -1 في الحالة الثانية ، ويأخذ القيمة صفرا في حالة عدم وجود أي ارتباط . والمعامل الذي يواجه كل هذه المتطلبات ، وسنرمز له بـ τ تميزا له عن معامل بيرسون للارتباط ، هو :

$$\tau = 1 - \frac{2\Sigma d^2}{\Sigma d^2 \text{ أكبر قيمة ممكنة لـ } \Sigma d^2}$$

فعندما يتطابق الترتيبان يكون $\Sigma d^2 = 0$ و $\tau = 1$ ، وعندما يتعكس الترتيبان تماما يأخذ Σd^2 أكبر قيمة ممكنة له ، ويكون :

$$\tau = 1 - \frac{2(\Sigma d^2 \text{ أكبر قيمة ممكنة لـ } \Sigma d^2)}{\Sigma d^2 \text{ أكبر قيمة ممكنة لـ } \Sigma d^2} = 1 - 2 = -1$$

ويمكن برهان أنه في حالة عدم وجود ارتباط يكون

$$2\Sigma d^2 = \Sigma d^2 \text{ أكبر قيمة ممكنة لـ } \Sigma d^2$$

أي $\tau = 0$.

وإذا كنا ندرس الارتباط في n من أزواج القياسات ، فيمكن البرهان على أن أكبر قيمة ممكنة لـ Σd^2 هي $\frac{n(n^2-1)}{3}$ ، وبالتعويض في العلاقة السابقة نصل إلى معامل سيرمان لارتباط الرتب ، وهو :

$$\tau = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

مثال (١ - ٣١)

لتكن مجموعة الأزواج من القياسات:

x	4	4	7	7	7	9	16	17	21	25
y	8	16	8	8	16	20	12	15	25	20

احسب معامل سيرمان لارتباط الرتب τ .

الحل

(١) نرتب قيم x ، ثم نرتب قيم y في جدولين منفصلين وفق الطريقة الموضحة في

المثال (١ - ٣٠).

رقم التسلسل	قيم x مرتبة	رتبة x
1	4	1.5
2	4	1.5
3	7	4
4	7	4
5	7	4
6	9	6
7	16	7
8	17	8
9	21	9
10	25	10

رقم التسلسل	قيم y مرتبة	رتبة y
1	8	2
2	8	2
3	8	2
4	12	4
5	15	5
6	16	6.5
7	16	6.5
8	20	8.5
9	20	8.5
10	25	10

(٢) ننظم الآن جدولاً يتضمن عموده الأول رتب x ، ويتضمن عموده الثانيرتب y المقابلة لها (التقابل بين قيم x وقيم y مبين في المثال). ويتضمن العمود الثالثالفرق d ، وهو يساوي الفرق بين رتبة x ورتبة y المقابلة لها. ومجموع هذا العمود يساويالصفري، ويتضمن العمود الرابع مربعات الفروق d ، ومجموع هذا العمود هو $\sum d^2$.

رتبة x	رتبة y	d	d^2
1.5	2	-0.5	0.25
1.5	6.5	-5.0	25.0
4	2	2.0	4.0
4	2	2.0	4.0
4	1.5	2.5	6.25
6	8.5	2.5	6.25
7	4	3.0	9.00
8	5	3.0	9.00
9	10	-1.0	1.00
10	8.5	11.5	2.25
المجموع		0	67.00

(٣) نعوض الآن في العلاقة:

$$\tau = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

حيث $n = 10$ ، $\sum d^2 = 67$ فنجد:

$$\tau = 1 - \frac{6 \times 67}{10(100 - 1)} = 0.594$$

تمارين (١ - ٥)

(١) احسب معامل سيرمان للارتباط في البيان الإحصائي التالي بعد أن ترسم مخطط الانتشار.

x	y	x	y	x	y	x	y
22	18	35	47	19	37	8	18

تابع:

x	y	x	y	x	y	x	y
15	16	46	22	36	42	1	3
9	31	16	25	25	20	9	7
7	8	7	36	10	12	18	28
4	2	6	27	11	17	46	21
45	36	46	45	5	6	9	25
19	12	11	18	26	45		
26	16	27	18	19	30		

٢) لدى مدرس قناعة بأن قائمة من أسئلة «الخطأ والصواب» ستعطيه من المعلومات عن كفاءة الطلاب في مادته، مثل ما تعطيه مجموعة من الأسئلة تتضمن تمارين ومناقشة. ولكي يثبت وجهة نظره، أعد للطلاب امتحانا يتضمن 25 سؤالاً من نوع «الخطأ والصواب»، وما تبقى من الامتحان كان تمارين وأسئلة مناقشة. وقسم العلامة التامة، وهي 200، إلى 50 للقسم الأول (خ، ص)، و 150 للقسم الثاني. وفيما يلي درجات طلابه الثلاثين في كل من القسمين، هل تجد معامل ارتباط مرتفع بين المجموعتين من الدرجات؟ وماذا تستنتج؟ ارسم مخطط الانتشار.

تمارين	(خ، ص)						
24	150	21	118	23	125	22	135
23	170	19	110	12	102	14	78
24	141	21	129	15	94	15	105
13	84	25	145	16	91	25	141
19	123	16	124	20	127	19	105
17	100	19	108	21	120	17	110
14	92	18	112	16	105		
18	105	16	98	25	149		

(٣) فيما يلي قياس الحذاء x ، والوزن بالباوند y ، لكل من عشرة طلاب جامعيين:

x قياس الحذاء	9.5	9.5	10.5	10.5	11	8.5	8.5	9.5	10	9
y الوزن	140	155	153	150	180	160	155	145	163	150

أ - احسب معامل بيرسون للارتباط،

ب - احسب معامل سبيرمان لارتباط الرتب.

(٤) فيما يلي سبعة أزواج من القياسات:

x	10	20	30	40	50	60	70
y	-4	-3	-2	0	3	6	7

ارسم مخطط الانتشار ثم احسب معامل الارتباط.

(٥) فيما يلي طول الأم بالبوصة، x ، وطول ابنتها بالبوصة، y :

x طول الأم	67	64	62	65	69	63	65	66
y طول الابنة	70	69	65	68	66	60	64	66

ارسم مخطط الانتشار واحسب معامل الارتباط بطريقتي بيرسون وسبيرمان.

(٦) سجلنا لعشرة عمال طباعة كلا من معدل إنتاجه في الساعة من الوحدات الجيدة، x ؛

ومعدل إنتاجه في الساعة من الوحدات المعيبة، y ، فوجدنا ما يلي:

x	94	98	106	114	107	93	98	88	103	95
y	4	5	6	7	6	5	6	4	7	5

احسب معامل الارتباط بين x و y .

(٧) في معرض فني يتضمن ثلاثين لوحة رتب محكمين اللوحات حسبما يراه عن درجة نجاحها وأعطى كل منهما الرتبة 1 لأفضل لوحة، و 2 لتلك التي تليها في الأفضلية حسب رأيه، وهكذا حتى وصلا إلى 30 لأردأ لوحة كل في رأيه. وفيما يلي الرتب التي

أعطاها المحكمان لكل من اللوحات الثلاثين. احسب معامل سيرمان لارتباط الرتب. ماذا تستنتج؟

رتبة المحكم الأول	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
رتبة المحكم الثاني	2	4	3	1	5	7	10	17	8	9	14
رتبة المحكم الأول	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
رتبة المحكم الثاني	6	15	11	13	12	18	19	21	16	23	30
رتبة المحكم الأول	23	24	25	26	27	28	29	30			
رتبة المحكم الثاني	29	20	22	25	24	28	26	27			

٨) فيما يلي درجة مادة الرياضيات x ودرجة مادة العلوم y لكل من عشرة طلاب في المرحلة الثانوية:

x	90	95	70	70	65	65	65	40	55	60
y	97	97	85	65	70	70	60	55	40	70

أ- ارسم مخطط الانتثار.

ب- احسب معامل بيرسون للارتباط بين x و y .

ج- احسب معامل سيرمان لارتباط الرتب بين x و y .

٩)* فيما يلي تطور انتاج القمح x في المملكة بآلاف الأطنان وتطور مجموع القروض الزراعية المنوحة y ، بملايين الريالات، وذلك بين عامي ١٣٩١هـ و ١٤٠٣هـ.

إنتاج القمح x	42	39	64	153	132	93	125	120	150
مجموع القروض الزراعية y	16.6	16.6	19.6	36.3	145.5	269.4	489.9	585.6	709.1
إنتاج القمح x	142	187	412	741					
مجموع القروض الزراعية y	1128.6	2530.8	2932.9	4166.0					

احسب معامل الارتباط بين x و y .

١٠) يعطي البيان التالي معدلات ما قبل الحرب لامدادات الطعام الصافية x ، ومعدلات وفيات الأطفال y في عدد مختار من الدول:

* مأخوذة من منجزات خطط التنمية الصادر عن وزارة التخطيط في المملكة. ص ٢٠٩ و ص ٢١٣.

البلاد	عدد الحريات البرية للشخص الواحد x	معدل وفيات الأطفال لكل 1000 (y)	البلاد	x	y	البلاد	x	y
الأرجنتين	2730	98.8	الدانمرك	3420	64.2	نيوزيلاند	3260	32.2
استراليا	3300	39.1	مصر	2450	162.9	النرويج	3160	40.5
النمسا	2990	87.4	فرنسا	2880	66.1	هولندا	3010	37.4
بلجيكا	3000	83.1	ألمانيا	2960	63.3	بولونيا	2710	139.4
بورما	2080	202.1	اليونان	2600	113.4	السويد	3210	43.3
كندا	3070	67.4	آيسلند	3160	42.4	سويسرا	3110	45.3
سيلان	1920	182.8	الهند	1970	161.6	المملكة المتحدة	3100	55.3
شيلي	2240	240.8	إيرلندا	3390	69.6	الولايات المتحدة	3150	53.2
كولومبيا	1860	155.6	إيطاليا	2510	102.7	أوروغواي	2380	94.1
كوبا	2610	116.8	اليابان	2180	60.6			

ارسم مخطط الانتشار واحسب معامل الارتباط بين عدد الحريات اليومية للشخص الواحد (x)، وبين y معدل وفيات الأطفال لكل 1000.

(١١) في التمرين ١٨ من مجموعة التمارين (١ - ١). معتبرا عدد الأسرة x وعدد الأطباء y . ارسم مخطط الانتشار. واحسب معامل الارتباط بين x و y .

(١٢) يتضمن البيان التالي معدل استهلاك الكحول السنوي بالليتر للشخص الواحد ممن تزيد أعمارهم عن الرابعة عشرة، x ، ومعدل الوفاة لكل مائة ألف من السكان بمرض تشمع الكبد أو الإدمان، y ، وذلك في مختارات من الدول. ارسم مخطط الانتشار لإيضاح وجود رابطة بين المتغيرين x و y ، ثم احسب معامل الارتباط بينهما.

البلاد	معدل استهلاك الكحول السنوي باللتر (x)	معدل الوفاة لكل 10 ⁵ من السكان بسبب تشمع الكبد أو الإدمان (y)
فرنسا	24.7	46.1
إيطاليا	15.2	23.6
ألمانيا الغربية	12.3	23.7
استراليا	10.9	7.0
بلجيكا	10.8	12.3
الولايات المتحدة	9.9	14.2
كندا	8.3	7.4
إنكلترا وويلز	7.2	3.0
السويد	6.6	7.2
اليابان	5.8	10.6
هولندا	5.7	3.7
إيرلندا	5.6	3.4
النرويج	4.3	4.3
فنلندا	3.9	3.6