

الباب الأول
مادة تمهيدية

obeikandi.com

١-١ مقدمة في البراهين الرياضية

obeikandi.com

البراهين الرياضية

يتميز علم الرياضيات عن غيره من العلوم بعدم اعتماد صحة أية عبارة ما لم يتم إثباتها بشكل يقيني لا يقبل الشك أو التأويل. كما تتجلى روعة هذا العلم الأصيل في تعدد طرق البرهان واعتمادها بشكل رئيس على المنطق. لذا ارتأينا أن نبدأ هذا الكتاب بملخص لبعض الطرق الرئيسية للبراهين الرياضية، خاصة تلك التي ستتم الاستعانة بها في حل المسائل الرياضية لاحقاً.

❖ البرهان المباشر

نستخدم المعطيات في حسابات مباشرة، كما نستخدم قوانين أو صيغ أو مبرهنات رياضية معروفة، إن لزم الأمر، لاستنتاج صحة العبارة المطلوب إثباتها.

ملاحظة: لإثبات أن العبارة ١ تؤدي إلى العبارة ٢ ($١ \Rightarrow ٢$)، نفترض أولاً صحة العبارة ١، ثم نستخدم هذا الفرض لاستنتاج أن العبارة ٢ صحيحة.

مثال: أثبت أنه إذا كان n عدداً فردياً، فإن n^2 عدد فردي.
البرهان: بما أن n عدد فردي، فإنه يمكن كتابته على الشكل $n = 2l + 1$ ، حيث l عدد صحيح. نستنتج من ذلك أن

$$n^2 = (2l + 1)^2 = 4l^2 + 4l + 1 = 4(l^2 + l) + 1$$

إذن، n^2 عدد فردي.

ملاحظة: لا يعني الإثبات المباشر لصحة $١ \Rightarrow ٢$ ب أنه يمكن الحصول على النتيجة في خطوة واحدة، بل قد يتضمن الإثبات عدة خطوات حيث نقسم المسألة الرئيسية عادة إلى مسائل جزئية أسهل

$$١ \Rightarrow ٢ \Rightarrow ٣ \Rightarrow ٤ \Rightarrow ٥ \Rightarrow ٦ \Rightarrow ٧ \Rightarrow ٨ \Rightarrow ٩$$

حيث $١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩$ عبارات بسيطة يتم اللجوء إليها حسب الحاجة - وقد تختلف من إثبات إلى آخر - ثم نستخدم خاصية التعدي للتضمنين " \Rightarrow " لنستنتج أن $١ \Rightarrow ٩$.

❖ البرهان باستخدام التناقض

لإثبات العبارة ب، نبدأ بافتراض أن العبارة ب غير صحيحة، ثم نستخدم هذا الفرض للتوصل إلى تناقض ما. نستنتج - باستخدام المنطق الرياضي - أن افتراض عدم صحة العبارة ب كان خطأ؛ أي أن العبارة ب صحيحة.

مثال: أثبت أن $\sqrt{2}$ غير نسبي (يسمى العدد نسبياً إذا أمكن كتابته على الصورة $\frac{ل}{ن}$ حيث $ل, ن$ عددان صحيحان و $ل \neq ٠$).

البرهان: افترض أن $\sqrt{2}$ نسبي. بناءً على ذلك، يمكن كتابة $\sqrt{2}$ على الصورة $\sqrt{2} = \frac{ل}{ن}$ ، حيث $ل, ن$ عددان صحيحان و $ل \neq ٠$. إذا كانت هناك قواسم مشتركة للعددين $ل, ن$ غير ± ١ ، فإنه يمكن اختصارها

وإعادة كتابة الكسر في أبسط صورة ممكنة لنحصل على $\frac{k}{l} = \frac{m}{n} = \sqrt{2}$ ، حيث m, n عدنان صحيحان ليس بينهما أية قواسم مشتركة غير ± 1 و $n \neq 0$. بتربيع الطرفين نحصل على $m^2 = 2n^2$ ، ونستنتج من ذلك أن m عدد زوجي، أي أن $m = 2l$ ، حيث l عدد صحيح. إذن $m^2 = 2(2l)^2 = 4l^2$ ، أي أن $2l^2 = 2n^2$ ، وبذلك يكون n عدداً زوجياً. وبما أن m زوجي، فإن 2 قاسم مشترك للعددين m, n ، وهذا يتناقض مع افتراضنا عدم وجود قواسم مشتركة للعددين m, n . إذن، افتراض أن $\sqrt{2}$ نسبي كان خطأ لأنه أدى إلى تناقض، والصحيح هو أن $\sqrt{2}$ غير نسبي.

❖ البرهان غير المباشر

لإثبات $P \Leftrightarrow Q$ ، نبدأ بافتراض أن العبارة P صحيحة، وأن العبارة Q غير صحيحة، ثم نستخدم هذا الفرض للتوصل إلى أن العبارة P غير صحيحة، وهذا تناقض مع المعطى (وهو صحة العبارة P). نستنتج - باستخدام المنطق الرياضي - أن افتراض عدم صحة العبارة Q كان خطأ؛ أي أن $P \Leftrightarrow Q$.

مثال: أثبت أنه إذا كان n عدداً فردياً، فإن n عدد فردي.
البرهان: ليكن n عدداً فردياً. افرض أن العبارة " n عدد فردي" خطأ، أي أن n عدد زوجي. في هذه الحالة يمكن كتابته على الصورة $n = 2l$ ، حيث l عدد صحيح. نستنتج من ذلك أن

$$n^2 = (2l)^2 = 4l^2 = 2(2l^2)$$

أي أن n^2 عدد زوجي، وهذا يتناقض مع الفرض.

❖ الاستقراء الرياضي

لإثبات أن العبارة $P(n)$ صحيحة لجميع الأعداد الصحيحة $n \leq k$ ، نطبق مبدأ الاستقراء الرياضي والذي يتكون من ثلاث خطوات:

- (١) نثبت أن العبارة صحيحة لـ $n = 1$ ؛ أي أن $P(1)$ صحيحة.
- (٢) نفرض أن العبارة صحيحة لـ $n = m$ ، حيث $m \leq k$ ؛ أي أن $P(m)$ صحيحة.
- (٣) باستخدام صحة $P(m)$ ، نثبت أن العبارة صحيحة لـ $n = m+1$ ؛ أي أن $P(m+1)$ صحيحة.

ملاحظة: توجد عدة صيغ مختلفة للاستقراء الرياضي لا يتسع المجال للتعرض لها بالتفصيل في هذا المقام. عادة ما يكون المطلوب هو إثبات صحة عبارة $P(n)$ لجميع الأعداد الطبيعية $n \leq k$.

مثال: أثبت أنه لأي عدد طبيعي n :

$$(*) \quad \frac{(1+n)n}{2} = n + \dots + 2 + 1$$

البرهان: نستخدم مبدأ الاستقراء الرياضي. لاحظ أن $P(n)$ معطاة في (*) أعلاه.

الخطوة الأولى: من الواضح أنّ (*) صحيحة عندما $n=1$ ، حيث إنّ $\frac{(1+1)^1}{2} = 1$.

الخطوة الثانية: نفرض أنّ (*) صحيحة لـ $n=r$ ؛ أي أنّ

$$\frac{(1+r)^r}{2} = r + \dots + 2 + 1$$

الخطوة الثالثة: نثبت أنّ (*) صحيحة لـ $n=r+1$ ؛ أي أنّ

$$\frac{(2+r)(1+r)}{2} = (1+r) + \dots + 2 + 1$$

لإثبات ذلك نستخدم الخطوة الثانية كما يلي

$$(1+r) + (r + \dots + 2 + 1) = (1+r) + r + \dots + 2 + 1$$

$$(1+r) + \frac{(1+r)^r}{2} =$$

$$\frac{(2+r)(1+r)}{2} =$$

حسب مبدأ الاستقراء الرياضي، نستنتج أنّ (*) صحيحة لجميع الأعداد الطبيعية n ؛ أي أنّ

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{(1+n)^n}{2} = n + \dots + 2 + 1$$

obeikandi.com

٢-١ مقدمة في الجبر

obeikandi.com

مجموعات الأعداد

❖ مقدمة

عرّف الإنسان بشكل تدريجي عدة مجموعات من الأعداد التي يحتاجها في حياته اليومية، مثل

$$\begin{aligned} \text{مجموعة الأعداد الطبيعية: } \mathbb{N} &= \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\} \\ \text{مجموعة الأعداد الكلية: } \mathbb{Z} &= \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\} \\ \text{مجموعة الأعداد الصحيحة: } \mathbb{Z} &= \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\} \\ \text{مجموعة الأعداد النسبية: } \mathbb{Q} &= \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} \end{aligned}$$

لاحظ أن كثيراً من المعادلات ليس لها حلول في \mathbb{N} (س $2 = 2$ ، مثلاً). لذلك تمت إضافة هذه الأعداد غير النسبية (مثل $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ ، $\sqrt{5}$) لتكوّن مع الأعداد النسبية مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} .

لكن هذه المجموعة لا تشمل -على سبيل المثال- أي جذر للمعادلة $x^2 + 1 = 0$ ، ولذلك تمت توسعتها لنحصل على مجموعة الأعداد المركبة

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$

ليكن $\mathbb{C} = a + bi$. يُسمّى a الجزء الحقيقي، كما يُسمّى b (أو b فقط حسب بعض المصادر)، الجزء التخيلي. يعرف مرافق العدد المركب $\mathbb{C} = a + bi$ على أنه العدد المركب $\bar{\mathbb{C}} = a - bi$ ، كما يعرف مقياس \mathbb{C} على أنه العدد الحقيقي $|\mathbb{C}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ، والذي يمثل هندسياً طول متجه يصل بين نقطة الأصل والنقطة (a, b) .

ملاحظة: $\bar{\bar{\mathbb{C}}} = \mathbb{C}$ ، $|\bar{\mathbb{C}}| = |\mathbb{C}|$ (عدد تخيلي (غير حقيقي) وهو أحد جذري المعادلة $x^2 + 1 = 0$ ، (الجذر الآخر هو $-\bar{\mathbb{C}}$). كل عدد حقيقي هو عدد مركب، أي أن $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. يكون العدد المركب \mathbb{C} حقيقياً إذا وفقط إذا $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$.

العمليات على الأعداد المركبة: ليكن $\mathbb{C}_1 = a_1 + bi_1$ ، $\mathbb{C}_2 = a_2 + bi_2$ عددين مركبين.

$$(1) \quad \mathbb{C}_1 + \mathbb{C}_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

$$(2) \quad \mathbb{C}_1 - \mathbb{C}_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

$$(3) \quad \mathbb{C}_1 \times \mathbb{C}_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

$$(4) \quad \frac{1}{\mathbb{C}} = \frac{1}{a + bi} = \frac{1}{a + bi} \times \frac{a - bi}{a - bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

❖ القيمة المطلقة

تعتبر دالة القيمة المطلقة من أهم الدوال في الرياضيات وأكثرها استعمالاً، وقد تم تعميمها إلى فضاءات إقليدية وغير إقليدية.

تعريف: ليكن x عدداً حقيقياً. تعرّف القيمة المطلقة للعدد x ، ويرمز لها بالرمز $|x|$ ، على النحو التالي:

$$\left. \begin{array}{l} x \leq 0 \\ x > 0 \end{array} \right\} = |x|$$

تمثل $|x|$ هندسياً بُعد النقطة التي تمثل العدد x على خط الأعداد عن تلك التي تمثل الصفر.

خصائص القيم المطلقة: ليكن x, y, z عددين حقيقيين.

$$(1) \quad 0 \leq |x|$$

$$(2) \quad |x-1| = |1-x|$$

$$(3) \quad |x| \geq 1 \Rightarrow |x-1| \geq 0$$

$$(4) \quad |x| |y| = |xy|$$

$$(5) \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \text{ بشرط } y \neq 0.$$

$$(6) \quad |x-y| = |y-x|$$

$$(7) \quad |x| + |y| \geq |x \pm y|$$

مبرهنة: ليكن x, y, z عددين حقيقيين، حيث $x \leq y$.

$$(1) \quad |x| \geq |y| \Leftrightarrow -x \geq y \geq -x$$

$$(2) \quad |x| \leq |y| \Leftrightarrow x \leq y \text{ أو } -x \geq -y$$

❖ الجذور

تعريف: ليكن n عدداً طبيعياً و x عدداً حقيقياً. تُعرّف

$$\left. \begin{array}{l} n \text{ فردي} \\ n \text{ زوجي} \end{array} \right\} = \sqrt[n]{x}$$

تنويه: من الأخطاء الشائعة اعتبار $\sqrt[n]{x} = \pm \sqrt[n]{x}$ ، والصحيح أن $\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x}$.

مثال: لحل المعادلة التربيعية $s^2 - 4s = 0$ ، نتبع الخطوات التالية

$$s^2 - 4s = 0 \Leftrightarrow s^2 = 4s \Leftrightarrow \sqrt{s^2} = \sqrt{4s} \Leftrightarrow |s| = 2 \Leftrightarrow s = \pm 2$$

أما الآتي فهو خطأ:

$$s^2 - 4s = 0 \Leftrightarrow s^2 = 4s \Leftrightarrow \sqrt{s^2} = \sqrt{4} \Leftrightarrow s = \pm 2$$

❖ متباينات هامة

فيما يلي نورد بعض المتباينات الهامة التي نحتاجها لحل العديد من المسائل في مسابقات الرياضيات:

- متباينة الوسط التوافقي - الوسط الحسابي - الوسط الهندسي - الوسط التربيقي: إذا كان a, b عددين حقيقيين موجبين، فإن

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{\frac{a+b}{2}} \geq \frac{2ab}{a+b} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \geq \sqrt{\frac{2ab}{a+b}}$$

حيث يرمز أصغر (a, b) لأصغر العددين و أكبر (a, b) لأكبرهما.

- متباينة الوسط الحسابي - الوسط الهندسي: إذا كانت a_1, a_2, \dots, a_n أعداداً حقيقية غير سالبة، فإن

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n}$$

- إذا كانت a, b, c, \dots ، فإن

$$a^2 + b^2 + c^2 + \dots \leq (a+b+c+\dots)^2$$

- إذا كانت a, b, c, \dots ر أعداداً حقيقية غير سالبة، فإن

$$\sqrt{a+b} + \sqrt{c+d} \geq \sqrt{(a+c) + (b+d)}$$

- متباينة كوشي - شفارتس (إذا كانت $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ ، فإن

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2$$

كثيرات الحدود

❖ مقدمة

تعتبر كثيرات الحدود من أفضل الدوال من ناحية سهولة التعامل معها ودراسة خصائصها.

تعريف: كثيرة الحدود في المتغير s من الدرجة n (حيث $n \geq 0$ عدد كلي) هي دالة:

$$d: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, d(s) = a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + a_ns^n$$

حيث $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{C}$ و $a_n \neq 0$. تُسمى $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ معاملات كثيرة الحدود، كما يُسمى a_n المعامل الرئيس، و يُسمى a_0 الحد الثابت. نرمز لدرجة $d(s)$ بالرمز درجة $d(s)$.

تعريف: كثيرة الحدود الصفرية هي الدالة $d(s) = 0$ لجميع قيم $s \in \mathbb{C}$ ، ونعتبر درجتها $-\infty$.

تعريف: نعرف مجموعة كثيرات الحدود على \mathbb{C} على أنها

$$\mathbb{C}[s] = \{ a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + a_ns^n \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{C}, n \geq 0 \}$$

بنفس الطريقة يمكن تعريف $\mathbb{C}[s]$ و $\mathbb{C}[s]$.

مبرهنة (القسمة مع باقي): لتكن $d(s)$ و $h(s)$ كثيرتي حدود. إذا كانت $h(s)$ غير صفرية، فإنه توجد كثيرتا حدود $g(s)$ و $b(s)$ ، بحيث

$$d(s) = g(s) \times h(s) + b(s) \quad \text{و درجة } b(s) < \text{درجة } h(s)$$

تعريف: في المبرهنة أعلاه، نسمي $d(s)$ المقسوم، و $h(s)$ المقسوم عليه، كما نسمي $g(s)$ خارج القسمة، و $b(s)$ باقي القسمة.

تعريف: لتكن الدالتان $d(s)$ و $h(s)$ كثيرتي حدود، حيث $h(s) \neq 0$. نقول إن $h(s)$ تقسم $d(s)$ ، إذا كان باقي قسمة $d(s)$ على $h(s)$ كثيرة الحدود الصفرية، ونكتب $h(s) \mid d(s)$.

تعريف: نقول: إن كثيرة الحدود $h(s)$ عامل مشترك لكثيرات الحدود $d_1(s), \dots, d_n(s)$ ، إذا كانت $h(s)$ تقسم كل واحدة من كثيرات الحدود هذه على حدة. ونقول: إن العامل المشترك $h(s)$ هو القاسم المشترك الأكبر لكثيرات الحدود $d_1(s), \dots, d_n(s)$ ، ونرمز له بالرمز

$$\text{م.ك.أ.}(d_1(s), \dots, d_n(s))$$

إذا كان أي عامل مشترك آخر لكثيرات الحدود هذه من قواسم $h(s)$.

مثال: لتكن $d(s) = s^3 + 1$ ، و $h(s) = s^2 - 2s + 1$ ، و $g(s) = s + 1$ ، و $b(s) = 1$ من الواضح أن

$$s^3 + 1 = (s^2 - 2s + 1)(s + 1) + 1 \quad \text{و أن} \quad \text{م.ك.أ.}(s^3 + 1, s^2 - 2s + 1) = 1$$

❖ جذور كثيرات الحدود

تعريف: تُسمى أية معادلة

$$د(س) = ٠، \text{ حيث } د(س) \in \mathbb{C}[س] \text{ وَدرجة } د(س) = n، \text{ حيث } n \in \mathbb{Z}$$

معادلة حدودية نونية (أو معادلة حدودية من الدرجة n).

تعريف: نقول: إن العدد المركب $\alpha + \beta i$ جذر لكثيرة الحدود $د(س)$ إذا كان $د(\alpha + \beta i) = ٠$.

مبرهنة: لتكن الدالتان $د(س)$ و $هـ(س)$ كثيرتي حدود، حيث $هـ(س)$ غير صفرية. إذا كانت كثيرة الحدود $ب(س)$ هي باقي قسمة $د(س)$ على $هـ(س)$ ، فإن $د(س) = ب(س) \cdot ج(س)$ لأي جذر $ج$ لكثيرة الحدود $هـ(س)$.

نتيجة: لتكن الدالة $د(س)$ كثيرة حدود، وليكن $ج$ عدداً حقيقياً.

(١) عند قسمة $د(س)$ على $هـ(س) = س - ج$ ، فإن ناتج القسمة يكون عدداً ثابتاً مساوياً لقيمة $د(ج)$.

(٢) $د(ج) = ٠$ إذا وفقط إذا $ج = س - ج$ و $د(س)$.

مبرهنة: إذا كان $د(س) = (س - \alpha)^2 + \beta$ جذراً لكثيرة الحدود $د(س) \in \mathbb{C}[س]$ ، فإن العدد المرافق $\bar{\alpha} = \alpha - \beta$ هو أيضاً جذر لكثيرة الحدود $د(س)$.

ملاحظة: تعني المبرهنة السابقة أن عدد الجذور غير الحقيقية لأية كثيرة حدود $د(س) \in \mathbb{C}[س]$ زوجي.

نتيجة: يكون العدد المركب $\alpha + \beta i$ جذراً لكثيرة الحدود $د(س)$ إذا وفقط إذا كانت $هـ(س)$ تقسم $د(س)$ ، حيث $هـ(س) = (س - \alpha)^2 + \beta$ و $س^2 - 2\alpha س + (\alpha^2 + \beta)$.

مبرهنة: لتكن $د(س)$ كثيرة حدود، وليكن α ، β عددين حقيقيين بحيث يكون $\alpha > \beta$. إذا كان $د(\alpha) \times د(\beta) > ٠$ ، فإنه يوجد عدد حقيقي (واحد على الأقل) $\gamma > \beta$ يحقق $د(\gamma) = ٠$.

مثال: لتكن $د(س) = س^٤ - س^٣ + ٢س - ١$. لاحظ أن

$$د(١) \times د(٢) = (٢) \times (-٣) = -٦ < ٠$$

بتطبيق المبرهنة السابقة، نستنتج أن لكثيرة الحدود $د(س)$ جذراً حقيقياً $\gamma > ١$ (لاحظ أنه ليس من السهل - في كثير من الأحيان - تحديد قيمة هذا الجذر).

المبرهنة الأساس للجبر: لأية كثيرة حدود $د(س) \in \mathbb{C}[س]$ ، درجتها $n \geq ١$ ، n من الجذور المركبة (باحتمساب الجذور المكررة إن وجدت).

نتيجة: لتكن $د(س) \in \mathbb{C}[س]$ كثيرة حدود من الدرجة $n \leq ١$.

(١) إذا كان n عدداً فردياً، فإن عدد الجذور الحقيقية لكثيرة الحدود $د(س)$ فردي.

(٢) إذا كان n عدداً زوجياً، فإن عدد الجذور الحقيقية لكثيرة الحدود D (س) زوجي.

ملاحظات: لتكن D (س) $\in \mathbb{C}[S]$ كثيرة حدود من الدرجة n .

(١) إذا كان n عدداً فردياً، فإنه يوجد لكثيرة الحدود D (س) جذر حقيقي واحد على الأقل.

(٢) إذا كان n عدداً زوجياً، فإن من المحتمل أن لا يكون لكثيرة الحدود D (س) أية جذور حقيقية.

مبرهنة (الجذور الصحيحة والجذور النسبية): لتكن

$$D(S) = a_n S^n + a_{n-1} S^{n-1} + \dots + a_1 S + a_0, \text{ حيث } a_i \in \mathbb{Z}, \dots, a_0, a_n \in \mathbb{Z}$$

(١) مجموعة الجذور النسبية المحتملة لكثيرة الحدود D (س) هي

$$\left\{ \frac{k}{l} : k \in \mathbb{Z}, l \in \mathbb{Z}, l \neq 0, \text{ (ليس لهما قواسم مشتركة), } k \mid a_0, l \mid a_n \right\}$$

(٢) إذا كان $a_n = \pm 1$ ، فإن أي جذر نسبي لكثيرة الحدود D (س) هو أحد قواسم الحد الثابت a_0 ، أي أنه عدد صحيح.

ملاحظات:

(١) لا تنطبق المبرهنة السابقة إذا كان أحد معاملات كثيرة الحدود عدداً غير صحيح.

(٢) الأعداد النسبية في المبرهنة أعلاه هي جذور محتملة قد تكون كلها أو بعضها جذوراً لكثيرة الحدود D (س)، وقد لا يكون أي منها جذراً لهذه الدالة.

مثال: ليس لكثيرة الحدود $D(S) = S^2 - 2S + 2$ أية جذور نسبية، حيث أن $\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

❖ جذور المعادلات التربيعية

الشكل العام للمعادلة التربيعية هو

$$a_2 S^2 + a_1 S + a_0 = 0, \text{ حيث } a_2 \neq 0, a_1 \in \mathbb{C}, a_0 \in \mathbb{C} (**)$$

القانون العام لحل المعادلة التربيعية: يوجد عددان مركبان يحققان المعادلة (**):

$$S = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2 a_0}}{2a_2}$$

ملاحظة: ليكن S_1 و S_2 جذري المعادلة التربيعية (**). من الواضح أن S_1 و S_2 يحققان

$$S_1 + S_2 = -\frac{a_1}{a_2} \text{ و } S_1 \times S_2 = \frac{a_0}{a_2}$$

المميز: يُسمى العدد الحقيقي $b^2 - 4ac$ مميز المعادلة التربيعية (**). لأن قيمته تميز بين ثلاث حالات:

(١) $b^2 - 4ac < 0$: للمعادلة في هذه الحالة جذران حقيقيان مختلفان هما

$$\frac{\sqrt{14-b^2}-b}{12} = s_2 \quad \text{و} \quad \frac{\sqrt{14-b^2}+b}{12} = s_1$$

(٢) $b^2 - 14 = 0$: للمعادلة في هذه الحالة جذران حقيقيان متساويان (أو نقول جذر حقيقي واحد مكرر)

$$s_2 = \frac{b}{12} = s_1$$

(٣) $b^2 - 14 > 0$: للمعادلة في هذه الحالة جذران مركبان غير حقيقيين

$$s_1 = \frac{\sqrt{14-b^2}+b}{12} = \frac{\sqrt{14-b^2}-b}{12} + b$$

$$s_2 = \frac{\sqrt{14-b^2}-b}{12} = \frac{\sqrt{14-b^2}+b}{12} - b$$

مبرهنة: لتكن $s^2 + bs + c = 0$ معادلة تربيعية، حيث a, b, c أعداد نسبية و $a \neq 0$. إذا كان l و l' جذراً للمعادلة التربيعية، حيث l, l', m أعداد نسبية و m غير نسبي، فإن $l - l' = \sqrt{m}$ هو الجذر الثاني للمعادلة التربيعية.

مثال: إذا كان $3 - 5\sqrt{7}$ جذراً للمعادلة $s^2 + bs + c = 0$ ، فأوجد b و c .

الحل: باستخدام المبرهنة أعلاه، نعلم أن الجذر الآخر للمعادلة هو $3 + 5\sqrt{7}$ ، وبذلك تكون المعادلة

$$s^2 - ((3 + 5\sqrt{7}) - (3 - 5\sqrt{7}))s + (3 + 5\sqrt{7})(3 - 5\sqrt{7}) = 0$$

$$s^2 - 10s - 38 = 0$$

نستنتج أن $b = -10$ و $c = -38$.

❖ جذور المعادلات التكعيبية

الشكل العام للمعادلة التكعيبية هو:

$$s^3 + bs^2 + cs + d = 0, \quad \text{حيث } d, c, b, a \in \mathbb{C}, a \neq 0 \quad (***)$$

ملاحظة: لأية معادلة تكعيبية (***) ثلاثة جذور مركبة أحدها أو جميعها حقيقية. توجد صيغة عامة لإيجاد جذور المعادلة (***)، ولكننا لن نتطرق لها في هذا الكتاب.

مبرهنة: إذا كانت s_1, s_2, s_3 الجذور الثلاثة للمعادلة التكعيبية (***)، فإن

$$\begin{aligned} \frac{ب}{١} &= ١س + ٢س + ٣س \\ \frac{ج}{١} &= ١س٣س + ٢س٢س + ٣س١س \\ \frac{د}{١} &= ١س٢س١س \end{aligned}$$

ملاحظة: لتكن $١س, ٢س, ٣س$ الجذور الثلاثة للمعادلة التكعيبية (***) . إذا كان $١س \times ٢س \times ٣س \neq ٠$ ، فإن

$$\frac{ج}{د} = \frac{\frac{ج}{١}}{\frac{د}{١}} = \frac{١س٣س + ٢س٢س + ٣س١س}{١س٢س١س} = \frac{١}{٣س} + \frac{١}{٢س} + \frac{١}{١س}$$

❖ التحليل إلى العوامل الأولية

تعريف: نقول: إن كثيرة الحدود $د(س) \in \mathbb{C}[س]$ ، حيث درجة $د(س) \leq ١$ أولية أو غير قابلة للاختزال، إذا كانت غير قابلة للتحليل كحاصل ضرب كثيرات حدود في $\mathbb{C}[س]$ ذات درجات أقل.

نتيجة: كثيرات الحدود الأولية في $\mathbb{C}[س]$ هي الدوال الخطية والدوال التربيعية ذات المميز السالب.

مبرهنة: يمكن تحليل أية كثيرة حدود غير أولية $د(س) \in \mathbb{C}[س]$ بطريقة وحيدة كحاصل ضرب كثيرات حدود أولية:

$$د(س) = (س)١ \times \dots \times (س)٣ \times (س)٤$$

تعريف: نسمي كثيرات الحدود $د١(س), \dots, د٣(س), د٤(س)$ في المبرهنة أعلاه العوامل الأولية للدالة $د(س)$.

مثال: لتكن $د(س) = س٥ + س٢ - س٤ - س٣ + س٧ + س٦$. بتعويض الجذور النسبية المحتملة وهي

$\{١ \pm, ٢ \pm, ٣ \pm, ٦ \pm\}$ ، نجد أن $١ = س١$ و $٣ = -س٢$ جذران لكثيرة الحدود $د(س)$. بالقسمة على

$ه(س) = (س - ١)(٣ + س)$ نحصل على $ه(س) = س٣ + س - ٢$. بتعويض الجذور النسبية المحتملة

لكثيرة الحدود $ه(س)$ وهي $\{١ \pm, ٢ \pm\}$ ، نجد أن $١ = س٣$ جذر لكثيرة الحدود $ه(س)$. بالقسمة على $(س - ١)$ ، نجد أن $ه(س) = (س - ١)(س٢ + س + ٢)$. حيث أن مميز $س٢ + س + ٢ = ٠$ هو $٧ - ٠ < ٠$ ، فإنه لا يوجد لهذه المعادلة أية جذور حقيقية وبذلك تكون الدالة $ه(س) = س٣ + س + ٢$ أولية. بذلك نحصل على التحليل التالي لكثيرة الحدود $د(س)$ إلى عواملها الأولية

$$د(س) = (س - ١)(س - ٣)(س٢ + س + ٢)$$

أمثلة: لأي عدد n نحصل على تحليل لكثيرات الحدود التالية إلى عواملها الأولية:

$$(1) \quad s^2 - 1 = (s-1)(s+1)$$

$$(2) \quad s^3 - 1 = (s-1)(s^2 + s + 1)$$

$$(3) \quad s^3 + 1 = (s+1)(s^2 - s + 1)$$

مبرهنة (ذات الحدين): إذا كان $n \geq 2$ ، فإن

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} s^i = (s+1)^n \quad \text{حيث } \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} \text{، } s^{-n} \text{، حيث}$$

ملاحظة: إذا كان $n \geq 2$ ، فإن $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$. من المتفق عليه اعتبار $0! = 1$.

حالات خاصة:

$$(1) \quad (s+1)^2 = s^2 + 2s + 1$$

$$(2) \quad (s-1)^2 = s^2 - 2s + 1$$

$$(3) \quad (s+1)^3 = s^3 + 3s^2 + 3s + 1$$

$$(4) \quad (s-1)^3 = s^3 - 3s^2 + 3s - 1$$

التحليل بالتجميع: يكون ذلك بتجميع الحدود التي تحتوي على قواسم مشتركة في التعبير الرياضي، ثم بإخراج هذه الحدود من كل تجمع على حدة. يمكن كذلك إعادة عملية التجميع هذه أكثر من مرة.

ملاحظات: لتحليل كثيرة حدود $D(s)$ $[s]$ إلى عواملها الأولية يكون من المفيد مراعاة ما يلي:

(1) نبدأ عادة باختبار إذا ما كان $D(s)$ حالة خاصة تنطبق عليها نظرية ذات الحدين.

(2) إخراج القاسم المشترك الأعظم لجميع حدود $D(s)$ كعامل مشترك.

(3) إذا كان $D(s)$ جذراً لكثيرة الحدود $D(s)$ ، فإن $D(s) = (s-a) \cdot E(s)$ عامل أولي لكثيرة الحدود $D(s)$.

(4) إذا كان $D(s) = (s-a) \cdot E(s)$ جذراً مركباً غير حقيقي لكثيرة الحدود $D(s)$ ، فإن $D(s) = (s-a) \cdot E(s)$ ويمكن كتابة $D(s)$ كحاصل ضرب كثيرتي حدود

$$D(s) = (s-a)(s-\bar{a}) + (s-a)(s-\bar{a})$$

مثال: لتحليل كثيرة الحدود $D(s) = s^6 - 21s^3 + 14 = (s-2)(s^2 - 7s + 7)(s^2 - 2s + 1)$ إلى عواملها الأولية، نبدأ بالتجميع، ثم نخرج القواسم المشتركة لنحصل على

$$\begin{aligned} s^6 - 21s^3 + 14 &= (s^2 - 7s + 7)(s^2 - 2s + 1) \\ &= (s^2 - 7s + 7)(s-2)(s-1) \\ &= (s^2 - 7s + 7)(s-2)(s-1) \\ &= (s^2 - 7s + 7)(s-2)(s-1) \end{aligned}$$

obeikandi.com

٣-١ مقدمة في المتابعات والمتسلسلات

obeikandi.com

المجاميع

❖ مقدمة

إذا أردنا أن نجمع الأعداد $١, ٢, ٣, ٤, \dots, ٦, ٧, ٨, ٩, ١٠, \dots, ١٠٠٠, ١٠٠١, ١٠٠٢, \dots, ١٠٠٠٠$ فإننا نكتب $١, ٢, ٣, ٤, \dots, ١٠٠٠٠$ (وهنا نستخدم النقاط الثلاث للدلالة على الاستمرار بنفس طريقة السرد. وغالبًا ما نستخدم الرمز \sum للدلالة على هذا المجموع. فمثلاً

$$١, ٢, ٣, ٤, \dots, ١٠٠٠٠ = \sum_{١=١}^{١٠٠٠٠} ١$$

ونسمي ١ الحد الأول، ونسمي ٢ الحد الثاني وبشكل عام نسمي ١٠٠٠٠ الحد النوني للمجموع. وقد يبدأ المجموع من أي عدد مثل ١٠٠٠ ، وفي هذه الحالة نكتب:

$$١٠٠٠, ١٠٠١, ١٠٠٢, \dots, ١٠٠٠٠ = \sum_{١=١٠٠٠}^{١٠٠٠٠} ١$$

❖ قوانين مهمة

نفرض أن ١ أي عدد حقيقي ثابت وأن ٢ أي عدد صحيح موجب.

$$١) \sum_{١=١}^{٢} ١ = ٢$$

$$٢) \sum_{١=١}^{٢} \frac{(١+٢)^٢}{٢} = ٢$$

$$٣) \sum_{١=١}^{٢} \frac{(١+٢)(١+٢)^٢}{٦} = ٢$$

$$٤) \sum_{١=١}^{٢} \left(\frac{(١+٢)^٢}{٢} \right)^٢ = ٢$$

$$٥) \sum_{١=١}^{٢} ١ = \sum_{١=١}^{٢} ١$$

$$٦) \sum_{١=١}^{٢} ١ + \sum_{١=١}^{٢} ١ = (\sum_{١=١}^{٢} ١) + (\sum_{١=١}^{٢} ١)$$

المتتابعات

❖ مقدمة

تعريف: نسمي مجموعة الأعداد المرتبة (a_1, a_2, \dots, a_n) متتابعة منتهية وتحتوي على n من الحدود كما نسمي المجموعة المرتبة (a_1, a_2, a_3, \dots) متتابعة غير منتهية. وهناك طرق أخرى لكتابة المتتابعات، فمثلاً يمكن كتابة المتتابعة المنتهية على صورة $\{a_n\}_{n=1}^n$ و غير المنتهية على صورة $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

تعريف: نقول إن المتابعتين $\{a_n\}$ و $\{b_n\}$ متساويتان إذا تحقق أحد الشرطين:

- (١) إذا كانتا منتهيتين ولهما نفس العدد من العناصر وكان $a_n = b_n$ لـ جميع قيم n .
- (٢) إذا كانتا غير منتهيتين وكان $a_n = b_n$ لـ جميع قيم n .

❖ المتتابعة الحسابية

تسمى المتتابعة $\{a_n\}$ متتابعة حسابية إذا وُجد عدد ثابت t بحيث أن $a_{n+1} - a_n = t$ لجميع قيم n . يسمى هذا الفرق الثابت t أساس المتتابعة الحسابية $\{a_n\}$. ونلاحظ أن المتتابعة الحسابية $\{a_n\}$ والتي حدها الأول a_1 والثابت فيها t يكون حدها النوني: $a_n = a_1 + (n-1)t$ ونستطيع كتابتها على صورة:

$$(a_1, a_1 + t, a_1 + 2t, a_1 + 3t, \dots, a_1 + (n-1)t, \dots)$$

❖ المتتابعة الهندسية

تسمى المتتابعة $\{a_n\}$ متتابعة هندسية إذا وُجد عدد ثابت مثل r بحيث أن $a_{n+1} = r a_n$ لجميع قيم n . يسمى r أساس المتتابعة الهندسية $\{a_n\}$. نلاحظ أن المتتابعة الهندسية $\{a_n\}$ التي حدها الأول a_1 وأساسها r يكون حدها النوني: $a_n = a_1 r^{n-1}$ ونستطيع كتابتها على صورة:

$$(a_1, a_1 r, a_1 r^2, a_1 r^3, \dots, a_1 r^{n-1}, \dots)$$

المتسلسلات

❖ مقدمة

إذا كانت لدينا متتابعة منتهية $\{k_n\}_{n=1}^r$ فإن المجموع $ج = k_1 + k_2 + \dots + k_r$ يسمى متسلسلة منتهية. نعرف كذلك المتسلسلة (غير المنتهية) على أنها مجموع المتوالية غير المنتهية $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}$ ونكتبها على صورة

$$ج = k_1 + k_2 + \dots$$

في حالة المتسلسلات غير المنتهية، قد يكون المجموع عدداً حقيقياً (وفي هذه الحالة تسمى المتسلسلة تقاربياً). وقد لا يكون المجموع عدداً حقيقياً، وفي هذه الحالة تسمى المتسلسلة غير تقاربياً.

عادة ما نستخدم رمز المجموع للمتسلسلات. فمثلاً نكتب المتسلسلة المنتهية على النحو الآتي

$$ج = \sum_{n=1}^r k_n = k_1 + k_2 + \dots + k_r$$

كذلك نكتب المتسلسلة غير المنتهية على الصورة

$$ج = \sum_{n=1}^{\infty} k_n = \dots + k_2 + k_1$$

ملاحظة: مجموع المتتابعة الحسابية (أو الهندسية) يسمى متسلسلة حسابية (أو هندسية). إذا كان لدينا متتابعة حسابية منتهية $\{k_n\}_{n=1}^r$ حدها الأول 1 وأساسها $ث$ فإننا وباستخدام تعريف المتتابعة الحسابية نستطيع كتابة مجموعها على صورة:

$$ج = k_1 + k_2 + \dots + k_r$$

$$= 1 + (1 + ث) + (1 + 2ث) + \dots + (1 + (r-1)ث)$$

ميرهنة: إذا كانت $\{k_n\}_{n=1}^r$ متتابعة حسابية حدها الأول 1 وأساسها $ث$ فإن مجموعها يساوي:

$$ج = \frac{1}{ث} [k_r + 1]$$

إذا كان لدينا متتابعة هندسية منتهية $\{k_n\}_{n=1}^r$ حدها الأول 1 وأساسها $ر$ فإننا وباستخدام تعريف المتتابعة الهندسية نستطيع كتابة مجموعها على الصورة

$$ج = k_1 + k_2 + \dots + k_r = 1 + ر + ر^2 + \dots + ر^{r-1}$$

ميرهنة: إذا كانت $\{k_n\}_{n=1}^r$ متتابعة هندسية حدها الأول 1 وأساسها $ر$ فإن مجموعها يساوي

$$ج = \frac{1 - ر^r}{1 - ر}$$

obeikandi.com

١-٤ مقدمة في نظرية الأعداد

obeikandi.com

القسمة

❖ مقدمة

تعريف: ليكن $ل$ ، $ل$ عددين صحيحين، حيث $ل \neq ٠$. نقول: إن $ل$ يقسم $ل$ (أو أن $ل$ من مضاعفات $ل$)، أو $ل$ يقسم على $ل$ بدون باقٍ، ونكتب $ل | ل$ إذا وجد عدد صحيح $ن$ ، بحيث يكون $ل = ن \cdot ل$. نرمز لمجموعة قواسم $ل$ الطبيعية بالرمز $د(ل)$ ، ولمجموعة مضاعفات $ل$ الطبيعية بالرمز $م(ل)$.

ملاحظة: $ل | ل$ لجميع الأعداد الصحيحة $ل \neq ٠$.

خصائص هامة: لتكن $ا، ب، ج، د، هـ$ أعداداً صحيحة.

$$(١) \quad ا | ب \text{ و } ب | ج \Rightarrow ا | ج.$$

$$(٢) \quad ا | ل \text{ و } د | ل \Rightarrow ا | (ا + د). \text{ بشكل خاص } د | (ب + ا) \text{ و } د | (ب - ا).$$

$$(٣) \quad (ب - ا) | (ب - ا) \Rightarrow (ب - ا) | (ب - ا) \cdot ن \text{ } \forall ن \in \mathbb{Z}.$$

$$(٤) \quad (ب + ا) | (ب + ا) \Rightarrow (ب + ا) | (ب + ا) \cdot ن \text{ حيث } ن \text{ أي عدد طبيعي فردي.}$$

حقيقة (القسمة الإقليدية): إذا كان $م$ عدداً صحيحاً و $ع$ عدداً طبيعياً، فإنه يمكن كتابة $م$ بصورة وحيدة على الشكل

$$م = ع \cdot ب + ع \text{ حيث } ع، ب، حيث } ع، ب \text{ و } ع > ٠.$$

يسمى $م$ المقسوم و $ع$ المقسوم عليه، و $ع$ خارج القسمة، و $ب$ باقٍ القسمة.

تعريف: ليكن $ب$ عدداً طبيعياً. يوجد لأي عدد كلي $ا$ تمثيل وحيد على الصورة

$$ا = (ا_١، ا_٢، \dots، ا_١) = ا_١ \cdot ١ + ا_٢ \cdot ١ + \dots + ا_١ \cdot ١ + ا_٢ \cdot ١ + \dots + ا_١ \cdot ١ + ا_٢ \cdot ١ + \dots$$

حيث $ا_١ \geq ٠$ و $ا_٢ > ٠$ عدد كلي. يسمى هذا تمثيل العدد $ا$ في النظام البناي.

ملاحظة: من أهم الأنظمة العددية النظام العشري (في هذه الحالة لا داعي لكتابة الأساس $ب = ١٠$)، والنظام الثنائي.

مثال:

$$\begin{aligned} (١٠١١١١) &= ١ \cdot ١٠٠٠٠ + ١ \cdot ١٠٠٠ + ١ \cdot ١٠٠ + ١ \cdot ١٠ + ١ \cdot ١ \\ &= ١٠٠٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠ + ١٠ + ١ \\ &= ١١١١١ \end{aligned}$$

تعريف: ليكن $ا = (ا_١، ا_٢، \dots، ا_١) = ا_١ \cdot ١ + ا_٢ \cdot ١ + \dots + ا_١ \cdot ١ + ا_٢ \cdot ١ + \dots + ا_١ \cdot ١ + ا_٢ \cdot ١ + \dots$ تمثيل العدد الكلي $ا$ في النظام العشري. نرمز لمجموع أرقام العدد $ا$ بالرمز $م(ا)$ ، أي أن

$$م(ا) = ا_١ + ا_٢ + \dots + ا_١$$

- بما أن ٧ لا تقسم ٣٠، نستنتج أن ٧ لا تقسم ١
- لا تقسم ٨ العدد ١، لأن باقي قسمة ٥٤٦ على ٨ لا يساوي ٠.
 - تقسم ٩ العدد ١، لأن $١٨ = (٣٠٤٦)٩$ من مضاعفات ٩
 - تقسم ١٠ العدد ١، لأن $٦ = ١٠ \neq ٠$.
 - لا يقسم ١١ العدد ١، لأن

$$١ - ١ + ١ - ١ + ١ - ١ = ٣ - ٥ + ٤ - ٦ = ٤$$

ليس من مضاعفات ١١

- لا يقسم العدد ١٢ العدد ١ لأنه ليس من مضاعفات ٤

❖ الأعداد الأولية

يمكننا بلا شك اعتبار مفهوم الأعداد الأولية المحور الرئيس الذي تدور حوله باقي المفاهيم في نظرية الأعداد، ويرجع الفضل في ذلك إلى المبرهنة الأساس للحساب.

ما هي الأعداد الأولية، وما أهميتها، وكم عددها؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة باختصار.

تعريف: ليكن $٢ \leq ١$ عدداً طبيعياً. نقول: إن ١ عدد أولي إذا لم يكن له أية قواسم طبيعية عدا ١ و ١. إذا لم يكن العدد ١ أولياً، فإننا نقول: إنه عدد مؤلف.

ملاحظة: حسب التعريف، العدد الطبيعي ١ ليس أولياً وليس مؤلفاً.

تنويه: يمكن أيضاً تعريف مجموعة الأعداد الصحيحة الأولية بنفس الطريقة. مثلاً: $٢ \pm, ٣ \pm, ٥ \pm, \dots$ أعداد صحيحة أولية. في هذا الكتاب، وفي حالة عدم ذكر غير ذلك بشكل صريح، نعني بالأعداد الأولية الأعداد الأولية الطبيعية فقط.

توطئة إقليدس: لتكن $١, ٢, \dots, ١, ٢, \dots, ١$ أعداداً صحيحة. إذا كان ١ عدداً أولياً فإن

$$١ \mid (١ \times \dots \times ١) \Leftrightarrow ١ \mid \text{لأحد قيم } ١ = ١, \dots, ١ \text{ (على الأقل).}$$

مبرهنة (المبرهنة الأساس للحساب): ليكن $٢ \leq ١$ عدداً صحيحاً موجباً. يمكن تحليل ١ بصورة وحيدة كحاصل ضرب أعداد أولية. بشكل مفصل، نقول: إنه يمكن تحليل ١ على الشكل التالي

$$١ = ١^١ \times \dots \times ١^١,$$

حيث $١, ٢, \dots, ١, ٢, \dots, ١, ٢, \dots, ١$ أعداد أولية و $١, ٢, \dots, ١, ٢, \dots, ١$ هذا التحليل وحيد، بمعنى أنه إذا كان هناك تحليل آخر

$$١ = ١^١ \times \dots \times ١^١,$$

حيث $١, ٢, \dots, ١, ٢, \dots, ١, ٢, \dots, ١$ أعداد أولية و $١, ٢, \dots, ١, ٢, \dots, ١$ فإن $٢ = ١$ ويمكن إعادة ترتيب المعاملات الأولية بحيث نحصل على

$$١ = ١^١ \times \dots \times ١^١ \quad \vee \quad ١ = ١^١ \times \dots \times ١^١$$

حقائق:

(١) إذا كان $n \leq 1$ عدداً أولياً، فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق

$$1 + n^6 = 1 \quad \text{أو} \quad 1 - n^6 = 1$$

(٢) إذا كان n عدداً طبيعياً، وكان $n \geq 1$ عدداً أولياً، فإن $(1+n) \nmid$ (٣) لأي عدد صحيح موجب $n \leq 2$ ، توجد $n-1$ من الأعداد المتتابعة القابلة للتحويل

$$n+!n, 2+!n, 3+!n, \dots, n+!n$$

ملاحظة: عكس الحقيقة (١) أعلاه غير صحيح. مثلاً: $1+4 \times 6 = 25$ و $1-16 \times 6 = 95$ ليسا أوليين.

مبرهنة (إقليدس): يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الأولية.

مبرهنة: ليكن $b \leq 2$ عدداً طبيعياً. إذا كان b غير أولي، فإن أصغر عامل أولي p للعدد b يحقق

$$\sqrt{b} \geq p$$

نتيجة: إذا لم يكن للعدد الطبيعي $b \leq 2$ أية قواسم أولية p ، حيث $\sqrt{b} \geq p$ ، فإن b أولي.مثال: لا يوجد أي عدد أولي أقل من $\sqrt{97} > 10$ ضمن قواسم العدد 97 ، حيث لا يوجد أي من الأعدادالأولية التي تقل عن $\sqrt{97}$ ، وهي $2, 3, 5, 7$ ، ضمن قواسم 97 . بتطبيق النتيجة السابقة نستنتج أن 97 عدد أولي.مبرهنة: ليكن $j \leq 2$ عدداً صحيحاً موجباً، وليكن $j = 1^3 \times \dots \times n^3$ تحليله إلى العوامل الأولية.عدد قواسم العدد j هو

$$j = (j_1 + 1) \times \dots \times (j_n + 1)$$

❖ القاسم المشترك الأكبر

تعريف: لتكن a, b, \dots, n أعداداً كلية، بحيث يكون أحدها - على الأقل - لا يساوي 0 . نقول: إن العددالطبيعي u هو القاسم المشترك الأكبر لهذه الأعداد، إذا كان u أكبر عدد كلي يقسم كل عدد من هذهالأعداد. نرمز لهذا العدد بالرمز $u(a, b, \dots, n)$.

ملاحظات:

(١) $u(0, k) = k$ ، لأي عدد طبيعي k .(٢) إذا كانت a, b, \dots, n أعداداً طبيعية، حيث $n \leq 3$ ، فإن

$$u(a, b, c) = u(u(a, b), c)$$

(٣) إذا كان j قاسماً مشتركاً للعددين الطبيعيين a, b ، فإن $j \mid u(a, b)$ (٤) لأي عددين طبيعيين $a \neq b$:

$$u(a, b) \geq \text{أصغر}(a, b) \quad \text{و} \quad u(a, b) \leq |a - b|$$

تعريف: ليكن l و n عددين طبيعيين. نقول: إن l عدد أولي بالنسبة للعدد n (أو أن l و n أوليان فيما بينهما)، إذا كان $n \cdot 10^k \cdot l = 1$.

مبرهنة: ليكن l و n عددين كليين أحدهما (على الأقل) لا يساوي ٠. يوجد عدنان صحيحان j و r ، بحيث يمكن كتابة القاسم المشترك الأكبر للعددين l و n على الشكل التالي:

$$n \cdot 10^k \cdot l = (l, n) \cdot j + r$$

توطئة: ليكن l و n عددين طبيعيين، وليكن $l \leq n$.

$$n \cdot 10^k \cdot l = (l, n) \cdot (b, l) \text{ حيث } b \text{ هو باقي قسمة } l \text{ على } n.$$

حقيقة: إذا كان

$$l = 1^k \times \dots \times l^k \text{ و } n = 1^l \times \dots \times l^l$$

حيث $1, \dots, l, \dots, l$ أعداد أولية، و $l, \dots, l, \dots, l, \dots, l, \dots, l, \dots, l$ ، فإن

$$n \cdot 10^k \cdot l = (l, n) \cdot 1^l \times \dots \times l^l$$

حيث $n_i = 1$ أصغر (l, n) ، $l_i = l$ ، $i = 1, \dots, l$.

مثال: يمكن إيجاد $n \cdot 10^k \cdot l = (504, 2052)$ بعدة طرق:

(١) بتكرار تطبيق التوطئة أعلاه نحصل على

$$n \cdot 10^k \cdot l = (504, 2052) \cdot 10^k \cdot l = (504, 36) \cdot 10^k \cdot l = (504, 36) \cdot 10^k \cdot l = 36$$

(٢) بالتحليل إلى العوامل الأولية، نحصل على

$$2052 = 2^2 \times 3^3 \times 19 \text{ و } 504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$$

بتطبيق الحقيقة أعلاه نحصل على

$$n \cdot 10^k \cdot l = (504, 2052) \cdot 10^k \cdot l = 19 \times 7 \times 2^3 \times 3^2 \times 2 = 36$$

❖ المضاعف المشترك الأصغر

تعريف: لتكن $1, \dots, l, \dots, l$ أعداداً كلية، بحيث يكون أحدها - على الأقل - لا يساوي ٠. نقول: إن العدد الكلي m هو المضاعف المشترك الأصغر لهذه الأعداد، إذا كان m أصغر عدد كلي يقسمه كل عدد من هذه الأعداد. نرمز لهذا العدد بالرمز $(1, \dots, l, \dots, l)$.

ملاحظات:

(١) $(l, l) = l$ ، لأي عدد طبيعي l

(٢) إذا كانت $1, \dots, l, \dots, l$ أعداداً طبيعية، حيث $3 \leq n$ ، فإن

$$(1, \dots, l, \dots, l) \cdot 10^k \cdot l = (1, \dots, l, \dots, l) \cdot 10^k \cdot l = ((1, \dots, l, \dots, l))$$

(٣) إذا كان j مضاعفاً مشتركاً للعددين الكليين l, b ، فإن $(b, l) \cdot 10^k \cdot l = j$

(٤) لأي عددين طبيعيين l, b :

$$(b, l) \cdot 10^k \cdot l \leq \text{أكبر}(l, b) \text{ و } (b, l) \cdot 10^k \cdot l \leq |b - l|$$

التطابق بمقاس

❖ مقدمة

يلعب مفهوم التطابق بمقاس دوراً رئيساً في نظرية الأعداد وفي حل العديد من المسائل التي يكون المهم فيها باقي قسمة عدد ما على عدد آخر.

تعريف: ليكن a, b عددين صحيحين و m عدداً طبيعياً. نقول: إن العدد a مطابق للعدد b بمقاس m ، ونكتب $a \equiv b \pmod{m}$ ، إذا وجد $h \in \mathbb{Z}$ بحيث يكون $a - b = hm$ (أي أن $a - b$ من مضاعفات m).

ملاحظة: ليكن a عدداً صحيحاً و m عدداً طبيعياً. يكون $a \equiv 0 \pmod{m}$ إذا فقط إذا كان a من مضاعفات m .

مبرهنة: لتكن a, b, c, m أعداداً صحيحة، حيث $m \leq 1$. إذا كان $a \equiv b \pmod{m}$ ، فإن:

$$(1) \quad a + 1 \equiv b + 1 \pmod{m}$$

$$(2) \quad a - 1 \equiv b - 1 \pmod{m}$$

$$(3) \quad a \times 1 \equiv b \times 1 \pmod{m}$$

$$(4) \quad a^2 \equiv b^2 \pmod{m}, \text{ بشرط } m \leq$$

حقيقة: لتكن a, b, c, d, m أعداداً صحيحة، حيث $m \leq 1$ ، و $a \equiv b \pmod{m}$ ، و $c \equiv d \pmod{m}$.

$$(1) \quad a + c \equiv b + d \pmod{m}$$

$$(2) \quad a \times c \equiv b \times d \pmod{m}$$

$$(3) \quad \text{إذا كانت } d \equiv c \pmod{m} \text{ فإن } d \equiv c \pmod{m}$$

حقيقة: ليكن m عدداً صحيحاً موجباً. العلاقة

$$\{a \equiv b \pmod{m} : a \equiv b \pmod{m}\} = [-]$$

هي علاقة تكافؤ. نرمز لصف التكافؤ الذي ينتمي له العدد b و m بالرمز $[b]_m$ ، أي أن

$$[b]_m = \{a \equiv b \pmod{m} : a \equiv b \pmod{m}\}$$

ملاحظة: ليكن m عدداً صحيحاً موجباً. عدد صفوف التكافؤ للعلاقة $[-]_m$ هو m .

مبرهنة: ليكن m عدداً صحيحاً موجباً. تشكل مجموعة صفوف التكافؤ

$$\{[a]_m : a \in \mathbb{Z}\}$$

زمرة تحت العملية الثنائية

$$+ : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, [a]_m + [b]_m = [a+b]_m$$

العنصر المحايد لهذه العملية هو صف التكافؤ $[0]$ ، ونظير صف التكافؤ $[b]$ هو صف التكافؤ $[b-2]$.

مبرهنة (خاصية الاختزال): لتكن a, b, c أعداداً صحيحة وليكن m عدداً طبيعياً. إذا كان $0 = m \cdot (c, m) \cdot (a, m)$ ، فإن

$$a \equiv b \pmod{c} \iff \left\| \frac{a}{m} \right\| \equiv \left\| \frac{b}{m} \right\| \pmod{c}$$

نتيجة: لتكن a, b, c أعداداً صحيحة، وليكن m عدداً طبيعياً. إذا كان $0 = m \cdot (c, m) \cdot (a, m)$ ، فإن

$$a \equiv b \pmod{c} \iff \left\| a \right\| \equiv \left\| b \right\| \pmod{c}$$

ملاحظة: الشرط $0 = m \cdot (c, m) \cdot (a, m)$ في النتيجة السابقة ضروري. مثلاً:

$$\left\| 6 \right\| 2 \not\equiv 4 \pmod{6}, \text{ لكن } \left\| 6 \right\| 3 \times 2 \equiv 3 \times 4 \pmod{6}$$

لاحظ أن $0 = 3 = (6, 3) \cdot (2, 3)$.

مبرهنة (خاصية الاختزال): ليكن a, b عددين صحيحين، و m, n, \dots, r أعداداً طبيعية. إذا كان $0 = m \cdot n \cdot \dots \cdot r \cdot (a, m, n, \dots, r)$ ، فإن

$$a \equiv b \pmod{m, n, \dots, r} \iff a \equiv b \pmod{m}$$

❖ معادلات التطابق الخطية

تعريف: معادلة التطابق الخطية هي معادلة لها الصيغة التالية

$$ax \equiv b \pmod{m}, \text{ حيث } a, b \in \mathbb{Z} \text{ و } m \in \mathbb{Z}^+$$

مبرهنة: لتكن لدينا معادلة التطابق الخطية

$$ax \equiv b \pmod{m}, \text{ حيث } a, b \in \mathbb{Z} \text{ و } m \in \mathbb{Z}^+$$

ولنفرض أن $0 = m \cdot (a, m)$.

(١) إذا كانت $0 \nmid b$ ، فليس لمعادلة التطابق أعلاه أية حلول.

(٢) إذا كانت $0 \mid b$ ، فإنه يوجد لمعادلة التطابق أعلاه عدد لانهايتي من الحلول يمكن تقسيمها إلى 0 من

صفوف التكافؤ بالنسبة للعلاقة $[-]_m$ هي

$$\left\{ \left[\frac{b}{m} \times k + c \right]_m \mid k = 0, 1, \dots, m-1, \text{ و } 0 = m \cdot (a, m) \right\}$$

مثال: أوجد مجموعة الحل للمعادلة $9x \equiv 12 \pmod{15}$.

الحل: لاحظ أن $٥ = ١٠٢٠ \cdot (١٥, ٩) = ٣$. بما أن $٣ \mid ١٢$ ، نستنتج أن هناك عدداً لا نهائياً من حلول هذه المعادلة تنقسم إلى ثلاثة صفوف تكافؤ بالنسبة للعلاقة $[-١٥]$. لاحظ أن $١٢ \equiv ٣ \times ٩ \pmod{١٥}$ ، وبذلك تكون صفوف التكافؤ الثلاثة:

$$\left\{ \left[\frac{١٥}{٣} \times ك + ٣ \right] \mid ك = ١, ٢, ٤ \right\} = \{ [٣], [٨], [١٣] \} \pmod{١٥}$$

نتيجة: لنكن لدينا معادلة التطابق الخطية

$$س \equiv ج \pmod{ك}, \text{ حيث } ك, ج, س \in \mathbb{Z}$$

إذا كان $١٠٢٠ \cdot (٢, ١) = ١$ ، فإنه يوجد لهذه المعادلة عدد لا نهائي من الحلول الصحيحة توجد جميعها في صف تكافؤ واحد بالنسبة للعلاقة $[-٢]$.

مثال: لنكن لدينا المعادلة $٧ \equiv ٣ \pmod{١٢}$. لاحظ أن $١٠٢٠ \cdot (١٢, ٧) = ١$. بتطبيق النتيجة أعلاه، نستنتج أن هناك عدداً لا نهائياً من الحلول الصحيحة يحتويها صف تكافؤ واحد بالنسبة للعلاقة $[-١٢]$. لإيجاد صف التكافؤ هذا، نلاحظ أن $٧ \times ٩ = ٦٣ \equiv ٣ \pmod{١٢}$. نستنتج من ذلك أن صف التكافؤ الذي يحوي جميع الحلول هو $[٩]_{١٢}$.

obeikandi.com

١-٥ مقدمة في نظرية التركيبات

obeikandi.com

الطرق الأساسية للعد

❖ مقدمة

هناك عدة مبادئ يمكن استخدامها للتعامل مع مسائل العد، وباستخدام هذه القوانين نستطيع تبسيط بعض المسائل المعقدة وتحويلها إلى حالات مجزأة سهلة المعالجة. سوف نستعرض بعضاً منها فيما يلي.

مبدأ المجموع

إذا كانت S و T مجموعتين منفصلتين (أي أن $S \cap T = \emptyset$) فإن $|S \cup T| = |S| + |T|$

مثال: مدرس لمادتي الرياضيات والفيزياء لديه ٢٠ طالباً في فصل الرياضيات و ٣٠ طالباً في فصل الفيزياء. إذا كان ٥ من هؤلاء الطلاب يدرسون كلا المادتين فما هو عدد الطلاب عند المدرس؟
الحل: لاحظ أنه يوجد ١٥ طالباً يدرسون الرياضيات فقط، و ٢٥ طالباً يدرسون الفيزياء فقط، و ٥ طلاب يدرسون المادتين معاً. فيكون المجموع: $٤٥ = ٥ + ٢٥ + ١٥$ طالباً

مبدأ الضرب: لأي مجموعتين S و T فإن $|S \times T| = |S| \times |T|$

مثال: بكم طريقة يمكن اختيار وفد مكون من ولد وبنت من بين ١٠ أولاد و ٧ بنات؟
الجواب: $٧٠ = ٧ \times ١٠$

نستطيع تعميم هذه القوانين لأي عدد من المجموعات كما يلي.

قانون المجموع العام: إذا كانت S_1, S_2, \dots, S_n مجموعات منفصلة عن بعضها بعضاً فإن

$$|S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|$$

قانون الضرب العام: إذا كانت S_1, S_2, \dots, S_n مجموعات منتهية فإن

$$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n| = |S_1| \times |S_2| \times \dots \times |S_n|$$

غالباً ما نستخدم صيغة أخرى مكافئة لمبدأ الضرب في حل المسائل: إذا كان إنجاز عمل مشروع ما يتطلب إنجاز مجموعة من المهمات المتتالية J_1, J_2, \dots, J_n (ج_١ أولاً ثم ج_٢ وهكذا) وإذا كان عدد طرق إنجاز المهمة ج_١ هو J_1 وعدد طرق إنجاز المهمة ج_٢ هو J_2 (ولا يعتمد على الكيفية التي يتم بها إنجاز المهمة الأولى) وهكذا، فإن عدد طرق إنجاز المشروع هو

$$J_1 \times J_2 \times \dots \times J_n$$

مثال: ما هو عدد كلمات السر المكونة من خمسة أحرف عربية؟ علماً بأن عدد حروف اللغة العربية ٢٨ حرفاً.

الحل: أي كلمة سر تتكون من ٥ أحرف وهناك ٢٨ خياراً لكل حرف، وبذلك يكون المجموع $٢٨ \times ٢٨ \times ٢٨ \times ٢٨ \times ٢٨ = ٢٨^5$ كلمة سر.

لإيجاد عدد قواسم العدد n نكتب العدد كالاتي

$$n = 1^e \times 2^f \times 3^g \times \dots \times p^k \times q^l$$

حيث $1, 2, 3, \dots, p, q$ تمثل العوامل الأولية للعدد n و e, f, g, \dots, k, l أعداد طبيعية. أي قاسم للعدد n يتكون من حاصل ضرب بعض هذه العوامل

$$h = 1^a \times 2^b \times 3^c \times \dots \times p^d \times q^e$$

حيث $0 \leq a \leq e, 0 \leq b \leq f, 0 \leq c \leq g, \dots, 0 \leq d \leq k, 0 \leq e \leq l$.

نلاحظ أنه يوجد $(e+1)$ طريقة لاختيار العدد 2^b . وكذلك $(f+1)$ طريقة لاختيار العدد 3^c وهكذا.

ومن هنا نرى أن عدد طرق تكوين قاسم مثل h يساوي

$$(e+1)(f+1)(g+1)\dots(k+1)(l+1)$$

ومنها يكون عدد القواسم $(e+1)(f+1)(g+1)\dots(k+1)(l+1)$.

مبدأ التقابل:

إذا كان $r : s$ ← s تقابلاً من المجموعة s إلى المجموعة s فإن $|s| = |s|$.

تعريف: نسمي أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي n أرضية العدد n ونستخدم الرمز $\lfloor n \rfloor$ للدلالة على هذا العدد. كذلك نسمي أصغر عدد صحيح أكبر من أو يساوي n سقف العدد n ونستخدم الرمز $\lceil n \rceil$ للدلالة على هذا العدد.

$$\text{فمثلاً } \lfloor 2,1 \rfloor = 2 \text{ وكذلك } \lceil 2,1 \rceil = 3.$$

مبدأ برج الحمام: ينص هذا المبدأ على أنه إذا كان عدد الحمام أكثر من عدد الصناديق، فإن أحد هذه الصناديق سيحتوي على حمامتين أو أكثر.

ونستطيع تعميم هذا المبدأ كما يلي:

إذا وزعنا m من الرسائل على n من الصناديق وكانت $m < n$ فإن أحد هذه الصناديق سوف يحتوي

$$\text{على الأقل } \left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1 \text{ من الرسائل.}$$

مثال: أي مجموعة من الطلاب فيها أكثر من ١٢ طالباً يجب أن تحتوي على الأقل على طالبين مولودين في نفس الشهر.

❖ **التبديل**

تعريف: تبديل مجموعة غير خالية مثل s هو ترتيب معين لعناصرها. ويعني هذا أن التبديل للمجموعة s هو تقابل من s إلى نفسها. ونستطيع كذلك تعريف تبديل المجموعة s والتي تحتوي على n من العناصر على أنه تقابل من $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ ← s بحيث أن صورة ١ تكون العنصر

الأول في الترتيب وصورة ٢ تكون العنصر الثاني في الترتيب وهكذا. ويدل هذا على أن الترتيب مهم جداً في التباديل.

مبرهنة: إذا كانت S مجموعة غير خالية وتحتوي على n من العناصر، فإن عدد تباديل S يساوي $n!$

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

ويقرأ $n!$ مضروب n (أو n عاملي).

مثال:

- (١) عدد تباديل المجموعة $\{س، ص، ع، ح، ح\}$ (يعني عدد ترتيب حروفها) يساوي $5! = 120$.
- (٢) عدد الطرق التي يمكن أن تجلس بها ٢٠ شخصاً في سطر واحد من الكراسي يساوي ٢٠!
- (٣) ما هو عدد الطرق التي يمكن أن تجلس بها ٢٠ شخصاً حول طاولة مستديرة؟

ملاحظة: نعرف مضروب الصفر على أنه يساوي ١ (أي أن $0! = 1$).

حقيقة: لجميع قيم $n \leq 1$ يكون $n! = (n-1)!$

والآن نريد أن نعرف التباديل على المجموعات الجزئية من مجموعة ما مثل S . لنفرض أن لدينا مجموعة غير خالية مثل S وتحتوي على k ($k < 0$) من العناصر. نسمي ترتيب أي مجموعة جزئية من S عدد عناصرها r (هنا $r \geq k$) تبديلاً للمجموعة S طولها r (أو عدد عناصره r)، ونرمز لهذا العدد بالرمز $r!$.

مبرهنة: لأي عددين صحيحين k و r بحيث $k \leq r \leq 0$ ، فإن:

$$r! = k! (k-1) \dots (2-k) (1-k) = \frac{k!}{(r-k)!}$$

ملاحظة: $r! = k!$ لأي عدد صحيح $k \leq r$.

تعريف مجموعة القوة: لنفرض أن لدينا مجموعة S وتحتوي على k من العناصر. نعرف مجموعة القوة للمجموعة S ، ونرمز لها بالرمز 2^S ، على أنها المجموعة التي عناصرها المجموعات الجزئية من S .

مبرهنة: إذا كان عدد عناصر المجموعة S يساوي k فإن عدد مجموعاتها الجزئية يساوي 2^k ، أي أن

$$2^k = |2^S|$$

مثال: عدد المجموعات الجزئية من المجموعة $S = \{١، ٢، ٣، ٤، ٥\}$ هو $|2^S| = 2^5 = 32$

❖ التوافيق (التراكيب)

تعريف: لنفرض أن لدينا مجموعة S تحتوي على k من العناصر. أي مجموعة جزئية من المجموعة S وتحتوي على r من العناصر تسمى توفيق r . بمعنى آخر، توافيق r للمجموعة S ، هي المجموعات الجزئية التي تحتوي على r من العناصر.

حقيقة: عدد توافيق r للمجموعة S التي تحتوي على k من العناصر يرمز له بالرمز $\binom{k}{r}$ ويساوي

$$\frac{k!}{r!(k-r)!} = \frac{k!}{r!} = \binom{k}{r}$$

مثال: عدد المجموعات الجزئية من المجموعة $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ والمكونة من 3 عناصر هو

$$\frac{5!}{3!2!} = 10 \text{ مجموعات.}$$

مبرهنة: لأي عددين صحيحين k و r بحيث $k \leq r \leq k$ ، فإن

$$(1) \quad \binom{k}{k} = 1$$

$$(2) \quad \binom{k}{0} = 1$$

$$(3) \quad \binom{k}{1} = k$$

$$(4) \quad \binom{k}{k-r} = \binom{k}{r}$$

تعريف: تسمى المجموعة الجزئية لمجموعة ما مجموعة جزئية مضاعفة إذا كان التكرار فيها مسموحاً.

مبرهنة: لنفرض أن لدينا مجموعة S تحتوي على k من العناصر. عدد المجموعات الجزئية المضاعفة من S والتي تحتوي على r من العناصر يساوي: $\binom{k+r-1}{r}$

مثال: بكم طريقة تستطيع اختيار ثلاث علب حليب من بين أربعة أنواع؟ (التكرار مسموح).

الحل: بتعويض $k=4$ و $r=3$ في المبرهنة أعلاه نحصل على

$$20 = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3}$$

طرق متطورة للعد

❖ نماذج أخذ العينات

إذا كانت لدينا مجموعة S وتحتوي على k من العناصر، بكم طريقة نستطيع أخذ عينة (يعني مجموعة جزئية) منها عدد عناصرها r ؟
هناك حالتان يجب التأكد منهما قبل الإجابة على هذا السؤال:

- (١) هل ترتيب عناصر العينة مهم أم لا؟
(٢) هل تكرار أخذ العناصر مسموح أم لا؟

مثال: عدد طرق تشكيل لجنة من ٤ أعضاء من بين ١٠ مدرسين هو

$$210 = \frac{!10}{!6!4} = \binom{10}{4}$$

لكن إذا أردنا أن يكون الأول رئيساً للجنة، والثاني نائباً للرئيس، والثالث سكرتيراً، والرابع مقررًا للجنة، كان الترتيب مهماً هنا ويكون عدد الطرق لتشكيل اللجنة هو

$$!10 = \frac{!10}{!6} = 5040$$

سؤال: كم عدداً يوجد بين ١٠٠ و ١٠٠٠؟ وكم عدداً يوجد بين ١٠٠ و ١٠٠٠ بحيث تكون أرقامه الثلاثة مختلفة؟

فيما يلي نلخص الحالات الأربعة السابقة لاختيار عينة (مجموعة جزئية) حجمها r من مجموعة تحتوي على k عنصر:

- (١) التكرار مسموح والترتيب مهم: عدد الطرق يساوي k^r
(٢) التكرار غير مسموح والترتيب مهم: عدد الطرق يساوي $\frac{k!}{(k-r)!}$
(٣) التكرار غير مسموح والترتيب غير مهم: عدد الطرق يساوي $\binom{k}{r} = \frac{k!}{r!(k-r)!}$
(٤) التكرار مسموح والترتيب غير مهم: عدد الطرق يساوي $\binom{k+r-1}{r}$

والآن لنأخذ مثلاً على هذه الحالات الأربعة.

مثال: أوجد عدد الطرق لأخذ عينة ثنائية مكونة من عنصرين من المجموعة $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

(١) التكرار مسموح والترتيب مهم: عدد الطرق يساوي $k^r = 4^2 = 16$ وهذه العينات هي

$$(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (1,3), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3), (1,4), (2,4), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)$$

(٢) التكرار غير مسموح والترتيب مهم: عدد الطرق يساوي

$${}^L P_4 = \frac{L!}{(L-4)!} = \frac{4!}{1!} = 24$$

وهذه العينات هي

$$(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (1,3), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3), (1,4), (2,4), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)$$

(٣) التكرار غير مسموح والترتيب غير مهم: عدد الطرق يساوي

$$\binom{L}{4} = \frac{L!}{4! (L-4)!} = \frac{4!}{2! 2!} = 6$$

وهذه العينات هي: (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)

(٤) التكرار مسموح والترتيب غير مهم: عدد الطرق يساوي

$$\binom{L+r-1}{r} = \binom{4+2-1}{2} = \binom{5}{2} = 10$$

وهذه العينات هي: (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (1,3), (3,1), (1,4), (4,1), (2,3), (3,2), (3,3), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)

ميرهنة: إذا أخذنا L من العناصر من أنواع مختلفة $1, 2, 3, 4, \dots, r$ بحيث نأخذ r من النوع الأول $1, 2, \dots, r$ من النوع الثاني $1, 2, \dots, r$ وهكذا، بحيث تكون $L = r_1 + r_2 + \dots + r_r$ فإن عدد تبديل هذه

$$\frac{L!}{r_1! r_2! \dots r_r!}$$

العناصر يساوي

❖ نماذج توزيع الكرات

هناك مجموعة كبيرة من مسائل العد نستطيع صياغتها على صورة توزيع مجموعة من الكرات على مجموعة من الصناديق. لنفرض أن لدينا r من الكرات ونريد أن نوزعها على n من الصناديق. لإيجاد عدد الطرق هناك حالات مختلفة يجب تمييزها:

- (١) هل الكرات متطابقة (متشابهة) تماماً أم مختلفة؟
- (٢) هل الصناديق متطابقة (متشابهة) تماماً أم مختلفة؟

هناك أربع حالات مختلفة لتوزيع r من الكرات على n من الصناديق:

- (١) الكرات مختلفة والصناديق مختلفة: عدد الطرق يساوي n^r
- (٢) الكرات متطابقة والصناديق مختلفة: عدد الطرق يساوي $\binom{n+r-1}{r}$
- (٣) الكرات متطابقة والصناديق متطابقة (ولا يوجد صندوق فارغ):

$$C(n, n-r) + C(n-1, n-r) = C(n, n-r) \sum_{h=0}^n \frac{1}{h!} = C(n, r)$$

حيث $C(n, r) = 0$ إذا كانت $r > n$ و $C(r, r) = C(n, r) = 1$

ويسمى هذا النوع من العلاقات بالعلاقات الارتدادية.

(٤) الكرات مختلفة والصناديق متطابقة (ولا صندوق فارغ):

$$C(n, r) = C(n, n-r) \sum_{h=0}^n \frac{1}{h!} = C(n, r)$$

ويسمى هذا العدد عدد ستيرلنج من النوع الثاني.

الحالتان (١) و (٢) سهلتان والحالتان (٣) و (٤) صعبتان، ونحتاج إلى مجموعة من التعاريف قبل أن نبين عدد الطرق المناسبة لهما، ولكن قبل ذلك يجب التنويه إلى وجود قاعدتين تتعلقان بالحالتين الأولى والثانية، هما:

القاعدة الأولى: عدد طرق توزيع r من الكرات المختلفة على n ($n \geq r$) من الصناديق المختلفة

$$\frac{n!}{(r-n)!} = r^n$$

القاعدة الثانية: لأي عدد صحيح $r \leq 0$ فإن عدد الحلول الكلية للمعادلة $s_1 + s_2 + \dots + s_r = n$ يساوي

$$\binom{n+r-1}{r}$$

مثال: هناك مجموعة من التمارين على هذه القاعدة تضع شروطاً على نوعية الحلول. فمثلاً: ما هو عدد الحلول الطبيعية للمعادلة $s_1 + s_2 + s_3 = 20$ بحيث $s_1 < 2$ ، $s_2 < 3$ ، $s_3 < 5$.

الحل: لاحظ الشروط الثلاثة هي نفس الشروط $s_1 \leq 3$ ، $s_2 \leq 4$ ، $s_3 \leq 6$. لنعرف الآن ثلاث متغيرات جديدة $s_1' = s_1 - 1$ ، $s_2' = s_2 - 2$ ، $s_3' = s_3 - 5$ ، فيكون عدد الحلول الطبيعية للمعادلة $s_1' + s_2' + s_3' = 20 - 1 - 2 - 5 = 12$ بحيث $s_1' < 2$ ، $s_2' < 3$ ، $s_3' < 5$ مساوياً لعدد الحلول الكلية للمعادلة $s_1' + s_2' + s_3' = 12$. من القاعدة السابقة نستنتج أن عدد الطرق يساوي

$$91 = \binom{14}{12} = \binom{12-3+12}{12}$$

ملاحظات:

(١) في الحالة الأولى إن لم يكن فيها صندوق فارغ، يكون العدد الكلي

$$C(n, r) = C(n, n-r) \sum_{h=0}^n \frac{1}{h!} = C(n, r)$$

(٢) في الحالة الثانية إن لم يكن فيها صندوق فارغ، يكون العدد الكلي يساوي $\binom{1-r}{1-n}$

(٣) في الحالة الثالثة إذا كان بعض الصناديق فارغاً؛ فإن العدد يساوي: $\binom{r}{n} + \binom{r}{n+1}$

(٤) عدد ستيرلنج من النوع الثاني هو نفسه عدد تجزئة مجموعة فيها r من العناصر إلى n من المجموعات الجزئية غير الفارغة.

نظرية ذات الحدين

لأي عددين حقيقيين s و v وأي عدد كلي n نحصل على:

$$(s+v)^n = \binom{n}{0} s^n + \binom{n}{1} s^{n-1} v + \dots + \binom{n}{n-1} s v^{n-1} + \binom{n}{n} v^n$$

$$= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} s^{n-i} v^i$$

$$\text{مثال: أثبت أن } \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$$

الحل: عوض $s=v=1$ في نظرية ذات الحدين لتحصل على النتيجة.

ملاحظات:

(١) نلاحظ أن معامل s^i في مفكوك نظرية ذات الحدين هو $\binom{n}{i}$.

(٢) إذا كان n عدداً زوجياً فإن عدد حدود المفكوك يكون فردياً، وفي هذه الحالة يوجد حد أوسط واحد

للمفكوك وترتيبه هو $\binom{n}{\frac{n}{2}}$. أما إذا كان n عدداً فردياً؛ فإن عدد حدود المفكوك يكون

زوجياً، وفي هذه الحالة يوجد حدان أوسطان للمفكوك ترتيبهما

$$\frac{\binom{n}{\frac{n-1}{2}}}{2} \text{ و } \frac{\binom{n}{\frac{n+1}{2}}}{2}$$

يمكن تعميم نظرية ذات الحدين إلى n من الحدود s_1, s_2, \dots, s_r بدلاً من الحدين s و v .

نفرض أن s_1, s_2, \dots, s_r أعداداً كلية بحيث $s_1 + s_2 + \dots + s_r = n$. في مفكوك

$$(s_1 + s_2 + \dots + s_r)^n$$

يكون معامل الحد الذي يحتوي على $s_1^{i_1} s_2^{i_2} \dots s_r^{i_r}$ هو $\frac{n!}{i_1! i_2! \dots i_r!}$ ويرمز له عادة

$$\text{بالرمز } \binom{n}{i_1, i_2, \dots, i_r}$$

لاحظ أن هذا العدد هو نفس عدد التباديل لعدد n من العناصر اختيرت من أنواع مختلفة بحيث نأخذ 1 من النوع الأول، ونأخذ 2 من النوع الثاني، وهكذا بحيث يكون $n = 1 + 2 + \dots + 1$. عدد تباديل هذه

$$\frac{n!}{1! 2! \dots 1!}$$

سؤال: أوجد معامل s^3 في $s^4 + s^3 + s^2 + s + 1$.

$$\frac{19}{3! 4! 2!}$$

مبدأ التضمن والإقصاء

لاحظنا في السابق أنه إذا كانت $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ مجموعات منفصلة عن بعضها بعضاً فإن

$$|S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|$$

ولكن ماذا لو كانت بعض هذه المجموعات $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ تحتوي على عناصر مشتركة؟ في هذه الحالة نستخدم مبدأ التضمن والإقصاء لحساب عدد العناصر الموجودة في $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n$. وسنقتصر هنا على الحالتين $n=2$ و $n=3$ فقط.

الحالة الأولى: إذا كانت S_1 و S_2 مجموعتين منتهيتين فإن

$$|S_1 \cup S_2| = |S_1| + |S_2| - |S_1 \cap S_2|$$

الحالة الثانية: إذا كانت S_1, S_2, S_3 ثلاث مجموعات منتهية فإن

$$|S_1 \cup S_2 \cup S_3| = |S_1| + |S_2| + |S_3| - |S_1 \cap S_2| - |S_1 \cap S_3| - |S_2 \cap S_3| + |S_1 \cap S_2 \cap S_3|$$

ونستطيع أن نعمم هذا المبدأ بنفس الطريقة إلى أكثر من ثلاث مجموعات.

الحالة الأولى: إذا كانت S_1 مجموعة جزئية من المجموعة S_2 تحتوي على العناصر ذات الخاصية C_1 وكانت S_2 مجموعة جزئية أخرى وتحتوي على العناصر ذات الخاصية C_2 ، فإن عدد العناصر ذات الخاصيتين C_1 و C_2 معاً يساوي: $|S_1 \cap S_2|$. ونلاحظ أيضاً أن عدد العناصر التي لا تحتوي على أي من الخاصيتين C_1 و C_2 يساوي:

$$\begin{aligned} & |S_1 \cup S_2| - |S_1 \cap S_2| = |S_2| - |S_1 \cap S_2| \\ & = |S_2| - |S_1| \end{aligned}$$

الحالة الثانية: إذا كانت S_1, S_2, S_3 ثلاث مجموعات جزئية للمجموعة S_4 تحتوي على العناصر ذات الخواص C_1, C_2, C_3 على الترتيب، فإن عدد العناصر التي تحقق الخواص الثلاث معاً يساوي:

$$\begin{aligned} & |S_1 \cap S_2 \cap S_3| = |S_1 \cap S_2 \cap S_3| \\ & = |S_1 \cap S_2 \cap S_3| - |S_1 \cap S_2| - |S_1 \cap S_3| - |S_2 \cap S_3| + |S_1 \cap S_2 \cap S_3| \\ & = |S_1 \cap S_2 \cap S_3| - |S_1 \cap S_2| - |S_1 \cap S_3| - |S_2 \cap S_3| + |S_1 \cap S_2 \cap S_3| \end{aligned}$$

مثال: عدد طلاب السنة الأولى في جامعة الملك فهد هو ٢٠٠٠ طالب. كل طالب مسجل في مادة واحدة على الأقل من بين المواد الثلاثة: فيزياء وكيمياء ورياضيات. لنفرض أن ٧٠٠ من الطلاب مسجلين في مادة الفيزياء، و ٦٠٠ طالب مسجلين في مادة الكيمياء، و ١٠٠٠ طالب مسجلين في مادة الرياضيات، و ١٥٠ طالباً مسجلين في مادتي الفيزياء والكيمياء و ٢٠٠ طالب مسجلين في مادتي الفيزياء والرياضيات، و ٣٠٠ مسجلين في مادتي الكيمياء والرياضيات. ما هو عدد الطلاب المسجلين في المواد الثلاث؟

الحل:

نفرض أن S مجموعة الطلاب المسجلين في مادة الفيزياء، وأن K مجموعة الطلاب المسجلين في مادة الكيمياء، وأن M مجموعة الطلاب المسجلين في مادة الرياضيات. فإن

$$|S \cup K \cup M| = 2000, |S| = 700, |K| = 600, |M| = 1000$$

$$\text{كما أن } |S \cap K| = 150, |S \cap M| = 200, |K \cap M| = 300$$

ونريد أن نجد $|S \cap K \cap M|$. باستخدام مبدأ التضمين والإقصاء نجد أن

$$|S \cup K \cup M| = |S| + |K| + |M| - |S \cap K| - |S \cap M| - |K \cap M| + |S \cap K \cap M|$$

بالتعويض نحصل على:

$$2000 = 700 + 600 + 1000 - 150 - 200 - 300 + |S \cap K \cap M|$$

$$\text{يعني هذا أن هناك } |S \cap K \cap M| = 350 \text{ من الطلاب مسجلين في المواد الثلاث.}$$


obeikandi.com

١-٦ مقدمة في الهندسة

obeikandi.com

الدائرة

❖ مقدمة



شكل (١)


الدائرة: مجموعة النقاط التي تبعد نفس المسافة (نصف القطر) عن نقطة ثابتة (مركز الدائرة).
 الوتر: كل قطعة مستقيمة طرفاها نقطتان من الدائرة.
 القطر: وتر يمر بمركز الدائرة (أطول وتر).
 القوس: جزء من منحنى الدائرة.
 القطاع الزاوي: الجزء المحدود بنصفي قطرين وقوس.
 القطعة الزاوية: الجزء المحدود بقوس ووتر.
 المماس: المستقيم الذي يقطع الدائرة في نقطة واحدة.
 الزاوية المركزية: زاوية رأسها مركز الدائرة.
 الزاوية المحيطية: زاوية ضلعاها وتران ورأسها يقع على الدائرة.
 زاوية القوس: الزاوية المركزية التي يكون القوس محدوداً بين ضلعيها.

في الشكل (١): القطعة المستقيمة AB وتر في دائرة مركزها M ويقسمها إلى القوسين \widehat{AB} الصغير و \widehat{AB} الكبير، AM قطر، MP مماس للدائرة عند P ، \widehat{BP} زاوية مركزية وهي زاوية القوس \widehat{BP} ، \widehat{BP} زاوية محيطية. المنطقة المحصورة بين القوس الصغير \widehat{BP} والقطعتين المستقيمتين MP و MP تسمى قطاعاً زاوياً، بينما تسمى المنطقة المحصورة بين القوس الصغير \widehat{BP} والوتر BP قطعة زاوية.

❖ علاقات أساسية

- نسبة محيط أي دائرة إلى قطرها ثابتة. هذه النسبة يرمز لها بالحرف π أو بالحرف اليوناني π وتساوي تقريباً ٣,١٤.
- محيط الدائرة = πr (حيث r قطر الدائرة و r نصف قطرها).
- مساحة الدائرة = πr^2 .

- كل زاوية مركزية تحد قوساً على الدائرة، وعندما نقول قياس زاوية القوس فإننا نعني بذلك قياس الزاوية المركزية التي يكون القوس محدوداً بين ضلعيها.
- العلاقة بين قياس الزاوية بالتقدير الستيني وقياس الزاوية بالتقدير الدائري: $180^\circ \equiv \pi$ راديان.
- الزاوية الحادة قياسها أكبر من الصفر وأقل من 90° ، الزاوية القائمة قياسها 90° ، الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90° وأقل من 180° ، الزاوية المستقيمة قياسها 180° .
- تكون الزاويتان متتامتين إذا كان مجموعهما يساوي 90° .
- تكون الزاويتان متكاملتين إذا كان مجموعهما يساوي 180° .



شكل (٢)

- كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان.
- كل زاويتين متبادلتين متساويتان.
- كل زاويتين متناظرتين متساويتان.

في الشكل (٢):

 $AB \parallel CD$ و EF قاطع لهما.


الزاويتان \hat{A} و \hat{D} متساويتان لأنهما متقابلتان بالرأس، وكذلك كل من الأزواج \hat{B} و \hat{E} ، \hat{C} و \hat{F} و \hat{A} و \hat{C} .

الزاويتان \hat{B} و \hat{D} متساويتان لأنهما متبادلتان، وكذلك الزاويتان \hat{A} و \hat{F} .

الزاويتان \hat{A} و \hat{F} متساويتان لأنهما متناظرتان، وكذلك كل من الأزواج \hat{B} و \hat{E} ، \hat{C} و \hat{F} .

- مجموع قياسات زوايا المثلث $= 180^\circ$.

في الشكل (٣):


 $AB \parallel CD$ ∴ $\hat{A} = \hat{C}$ بالتبادل،ب $\hat{B} = \hat{D}$ بالتبادل.∴ $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \hat{C} + \hat{B} + \hat{D}$ (زاوية مستقيمة)∴ $\hat{A} + \hat{B} + \hat{D} = 180^\circ$ 

شكل (٣)

- قياس الزاوية الخارجية في مثلث يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين غير المجاورتين لها.


في الشكل (٤):

الزاوية $\widehat{ص}$ زاوية خارجية وتحقق
 $\widehat{ص} = \widehat{ع} + \widehat{س}$



شكل (٤)

- نسبة طول قوس (س) إلى محيط الدائرة تساوي نسبة قياس زاوية القوس (بالراديان) إلى قياس زاوية الدائرة (٢ط).



شكل (٥)


في الشكل (٥):

$$\frac{\widehat{نوه}}{٢\pi} = \frac{\widehat{س}}{س}$$


$$\frac{\widehat{س}}{\widehat{نوه}} = \leftarrow$$

❖ الزوايا الناتجة عن تقاطع مستقيمتين ودائرة

- قياس الزاوية المحيطية ($\widehat{ن}$) في الشكل (٦-أ) يساوي نصف قياس الزاوية المركزية ($\widehat{م}$) المشتركة معها في القوس ($\widehat{س}$). إذا كتبنا $\widehat{س}$ فإننا نعني بذلك الزاوية المركزية التي يحد ضلعاها القوس $\widehat{س}$ (أي الزاوية المركزية $\widehat{م}$). ولذلك فإننا في كثير من الأحيان لسنا بحاجة لرسم الزاوية المركزية التي ضلعاها يحدان القوس كما في الشكل (٦-ب) ونستعاض عن ذلك بكتابة $\widehat{س}$ ونقرؤها: الزاوية المركزية التي ضلعاها يحدان القوس $\widehat{س}$. (لاحظ أن: $\widehat{س} = \widehat{ن} \times 2$).



(ب)




(أ)

شكل (٦)

- قياس الزاوية الناتجة عن تقاطع قاطعين لدائرة في نقطة خارجها ($\hat{\nu}$ في الشكل (٧)) يساوي نصف حاصل طرح الزاويتين المركزيتين المقابلتين للقوسين المحصورين بين القاطعين.


$$\left(\frac{\widehat{س} - \widehat{ص}}{2} = \hat{\nu} \right) \text{ (أي أن: } \hat{\nu} = \frac{\widehat{س} - \widehat{ص}}{2} \text{)}$$



شكل (٧)


- قياس الزاوية المماسية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المقابلة للقوس المحدود بضلعيها

$$\left(\frac{\widehat{س}}{2} = \widehat{سب} \right) \text{ (أي أن: } \widehat{سب} = \frac{\widehat{س}}{2} \text{)}$$



شكل (٨)


ومن الطبيعي الاستنتاج أن أي قطر مرسوم من نقطة التماس يكون عمودياً على المماس.



شكل (٩)

- قياس الزاوية المتكونة من تقاطع وترين، يساوي نصف مجموع قياسي الزاويتين المركزيتين المقابلتين للقوسين المحدودين بالوترين.


$$\widehat{ص} + \widehat{س} = 2\widehat{ن} \quad (\text{في الشكل (١٠)})$$



شكل (١٠)

❖ مبرهنة قوة النقطة


إذا رسمنا قطعة مستقيمة من نقطة ثابتة $أ$ بحيث تقطع دائرة ما في نقطتين $ب$ و $ت$ ، فإن المقدار $|أب| \times |أت|$ ثابت ولا يعتمد على اختيار النقطتين $ب$ و $ت$.



شكل (١١)


المبرهنة هامة في عدة حالات خاصة، منها مثلاً أن المبرهنة تقود إلى أن المماسين المرسومين من نقطة خارج دائرة متطابقان. ففي الشكل (١٢)، النقطتان $ب$ و $ت$ هما نفس النقطة. ولذلك، وباستخدام المبرهنة، فإن

$$|أب| \times |أت| = |أب|^2 = \text{ثابت} = |أج| \times |أج| = |أج|^2, \text{ أي أن } |أب| = |أج|$$




شكل (١٢)


في الشكل (١٣-أ)، نستنتج أن $|اب|^2 = |ا|ج| \times |ا|س|$ ، وفي الشكل (١٣-ب) حيث هناك قاطعان للدائرة من النقطة $ا$ ، نستنتج أن $|اب| \times |ا|ت| = |ا|ج| \times |ا|س|$. المبرهنة أيضاً صحيحة إذا كانت النقطة داخل الدائرة كما في الشكل (١٣-ج) حيث يمكننا كتابة $|اب| \times |ا|ت| = |ا|ج| \times |ا|س|$.



(ج)




(ب)



(أ)

شكل (١٣)


المثلث



شكل (١٤)

❖ تصنيف المثلثات

يمكن تصنيف المثلثات حسب أضلاعها وزواياها.



شكل (١٥)

المثلث الحاد: مثلث جميع زواياه حادة، (شكل (١٥-أ)).

المثلث القائم: مثلث إحدى زواياه قائمة وتكون الزاويتان الأخريان حادتين (تذكر: مجموع زوايا المثلث $= 180^\circ$ وبذلك تكون الزاويتان الأخريان متتامتين). في المثلث القائم، نسمي الضلع المقابل للزاوية القائمة "وتر"، (شكل (١٥-ب)).

المثلث المنفرج: مثلث إحدى زواياه منفرجة، (شكل (١٥-ج)).

المثلث المتطابق الأضلاع: مثلث جميع أضلاعه متطابقة، وتكون جميع زواياه متساوية (قياس كل زاوية $= 60^\circ$)، (شكل (١٥-د)).


المثلث المتطابق الضلعين: في هذا المثلث يكون ضلعان من أضلاعه متطابقين، وتكون الزاويتان المواجهتان للضلعين المتطابقين متساويتين، (شكل (١٥-ه)).

هناك بعض المستقيمات الخاصة والهامة والتي يمكن رسمها في المثلثات، ومنها:

❖ المتوسط

هو كل مستقيم يمر في أحد رؤوس المثلث وفي منتصف الضلع المواجه لذلك الرأس، (شكل (١٦)). المتوسطات الثلاث تلتقي في نقطة واحدة، وهذه النقطة تقسم كل متوسط بنسبة ٢:١، أي:


$$\frac{2}{1} = \frac{2س}{ج2} = \frac{2و}{ب2} = \frac{2ا}{ه2}$$



شكل (١٦)

❖ منصف الزاوية


هو كل مستقيم يمر في أحد رؤوس المثلث وينصف زاوية ذلك الرأس. كل نقطة على أي منصف تقع على نفس البعد من ضلعي زاوية الرأس المنصّفة، كما أن المنصفات الثلاث تلتقي في نقطة واحدة، (شكل (١٧)).



شكل (١٧)


ملاحظة: بما أن المنصفات الثلاث تلتقي في نقطة واحدة وتكون هذه النقطة على نفس البعد من أضلاع المثلث، فإنه يمكننا أن نرسم دائرة داخل المثلث تمس أضلاع المثلث من الداخل. نسمي هذه الدائرة "الدائرة الداخلية".

(تنبيه: الخطوط المتقطعة في شكل (١٨) ليست امتدادات منصفات الزوايا، بل هي المسافات العمودية من نقطة التقاء منصفات الزوايا إلى أضلاع المثلث، وطول كل منها يساوي نصف قطر الدائرة الداخلية).



شكل (١٨)

❖ العمود المنصف لضلع المثلث




شكل (١٩)


هو كل مستقيم عمودي على ضلع من أضلاع المثلث وينصفه. الأعمدة المنصفة لأضلاع المثلث تلتقي في نقطة واحدة، وتقع هذه النقطة على أبعاد متساوية من رؤوس المثلث. في الشكل (١٩)، نقطة التقاء

الأعمدة المنصفة تقع داخل المثلث. هذه النقطة تقع خارج المثلث المنفرج، وتقع على المثلث القائم كما في الشكل (٢٠).

ملاحظة: بما أن الأعمدة المنصفة الثلاث تلتقي في نقطة واحدة وتكون هذه النقطة على نفس البعد من رؤوس المثلث، فإنه يمكننا أن نرسم دائرة خارج المثلث وتمر برؤوس المثلث الثلاثة. نسمي هذه الدائرة "الدائرة الخارجية"، (شكل (٢١)).




شكل (٢٠)



شكل (٢١)

❖ ارتفاع المثلث

هو كل قطعة مستقيمة عمودية من رأس المثلث إلى الضلع المقابل (أو امتداد الضلع المقابل كما في المثلث المنفرج).




شكل (٢٢)

الارتفاعات الثلاثة في المثلث تلتقي في نقطة واحدة كما في الشكل (٢٣).

❖ المتباينة المثلثية


مجموع أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع الثالث. فمثلاً لا يوجد مثلث أطوال أضلاعه ١، ٣، ٥ بما أن $٥ > ٣ + ١$.



شكل (٢٣)

❖ مبرهنة فيثاغورس


في المثلث القائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. الشكل (٢٤) يوضح مبرهنة فيثاغورس هندسياً حيث مساحة المربع الفاتح (مربع الوتر) تساوي مجموع مساحتي المربعين القاتمين (مجموع مربعي الضلعين الآخرين).



شكل (٢٤)


❖ تطابق المثلثات

يتطابق المثلثان إذا تساوت الزوايا المتناظرة وتطابقت فيهما الأضلاع المتناظرة. نحن لسنا بحاجة لإثبات تساوي ثلاث زوايا متناظرة وتطابق ثلاثة أضلاع متناظرة، بل يكفي لإثبات تطابق مثلثين أي مما يلي:



شكل (٢٥)


- يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ضلع في مثلث مع نظيره في المثلث الآخر.




شكل (٢٦)

- يتطابق المثلثان إذا تطابق ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في مثلث مع نظائرها في المثلث الآخر.

تنبيه: كلمة "نظائرها" في العبارة السابقة هامة جداً (قارن بين الشكل (٢٧) الذي يحوي مثلثين متطابقين وبين الشكل (٢٨) حيث لا يوجد تطابق).




شكل (٢٧)



شكل (٢٨)


- يتطابق المثلثان إذا تطابق ضلع وزاويتان في مثلث مع نظائرها في المثلث الآخر.



شكل (٢٩)


وفي المثلثات القائمة، يتطابق المثلثان إذا:

- تساوى وتر وضع في مثلث مع نظائرها في المثلث الآخر. هذه الحالة مكافئة للحالة الأولى من تطابق المثلثات نظراً لأن طول الضلع الثالث في أي من المثلثين يساوي طول الضلع الثالث في المثلث الآخر (باستخدام مبرهنة فيثاغورس).




شكل (٣٠)

- تساوى ضلعا الزاوية القائمة في مثلث مع ضلعي الزاوية القائمة في المثلث الآخر. هذه الحالة مكافئة للحالة الثانية من تطابق المثلثات حيث الزاوية المحصورة هي الزاوية القائمة.



شكل (٣١)

- تساوت زاوية حادة وأحد ضلعيها في مثلث مع نظائرها في المثلث الآخر. هذه الحالة مكافئة للحالة الثالثة من تطابق المثلثات نظراً لمعرفةنا لزاوية أخرى وهي الزاوية القائمة.




شكل (٣٢)

❖ تشابه المثلثات

يتشابه مثلثان إذا كان أحدهما صورة مكبرة عن الآخر، وتكون نسبة طول أي ضلعين متناظرين ثابتة.

$$\frac{ا}{ع} = \frac{ب}{س} = \frac{ج}{س} \text{، (٣٣) الشكل}$$



شكل (٣٣)


وبالإضافة للأضلاع، فإن تشابه مثلثين يعني أن الأطوال الأخرى كالارتفاعات والمتوسطات وغيرها متناسبة.

هنالك ثلاث طرق عامة لإثبات تشابه مثلثين:

- يتشابه مثلثان إذا تناسبت أضلاعهما المتناظرة.
- يتشابه مثلثان إذا تساوت زوايا أحدهما مع زوايا المثلث الآخر. هذه الطريقة هي الأكثر أهمية لإثبات تشابه مثلثين، ويكفي أن تلاحظ تساوي زاويتين في أحد المثلثين مع زاويتين في المثلث الآخر نظراً لأن الزاوية الثالثة هي المكمل للزاويتين الأخرين.
- يتشابه مثلثان إذا تساوت زاوية في أحدهما مع زاوية في المثلث الآخر وتناسب ضلعا الزاوية مع نظيريهما في المثلث الآخر.

❖ حساب المثلثات

نورد هنا باختصار تعريف الدوال المثلثية وبعض علاقاتها لما تلعبه هذه الدوال من دور كبير. الدوال المثلثية إجمالاً تعبر عن علاقات الأضلاع في المثلث قائم الزاوية. الدوال المثلثية الأساسية لزاوية θ تعرف كما يلي:



شكل (٣٤)

$$\frac{p}{t} = \frac{1}{\text{جاس } t} = \text{قاس } t$$

$$\frac{b}{t} = \frac{1}{\text{جاس } b} = \text{قاس } b$$

$$\frac{b}{p} = \frac{1}{\text{ظاس } p} = \text{ظاس } b$$

$$\frac{p}{t} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \text{جاس } t$$

$$\frac{b}{t} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \text{جاس } b$$

$$\frac{b}{p} = \frac{\text{جاس } b}{\text{جاس } p} = \text{ظاس } b$$

يمكننا عن طريق تعريفات الدوال المثلثية الحصول على بعض العلاقات الهامة، ومنها:

$$\text{جاس } \theta = \text{جاس } (90^\circ - \theta), \quad \text{جاس } \theta = \text{جا } (90^\circ - \theta), \quad \text{ظاس } \theta = \text{ظاس } (90^\circ - \theta), \quad \dots \text{ الخ.}$$

$$\text{جا }^2 \theta + \text{جاس }^2 \theta = 1$$


$$\text{ظاس }^2 \theta + 1 = \text{قا }^2 \theta$$

$$\text{ظنا}^2 = 1 + \text{قنا}^2$$

$$\text{جا}(س + ص) = \text{جا}س \text{جا}ص + \text{جنا}س \text{جنا}ص$$

$$\text{جنا}(س + ص) = \text{جنا}س \text{جنا}ص - \text{جا}س \text{جا}ص$$

هناك بعض الزوايا الهامة نظراً لحدوثها المتكرر، نتيجة لتتصيف زاوية قائمة مثلاً، أو لأنها زاوية في مثلث متطابق الأضلاع، أو غيرها. ومن هذه الزوايا الهامة 30° ، 45° ، 60° . الجدول التالي يوضح قيم الدوال المثلثية لهذه الزوايا بالإضافة للزاوية القائمة والصفر.




شكل (٣٥)

الدالة المثلثية	صفر°	30°	45°	60°	90°
جاس	٠	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	١
جناص	١	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	٠
ظاس	٠	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	١	$\sqrt{3}$	غير معرف
قاس	١	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	٢	غير معرف
قناص	غير معرف	٢	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	١
ظناص	غير معرف	$\sqrt{3}$	١	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	٠

ليس ضرورياً حفظ قيم الدوال المثلثية في الجدول، إذ يمكننا الحصول عليها عن طريق الرجوع لتعريف كل من هذه الدوال بالإضافة إلى رسم المثلث القائم الثلاثيني الستيني والمثلث القائم المتطابق الضلعين، كما في الشكل (٣٥). لاحظ أن طول الضلع المقابل للزاوية 30° يساوي نصف الوتر.

❖ قانون الجيب



في المثلث $أ ب ج$ في الشكل (٣٦)،

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

❖ قانون جيب التمام

في المثلث $أ ب ج$ في الشكل (٣٦)،


$$ج^2 = ا^2 + ب^2 - 2 \times ا \times ب \times \cos \hat{ج}$$

❖ مساحة المثلث

هناك عدة صيغ لحساب مساحة المثلث ذي الأضلاع $ا، ب، و ج$ ، منها:

- مساحة المثلث $= \frac{1}{2} \times ا \times ب \times \sin \hat{ج}$ ، حيث $\hat{ج}$ هي قاعدة المثلث و $ع$ ارتفاعه.
- مساحة المثلث $= \frac{1}{2} \times ا \times ب \times \sin \hat{ج}$ ، حيث $\hat{س}$ هي الزاوية المحصورة بين الضلعين $ا$ و $ب$.
- مساحة المثلث $= ر \times نوه$ ، حيث $ر$ نصف محيط المثلث و $نوه$ نصف قطر الدائرة الداخلية.
- مساحة المثلث $= \sqrt{س(س-ا)(س-ب)(س-ج)}$ وتسمى هذه الصيغة صيغة "هيرون".
- مساحة المثلث $= \frac{ا ب ج}{4 \times نوه ع}$ ، حيث $نوه ع$ نصف قطر الدائرة الخارجية.

الأشكال الرباعية




❖ مقدمة

الشكل الرباعي: هو شكل هندسي ذو أربعة أضلاع، ومحيطه هو مجموع أطوال هذه الأضلاع. يكون الشكل الرباعي إما محدباً إذا كانت جميع زواياه الداخلية أقل من 180° ، أو مقعراً إذا كانت إحدى زواياه أكبر من 180° . القطعة المستقيمة الواصلة من أحد رؤوس الشكل الرباعي إلى أي رأس آخر غير مجاور تسمى القطر. يقسم القطر الشكل الرباعي إلى مثلثين، وبذلك نستنتج أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية في الشكل الرباعي يساوي 360° .

نستعرض فيما يأتي أهم الأشكال الرباعية.

❖ شبه المنحرف




شكل (٣٧)

هو شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط. الضلعان المتوازيان هما قاعدتا شبه المنحرف. القطعة المستقيمة لـ ل في الشكل (٣٧) تمثل ارتفاع شبه المنحرف، والقطعة المستقيمة س س التي تصل بين منتصفي الضلعين غير المتوازيين تسمى القاعدة المتوسطة. القاعدة المتوسطة موازية لقاعدتي شبه

المنحرف وطولها يساوي متوسط طوليها (أي أن: $|س| = \frac{|ب| + |د|}{2}$). نحث القارئ على إثبات

ذلك عن طريق إسقاط عمودين من ا و ب إلى القاعدة جـ د ومن ثم استخدام تشابه المثلثات الناتجة. وبنفس الطريقة يمكننا إثبات أن مساحة شبه المنحرف تساوي حاصل ضرب الارتفاع بطول القاعدة المتوسطة (أي أن: مساحة شبه المنحرف $= |س| \times |ل|$).


❖ متوازي الأضلاع



شكل (٣٨)

هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. ونتيجة لذلك فإن كل زاويتين متقابلتين متساويتان، وكل زاويتين غير متساويتين متكاملتان. كما أن كل ضلعين متقابلين متطابقان (اثبت ذلك عن طريق رسم القطرين وإيجاد مثلثات متطابقة). وبطريقة إيجاد المثلثات المتطابقة نستطيع أن نثبت أن القطرين في متوازي الأضلاع ينصفان بعضيهما. وبالنظر لمتوازي الأضلاع على أنه شبه منحرف نجد أن مساحته تساوي حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع (لاحظ أن طول القاعدة المتوسطة يساوي طول أي من القاعدتين المتساويتين).


❖ المعين



شكل (٣٩)

هو شكل رباعي جميع أضلاعه متطابقة. يمكننا بسهولة (كيف؟) أن نثبت أن كل معين هو متوازي أضلاع. ويتميز المعين بتعامد قطريه، مما يمكننا من استخدامهما لحساب مساحته. فمساحة المعين تساوي نصف حاصل ضرب القطرين. وبالطبع يمكننا حساب مساحة المعين كشبه منحرف أو متوازي أضلاع.

❖ المستطيل والمربع




شكل (٤٠)

المستطيل: هو شكل رباعي جميع زواياه متساوية (قياس كل زاوية 90°). كل مستطيل هو متوازي أضلاع. يطلق على الضلع الأطول في المستطيل اسم الطول (ل) بينما يسمى الضلع الأصغر العرض (ع)، ومساحة المستطيل هي حاصل ضرب الطول في العرض (ع × ل). قطرا المستطيل متطابقان


(طول كل منهما يساوي $\sqrt{ع^2 + ل^2}$). إذا تساوى الطول والعرض في مستطيل فإننا نسميه مربع. إذن المربع: هو شكل رباعي جميع زواياه متساوية، وجميع أضلاعه متطابقة، وكل مربع هو في نفس الوقت مستطيل ومعين ومتوازي أضلاع.

المضلع



شكل (٤١)

هو شكل مستوي مغلق محدود بثلاث قطع مستقيمة أو أكثر، تلتقي أزواجاً في نفس الرؤوس، ولا تتقاطع إلا في رؤوسها. ومن المضلعات الشهيرة المثلث وهو مكون من ثلاثة أضلاع، والشكل الرباعي المكون من أربعة أضلاع.




شكل (٤٢)

يسمى المضلع منتظماً (شكل (٤٢)) إذا تطابقت جميع أضلعه وتساوت جميع زواياه. ولا يكفي أن تتساوى زواياه فقط ليكون منتظماً (المستطيل مثلاً)، كما أن تطابق الأضلاع فقط لا يكفي.

القطعة المستقيمة الواصلة من رأس من رؤوس المضلع إلى أي رأس آخر غير مجاور تسمى القطر. عدد الأقطار في مضلع مكون من n من القطع المستقيمة يساوي $\frac{n(n-3)}{2}$. لاحظ أنه يمكننا رسم قطعة مستقيمة من رأس ما، لأي من الرؤوس المتبقية وعددها $n-1$ باستثناء الرأسين المجاورين، أي أنه يمكننا أن نرسم $n-3$ قطراً من كل رأس من الرؤوس البالغ عددها n (شكل (٤٣))، أي ما مجموعه $n(n-3)$. نقسم العدد الكلي على ٢ لأن القطر من نقطة ١ إلى نقطة ب هو نفسه من نقطة ب إلى نقطة ١.

يمكننا ملاحظة أن الأقطار المرسومة من رأس في المضلع وعددها $n-3$ تقسم المضلع إلى $n-2$ مثلثاً. نستنتج من ذلك أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع مكون من n ضلعاً يساوي $(n-2) \times 180^\circ$. فعلى سبيل المثال،

مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي $(3-2) \times 180 = 180^\circ$ ، ومجموع قياسات زوايا المضلع الثماني يساوي $(8-2) \times 180 = 1080^\circ$ (بمعدل 135° لكل زاوية في حالة كون المضلع منتظماً).




شكل (٤٣)

تلتقي المنصفات العمودية لأضلاع المضلع المنتظم في نقطة واحدة (أثبت ذلك باستخدام تطابق المثلثات). نقطة التقاء المنصفات العمودية هي أيضاً نقطة التقاء منصفات الزوايا الداخلية للمضلع المنتظم. ولذلك يمكننا أن نرسم من هذه النقطة دائرتين، إحداهما تمر بجميع رؤوس المضلع، والأخرى تمس جميع أضلاعه، (شكل (٤٤)). يمكننا إيجاد نصفي قطري هاتين الدائرتين إذا قسمنا المضلع، والذي طول ضلعه l ، إلى مثلثات قائمة كما في الشكل (٤٤). باستخدام الدوال المثلثية نجد أن:

$$\frac{l}{2} = r \cos 45^\circ \quad \text{و} \quad \frac{l}{2} = R \sin 45^\circ$$

قياس الزاوية $\widehat{هـأ} = 36^\circ$ حيث n عدد أضلاع المضلع (لماذا؟). (لاحظ أن: في المضلع السداسي $\widehat{هـأ} = 30^\circ$ والمثلث $أب$ متطابق الأضلاع).

$$\text{وبالتالي فإن مساحة المضلع} = n \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{l}{2} \times \frac{l}{2} \times \sin 90^\circ \right) = \frac{n l^2}{4}$$




شكل (٤٤)

ثلاثيات الأبعاد

نستعرض فيما يلي باختصار بعض الأجسام ثلاثية الأبعاد.

❖ الكرة




شكل (٤٥)

هي مجموعة النقاط في الفضاء والتي تقع على بعد متساوٍ وثابت من نقطة معلومة. النقطة المعلومة هي مركز الكرة، والبعد الثابت هو نصف قطرها.

المساحة السطحية للكرة تساوي $4\pi r^2$ وحجمها يساوي $\frac{4}{3}\pi r^3$.

إذا قطع مستوى كرة فإن التقاطع يكون على شكل دائرة يتراوح قطرها من قطر الكرة نفسها (إذا كان التقاطع ماراً بمركز الكرة) إلى صفر (وفي هذه الحالة يمس المستوى الكرة فقط).

❖ متوازي المستطيلات (الصندوق)




شكل (٤٦)

هو مجسم من ستة أوجه، وأوجهه المتقابلة مستطيلات متطابقة. القطع المستقيمة المكونة للأسطح المستطيلة تسمى أحرفاً، وتلتقي الأحرف في نقاط تسمى الرؤوس. القطر في متوازي المستطيلات هو القطعة المستقيمة المرسومة من رأس ما إلى الرأس المقابل.

المساحة السطحية لمتوازي مستطيلات ذي الأبعاد طول (س) وعرض (ص) وارتفاع (ع) تساوي مجموع مساحات المستطيلات الستة، أي أن $2(س \times ص + ص \times ع + ع \times س)$. إذا تساوى الطول والعرض والارتفاع يسمى متوازي المستطيلات مكعباً. وبذلك فإن المساحة السطحية للمكعب تساوي $6س^2$ حيث س هو طول الحرف.

حجم متوازي المستطيلات يساوي $س \times ص \times ع$ ، وحجم المكعب يساوي $س^3$.
طول قطر متوازي المستطيلات (يمكن حسابه باستخدام مبرهنة فيثاغورس، شكل (٤٦)) يساوي $\sqrt{س^2 + ص^2 + ع^2}$.


❖ المنشور



شكل (٤٧)

هو مجسم له قاعدتان مضلعتان متطابقتان ومتوازيتان، وأوجهه الجانبية عبارة عن متوازيات أضلاع تنتج من توصيل رؤوس القاعدتين المتقابلتين. في المنشور المنتظم تكون القاعدتان مضلعان منتظمين، وفي المنشور القائم تكون الأحراف الجانبية عمودية على القاعدتين (متوازي المستطيلات والمكعب). المساحة السطحية للمنشور هي مجموع مساحات القاعدتين والأوجه الجانبية، وحجم المنشور هو حاصل ضرب مساحة القاعدة في الارتفاع (الارتفاع هو المسافة بين القاعدتين).

❖ الاسطوانة




شكل (٤٨)

هو منشور قاعدته منحنيان عوضاً عن كونهما مضلعان. الاسطوانة الدائرية لها قاعدتان على شكل دائرتين. وقد تكون الاسطوانة الدائرية قائمة، وفي هذه الحالة فإن مساحتها السطحية مكونة من المساحة

الجانبية بالإضافة إلى مساحتي القاعدتين، أي $2ط\text{نوه} + 2ط\text{نوه}^2$ ، حيث نوه نصف قطر القاعدة و $ع$ الارتفاع. وحجم الاسطوانة الدائرية القائمة يساوي $ط\text{نوه}^2 ع$.


❖ الهرم



شكل (٤٩)

هو مجسم فيه وجه واحد على شكل مضلع (يسمى قاعدة الهرم وقد يكون مثلثاً) والباقي مثلثات تلتقي في رأس واحد (يسمى رأس الهرم). يسمى الهرم منتظماً إذا كانت قاعدته مضلعاً منتظماً وجميع الأوجه الجانبية لها نفس الزاوية مع رأس الهرم. ارتفاع الهرم هو المسافة العمودية من رأس الهرم إلى القاعدة. حجم الهرم يساوي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، ومساحته السطحية تساوي مجموع مساحات الأوجه الجانبية ومساحة القاعدة.

❖ المخروط



شكل (٥٠)


هو هرم قاعدته منحنى عوضاً عن كونها مضلعاً. إذا كانت القاعدة دائرة فإن المخروط يسمى مخروطاً دائرياً. المخروط الدائري القائم هو هرم منتظم قاعدته دائرية وحجمه يساوي $\frac{1}{3}ط\text{نوه}^2 ع$ حيث نوه

نصف قطر القاعدة و h الارتفاع. المساحة الجانبية للمخروط الدائري القائم تساوي $\pi r l$ حيث l طول "الراسم"، (شكل (٥٠)).

❖ متعدد السطوح

هو مجسم سطحه محدود بوساطة أربعة وجوه مضلعة أو أكثر بحيث تتلاقى أزواج الأوجه على طول الأحرف، وبحيث يتلاقى ثلاثة أحرف أو أكثر عند كل رأس. يتكون متعدد السطوح المنتظم من مضلعات منتظمة متطابقة تصنع مع بعضها زوايا متساوية. توجد خمسة متعددات سطوح منتظمة فقط. تسمى بعض متعددات السطوح تبعاً لعدد وجوهها مثل رباعي الوجوه وسداسي الوجوه، ... الخ. العلاقة التالية تربط بين عدد الرؤوس وعدد الوجوه وعدد الأحرف في أي متعدد سطوح سواءً أكان منتظماً أو غير منتظم:

$$\text{عدد الرؤوس} + \text{عدد الوجوه} - \text{عدد الأحرف} = 2$$



شكل (٥١)