

٤ – الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتها

١/٤	عرض النتائج
٢/٤	تفسير ومناقشة النتائج

يتناول هذا الفصل عرض النتائج التى أمكن التوصل إليها من خلال المعالجة الإحصائية لبيانات البحث وفى ضوء القياسات المستخدمة ويتم عرض النتائج وفقا لترتيب الأهداف كمايلي:

- ١ - تأثير التدليك الإنعاشى على بعض المتغيرات الفسيولوجية للجهاز الدورى (معدل النبض - ضغط الدم الشريانى) نبضة / دقيقة .
 - ٢ - تأثير التدليك الإنعاشى على توتر الجلد / مللى أمبير .
 - ٣ - تأثير التدليك الإنعاشى على مستوى حمض اللاكتيك فى الدم مللجرام .
 - ٤ - تأثير التدليك الإنعاشى على التوافق العصبى العضلى .
 - ٥ - تأثير التدليك الإنعاشى على كهربية العضلات (النشاط الكهربى البيولوجى الحيوى) مللى / فولت .
- سوف توضح الجداول الإحصائية نتائج البحث وفقا للترتيب السابق .

١/٤ عرض النتائج

جدول (٤)

المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء
لقياس معدل النبض
ن = ١٤

النبض	م	ع	ل
ق ١	٧٩,٤٣	٥,٦١	٠,٦١
ق ٢	١٧٦,٦٤	٢٣,٥٤	٠,٤٤-
ق ٣	٩٤,١٤	١٢,١٧	٠,١٥

يتضح من جدول (٤) المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء حيث تراوح معامل الالتواء بين (٠,٤٤- ، ٠,٦١) و هذه القيم محصورة بين (٣- ، ٣) أى قيم الاختبار تقع تحت المنحنى الاعتدالى لقياس معدل النبض .

جدول (٥)

المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الإلتواء لقياس

ضغط الدم الإنقباضى

ن = ١٤

الضغط الإنقباضى	م	ع	ل
ق ١	١١٨,٩٣	٣,٨٢	٠,٢٨ -
ق ٢	١٥٠,٧١	١٤,١٢	٠,٦٤ -
ق ٣	١١٦,٧٩	٥,١٢	٠,٦٣ -

يتضح من الجدول (٥) المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الإلتواء حيث

تراوح معامل الإلتواء بين (-٠,٦٤ ، -٠,٢٨) وهذه القيم محصورة بين (-٣ ، ٣) أى
قيم الاختبار تقع تحت المنحنى الإعتدالى لقياس ضغط الدم الإنقباضى .

جدول (٦)

المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء لقياس
ضغط الدم الإنبساطى

ن = ١٤

الضغط الإنبساطى	م	ع	ل
ق ١	٧٩,٦٤	١,٤٥	٠,٢٥
ق ٢	١٢١,٤٣	٢١,٣٣	٠,٨٦-
ق ٣	٧٨,٩٣	٦,٠٨	٠,١٦-

يتضح من جدول (٦) المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء حيث
تراوح معامل الالتواء بين (٠,٨٦- ، ٠,٢٥) وهذه القيم محصورة بين (٣- ، ٣) أى قيم
الاختبار تقع تحت المنحنى الإعتدالى لقياس ضغط الدم الإنبساطى .

جدول (٧)

المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء

لقياس توتر الجلد

ن = ١٤

توتر الجلد	م	ع	ل
ق ١	٧٢,٦٤	٢٢,٠٦	١,٢٤ -
ق ٢	٤٥,٧٩	٢٠,١٢	٠,٧٨
ق ٣	٩٩,٥٧	٢٦,٢٩	٠,٧٨ -

يتضح من جدول (٧) المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء حيث تراوح معامل الالتواء بين (-١,٢٤ ، ٠,٧٨) وهذه القيم محصورة بين (-٣ ، ٣) أى قيم الاختبار تقع تحت المنحنى الإعتدالى لقياس توتر الجلد .

جدول (٨)

المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء

لقياس حمض اللاكتيك

ن = ١٤

ل	ع	م	حمض اللاكتيك
٠,٤٦ -	١,٦٤	١١,٦٥	ق ١
٠,١٥ -	٣,٩٤	٥٠,٢١	ق ٢
٠,٦٢	٢,١٣	١٦,٧١	ق ٣

يتضح من جدول (٨) المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء حيث تراوح معامل الالتواء بين (- ٠,٤٦ ، ٠,٦٢) وهذه القيم محصورة بين (- ٣ ، ٣) أى قيم الإختبار تقع تحت المنحنى الإعتدالى لقياس حمض اللاكتيك .

جدول (٩)

المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء لقياس
التوافق العصبى العضلى
ن = ١٤

التوافق	م	ع	ل
ق ١	١٣١,٤٣	٢٤,٤٥	- ٠,٧٦
ق ٢	١٥٢,١٤	٢٧,٧٨	- ٠,٦٤
ق ٣	٧٨,٥٠	١٥,٧١	- ٠,٧٣

يتضح من جدول (٩) المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء حيث
تراوح معامل الالتواء بين (- ٠,٧٦ ، - ٠,٦٤) وهذه القيم محصورة بين (- ٣ ، ٣) أى
قيم الاختبار تقع تحت المنحنى الإعتدالى لقياس التوافق العصبى العضلى .

جدول (١٠)

المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء لقياس

رسام العضلات EMG

ن = ١٤

ل	ع	م	EMG
٠,٥٦ -	٤٢,٩٠	١١١٧,٩٨	ق ١
٠,٦٢ -	١٤,٩٤	٣٦٨,٠٢	ق ٢
٠,٩٤	٤٣,٢٥	٩٢٦,٥٦	ق ٣

يتضح من جدول (١٠) المتوسط الحسابى والانحراف المعياري ومعامل الالتواء حيث تراوح معامل الالتواء بين (- ٠,٦٢ ، ٠,٩٤) وهذه القيم محصورة بين (- ٣ ، ٣) أى قيم الاختبار تقع تحت المنحنى الإعتدالى لقياس رسام العضلات الكهربائى EMG .

جدول (١١)
تحليل تباين فى إتجاه واحد لقياسات
معدل النبض
ن = ١٤

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
تباين كلى	٧٧٩٠٣,٦٢	٤١	١٩٠٠,٠٩	
تباين بين المجموعات	١٥٧٩,٦٢	١٣	١٢١,٥١	
تباين داخل المجموعات	٧٦٣٢٤,٠٠	٢٨	٢٧٢٥,٨٦	
المعالجات	٧٣٦٧٥,٦٢	٢	٣٦٨٣٧,٨١	*٣٦١,٦٥
البواقي	٢٦٤٨,٣٨	٢٦	١٠١,٨٦	

ويتضح من جدول (١١) أن قيمة "ف" دالة عند مستوى ٠,٠٥ وأن "ف" الجدولية دالة عند درجات حرية (٢٦ ، ٢) .

جدول (١٢)
إختبار تيوكى لمعدل النبض

$$12,20 = \text{LSD}$$

$$14 = n$$

متوسط درجات المجموعات			
س _١ = ٧٩,٣٤	س _٢ = ١٧٤,٧١	س _٣ = ٩٤,١٤	
*١٤,٨٠	*٨٠,٥٧		س _٣ = ٩٤,١٤
*٩٥,٣٧			س _٢ = ١٧٤,٧١

يتضح من جدول (١٢) أن القيم دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥)

- توجد دلالة إحصائية بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن معدل النبض يتجه إلى المعدل الطبيعى بعد التدليك الإنعاشى .
- وتوجد دلالة إحصائية بين درجات القياس بعد المجهود ومع درجات قياس التدليك الإنعاشى عالية أى أن المجهود البدنى يزيد من معدل النبض .
- توجد دلالة إحصائية عالية بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد المجهود .

جدول (١٣)
تحليل تباين فى إتجاه واحد لقياسات
ضغط الدم الإنقباضى
ن = ١٤

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
تباين كلى	١٣٥٩٠,٤٨	٤١	٣٣١,٤٨	
تباين بين المجموعات	٢٠٢٣,٨١	١٣	١٥٥,٦٨	
تباين داخل المجموعات	١١٥٦٦,٦٧	٢٨	٤١٣,٠٩	
المعالجات	١٠١٠٨,٣٣	٢	٥٠٥٤,١٧	*٩٠,١١
البواقي	١٤٥٨,٣٣	٢٦	٥٦,٠٩	

ويتضح من جدول (١٣) أن قيمة "ف" دالة عند مستوى ٠,٠٥ وأن "ف" الجدولية دالة عند درجات حرية (٢٦ ، ٢) .

جدول (١٤)

إختبار تيوكي لقياس ضغط الدم الإنقباضى

$$9,03 = \text{LSD}$$

$$14 = \text{ن}$$

متوسط درجات المجموعات			
س ٣ = ١١٦,٧٩	س ٢ = ١٥٠,٧١	س ١ = ١١٨,٩٣	
	*٣٣,٩٢	٢,١٤	س ٣ = ١١٦,٧٩
		*٣١,٧٨	س ٢ = ١٥٠,٧١

يتضح من جدول (١٤) أن القيم دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥)

- ويتضح أيضا من الجدول أنه لا توجد فروق دالة إحصائية بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات قياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن ضغط الدم الإنقباضى وصل إلى معدله الطبيعى بعد التدليك إلى ماكانت عليه الطالبة أثناء الراحة .
- وتوجد فروق دالة إحصائية بين درجات القياس بعد المجهود وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى عالية أى أن المجهود البدنى يزيد من ضغط الدم الإنقباضى .
- توجد فروق دالة إحصائية بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد المجهود .

جدول (١٥)
تحليل تباين فى إتجاه واحد لقياسات
ضغط الدم الإنبساطى
ن = ١٤

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
تباين كلى	٢٢٥٥٧,١٤	٤١	٥٥٠,١٧	
تباين بين المجموعات	٣٣٥٧,١٤	١٣	٢٥٨,٢٤	
تباين داخل المجموعات	١٩٢٠٠,٠٠	٢٨	٦٨٥,٧١	
المعالجات	١٣٨٨٩,٢٩	٢	٦٩٤٤,٦٤	*٣٣,٩٩
البواقي	٥٣١٠,٧١	٢٦	٢٠٤,٢٦	

ويتضح من جدول (١٥) أن قيمة "ف" المحسوبة دالة عند مستوى ٠,٠٥ وأن "ف"
الجدولية دالة عند درجات حرية (٢٦ ، ٢) .

جدول (١٦)

إختبار تيوكى لقياس ضغط الدم الإنبساطى

$$17,26 = LSD$$

$$14 = n$$

متوسط درجات المجموعات			
س ١ = ٧٩,٦٤	س ٢ = ١٢١,٤٣	س ٣ = ٧٨,٩٣	
٠,٧١	*٤٢,٥٤		س ٣ = ٧٨,٩٣
*٤١,٧٩			س ٢ = ١٢١,٤٣

يتضح من جدول (١٦) أن القيم دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥)

- ويتضح أيضا من الجدول أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات قياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن ضغط الدم الإنبساطى وصل إلى معدله الطبيعى بعد التدليك إلى ماكانت عليه الطالبة أثناء الراحة .
- وتوجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس بعد المجهود البدنى وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى عالية أى أن المجهود البدنى يزيد من ضغط الدم الإنبساطى .
- توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد المجهود .

جدول (١٧)
تحليل تباين فى إتجاه واحد لقياسات
توتر الجلد
ن = ١٤

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
تباين كلى	٤٠٨٣١,٣٣	٤١	٩٩٥,٨٩	
تباين بين المجموعات	١٤٥١٢,٦٧	١٣	١١٦,٣٦	
تباين داخل المجموعات	٢٦٣١٨,٦٧	٢٨	٩٣٩,٩٥	
المعالجات	٢٠٢٥٠,٣٣	٢	١٠١٢٥,١٧	*٤٣,٣٨
البواقي	٦٠٦٨,٣٣	٢٦	٢٣٣,٤٠	

ويتضح من جدول (١٧) أن قيمة "ف" المحسوبة دالة عند مستوى ٠,٠٥ وأن "ف"
الجدولية دالة عند درجات حرية (٢٦ ، ٢) .

جدول (١٨)

إختبار تيوكى لقياس توتر الجلد

$$18,43 = \text{LSD}$$

$$14 = n$$

متوسط درجات المجموعات			
س٣ = ٩٩,٥٧	س٢ = ٤٥,٧٩	س١ = ٧٢,٦٤	
	*٥٣,٧٨	*٢٦,٩٣	س٣ = ٩٩,٥٧
		*٢٦,٨٥	س٢ = ٤٥,٧٩

يتضح من جدول (١٨) أن القيم دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥)

- ويتضح أيضا من الجدول أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشي أى أن توتر الجلد يتجه إلى المستوى الطبيعي الذى كانت عليه الطالبة أثناء الراحة .

- وتوجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس بعد المجهود البدنى وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشي أى أن المجهود البدنى يزيد من توتر الجلد .

- توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد المجهود .

جدول (١٩)
تحليل تباين فى إتجاه واحد لقياسات
حمض اللاكتيك فى الدم
ن = ١٤

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
تباين كلى	١٢٥٨٩,٠٨	٤١	٣٠٧,٠٥	
تباين بين المجموعات	١٢٢,٨٢	١٣	٩,٤٥	
تباين داخل المجموعات	١٢٤٦٦,٢٥	٢٨	٤٤٥,٢٢	
المعالجات	١٢٢٩٩,٠٤	٢	٦١٤٩,٥٢	*٩٥٦,٣٨
البواقي	١٦٧,٢٢	٢٦	٦,٣٤	

ويتضح من جدول (١٩) أن قيمة "ف" المحسوبة دالة عند مستوى ٠,٠٥ وأن "ف"
الجدولية دالة عند درجات حرية (٢٦ ، ٢) .

جدول (٢٠)

إختبار تيوكى لقياس حمض اللاكتيك

$$3,07 = \text{LSD}$$

$$14 = n$$

متوسط درجات المجموعات			
س٣ = ١٦,٧١	س٢ = ٥٠,٢١	س١ = ١١,٦٥	
	*٣٣,٥٠	*٥,٠٦	س٣ = ١٦,٧١
		*٣٨,٥٦	س٢ = ٥٠,٢١

يتضح من جدول (٢٠) أن القيم دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥)

- ويتضح أيضا من الجدول أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن حمض اللاكتيك يتجه نحو المستوى الطبيعى الذى كانت عليه الطالبة أثناء الراحة .

- وتوجد فروق دالة إحصائية عالية بين درجات القياس بعد المجهود البدنى وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن المجهود البدنى يزيد من حمض اللاكتيك فى الدم .

- توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد المجهود .

جدول (٢١)
تحليل تباين فى إتجاه واحد لقياسات
التوافق العصبى العضلى
ن = ١٤

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
تباين كلى	٦١٤٠٠,٩٨	٤١	١٤٩٧,٥٩	
تباين بين المجموعات	١٨٦٣٣,٦٤	١٣	١٤٣٣,٣١	
تباين داخل المجموعات	٤٢٧٦٧,٣٣	٢٨	١٥٢٧,٤١	
المعالجات	٤٠٣٨٤,٣٣	٢	٢٠١٩٢,١٧	*٢٢٠,٣٢
البواقي	٢٣٨٣,٠٠	٢٦	٩١,٦٥	

ويتضح من جدول (٢١) أن قيمة "ف" المحسوبة دالة عند مستوى ٠,٠٥ وأن "ف"
الجدولية دالة عند درجات حرية (٢٦ ، ٢) .

جدول (٢٢)

إختبار تيوكى لقياس التوافق العصبى العضلى

$$11,56 = \text{LSD}$$

$$14 = \text{ن}$$

متوسط درجات المجموعات			
س ٣ = ٧٨,٥٠	س ٢ = ١٥٢,١٤	س ١ = ١٣١,٤٣	
	*٧٣,٦٤	*٥٢,٩٣	س ٣ = ٧٨,٥٠
		*٢٠,٧١	س ٢ = ١٥٢,١٤

يتضح من جدول (٢٢) أن القيم دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥)

- ويتضح أيضا من الجدول أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن التوافق العصبى العضلى يتجه إلى المستوى الطبيعى الذى كانت عليه الطالبة أثناء الراحة .

- وتوجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس بعد المجهود البدنى وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن المجهود البدنى يؤثر على التوافق العصبى العضلى .

- توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد المجهود .

جدول (٢٣)
تحليل تباين فى إتجاه واحد لقياسات
رسام العضلات EMG
ن = ١٤

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
تباين كلى	٤٣٠٦٢٩٢,٢٤	٤١	١٠٥٠٣١,٥٢	
تباين بين المجموعات	٤٤٧٦١,٣٤	١٣	٣٤٤٣,١٨	
تباين داخل المجموعات	٤٢٦١٥٣٠,٩٠	٢٨	١٥٢١٩٧,٥٣	
المعالجات	٤٢٥١١٢١,٣٠	٢	٢١٢٥٥٦٠,٦	*٥٣,٨٠
البواقي	١٠٤٠٩,٦٠	٢٦	٥	
			٤٠٠,٣٧	

ويتضح من جدول (٢٣) أن قيمة "ف" المحسوبة دالة عند مستوى ٠,٠٥ وأن "ف"
الجدولية دالة عند درجات حرية (٢٦ ، ٢) .

جدول (٢٤)

إختبار تيوكى لقياس رسام العضلات EMG


$$24,17 = \text{LSD}$$

$$14 = n$$


متوسط درجات المجموعات			
س ١ = ١١١٧,٩٨	س ٢ = ٣٦٨,٠٦	س ٣ = ٩٢٦,٥٦	
*١٩١,٤٢	*٥٥٨,٥٠		س ٣ = ٩٢٦,٥٦
*٧٤٩,٩٢			س ٢ = ٣٦٨,٠٦

يتضح من جدول (٢٤) أن القيم دالة إحصائيا عند مستوى (٠,٠٥)

- ويتضح أيضا من الجدول أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى أى أن النشاط الكهربائى للعضلات يتجه إلى المستوى الطبيعى الذى كانت عليه الطالبة أثناء الراحة .
- وتوجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس بعد المجهود البدنى وبين درجات القياس بعد التدليك الإنعاشى .
- توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات القياس أثناء الراحة وبين درجات القياس بعد المجهود .




شكل رقم (١)
يوضح معدلات النبض أثناء الراحة
وبعد المجهود ثم بعد التدليك




شكل رقم (٢)

يوضح معدلات ضغط الدم الشرياني أثناء الراحة
وبعد المجهود ثم بعد التدليك




شكل (٣)

يوضح توتر الجلد أثناء الراحة وبعد المجهود
ثم بعد التدليك




شكل رقم (٤)

يوضح مستوى نسبة تركيز حمض اللاكتيك في الدم أثناء الراحة
وبعد المجهود ثم بعد التدليك




شكل رقم (٥)

يوضح التوافق العصبى العضلى أثناء الراحة
وبعد المجهود ثم بعد التدليك



شكل رقم (٦)

يوضح النشاط الكهربائي البيولوجي للعضلات EMG أثناء الراحة
وبعد المجهود ثم بعد التدليك



تسجيل النشاط الكهربائي بعد المجهود



تسجيل النشاط الكهربائي بعد التدليك

٢/٤ تفسير ومناقشة النتائج

من واقع البيانات وفى ضوء المعالجات السابق عرضها توصلت الباحثة إلى تفسير ومناقشة النتائج على النحو التالى :

أ - تفسير نتائج معدل النبض

من الجداول (٤) (١١) (١٢) يتضح زيادة معدل النبض بعد أداء المجهود البدنى وهذا يتفق مع ما أوضحتة كاربوفيتش وسننج (١٩٧١) من أن معدل النبض يزداد بسرعة فى بداية أداء العمل العضلى ويسجل أعلى زيادة خلال الدقيقة الأولى من الأداء حيث يزداد معدل النبض من ٧٠ نبضة / دقيقة أثناء الراحة إلى ١٨٠ نبضة / دقيقة أو أكثر أثناء أداء العمل العضلى وترجع أسباب هذه الزيادة إلى أثارة الأعصاب السمبثاوية التى تزيد من دقات القلب أو نتيجة لأفراز هرمون الأدرينالين أثناء المجهود البدنى أو لزيادة تركيز حمض اللاكتيك فى الدم والعضلات أو نقص الأس الهيدروجينى .

ويتضح بعد إجراء التدليك أن هناك انخفاض فى معدل النبض يقترب من المعدل الطبيعى الذى كانت عليه الطالبة أثناء الراحة ويرجع أسباب انخفاض معدل النبض بصورة أسرع بعد أداء التدليك الإنعاشى إلى أن لحركات اليدين أثناء إجراء التدليك الإنعاشى القدرة على أحداث ردود أفعال إنعكاسية للأوعية الدموية السطحية مما يؤدى إلى سرعة إتساع الشعيرات الدموية بطريقة آليه مما يساعد على زيادة كمية الدم الشريانى المتجه إلى الأجزاء الواقعة تحت تأثير التدليك الإنعاشى وبالتالي يؤدى إلى تقليل المقاومة الطرفية مما يؤدى إلى إنخفاض معدل النبض .

ب - ضغط الدم الشريانى (الإنقباضى والإنبساطى)

من الجداول (٥) (٦) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) يتضح زيادة مستوى ضغط الدم الشريانى بعد أداء المجهود البدنى وترجع هذه الزيادة إلى التغيرات التى تحدث فى كمية الدم الذى يدفعه القلب وحجم الأوعية الدموية وحجم الدم وتؤدى زيادة الدفع القلبنى إلى زيادة سريان الدم فى الشرايين مما يؤدى بالتالى إلى زيادة الضغط فى الأوعية ويساعد إنقباض الشرايين على زيادة مقاومة سريان الدم ، لذلك فإنه يتعين على القلب أن يزيد من قوة الضخ ليدفع الدم خلال الشرايين الضيقة وهو ما يؤدى إلى زيادة ضغط الدم زيادة فسيولوجية لتلائم زيادة حاجة العضلات العاملة إلى الدم الشريانى .

ويتضح من نتائج إجراء التدليك الإنعاشي أن ضغط الدم الشرياني أقترَب من المعدل الطبيعي الذي كانت عليه الطالبة أثناء الراحة .

وهذا ما أكدته درس كلا من Bell & Taslitg أن للتدليك تأثير على ضغط الدم الشرياني نتيجة زيادة النشاط الجهاز العصبي السمبثاوي .

ج - تفسير تحسن توتر الجلد

يقوم الجلد في الإنسان بعدة وظائف منها حماية الأنسجة والأعضاء الداخلية وينظم درجة حرارة الجسم وهو عضو إستقبال الإحساس باللمس والحرارة والبرودة والألم لأن الجلد يحتوى على مستقبلات الإحساس وتحولها إلى إشارات عصبية تنتقل بواسطة الأعصاب الحسية إلى مناطق الإحساس الموجودة في قشرة المخ المسئولة عن إستقبال إدراك الأحساس الصادر من الجلد وأثناء المجهود البدني يحدث توتر ملحوظ في الجلد نتيجة تغيرات حرارية في الجلد ففي حالة سخونة الجلد يولد الهيپوثلامس إشارات عصبية تؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية بالجلد وبالتالي أفراس كمية أكبر من العرق ، ومن الجداول (٧) (١٧) (١٨) يتضح أن التدليك الإنعاشي أثر على توتر الجلد ويقترب من المعدل الطبيعي الذي كانت عليه الطالبة أثناء الراحة لأن التدليك يؤثر تأثيرا فسيولوجيا على الجلد لأنه أثناء التدليك تتجدد الخلايا السطحية الجلدية فتحسن الوظائف الأفراسية للغدد الدهنية والعرقية وتعمل على عزل منتجات التمثيل الغذائي من الجسم وتحسن الدورة الدموية في الجلد ويتدفق الدم لطبقات الجلد وتحسن تغذيته وتتجدد خلايا الجسم عامة ويتفق هذا مع رأى كلا من بيتر ١٩٩١ Bucholg, Barr & Mennell ١٩٨١ أن التدليك له تأثير على نشاط الجلد ورفع درجة حرارة الجلد من ٢ - ٣ درجات وهذا يساعد على إزالة التعب ويهدئ من توتر الجلد .

د - تفسير معدلات حمض اللاكتيك

يلاحظ تأثير المجهود البدني على نسبة تركيز حمض اللاكتيك في الدم فتزيد نسبته أثناء المجهود البدني الذي يتطلب إنتاج الطاقة في غياب الأكسجين وتراكم حمض اللاكتيك يؤدي إلى حدوث التعب نتيجة أعاقه سريان الدم في العضلات العاملة وبالتالي تقل بدرجة كبيرة التغذية الدموية وكمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات وذلك على الرغم من اشتراك عدد كبير من الوحدات الحركية في الأداء مما يؤدي إلى هبوط في كفاءة الأداء ويؤكد هذا الرأي دراسات كل من مولر وسيمون (١٩٣٢) Mollar & Simoon إلى أنه أثناء العمل العضلي الذي يمتاز بأداء أنقباضات عضلية فإن سريان الدم في العضلة أثناء الإنقباض يتوقف تماما

حيث يؤدي العمل العضلي إلى أغلاق الأوعية الدموية ويمنع سريان الدم عن العضلات العاملة وفي هذه الحالة تعمل العضلات اعتمادا على كمية ضئيلة جدا من الأكسجين مما يؤدي إلى تراكم حمض اللاكتيك وبالتالي الشعور بالتعب وتقل قدرة العضلة على الإنقباض ومن الجداول (٨) (١٩) (٢٠) أن حمض اللاكتيك يقترب من المعدل الطبيعي الذي كانت عليه الطالبة أثناء الراحة نتيجة إجراء التدليك الأنعاشي الذي يسرع في أنسياب كل سوائل الجسم كالدم والليمف والسوائل بين الأنسجة ونتيجة للتأثير الميكانيكي لعمليات التدليك تتسع الأوعية الدموية وهذا ليس فقط في المنطقة المدلكة ولكن أيضا في المناطق المجاورة وهذا الاتساع يساعد على تدفق كمية كبيرة من الدم إلى الأنسجة وتحسين عمليات التأكسد والتغذية والتدليك يزيل التعب العضلي ويساعد على عمليات البناء في الأنسجة .

وهذا ما أكدته دراسات كل من عادل شتا ١٩٨٦ ، ونوال الفار ١٩٨١ على أن التدليك من أفضل الوسائل المختارة للتخلص من التعب تأثيرا على تقليل نسبة تركيز حمض اللاكتيك في الدم .

هـ - تفسير تحسن التوافق العصبي العضلي

يقوم الجهاز العصبي بتوجيه عمل الجهاز الحركي من خلال الاتصال المباشر بينهما والذي تقوم به الأعصاب الحسية حيث تقوم الإشارات العصبية الحسية بنقل الإحساس من البيئة الخارجية والداخلية إلى الجهاز العصبي وبناء على هذه الإشارات التي يستقبلها الجهاز العصبي يقوم بدوره في توجيه الحركة والتحكم في أدائها من خلال الإشارات العصبية الحركية التي يرسلها إلى عضلات الجسم (١٥ : ٨٠) .

ونتيجة للمجهود البدني يحدث زيادة في توتر العضلات الأرادية نتيجة زيادة سرعة التنفس وزيادة سرعة دقات القلب ، وزيادة إفراز العرق وزيادة ضغط الدم وزيادة ارتعاش الأطراف مما يعوق التوافق الحركي المطلوب حيث يتطلب أنقباض بعض العضلات وأرتخاء العضلات المقابلة لها وتقل القدرة على الإرتخاء العضلي نتيجة للتعب ومن الجداول (٩) (٢١) (٢٢) يتضح أنه يوجد تحسن في التوافق العصبي العضلي يقترب من المعدل الطبيعي الذي كانت عليه الطالبة أثناء الراحة نتيجة تأثير التدليك الأنعاشي أي أن عمليات التدليك تزيد من النشاط الحيوي بالجسم ويتم نتيجة لذلك إفراز بعض الهرمونات والمواد مثل مادة الهستامين التي تنشط الدورة الدموية وهرمون الأدرينالين الذي ينشط عضلة القلب والتنفس ومادة الإستيل كولين الذي يقوم بدور وسيط هام في توصيل التنبه العصبي من نهاية العصب إلى العضلة

المتصلة به الذى يعمل على تنشيط العضلات والأنسجة المختلفة ويؤدى التدليك إلى توسيع الأوعية الدموية وتحسين عمليات التمثيل الغذائى ويساعد على تحسين عمليات توزيع الدم على الأجهزة العصبية المركزية والأعصاب الطرفية إذ أن الأوعية الشريانية التى تمد العضلات بالدم تعطى الفروع التى تغذى الأعصاب الصغيرة والكبيرة على السواء ، وبمساعدة التدليك يمكن التقليل من الإحساس بالألم وتحسين سرعة تأثير الأعصاب وقابلية توصيل الإشارات العصبية ويتفق هذا مع رأى كل من Rosentaln & Maggiord ١٩٨١ وآخرون فهم يرون أن العضلة التى تزيد كفاءتها بالعمل أو بالإستثارة الكهربائية سوف تنمو أسرع من خلال التدليك .

والتدليك يؤدى إلى أرتخاء ملحوظ للعضلة وبالتالي يؤدى إلى تحسين التوافق العصبى العضلى ويساعد العضلة على أداء وظيفتها بشكل أفضل .

و - تفسير تحسن EMG النشاط الكهربى البيولوجى للعضلات

يحدث الإنقباض العضلى نتيجة لإستقبال الليفة العضلية إشارة من الأعصاب الحركية مما يؤدى إلى تغير مفاجئ فى الحالة الكهربائية للعضلة وتنتشر موجه هذه الإشارة على طول الليفة العضلية وإلى داخلها لتصل إلى اللويحات التى تستجيب لذلك بالإنقباض ومن الجداول (١٠) (٢٣) (٢٤) يتضح أن مستوى النشاط الكهربائى البيولوجى قد أنخفض بعد المجهود البدنى نتيجة ظاهرة التعب الناتجة عن عدم أنفصال أجزاء اللاكتيتين عن المايوسين وبالتالي لا يحدث الإرتخاء العضلى فيؤدى هذا أنخفاض قوة الإنقباض العضلية .

وبعد إجراء التدليك الإنعاشى يقترب مستوى النشاط الكهربائى من المعدل الطبيعى الذى كانت عليه الطالبة أثناء الراحة لأن تدليك العضلات المجهدة لايعيد فقط قدرتها الأولى على العمل بل يزيد من هذه القدرة وقد أكدت بعض التجارب أن قدرة العمل للعضلات يمكن أن تزيد من ٥ : ٧ مرات بعد إجراء التدليك .

وأن زيادة حساسية الألياف العضلية للإستثارة بعد عمليات التدليك تجعل العضلات تتمدد ويمكن تفسير ذلك بتنبية خاص للألياف العصبية الدقيقة الكامنة فى سمك الحزم العضلية فالتدليك يحسن الدورة الدموية وعمليات إعادة التأكسد فى العضلات ويساعد على تدفق الدم للعضلة المدركة كما أنه يسرع بعزل نتائج التمثيل الغذائى ، كما بينت الملاحظات أن حالات التقلص العضلى والإحساس بالألم وبعد تدريبات مجهدة من الأمور التى يمكن التغلب عليها بمساعدة الطرق المختلفة للتدليك .

وهذا ما أكدته دراسات كل من زينب العالم وبيريوكوف وخالد نسيم بأن التدليك يحسن من التغذية الواصلة للعضلات وعليه يتحسن من نموها ويزيد من قوة العضلات ويجعلها أكثر مطاطية ويزيد من قدرتها على الإنقباض والإنبساط .