

النفاس

- النفاس • الخمج النفاسي
- منع الحمل • التعقيم

obeykandi.com

النفاس

The Puerperium

- ٣٠- ١. يصف التعريف الأكثر شيوعاً للنفاس أيًا من الفترات الزمنية التالية؟
- (أ) أسبوعان عقب الولادة
(ب) ٤ أسابيع عقب الولادة
(ج) ٦ أسابيع عقب الولادة
(د) ١٢ أسبوعاً عقب الولادة
- ٣٠- ٢. تشمل المميزات التشريحية النموذجية الدائمة لعنق الرحم عقب الولادة أيًا مما يأتي؟
- (أ) الفوهة الظاهرية أكثر اتساعاً
(ب) الفوهة الظاهرية ضيقة و نديبة
(ج) تضاعف طول العنق من سابق الحمل
(د) تقلص طول العنق للنصف من سابق الحمل
- ٣٠- ٣. كم عدد الأسابيع من بعد الولادة التي يأخذها الرحم للعودة لحجمه قبل الحمل؟
- (أ) ٢
(ب) ٤
(ج) ٦
- ٣٠- ٤. ما المصطلح مما يلي الذي يستخدم اصطلاحياً ليصف العملية التي فيها يتقلص و يضمم الرحم ليصل لحجمه قبل الحمل؟
- (أ) تَخْفِيفُ الضَّغْطِ decompression
(ب) تَقْفَعُ contracture
(ج) ترميم reparation
(د) أوب involution
- ٣٠- ٥. تشمل إحدى المميزات السريرية النموذجية للحَوَالِفُ (طَلْقُ بَلْوِي) أيًا من التالي؟
- (أ) تيراً بعد الأسبوع السابع من النفاس
(ب) تتطلب استخدام المسكنات
(ج) تفرج بالتدليك الرحمي
(د) تتفاقم بالرضاعة من الثدي
- ٣٠- ٦. قد تشير بالصواب على مريضتك النفاس بشأن الهلابة (السائل النفاسي) بأي من العبارات التالية؟
- (أ) ٢
(ب) ٤
(ج) ٦

- ٣٠- أ) تستمر الهلابة (السائل النفاسي) حمراء طوال مدتها
- ب) مستقل الرضاعة الطبيعية من مدة السريان الهلابي
- ج) قد يدوم السريان الهلابي حتى ٨ أسابيع في النفاس
- د) تطيل العملة الجنينية من أمد السريان الهلابي
- ٣٠- ٧. يتضمن أحد الأسباب الشائعة للأوب الجزئي (للرحم) أيا من التالي؟
- أ) خمج حوضي نفاسي
- ب) العملة الجنينية
- ج) موة السلى سابق الولادة
- د) انقطاع الرضاعة الطبيعية
- ٣٠- ٨. قد يعالج نزف الأوب الجزئي بأي مما يلي ماعدا:
- أ) إرجونوفين
- ب) تتراسيكلين
- ج) استروجين فموي
- د) ميشيل إرجونوفين
- ٣٠- ٩. أيا من العبارات التالية تحدد بشكل صحيح استخدام الكحت في علاج النزف النفاسي المتأخر؟
- أ) يجب استخدامه كعلاج في الخط الأول
- ب) يجب استخدامه بعد فشل العوامل الدوائية في إيقاف النزف
- ج) يجب استخدامه كوسيلة ناجعة في النسيج المشيمي المحتبس
- د) يجب استخدامه لكل من النزف الطفيف والغزير
- ٣٠- ١٠. شاورت مريضتك النفساء أن تتوقع زيادة في التبول خلال أي فترة زمنية للنفاس؟
- أ) أول ٢٤ ساعة
- ب) الأيام من ٢ إلى ٥
- ج) الأيام من ٥ إلى ٧
- د) من الأسبوع الأول إلى الثاني
- ٣٠- ١١. أيا من الآتي من مميزات المئانة النفساء؟
- أ) تمدد ناقص وإفراغ كامل
- ب) تمدد ناقص وإفراغ غير تام
- ج) تمدد مفرط وإفراغ كامل
- د) تمدد مفرط وإفراغ غير تام
- ٣٠- ١٢. أيا من التالي يترافق في أغلب الأحيان مع احتباس البول؟
- أ) ولادة بالملقط
- ب) ولادة متعجلة
- ج) استخدام تسكين بأكسيد النيتروز أثناء المرحلة الثانية من المخاض
- د) نزف نفاسي

- ٣٠- ١٣. أي مما يأتي نموذجيا لا يصاحب سلسُّ البول الإجهادي النفاسي؟
 (أ) استقالة المرحلة الثانية
 (ب) حجم رأس الجنين
 (ج) ولادة قيصرية
 (د) قص العجان
- ٣٠- ١٤. يعود نموذجيا معدل القلب و النتاج القلبي للمستويات الطبيعية في أي فترة زمنية بعد الولادة؟
 (أ) أسبوعان
 (ب) ٤ أسابيع
 (ج) ٦ أسابيع
 (د) ٨ أسابيع
- ٣٠- ١٥. تشاورت مع مريضتك النساء أن معظم النساء يسترجعن وزنهن قبل الحمل على مدى أي فترة زمنية بعد الوضع؟
 (أ) ٤ شهور
 (ب) ٦ شهور
 (ج) ٨ شهور
 (د) ١٢ شهرا
- ٣٠- ١٦. يحوي اللبن بالمقارنة بلبن ثدي الأم على مقدار أكبر من أي مما يأتي؟
 (أ) دهون
 (ب) معادن
- ٣٠- ١٧. أي مما يأتي لم يعين في لبن الثدي البشري؟
 (أ) إنترلوكين - ٦
 (ب) برولاكتين
 (ج) عامل نمو البشرة
 (د) فيتامين ك
- ٣٠- ١٨. تشمل التغيرات الهرمونية الأساسية أثناء النفاس الضرورية للرضاعة الطبيعية جميع ما يلي ما عدا:
 (أ) نقص في مستويات البروجستيرون
 (ب) زيادة في مستويات البرولاكتين
 (ج) زيادة في مستويات الاستروجين
 (د) زيادة في مستويات الأوكستوسين
- ٣٠- ١٩. يدعى أن الغلوبيولين مناعي A الموجود في لبن الثدي يقلل من خطورة أي من الأحوال التالية في أطفال رضاعة الثدي بالمقارنة بأطفال رضاعة القارورة؟
 (أ) العدوى المعوية
 (ب) العدوى التنفسية
 (ج) التهاب الأذن الوسطى
 (د) الربو
- ٣٠- ٢٠. لا توصي إدارة الأغذية والأدوية (FDA)

- ٣٠- ١٣. أي مما يأتي نموذجيا لا يصاحب سلسُّ البول الإجهادي النفاسي؟
 (أ) استقالة المرحلة الثانية
 (ب) حجم رأس الجنين
 (ج) ولادة قيصرية
 (د) قص العجان
- ٣٠- ١٤. يعود نموذجيا معدل القلب و النتاج القلبي للمستويات الطبيعية في أي فترة زمنية بعد الولادة؟
 (أ) أسبوعان
 (ب) ٤ أسابيع
 (ج) ٦ أسابيع
 (د) ٨ أسابيع
- ٣٠- ١٥. تشاورت مع مريضتك النساء أن معظم النساء يسترجعن وزنهن قبل الحمل على مدى أي فترة زمنية بعد الوضع؟
 (أ) ٤ شهور
 (ب) ٦ شهور
 (ج) ٨ شهور
 (د) ١٢ شهرا
- ٣٠- ١٦. يحوي اللبن بالمقارنة بلبن ثدي الأم على مقدار أكبر من أي مما يأتي؟
 (أ) دهون
 (ب) معادن

٣٠- ٢٣. تشمل العوامل التي يجب تجنبها مع الرضاعة الطبيعية جميع ما يلي ما عدا:

- (أ) النظائر المشعة
(ب) لقاحات ضد الفيروس النطاقي الحماقي
(ج) عوامل سامة للخلايا
(د) إرجوت قلوي

٣٠- ٢٤. تشمل الموجودات السريرية النموذجية بخصوص التهاب الثدي أيًا من التالي؟

- (أ) ألم شديد بالثدي
(ب) شمول كلا الثديين
(ج) التقدم لتكون خراج
(د) تقرح جلد الثدي

٣٠- ٢٥. ما أكثر العوامل المسببة لالتهاب الثدي انتشاراً؟

- (أ) العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus
(ب) التهاب البشرة
(ج) العنقودي Staphylococcus epidermitis
(د) المكورات المعوية Enterococci Group A
(د) العقدية مجموعة A Streptococcus

٣٠- ٢٦. يتضمن العلاج النموذجي لالتهاب الثدي أيًا من التالي؟

- (أ) عقاقير مضادة للميكروبات بالوريد
(ب) منع مضخة الثدي

باستخدام بروموكريبتين لتثبيط دُرُ اللَّبَنِ لأنه يصاحب أيًا من التالي؟

- (أ) التهاب كبدي
(ب) فشل كلوي
(ج) داء قلبي صمامي
(د) سكتة

٣٠- ٢١. تتضمن العبارات الصحيحة بشأن منع الحمل في النساء المرضعات أيًا من التالي؟

- (أ) يقلل ميدروكسي بروجيستيرون المُدَخَّر من نوعية لبن الثدي
(ب) لا تؤثر حَبَّات بروجيستن - فقط لتنظيم النسل على مقدار لبن الثدي
(ج) لا تؤثر حَبَّات استروجين - بروجيستن لتنظيم النسل على نوعية لبن الثدي
(د) لا تؤثر حَبَّات استروجين - بروجيستن لتنظيم النسل على مقدار لبن الثدي

٣٠- ٢٢. تمنع الرضاعة الطبيعية بالثدي مع أي عدوى للأم من الآتي؟

- (أ) التهاب كبدي ج (سي)
(ب) التهاب كبدي ب
(ج) درن فعال وغير معالج
(د) عدوى الفيروس المُصَحَّم للخلايا

- (ج) منع الإرضاع بالثدي
(د) عقاقير مضادة للجراثيم لمدة ١٠ إلى ١٤ يوماً
- ٣٠- ٣٠. وجدت مريضتك دامعة العينين أثناء مرورك في اليوم المقرر لخروجها من المستشفى و بالمزيد من الأسئلة كشفت عن مخاوفها حول العناية بالوليد. يكشف تاريخها عن عدم وجود علة نفسانية. تتضمن التدابير العلاجية الأكثر ملائمة لتلك المريضة أيًا من التالي؟
- (أ) استشارة من طبيب نفسي
(ب) بعث الطمأنينة في نفس المريضة أن مزاجها سيتحسن خلال ٢ إلى ٣ أيام
(ج) ابدأ مع مشط انتقائي لاسترُداد سيرُوثونين (SSRI)
(د) إطالة مدة بقائها بالمستشفى لملاحظة علامات اكتئاب شديد
- ٣٠- ٣١. أصيبت مريضتك باعتلال الأعصاب نتيجة لإصابة اثر الولادة. وقد تشاورت معها حول المدة الوسطية للأعراض أنها أيًا مما يأتي؟
- (أ) شهر
(ب) شهرين
(ج) ٦ شهور
(د) ١٢ شهرا
- ٣٠- ٣٢. ما التَّحْصِين من الآتي يجب عدم إعطائه
- (ج) منع الإرضاع بالثدي
(د) عقاقير مضادة للجراثيم لمدة ١٠ إلى ١٤ يوماً
- ٣٠- ٢٧. أيًا من التالي فائدة مؤكدة للتجول الباكر في النفاس؟
- (أ) يعجل من إصلاح قص العجان
(ب) يخفف من خطورة الكتابة التالية للموضع
(ج) يقلل الإمساك
(د) يقصر مدة الهلابة (السائل النَّفَاسِي)
- ٣٠- ٢٨. مريضتك الآن ٦ ساعات بعد الولادة، علاماتها الحياتية في المعدل الطبيعي، جس رحيمها أعلى من مستوى السرة، وهي لم تفرغ مثانتها بعد، ماذا تتضمن الخطوة التالية لمعالجة تلك المريضة مما يلي؟
- (أ) تشجيع تناول السوائل
(ب) وضع قسطرة بولية
(ج) تدليك رحمي
(د) كمادات ثلج على العجان
- ٣٠- ٢٩. نموذجيا قد يكون ألم قص العجان الشديد خلال أول ٢٤ ساعة بعد الولادة علامة تحذيرية لأي من المشاكل التالية؟
- (أ) تلوث جرح قص العجان
(ب) احتباس البول
(ج) ورم دموي عجاني

بعد الوضع؟

- (أ) الخُناق - الكُزاز
(ب) غلُبولينٌ مناعيٌّ ضد D
(ج) لقاحُ الحصبةِ و النُكافِ و الحميراء
(د) لا قيود على أي منهم

٣٠-٣٣. متى يعود الطمث بطبيعته بعد الوضع

(بالأسابيع) في النسوة غير المرضعات؟

- (أ) ٤ إلى ٦
(ب) ٦ إلى ٨
(ج) ١٢ إلى ١٤
(د) ١٦ إلى ١٨

الخمج النفاسي

Puerperal Infection

- ٣١- ١. أي من العوامل التالية الأكبر مسئولية عن النقصان في وفيات الأمهات من خمج النفاس؟
- (أ) تزايد عدد وحدات الرعاية المركزة
(ب) الاستخدام المكثف للمزارع الجرثومية لتحديد نوع خمج النفاس
(ج) تطور مضادات الميكروبات
(د) تحسن تقنيات التعقيم حين الولادة و إغلاق الجروح
- ٣١- ٢. ما تعريف المرض النفاسي؟
- (أ) درجة الحرارة 38.0°C (100.4°F) أو أكثر في أي يومين أثناء العشرة أيام الأولى التالية للموضع باستثناء أول ٢٤ ساعة من النفاس
(ب) درجة الحرارة 39.0°C (102.25°F) أو أكثر في أي يومين أثناء الخمسة أيام الأولى التالية للموضع باستثناء أول ٢٤ ساعة من النفاس
- ٣١- ٣. أي من التالي أكثر الأسباب شيوعاً لحمى النفاس المستديمة؟
- (أ) الخصاص atelectasis
(ب) عدوى السبيل التناسلي
(ج) التهاب الحويضة والكلى
(د) تحلل الثدي
- ٣١- ٤. الحمى الحادة المرتفعة التي تظهر خلال أول ٢٤ ساعة من النفاس يكون سببها على الأرجح أي مما يلي؟
- (أ) تحلل الثدي
(ب) الخصاص

٣١- ٨. ما عامل الخطورة الوحيد الأهم لالتهاب

الرَّحِمِ النَّفَاسِيَّ؟

(أ) عدد الفحوص الحوضية

(ب) مدة المخاض

(ج) مدة تمزق الأغشية

(د) سبيل الولادة

٣١- ٩. أي من التالي يصاحب أكبر خطر لالتهاب

الرَّحِمِ النَّفَاسِيَّ بعد الولادة المهبلية؟

(أ) تمزق الأغشية لفترة ممتدة

(ب) مخاض ممتد

(ج) التهاب المشيمة و السلى أثناء الوضع

(د) تعدد الفحوص العنقية

٣١- ١٠. أي من التالي لا يعد من عوامل الخطورة

لالتهاب الرَّحِمِ النَّفَاسِيَّ للوضع بعد ولادة

قيصرية؟

(أ) تعدد الفحوص العنقية

(ب) المراقبة الجنينية الداخلية

(ج) لا تناسب رأسي حوضي

(د) مدة المخاض > ٨ ساعات

٣١- ١١. أي من العوامل التالية يرتبط بخطورة عالية

مع التهاب الرَّحِمِ النَّفَاسِيَّ بعد ولادة

قيصرية؟

(أ) ضعف التغذية

(ج) عدوى الحوض بالمتدثرة

(د) عدوى الحوض بالعقدويات مجموعة أ

(A)

٣١- ٥. كيف يمكن منع الانخماص atelectasis؟

(أ) السعال و التنفس العميق

(ب) التنفس العميق و تناول أسبرين

(ج) تجنب أفيورتيات المفعول للتسكين بعد

العمليات الجراحية

(د) تناول ثيوفيلين للوقاية

٣١- ٦. تتميز عادة الحمى الناشئة عن تحفُّل الثدي

بأي مما يلي؟

(أ) تزيد عن ٣٩.٠ م

(ب) تستمر > ٢٤ ساعة

(ج) تبدأ خلال ال ٢٤ ساعة الأولى من

النفاس

(د) تستمر < ٤٨ ساعة

٣١- ٧. في النساء النفساء؛ تتضمن عادة أول علامة

سريرية لالتهاب الحويضة و الكلبية الحاد أيًا

من التالي؟

(أ) صداع

(ب) ارتفاع في درجة الحرارة

(ج) علوص شللي

(د) بيلة دموية

- (أ) المشعرة المهبلية *Trichomonas vaginalis*
- (ب) العقديات مجموعة ب group B streptococcus
- (ج) الغاردنريلا المهبلية *Gardnerella vaginalis*
- (د) المنطورة البشرية *Mycoplasma hominis*

- (ب) فقر دم الأم
- (ج) البدانة
- (د) مستوى اقتصادي واجتماعي مرتفع

٣١- ١٢. استعمار ثقيل للمجرى المهبلي بأي نوع من الجراثيم التالية يتصاحب مع الحمج

٣١- ١٥. أي مما يلي يصاحب متلازمة السمية

التناسلي؟

- شبيهة - الصدمة؟
- (أ) العنقودية البشرية *Staphylococcus epidermidis*
- (ب) الإشريكية القولونية *Escherichia coli*
- (ج) عقديية بيتا حالة للدم مجموعة أ group A β-hemolytic streptococcus
- (د) الكلبسيلا الرئوية *Klebsiella pneumoniae*

- (أ) العقديية المقيحة *Streptococcus pyogenes*
- (ب) العقديية الرئوية *Streptococcus pneumoniae*
- (ج) العقديية القاطعة للدر *Streptococcus agalactiae*
- (د) الغاردنريلا المهبلية *Gardnerella vaginalis*

٣١- ١٦. أي من الكائنات التالية تشترك كسبب

للحمج التناسلي المتأخر؟

- (أ) النيسرية البنية *Neisseria gonorrhoeae*
- (ب) المتدثرة الحثرية *Chlamydia trachomatis*
- (ج) المشعرة المهبلية *Trichomonas vaginalis*
- (د) العصوانية البيضية *Bacteroides bivius*

٣١- ١٣. أي من الخصائص الميكروبيولوجية التالية

يتطابق مع التهاب الرّجيم التناسلي؟

- (أ) الجراثيم متوطنة في المسلك التناسلي الأنثوي
- (ب) تم عزل جراثيم من أنواع وحيدة
- (ج) تعدد الجراثيم المعزولة عالية فوعة بصورة نموذجية
- (د) الجراثيم من الأنواع الهوائية تعزل كلية

٣١- ١٧. أجرت مريضتك ولادة قيصرية منذ

يومين، درجة حرارتها ٣٩.٠ م. بالفحص وجدت إيلاما رحميا وهلاية كريبية الرائحة. بدأ الجرح سليما وبدون احمرارا. يشمل التدبير العلاجي الروتين

٣١- ١٤. أي من كائنات المسلك التناسلي الأسفل

التالية لا تترافق مع زيادة في الحمج التناسلي؟

لهذه المريضة أيًا من التالي؟

- (أ) الحصول على مزرعة مهبلية
 (ب) الحصول على مزرعة من الدم
 (ج) انتظار نتائج المزرعة للبدء في مضادات
 المكروبات
 (د) يجب أن يشمل اختيار مضادات
 المكروبات على تغطية للاهوائيات

يلي؟

- (أ) جراثيم مقاومة لمضادات المكروبات
 (ب) حُمى دوائية
 (ج) خراج حوضي
 (د) الخصاص

٣١- ٢١ ما الوصمة السريرية مما يلي التي كثيرا ما
 تستخدم لمراقبة التحسن في التهاب الرُجم

النفاسي؟

- (أ) درجة الحرارة
 (ب) عدد الكريات البيضاء
 (ج) الألم الباطني
 (د) رائحة الهلابة

٣١- ١٨ بالإضافة للحُمى؛ ما الموجودات
 السريرية التي عادة تصاحب التهاب الرُجم
 النفاسي؟

- (أ) غثيان وقيء
 (ب) إيلام حول الرحم
 (ج) مزرعة دم موجبة
 (د) وذمة فرجية

٣١- ٢٢ ما نظام مضادات المكروبات من التالي
 الذي يعد المقياس الذهبي الدوائي لالتهاب

الرُجم النفاسي؟

- (أ) أميسيلين + جنتاميسين
 (ب) جنتاميسين + كلينداميسين
 (ج) أميسيلين + كلينداميسين
 (د) أميسيلين + جنتاميسين + كلينداميسين

٣١- ١٩ ما مدة العلاج بمضادات المكروبات التي
 ينبغي على النساء بالتهاب الرُجم النفاسي
 مراعاتها؟

- (أ) حتى تختفي الحمى لمدة ٢٤ ساعة
 (ب) فترة ٥ أيام
 (ج) فترة ١٠ أيام
 (د) فترة ١٤ يوما

٣١- ٢٣ ما العبارة الصحيحة مما يلي بشأن
 الصفات الدوائية للجنتاميسين في علاج

التهاب الرُجم النفاسي؟

- (أ) جرعة واحدة يوميا من جنتاميسين لا

٣١- ٢٠ تشمل مضاعفات التهاب الرُجم النفاسي
 التي كثيرا ما تسبب استمرار الحمى أيًا مما

- أ) إعطاء جرعة واحدة من دواء مضاد للمكروبات قبل الجراحة
- ب) تنظيم إعطاء جرعات متعددة لدواء مضاد للمكروبات أثناء ال ٢٤ ساعة التالية للولادة
- ج) علاج قبل الولادة لداء المهبل الجرثومي اللاعرضي
- د) وضع علامة ميترونيدازول موضعيًا قبل العملية بالإضافة إلى مضاد مكروبي بالوريد للوقاية
- تنتج مستويات كافية في الدم
- ب) جرعة واحدة يوميًا من جنتاميسين لا تخفف الحاجة لقياس مستوى الدواء في الدم
- ج) جرعة واحدة يوميًا من جنتاميسين مع كلينداميسين بالمقارنة مع جرعات كل ٨ ساعات تعطي معدلًا أعلى للشفاء من التهاب الرحم
- د) جرعة واحدة يوميًا من جنتاميسين مع كلينداميسين بالمقارنة مع جرعات كل ٨ ساعات لهما نفس معدل الشفاء من التهاب الرحم
- ٣١- ٢٦ ما النسبة المئوية لمريضات التهاب الرحم النفاسي اللاتسي يستجبن لمضادات المكروبات خلال ٧٢ ساعة؟

- أ) ٢٥
- ب) ٥٠
- ج) ٧٥
- د) ٩٠

٣١- ٢٧. أي مما يأتي ليس من عوامل الخطر لحمج الجرح؟

- أ) تكون ورم دموي
- ب) فقر دم
- ج) فرط الدرقية
- د) السكري

٣١- ٢٤. الميزة الدوائية لإضافة مثبطات البيتا

لاكتاماز مثل سالباكتام لأدوية عائلة

البنسلين أنها تقلل أي مما يلي؟

أ) الحاجة لإضافة عامل ثان مضاد للمكروبات

ب) خطورة التفاعل الأرجي للبنسلين

ج) سمية الدواء المصاحبة للبنسلين

د) التصفية الكلوية للبنسلين

٣١- ٢٥. توصي الكلية الأمريكية لأطباء التوليد

والطب النسائي بأي من البروتوكول التالية

لمنع التهاب الرحم النفاسي عقب الولادة

القيصرية؟

- ٣١- ٢٨. ما أكثر سبب للتفتُّر اللفافي حدوثاً؟
 (أ) ضعف التقنية الجراحية
 (ب) العدوى
 (ج) البدانة
 (د) السعال
- ٣١- ٣٢. ما النظام المضاد للمكروبات المختار
 لالتهاب اللفافة الناخر؟
 (أ) سيفالوسبورين الجيل الثاني +
 جينتاميسين
 (ب) عامل بيتا- لاكتام + كلينداميسين
 (ج) جينتاميسين + كلينداميسين
 (د) أمبيسيلين + جينتاميسين
- ٣١- ٣٣. أي مما يلي يشاهد و بكثرة مع التهاب
 الصفاق النفاسي؟
 (أ) صمّل باطني واضح
 (ب) تمدد صئيل للمعي
 (ج) علوص شللي
 (د) ألم صئيل
- ٣١- ٣٤. تتضمن المميزات التقليدية للفلقمُون
 المجاورة للرحم أي مما يلي؟
 (أ) التهاب البهلّ شاملاً الرباط العريض
 على جانب واحد
 (ب) التهاب البهلّ شاملاً الحاجز المستقيمي
 المهبلي
 (ج) التهاب البهلّ شاملاً الأريطة الرحمية
 العجزية
- ٣١- ٢٩. أي مما يأتي من الموجودات السريرية
 الشائعة المصاحبة للتفتُّر اللفافي؟
 (أ) المظهر في اليوم الثاني من الجراحة
 (ب) ألخياص متزامن
 (ج) نزح مصلي دموي من الجرح
 (د) نزح غاطي من الجرح
- ٣١- ٣٠. أي من التالي ليس من عوامل الخطورة
 لالتهاب اللفافة الناخر؟
 (أ) البدانة
 (ب) فرط ضغط الدم
 (ج) السكري
 (د) صغر عمر الأم
- ٣١- ٣١. يتطلب العلاج النموذجي لالتهاب اللفافة
 الناخر بالإضافة لمضادات المكروبات
 الوريدية لأي مما يأتي أيضاً؟
 (أ) أنضار اللفافة
 (ب) دهن هلامة ميترونيدازول موضعياً
 على الجرح يومياً

التشخيصية القادمة في تقييم هذه المريضة
أيام من التالي؟

- (أ) اختبار تحدي الهيارين
(ب) تصوير مقطعي مُحوسَب
(ج) التصوير فوق الصوتي
(د) التصوير الشعاعي الباطني

٣١- ٣٨. أي مما يأتي سمة واصمة سريرية لامرأة
معها التهاب الوريد الخثاري الحوضي
الإلتائي النفاسي؟

- (أ) حمى مبهمه
(ب) ألم أسفل البطن
(ج) كتلة رحمية
(د) انتفاخ باطني

٣١- ٣٩. ما أكثر الأسباب شيوعاً لتقرُّر شق
العجان (بضع الفرج)؟

- (أ) فقر دم تال للوضع
(ب) فقر التغذية
(ج) العدوى
(د) إصلاح خاطئ لشق العجان

٣١- ٤٠. ما العامل غير المؤهَّب لتضعُّع شق
العجان؟

- (أ) فيروس الورم الحليمي البشري
(ب) التدخين

(د) يمتد التهاب الهلّل في معظم الأحيان
للأمام

٣١- ٣٥. ما العلاج الموصى به للفلغمون المجاورة
للرحم؟

- (أ) استئصال الرحم
(ب) دواء مضاد للمكروبات + هيارين
(ج) نزع بطريق الجلد
(د) دواء مضاد للمكروبات فقط

٣١- ٣٦. كثيراً ما يمتد التهاب الوريد الخثاري
الحوضي الإلتائي النفاسي ليشمل أيام من
التراكيب التالية؟

- (أ) الوريد الفخذي
(ب) الوريد المبيضي
(ج) الوريد الأجوْف السفلي
(د) الوريد الكلوي

٣١- ٣٧. أجرت مريضتك ولادة قيصرية منذ
٥ أيام، و في اليوم الثاني بعد الجراحة بدء
بجنتاميسين و كلينداميسين وريديا لوجود
علامات سريرية التهاب الرحم النفاسي. و
بالرغم من وجود تحسن في الألم الباطني و
الإيلام الرحمي مازالت تعاني من
ارتفاعات يومية في درجة حرارتها حتى
٣٩.٠ °م، يجب أن تتضمن الخطوة

٣١- ٤٣ يشمل حاليا العلاج الموصى به لخلل شق

العجان عقب التفزر أيا من التالي؟

(أ) إصلاح بسديلة مستقيمة بعد حوالي

أسبوع من التفزر

(ب) التام الجرح من خلال ندب ثانوي

(ج) إصلاح بإعادة مقارئة بعد حوالي

أسبوع من التفزر

(د) إصلاح بسديلة مستقيمة بعد حوالي ٣

شهور من التفزر

(ج) اضطرابات تخثرية

(د) سيلان

٣١- ٤١ أيا مما يلي ليس مكونا سريريا شائعا لتفزر

شق العجان؟

(أ) ألم

(ب) تَعَوُّطٌ مُدْمِي hematochezia

(ج) عُسْرُ التَّبَوُّلِ

(د) حمى

٣١- ٤٤ أيا من الخصائص السريرية التالية تترافق

نموجيا مع التهاب اللفافة الناخر الذي

يَتَسَبَّبُ فِي مُضَاعَفَةِ تَهْتِكِ عَجَانِي؟

(أ) يمتلك خاصية سريرية واضحة عن

العدوى السطحية للعجان

(ب) قد يمتد للفخذين

(ج) يمتلك معد وفيات حتى ١٥٪ بالرغم

من العلاج المكثف

(د) تتقدم الأعراض بسرعة خلال أول ٢٤

إلى ٤٨ ساعة عقب الولادة

٣١- ٤٢ منذ ثلاثة أيام ولدت مريضتك ولادة

مهبلية مَصْحُوبَةٌ بِمُضَاعَفَاتِ الْهَيْتَاكِ مِنْ

الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ وَهِيَ تَشْتَكِي الْآنَ مِنْ أَلَمٍ

عَجَانِي بِالرَّغْمِ مِنَ الْعِلَاجِ بِكِمَادَاتِ الثَّلْجِ

الموضعية و المسكنات الفموية. درجة

حرارتها ٣٨.٥ م°، أظهر الفحص البدني

عن حُمَامَةٍ وَجَسَاوَةٍ وَإِفْرَازَ صَدِيدِي

بموضع شق العجان. يجب أن تشمل

المعالجة السريرية لهذه المريضة أيا مما يلي؟

(أ) فتح شق العجان + عقار مضاد

للمكروبات وريديا

(ب) ملاحظة الجرح + عقار مضاد

للمكروبات وريديا

(ج) فتح شق العجان + معالجة مائية

(د) فتح شق العجان + عقار موضعي

مضاد للمكروبات واسع الطيف

٣١- ٤٥ ما البكتيريا المسؤولة عن متلازمة الصدمة

السمية من التالي؟

(أ) العُنُقُودِيَّةُ الدَّهْيِيَّةُ Staphylococcus

aureus

(ب) العُنُقُودِيَّةُ البَشْرُويَّةُ Staphylococcus

epidermidis

(ج) العُنُقُودِيَّةُ المُقَيِّحَةُ Streptococcus
pyogenes

(د) العُنُقُودِيَّةُ السَّمِيَّةُ Staphylococcus toxi

٣١- ٤٦. قد تشمل الموجودات السريرية لمتلازمة

الصدمة السمية في مراحلها المبكرة أيًا مما

يلي؟

(أ) طفح حُمَامَوِيٌّ

(ب) التَّيْهَابُ الْمُتَتَجِّمَةُ

(ج) دُورَارٌ vertigo

(د) طفح جلدي حَلْثِيٌّ الشُّكْلُ

٣١- ٤٧. يتضمن العلاج النموذجي السريرية

لمتلازمة الصدمة السمية إعطاء أي مما يأتي؟

(أ) غُلوْبُولِينٌ مَنَاعِيٌّ مُبَاشِرَةٌ صَدَّ الذِّيفَانِ

الخَارِجِيٍّ لِلْعُنُقُودِيَّةِ الدَّهْيِيَّةِ

(ب) غُلوْبُولِينٌ مَنَاعِيٌّ مُبَاشِرَةٌ صَدَّ الذِّيفَانِ

الدَّاخِلِيٍّ لِلْعُنُقُودِيَّةِ الدَّهْيِيَّةِ

(ج) قَطْطٌ سَوَائِلٌ بِالْوَرِيدِ

(د) سَوَائِلٌ بِالْوَرِيدِ وَ مَضَادَاتُ المَكْرُوبَاتِ

٣١- ٤٨. يشمل الشفاء من متلازمة الصدمة السمية

تقليدياً أيًا مما يلي؟

(أ) الخَفَاضُ الحَرَارَةِ

(ب) تَوَسُّفُ الجِلْدِ

(ج) إِسْهَالٌ مَائِيٌّ

(د) طَّنِينٌ

obeyikandi.com

منع الحمل Contraception

- ٣٢- ١. ما النسبة المثوية للمراهقات اللاتي يتوقفن عن استخدام خدمات الرعاية الصحية الجنسية إذا تطلبت إخبار الوالدين؟
- (أ) ١٠
(ب) ٢٠
(ج) ٤٠
(د) ٦٠
- ٣٢- ٢. لأي مجموعة عمرية يحمل الإجهاض خطراً متزايداً للموت بالمقارنة مع الحمل؟
- (أ) ١٥ إلى ١٩ عاماً
(ب) ٢٥ إلى ٢٩ عاماً
(ج) ٤٠ إلى ٤٤ عاماً
(د) غير حقيقي لأي مجموعة عمرية
- ٣٢- ٣. في غياب وسائل منع الحمل؛ ما النسبة المثوية للنساء ذوات خصوبة ونشاط جنسي اللاتي يحملن خلال عام واحد؟
- (أ) ٩٠
- ٣٢- ٤. كلما اقترب الإياس؛ ما الذي يتنبأ بثقة بتوقف الإباضة؟
- (أ) انقطاع الطمث
(ب) ارتفاع مستويات موجبات القند
(ج) هبات الحرارة
(د) لا شيء مما سبق
- ٣٢- ٥. ما وسيلة منع الحمل الأكثر استعمالاً من النساء في الولايات المتحدة (بكسينينيو و موشيرس ١٩٩٨)؟
- (أ) تعقيم الأنثى
(ب) لَوْلَبٌ رَجِيمِيٌّ (جَهِيْزَةٌ دَاخِلَ الرَّحْمِ)
(ج) العازل الذكرِي
(د) موانع الحمل الفموية

٣٢- ٦. أي من وسائل الحمل الآتية مع الاستخدام الأمثل تحمل أعلى معدل للفشل خلال

العام الأول من الاستخدام؟

(أ) الواقي الذكري

(ب) حبوب بروجستيرون - فقط

(ج) مبيدات النطف

(د) العزل (الإنتراج)

٣٢- ٧. ما معدل الفشل المعهود من ديوبروفيرا

(بالحقن) أثناء العام الأول من الاستخدام؟

(أ) ٠.٠٣٪

(ب) ٠.٣٪

(ج) ١.٠٪

(د) ٣.٠٪

٣٢- ٨. ما آلية عمل موانع الحمل الفموية؟

(أ) منع الإباضة

(ب) إعاقاة مرور الحيمن للرحم

(ج) جعل بطانة الرحم غير ملائمة للغرس

(د) جميع ما سبق

٣٢- ٩. أي من الاستروجينات التالية يستخدم في

موانع الحمل الفموية؟

(أ) استرون

(ب) إيثينيل استراديول

(ج) استريول

(د) إكويلين

٣٢- ١٠. ما فاعلية إيثينيل استراديول بالمقارنة إلى

ميسترانول؟

(أ) فاعلية متساوية

(ب) أكثر فاعلية ب ١.٢ إلى ١.٥ مرة

(ج) أكثر فاعلية ب ٢.١ إلى ٢.٣ مرة

(د) أضعف ب ٠.٤ إلى ١.٥ مرة

٣٢- ١١. لكل ماعدا واحد من بروجستين موانع

الحمل الفموية هي مشتقات من أي

ستيرويد؟

(أ) أندروستندويون androstenedione

(ب) ١٧ - هيدروكسي تستوستيرون

(ج) ١٩ - نورتستوستيرون

(د) سيرونولاكتون

٣٢- ١٢. ما أثر المكون البرجستروني لموانع الحمل

الفموية؟

(أ) يخفض مستويات تستوستيرون الطليق

(ب) يزيد نشاط مُحْتَرِة الألفا - ٥

(ج) يخفض مستويات بولاكتين

(د) يزيد مستويات ثنائي

هيدروتيستوستيرون

٣٢- ١٣. تملأ أساسا أقل جرعة مقبولة من إيثينيل

- استراديول في موانع الحمل الفموية بحدوث أي مما يأتي؟
- (أ) العُدَّة (حب الشباب)
 (ب) نَزْفٌ اخْتِرَاقِيٌّ
 (ج) عسر الطمث
 (د) صداع
- ٣٢- ١٧. أي مما يلي يزداد بتناول موانع الحمل الفموية؟
- (أ) كثافة العظام
 (ب) سرطان بطانة الرحم
 (ج) سرطان المبيض
 (د) التهاب قنوات فالوب
- ٣٢- ١٤. أي الدوائيين يقللا من فعالية موانع الحمل الفموية؟
- (أ) أسبرين و ايبوبروفين
 (ب) إريثروميسين و سيفترياكسون
 (ج) ريفاميسين و فينيتوين
 (د) بروبرانولول و أيزونيازيد
- ٣٢- ١٨. في المريضة التي تتناول موانع الحمل الفموية ؛ أي مما يلي يزداد؟
- (أ) ثيروكسين البلازما
 (ب) كورتيزول البلازما
 (ج) ترانزكورتين
 (د) جميع ما سبق
- ٣٢- ١٥. يزداد الاستخدام الشاذ لأي من الفيتامينات التالية من احتمالية النزف الاختراقي أثناء استخدام موانع الحمل الفموية؟
- (أ) A
 (ب) B
 (ج) C
 (د) K
- ٣٢- ١٩. موانع الحمل الفموية لا تسبب و لكن قد تسرع في أي مما يأتي؟
- (أ) تَصَلُّبٌ عَصِيديٌّ
 (ب) تَكَوُّنٌ وَرَمٍ عُنَقِيٍّ
 (ج) مرض المرارة
 (د) سرطان المبيض
- ٣٢- ٢٠. بعد كم سنة من تناول موانع الحمل
١٦. في النساء اليافعات السليمات ؛ أي من الأنشطة التالية الأقل احتمالا في التسبب في الوفاة؟

- الفموية يزداد خطر سرطان عنق الرحم الغزوي؟
- (أ) ١
(ب) ٢
(ج) ٥
(د) ١٠
- ٣٢- ٢٤ يزداد خطر السكتة مع استخدام موانع الحمل الفموية إذا وجد أيا من تَمِيم العامل التالي؟
- (أ) ارتفاع ضغط الدم
(ب) الشقيقة (الصداع النصفي)
(ج) التدخين
(د) جميع ما سبق
- ٣٢- ٢١ ما العلاقة بين استخدام موانع الحمل الفموية و سرطان الثدي؟
- (أ) السرطان أكثر عدوانية
(ب) زيادة الخطورة مع التاريخ العائلي لسرطان الثدي
(ج) تباين الخطورة تبعاً لنوع البروجسترون المستخدم
(د) لا علاقة واضحة
- ٣٢- ٢٥ ما العلاقة التي يظهرها استخدام موانع الحمل الفموية إلى احتشاء عضل القلب طبقاً للمعلومات التالية؟
- (أ) لا تزداد الخطورة في غير المدخات
(ب) تزداد الخطورة في كل من المدخات و غير المدخات
(ج) لا تزداد الخطورة في أي طائفة
(د) تزداد الخطورة في غير المدخات فوق عمر ٣٥ سنة
- ٣٢- ٢٢ أياً مما يأتي يزداد في غير المدخات الصحيحات اللاتي يتناولن موانع الحمل الفموية؟
- (أ) السكري
(ب) احتشاء عضل القلب
(ج) سكتات
(د) خثار وريدي
- ٣٢- ٢٦ يُظن حالياً أن موانع الحمل الفموية تتسبب في أي من العيوب الخلقية التالية؟
- (أ) تشوهات نقص الأطراف
(ب) التباس جنسي
- ٣٢- ٢٣ ارتفاع ضغط الدم المصاحب لاستخدام موانع الحمل الفموية يرتبط مع زيادة إنتاج أيا مما يلي؟

- (ج) تشوهات قلبية
(د) لا علاقة مع أي عيب
- (ج) تبادل نُصُج البطانة الرحمية
(د) تزيد من حدوث كيسات المبيض
- ٣٢- ٢٧. تصاحب موانع الحمل الفموية زيادة في حدوث أي مما يلي؟
(أ) عُدَّة (حَبُّ الشَّباب)
(ب) كَلْف
(ج) خُمج HIV
(د) وَرَمٌ عَصَلِيٌّ رَحِمِي
- ٣٢- ٢٨. أي مما يلي عامل اختطار لاستعادة الإباضة في أقل من ٦ أسابيع بعد انتهاء الحمل؟
(أ) إجهاض
(ب) إِرْضَاعٌ مِنَ التُّدِي
(ج) تعدد الحمل
(د) الانفعال
- ٣٢- ٣١. أي مما يأتي مِيزَة لحبات بروجستين - فقط بالمقارنة مع موانع الحمل الفموية المركبة؟
(أ) كيسات مبيض أقل
(ب) نَزْفٌ اخْتِرَاقِيٌّ أَقْلُ
(ج) أكثر أماناً في حالة وجود عوامل خطورة قلبية وعائية
(د) نسبة حدوث حمل هاجر أقل إذا فشلت الوسيلة
- ٣٢- ٣٢. ما أقوى موانع لاستخدام موانع الحمل بروجستين - فقط الفموية؟
(أ) تدخين السجائر
(ب) الاكتئاب
(ج) ارتفاع بسيط لضغط الدم
(د) نزف رحمي غير مفسر
- ٣٢- ٣٣. ما جرعة منع الحمل لميدروكسي بروجستيرون المُدَخَّرِيٌّ؟
(أ) ٥٠٠ مجم كل ٣ شهور
(ب) ١٠٠ مجم كل ٣ شهور
(ج) ١٥٠ مجم كل ٣ شهور
(د) ٢٠٠ مجم كل ٣ شهور
- ٣٢- ٢٩. أي مما يأتي ليس من موانع الاستعمال المطلقة لموانع الحمل الفموية؟
(أ) نزف تناسلي شاذ
(ب) مرض كبدي نشط
(ج) صداع نصفي
(د) انصمام خُثَارِيٍّ سابق
- ٣٢- ٣٠. أي مما يلي ليس صحيحاً بشأن حبات منع الحمل بروجستين - فقط؟
(أ) تثبط مُعَوَّلِيَّةَ الإباضة
(ب) تُبَدِّلُ المخاط العنقي

- ٣٢- ما النسبة المئوية للنساء اللاتي ينقطع لديهن الطمث بعد ٥ سنوات من استخدام البروجستين المدخر؟
- (أ) ١٠
(ب) ٣٠
(ج) ٥٠
(د) ٨٠
- ٣٢- ما الذي يزيد مع موانع الحمل ليونيل بالمقارنة مع بروجستين الادخاري؟
- (أ) النزف الاختراقي
(ب) مضاعفات قلبية وعائية
(ج) تأخر استعادة الخصوبة
(د) تكرار الحقن
- ٣٢- ما مساوئ موانع الحمل بالبروجستين الحقن؟
- (أ) نزف غير منتظم
(ب) تأخر استعادة الخصوبة
(ج) الحاجة لزيارة مقدم للرعاية الصحية لأجل الحقن
(د) جميع ما سبق
- ٣٢- ٣٦. أي جانب من استخدام حقن البروجستيرون مقلق على وجه الخصوص في اليافعات والمراهقات؟
- (أ) نقصان كثافة المعادن في العظم
(ب) زيادة خمج الحوض
(ج) العد يزداد سوءا
(د) زيادة خطر سرطان الرحم
- ٣٢- ٣٧. ما السبب الأولي لعدم توافر غرسة بروجستين موانع الحمل؟
- (أ) معدل الفشل كمانع للحمل
(ب) ارتفاع سعره
(ج) صعوبة الإدخال و الإزالة
(د) التقاضي
- ٣٢- ٣٨. ما الذي يزيد مع موانع الحمل ليونيل بالمقارنة مع بروجستين الادخاري؟
- (أ) النزف الاختراقي
(ب) مضاعفات قلبية وعائية
(ج) تأخر استعادة الخصوبة
(د) تكرار الحقن
- ٣٢- ٣٩. متى يحتاج لاستبدال جهيزة ميرينا داخل الرحم؟
- (أ) كل سنة
(ب) كل سنتين
(ج) كل ٥ سنوات
(د) كل ١٠ سنوات
- ٣٢- ٤٠. متى يحتاج لاستبدال جهيزة باراجارد داخل الرحم؟
- (أ) سنويا
(ب) كل ٥ سنوات
(ج) كل ١٠ سنوات
(د) كل ٢٠ سنة

- ٣٢- ٤١. أيًا مما يأتي ليس من مكونات جَهيزَة ميرينا داخل الرَّحْمِ؟
- (أ) نحاس
(ب) ليفونورجستريل
(ج) بولي إيثيلين
(د) بولي داي ميثيلسيلوكسان
- ٣٢- ٤٢. أيًا مما يلي ليس من آليات عمل جَهيزَة النحاس داخل الرَّحْمِ؟
- (أ) مُبيدُ النُّطاف
(ب) منع الإباضة
(ج) تفاعل التهابي موضعي لبطانة الرحم
(د) منع الإخصاب
- ٣٢- ٤٣. تصاحب جَهيزَة البروجستين داخل الرَّحْمِ أيًا مما يلي؟
- (أ) زيادة فقد الدم الطمثي
(ب) ضمور لبطانة الرحم
(ج) عسر الطمث
(د) أورام عضلية رحمية
- ٣٢- ٤٤. ما معدل ثقب الرحم أثناء إيلاج اللولب الرحمي؟
- (أ) ١ في ١٠٠
(ب) ١ في ١٠٠٠
(ج) ١ في ١٠٠٠٠
- ٣٢- ٤٥. ما النسبة المئوية للنساء المستخدمات اللولب الرحمي نحاس T ٣٨٠ A و ينزعنه بسبب غزارة الطُمث؟
- (أ) ٢ إلى ٥
(ب) ١٠ إلى ١٥
(ج) ٢٠ إلى ٢٥
(د) ٣٠ إلى ٣٥
- ٣٢- ٤٦. ما الذي يميز خطورة العدوى الرحمية في مستخدمات اللولب الرحمي بالمقارنة بغير المستخدمات مما يلي؟
- (أ) زيادة الخطورة مع مدة استخدام IUD
(ب) زيادة خطر العدوى أثناء أول ٢٠ يوما بعد الإيلاج
(ج) زيادة خطر العدوى للعام الأول من استخدام IUD
(د) لا زيادة في خطر العدوى
- ٣٢- ٤٧. ما نسبة حدوث التعرف على مكونات شبيهة - الشععية actinomyces-like على مسحة Pap في النساء باللولب الرحمي؟
- (أ) ٠.٧٪
(ب) ١.٠٪
(ج) ٧.٠٪

- ٣٢- ما أنسب علاج لامرأة حامل في ٨ أسابيع ويرى خيط اللولب الرحمي نحاس T_٣٨٠ من عنق الرحم؟
- (أ) مضادات حيوية
(ب) إجهاض
(ج) نزع اللولب الرحمي
(د) لا عمل
- ٣٢- ٤٩ ما معدل الإجهاض التقريبي إذا ترك اللولب الرحمي في موضعه أثناء الحمل؟
- (أ) ١٠٪
(ب) ٢٥٪
(ج) ٥٠٪
(د) ٧٥٪
- ٣٢- ٥٠ ما معدل الإجهاض التقريبي إذا نزع اللولب الرحمي من موضعه في الحمل الباكر بدون ابطاء؟
- (أ) ١٠٪
(ب) ٢٥٪
(ج) ٥٠٪
(د) ٧٥٪
- ٣٢- ٥١ أي مما يلي ليس مانعا مطلقا لاستعمال اللولب الرحمي؟
- (أ) التهاب البوق النشط أو الحديث
(ب) حمل
(ج) نزف رحمي غير مشخص
(د) قيصرية سابقة
- ٣٢- ٥٢ ما مانع الاستخدام الخاص بتهيئة البروجستين داخل الرحم؟
- (أ) عسر الطمث
(ب) تاريخ حمل هاجر
(ج) أخصام خثاري سابق
(د) داء ولسون
- ٣٢- ٥٣ استخدام أي مما يأتي قد ينقص فعالية العازل الذكري؟
- (أ) مبيد للنطف داخل المهبل
(ب) مزلق زيتي القاعدة
(ج) مستودع الطرف
(د) مزلاقات مبيدة للنطف
- ٣٢- ٥٤ ما ميزة عوازل البولي يوريثان مقارنة بعوازل اللاتكس؟
- (أ) تقليل معدل الانكسار
(ب) تفاعلات حساسية أقل
(ج) معدل فشل أقل
(د) لا شيء مما سبق

- ٣٢- ٥٥ ما معدل انكسار العازل الأثوي؟
- (أ) $> 1\%$
- (ب) 3%
- (ج) 5%
- (د) 9%
- (أ) التهاب عنق الرحم
- (ب) قيلة متائية
- (ج) مرض التهاب الحوض
- (د) خمج الجهاز البولي

٣٢- ٦٠ حتى كم ساعة قبل الجماع يمكن إيلاج

إسْفَنْج منع الحمل (اليوم TODAY)؟

- (أ) ساعة واحدة
- (ب) ٦ ساعات
- (ج) ١٢ ساعة
- (د) ٢٤ ساعة

٣٢- ٥٦ ما مدة أقصى فعالية لمبيدات النطف؟

- (أ) ساعة واحدة
- (ب) ٦ ساعات
- (ج) ٨ ساعات
- (د) ٢٤ ساعة

٣٢- ٥٧ أي مما يأتي يزداد مع استخدام مبيدات

النطف؟

٣٢- ٦١ أي من التالي ليس شكلا من أشكال

الامتناع الدوري كاسلوب لتنظيم الأسرة؟

- (أ) التواتر التقويمي
- (ب) طريقة المخاط العنقي
- (ج) الأعراض الحرارية
- (د) الانسحاب

- (أ) عيوب الأنبوب العصبي
- (ب) عيوب نقصان الأطراف
- (ج) متلازمة داوون
- (د) لا شيء مما سبق

٣٢- ٥٨ ما أقل مدة من الوقت بعد الجماع ينبغي

للحجاب الأثوي أن يبقى في موضعه؟

٣٢- ٦٢ متى تبحث المراهقات في المعهود عن منع

الحمل في ما يتعلق ببدء النشاط الجنسي؟

- (أ) قبله بأسابيع قليلة
- (ب) قبله بأشهر قليلة
- (ج) بعده بأسابيع لأشهر قليلة
- (د) بعده بعام أو أكثر

- (أ) ساعتين
- (ب) ٦ ساعات
- (ج) ١٢ ساعة
- (د) ١٨ ساعة

٣٢- ٥٩ نسبة حدوث أي مما يلي تزداد قليلا مع

استخدام الحجاب الأثوي؟

٣٢- ٦٣ ما نوع مانع الحمل الذي يقدم أفضل ميزة

- للمراهقات؟
- أ) موانع الحمل الفموية
- ب) بروجستين الادرخاري
- ج) جهمزة داخل الرحم
- د) مبيدات النطف
- ٣٢- ٦٦. بأي نسبة تقلل موانع الحمل الطارئة من
اختطار الحمل؟
- أ) ٢٥
- ب) ٥٠
- ج) ٧٥
- د) ١٠٠
- ٣٢- ٦٤. ما النسبة المثوية لإنهاء الحمل في النساء
اللاتي عمرهن ٤٠ سنة أو أكثر؟
- أ) ١٥
- ب) ٣٥
- ج) ٦٥
- د) ٩٥
- ٣٢- ٦٧. ما الآلية التي بها يقدم
ميفيرونستون (RU486) منع للحمل بعد
جماع؟
- أ) يُناهض البروجسترون
- ب) مضاد للبروستاجلاندين
- ج) يقيد إنتاج البروجسترون
- د) يحدث نشاطا للمجسيم الحال لبطانة
الرحم
- ٣٢- ٦٥. أيها من التالي حقيقي بشأن منع الحمل
الطارئ (EC)؟
- أ) الاستعداد المسبق المحسن لـ EC يقلل
من استخدام موانع الحمل الروتينية
- ب) توليفة استروجين - بروجستين
EC أكثر فاعلية من بروجستين - فقط
EC
- ج) يجب أخذ EC خلال ٧٢ ساعة من
جماع بلا وقاية لتحقيق الفاعلية

التعقيم

Sterilization

- ٣٣- ١. ما أكثر أشكال موانع الحمل شعبية في الولايات المتحدة؟
- (أ) الواقي الذكري
(ب) موانع الحمل الفموية
(ج) اللوالب الرحمية
(د) التعقيم
- ٣٣- ٢. تجرى نصف عمليات التعقيم الأنبوبي على الأقل بالتزامن مع أي مما يلي؟
- (أ) استئصال المرارة
(ب) استئصال الرحم
(ج) ولادة تُولدِيَّة
(د) استئصال الأُسهر
- ٣٣- ٣. ما إجراء تعقيم البوق النفاسي الأقل احتمالاً للفشل ولكن الأكثر صعوبة في الاتجاز؟
- (أ) بوميروي
(ب) ارفنج
- ٣٣- ٤. يعتمد نجاح إجراء بوميروي على استخدام أي نوع من الربطات؟
- (أ) خَيْط جِراحي كرومي
(ب) خَيْط جِراحي بسيط
(ج) بَلْمَر تَخْلِيقي
(د) حرير
- ٣٣- ٥. يقارب معدل الفشل للتعقيم الأنبوبي نوع باركلاند أياً من التالي؟
- (أ) ١ في ٥٠
(ب) ١ في ١٠٠
(ج) ١ في ٢٠٠
(د) ١ في ٤٠٠
- ٣٣- ٦. ما المعدل الحالي للوفيات المرتبط مباشرة بالتعقيم بالتنظير الباطني؟
- (ج) باركلاند
(د) استئصال الحَمَل (البوقي)
- ٣٣- ٤. يعتمد نجاح إجراء بوميروي على استخدام

٣٣- ١٠. أيًا من تقنيات التعقيم الأنبوبي التالية لها أعلى معدل لخطر الحمل الهاجر عند الفشل؟

- (أ) المشابك
(ب) تَحْثِيرٌ كَهْرَبِيٌّ
(ج) حلقات
(د) قطع الأنبوب

- (أ) ١.٥ في ١٠٠٠٠٠
(ب) ١.٥ في ١٠٠٠٠
(ج) ١.٥ في ١٠٠٠
(د) ١.٥ في ١٠٠

٣٣- ١١. أيًا مما يأتي الأكثر احتمالًا للحدوث عقب التعقيم الأنبوبي؟

- (أ) عسر الطمث : بداية جديدة أو زيادة
(ب) نزف قُرْبِيٌّ
(ج) غَزَارَةُ الطَّمْثِ
(د) عدم تغير مقدار الطمث

- (أ) مضاعفات تحذيرية
(ب) ألم حوضي مزمن
(ج) إصابة تركيبات مجاورة
(د) فشل التعقيم

٣٣- ١٢. قد يكون لوجود المعطيات التي تقترح التعقيم الأنبوبي تأثيرات مفيدة لأي مما يلي؟

- (أ) معدلات سرطان المبيض
(ب) خطر التهاب البوق
(ج) الرضاء الجنسي
(د) جميع ما سبق

- (أ) ١ في ١٠
(ب) ١ في ١٠٠
(ج) ١ في ١٠٠٠
(د) ١ في ١٠٠٠٠

٣٣- ١٣. ما النسبة المئوية للنسوة اللاتي يبدن ندمهن عقب أيًا من تعقيم أنبوبي أو إستئصال الأسنهر لأزواجهن؟

٣٣- ٧. أيًا مما يلي ليس من المضعفات الوطنية للتعقيم الأنبوبي بالتنظير الباطني؟

- (أ) مضاعفات تحذيرية
(ب) ألم حوضي مزمن
(ج) إصابة تركيبات مجاورة
(د) فشل التعقيم

٣٣- ٨. كم مرة يجري شق غير مخطط للبطن عند محاولة إجراء تعقيم بالتنظير الباطني؟

- (أ) ١ في ١٠
(ب) ١ في ١٠٠
(ج) ١ في ١٠٠٠
(د) ١ في ١٠٠٠٠

٣٣- ٩. قد يحدث فشل التعقيم الأنبوبي كنتيجة لأي من التالي؟

- (أ) تكون ناسور
(ب) عدم انطباق الأجهزة الآلية بالكامل
(ج) تَحْثِيرٌ غير كاف مع بالطرق ثنائية القطب
(د) جميع ما سبق

- ٣٣- ١٧ ما مساوي استئصال الأسهر؟
- (أ) فقد النطف
- (ب) زيادة العناية
- (ج) الاعتكاس غير ممكن
- (د) لا يتم التعقيم على الفور

- (أ) > ١٠
- (ب) ٢٠
- (ج) ٥٠
- (د) ٨٠

- ٣٣- ١٨ ما معدل النجاح التقريبي لاعتكاس استئصال الأسهر؟

- (أ) ١٥ %
- (ب) ٥٠ %
- (ج) ٧٥ %
- (د) ٩٠ %

- ٣٣- ١٤ بعد اعتكاس التعقيم الأنبوبي ما النسبة المثوية للنساء اللاتي سيصيبن حملهاجر؟

- (أ) ١٥
- (ب) ١٠
- (ج) ٥٠
- (د) ٩٠

- ٣٣- ١٩ عقب استئصال الأسهر : ما العبارة الصائبة؟

- (أ) غالبا يتعرف على أجسام مضادة للحيوانات المنوية
- (ب) تكثر أمراض المناعة الذاتية
- (ج) يتسارع تصلب الشرايين
- (د) يزداد سرطان الخصية

- ٣٣- ١٥ ما التراكيب التي يقطعها استئصال الأسهر على كلا الجانبين؟

- (أ) البربخ epididymis
- (ب) الحويصلة المنوية seminal vesicle
- (ج) الأسهر vas deferens
- (د) قناة وولف Wolffian duct

- ٣٣- ٢٠ أي مما يلي له ترابط ضعيف مع استئصال الأسهر؟

- (أ) سرطان المثانة
- (ب) سرطان البروستاتة (الموتة)
- (ج) سرطانة الخلايا الكلووية
- (د) سرطان الخصية

- ٣٣- ١٦ مقارنة مع استئصال السهر أي مما يأتي يرتفع مع التعقيم الأنبوبي للأنثى؟

- (أ) معدل المضاعفات
- (ب) التكلفة
- (ج) معدل الفشل
- (د) جميع ما سبق