

الثدييات

الحفاشية

الحفاش أو الوطواط حيوان لبون من رتبة مجنحة الأيدي .
ويوجد في مصر منه أنواع كثيرة تسكن المعابد القديمة والأماكن
الخربة ، ومنها أنواع تتغذى على الثمار وأنواع أخرى تقتات على
الحشرات ولهذه الحيوانات بيوت شتوى ولها ثديان على المنطقة
الصدرية ، وقد تكون حلبة الثدي كبيرة ولذا تتمكن الصغار من
التشبث بصدر أمها وقت الطيران .

وتلد عادة في شهر فبراير ومارس ولا يتم الإخصاب وقت
التزاوج إلا في القرن اليساري للرحم وقيل عن الأنواع المصرية
أنها قد تهاجر في الشتاء إلى الجنوب .

تعرف تحت هذه الرتبة دون ما استثناء كل الحيوانات التي
تعيش على الحشرات الضارة بالمحاصيل وهذه الرتبة تحتوى غالباً
أنواعاً من الحيوانات الصغيرة وهي عموماً أصغر الحيوانات
اللبونة وأغلبها حيوانات ليلية تعيش تحت سطح الأرض في
جحور من صنع أيدينا، وأسنانها معدة لاقتناص الحشرات ولذا
فهي مديبة ، ويوجد منها في مصر .

القنفذ *Erinaceus auritus* وهو أكبر من الجرذ قليلا
وعليه أشواك وله حول جسمه عضل ممتد يحيط بجوانبه يمكنه
من أن ينطوى على نفسه فيصبح كاه كأنه كرة من الشوك
تحميه من أعدائه ، وهو منتشر في الحقول والحدائق ويتغذى
على الحشرات ويعتقد الناس أن أشواكه تشفى المرضى بالحمى
عند حرقها والتبخر بها وهو زعم فاسد يعرض هذا الحيوان
النافع للانقراض .



(شكل ٢٩) القنفذ

الفصيلة العرسية آكلات لحوم طوال الأبدان قصارى
القوائم .

العشيرة العرسية : صغيرة الجسم طويلة البدن نحيفة رشيقة
قصيرة الأطراف جداً و سطح الجسم العلوى غير مخطط ومنها
فى مصر .

ابن عرس *Mustela Africana* وهو بيضاوى الرأس
صغيره ، ولون السطح العلوى بنى والأسفل أبيض والذقن أبيض
وعليه بقعة أو بقعتين بنية اللون وطرف الذنب أدكن من
بقية لون الجسم وقيل أنه أدخل إلى مصر ليقضى على الفيران
ولكنه تكاثر وأصبح أعدى أعداء الدواجن وهو يدخل
المنازل ويوجد فى الحقول .

أبو منتن *Tetonyx lybica* وفيه الأرجل الأمامية أطول
من الخلفية ولها مخالب قوية ، شعره بالغ الطول وعلى السطح
العلوى شرائط مستطيلة سود والسطح السفلى أسود وهو صحراوى
يفترس الدجاج والزواحف .

الفصيلة الكلبية

من آكلات اللحوم لا تجمع مخالبها فى أكمام ولا تصعد
الشجر ولا تقبض على فريستها بأظافر بل تطاردها وتقبعز عليها
بأنيابها وهى تشمل الكلاب الأهلية والذئاب وبنات آوى
والتعالب .