

الطيور

الطيور حيوانات فقريّة مغطاة بالريش ودرجة حرارة أجسامها ثابتة ، وهي ممثلة في مصر أحسن تمثيل وتربو أنواعها على الستمائة مابين قاطع وآبد وشارد وفيما يلي بعض هذه الأنواع مرتباً ترتيباً علياً .

شاعر (غطاس متوج) Podiceps cristatus :

من طيور مصر المقيمة النادرة ويشاهد في الفيوم وبحيرات الدلتا ويتغذى على الأسماك ويجيد الغوص وطيرانه ضعيف ويضع الغطاس بيضه في أعشاش عائمة يبنها من الأعشاب يضع فيها من ثلاث إلى ست بيضات بيض تتحول إلى اللون البني .

غطاس أحمر الرقبة (الزهوت) Podiceps ruficollis capensis :

من طيور مصر المقيمة في الدلتا ووادي النطرون والفيوم وعلى شواطئ النيل ويحتمل قطوعه إلى مصر في الشتاء .

جلم الماء (طائر النوء الشرقى) Puffinus puffinu :

توجد هذه الطيور دائماً في الماء وتطير على سطح البحر

دون أن تحرك أجنحتها وليس لها صوت إلا وقت التزاوج
وتقتات بما يطفو على سطح الماء أو ما تغوص لجلبه .

جلم الماء الرمادى الكبير (طائر النوء الرمادى الكبير)

puffinus K. kuhlii : يستوطن حوض البحر الأبيض وهو من
طيور مصر النادرة ويشاهد عند دمياط وهو أكبر من جلم الماء
الشرقى .

بجعة بيضاء (جمل البحر) Pelecanus onocrotalus :

يكثر فى مصر فى الشتاء أينما وجد الماء حيث يشاهد بكثرة
فى الفيوم وقناة السويس والنيل وله كيس عند الزور لتخزين
الغذاء ويلاحظ أنه يغمر رأسه فى الماء ليلتقط ما قد يكون عالقا
فيه وليس ثمة دليل على تزاوجه فى مصر .

الأطيش Sula leucogaster : من طيور مصر الأوابد

ويشاهد على ساحل البحر الأحمر وغذاؤه قاصر على الأسماك .

عقق (غراب البحر) Phalacrocorax carbo sinensis :

يوجد فى مصر فى شمال الدلتا والفيوم والبحيرات المرة وفى
النيل ويكثر فى ما بين شبرى يناير وإبريل ويقل فيما بين مايو
وأكتوبر ويندر وجوده بعد ذلك ، وليس ثمة دليل مادى على
تزاوجه فى مصر ، وصوته يشبه صوت الغراب البلدى المعروف .

بلشون سنجابى أو (بلشون رمادى) *Ardea cinerea*

يقطع البلشون السنجابى إلى مصر فى الشتاء ويشاهد فى شبه جزيرة سيناء من أكتوبر إلى مارس وترى أسراب الخريف فى مصر من أوائل سبتمبر إلى أوائل نوفمبر وأسراب الربيع من أواخر فبراير إلى أوائل إبريل كما أن بعضه مقيم يبيض ويفرخ فى الفيوم ووادى النطرون . ويضع من أربع إلى خمس بيضات ذات لون مزرق .

مالك الحزين (جحفة) *Ardea p. purpurea* :

من طيور مصر القواطع حيث يشاهد فى رحلتى الخريف والربيع وترى أسراب الخريف من أواخر أغسطس إلى نوفمبر وأسراب الربيع من أوائل مارس إلى أوائل مايو ويوجد فى الفيوم ووادى النطرون كما أن بعضه يقضى الشتاء فى شبه جزيرة سيناء وهو يكثُر فى الأماكن الكثيفة العشب المنعزلة ولذا سُمى مالك الحزين وهو حذر يتجنب الناس .


بلشون أبيض صغير (أبو بليقه) *Egretta g. garzetta* :

طائر يشبه أبو قردان فى المظهر الخارجى إلى حد كبير وقد اختفى من مصر فى عام ١٩١٠ ولكنه الآن كثير وهو أبيض اللون وله تاج فى الصيف ويحميه القانون حيث هو من أنفع

الطيور للفلاح. وهو كثير في الدلتا والفيوم ويميز عن أبو قردان،
بأن منقاره أسود وكذلك الساق .

أبو قردان *Ardeola ibis ibis* :

من طيور مصر الأوابد وهو معروف بحميه القانون ، ومنقاره



(شكل ٢٣) أبو قردان

أصفر وكذلك الساق ويبيض أبو قردان في أعشاش يبنيها على
الشجر من العصي والأفرع الصغيرة ويضع فيها من ٣ - ٥
بيضات من إبريل حتى سبتمبر .

واق أبيض صغير : Ardeola ralloides

طائر ليلي أصغر من البلشون يوجد في الفيوم من نوفمبر إلى إبريل ووادي النطرون من يناير إلى مايو .

واق الشجر أو غراب الليل : Nycticorax n. nycticorax

من طيور مصر الأوابد ويختبئ في النهار بين أغصان الشجر ولا يبدأ نشاطه إلا ليلاً .

واق صغير (مليحه) : Ixobrychus minutus minutus

وهو من طيور مصر الأوابد حيث يتزاوج في وادي النطرون والفيوم وقد يقطع إليها من مواطنه عابراً إلى الجنوب وهو أكثر ما يكون انتشاراً في شهر إبريل .

واق (بغيغ) : Botaurus stellaris stellaris

قاطع شتوي إلى مصر ويشاهد فيها من نوفمبر إلى مايو .

عنز أبيض (لقلق) : Ciconia ciconia ciconia

قاطع شتوي إلى مصر عابراً في رحاق الخريف والربيع وهو في الأخيرة أكثر ظهوراً وقد يقضى بعضه الصيف في مصر ولكنه لا يتزاوج فيها .

أبو منجل الأسود (معزة الماء) Plegadis f. falcinellus :

قاطع شتوى إلى مصر حيث يقضى فيها الشتاء وجزء من الربيع وتعم جموعه وادى النيل ووادى النطرون .

بشروش Phoenicopterus ruber antiquorum :

يوجد فى بحيرة البردويل والمنزلة ومريوط والفيوم ووادى النطرون ولا يتزاوج فى مصر .

وز أبيض الجبهة Anser a. albifrons :

قاطع شتوى بكثرة إلى مصر

وز صغير أبيض الجبهة Anser erythropus : من القواطع

إلى مصر شتاء ، وهو أقل انتشاراً من سابقه ، كما أنه أصغر منه ، ومن الصعب على غير الخبير التمييز بينهما ، ولذا يحتمل أنه يفد إلى مصر فى كثرة غير ملحوظة .

وز مصرى Alopochen aegyptiaca : من طيور مصر

الأوابد النادرة يقل فى الدلتا ويكثر فى الوجه القبلى .

شهرمان Tadorna tadorna : يكثر فى مصر ما بين ديسمبر

ومارس حيث يؤم الشواطىء ولا يوجد بسينا .

أبو فروة Casarca ferruginea : واسع الانتشار فى مصر

وسينا شتاء ، ولا يشاهد فى المناطق الصحراوية .

خضارى Anas p. platyrhynchos : يقطع إلى مصر في الشتاء وبعضه يظل طويلاً العام في مصر ويتزاوج فيها .

سمارى Anas strepera : يكثر بمصر في الشتاء .

بلبول Daflia acuta : واسع الانتشار في مصر شتاءً .

زأو (صواى) Anas penelope :

قاطع إلى مصر شتاءً ويوجد بكثرة أبداً توفرت له أسباب المعيشة .

شرشير مخاط (منيه) Anas angustirostris :

من طيور مصر المقيمة وهو يبيض ويفرخ في منطقتي الفيوم ووادي النطرون ويضع أربع بيضات بالقرب من الماء .

شرشير صيفي (كركج) Anas querquedula :

من القواطع إلى مصر التي تصل إليها بكثرة مبكرة فتشاهد جموعه في أواخر يوليو ثم تزايد في أغسطس وأوائل سبتمبر ثم يختفي في الشتاء ويعود في الربيع حيث تشاهد أسرابه في مارس وأبريل .

شرشير شتوي Anas crecca crecca : واسع الانتشار جداً

في مصر حيث تفد جموعه في الشتاء وهو يغشى جميع البحيرات .

كيش Spatula clypeata : واسع الانتشار في مصر شتاءً .

حمرأى Nyroca ferina ferina : واسع الانتشار في مصر
من سبتمبر إلى إبريل وهو موجود أينما توفرت له سبل المعيشة .
زريقل Nyroca nyroca nyroca :

يتميز بأن عينييه بيضاء وهو واسع الانتشار كسابقه ويفد إلى
مصر في أكتوبر ويقضى فيها الشتاء حتى أوائل الربيع ويغشى
المناطق المائية الكثيرة الحشائش النامية .

زرقاى Nyroca fuligula : واسع الانتشار في ما بين
أكتوبر ومارس ويوجد في معظم البحيرات المصرية .

رخمة مصرية Neophron p. percnopterus :
من طيور مصر الأوابد وتتغذى على الجيف وتوجد بالقرب من
السلخانات وتستوطن جبل المقطم وسينا والفيوم ووادي النطرون
وتبنى عشها على الأشجار والصخور من الأغصان الجافة وتضع
فيه بيضتين في مارس وإبريل ولون البيض أبيض محمر .

نسر Gyps f. fulvus : يقيم في شبه جزيرة سيناء والواحات
الداخلية والفيوم ووادي النطرون ويبنى أعشاشه على الصخور
ويضع فيها بيضة واحدة بين يناير ومارس .

نسر أذون Torgos tracheliotus nubicus :

يقطع إلى مصر من أماكن استيطانه في الحبشة والصومال
والسودان وهو واسع الانتشار فيها وتشاهد جموعه العديدة في

الأقصر والقصير وحلوان حتى أوائل مارس ويتميز بأن الجلد الأعلى على جانبي الرقبة يتبدل ليكون ما يشبه صيوان الأذن في الثدييات .



(شكل ٢٤) رخمة مصرية

نسر أبو ذقن (كاسر العظام) : Gypaetus barbatus

يوجد بمصر في شبه جزيرة سيناء وعند حلوان وفي الطريق الصحراوي بين السويس والقاهرة .

باشق أوربي : Accipiter n. nisus : من طيور مصر

القواطع التي تقضى فيها الشتاء ابتداء من سبتمبر حتى مايو وهو واسع الانتشار في مصر وشبه جزيرة سيناء ويقطن على الحمام والبط والعصافير يقتنصها وهي طائفة .

دريعه Circus a. aeruginosus :

قاطع شتوى إلى مصر وواسع الانتشار بها وتشاهد
جموعة في منطقة الفيوم ووادي النطرون والواحات وعلى النيل في
مصر العليا وهو نادر في شبه جزيرة سيناء .

أبو شرده باهت أو مرزه بفتاء Circus macrourus :

من طيور مصر القواطع التي تقضى فيها الشتاء من سبتمبر إلى
أبريل ولكن كثرة منه تبقى في مصر ما بين يونيو ويوليو ،
ورغم ذلك لا يوجد دليل مادي على تزاوجها فيها ، وهو واسع
الانتشار في معظم أنحاءها وقد يشاهد متوغلا في مناطقها
الصحراوية البعيدة عن الماء .

عقاب بيضاء أو صراره Circaetus gallicus gallicus :

من طيور مصر المقيمة التي تستوطن الواحات وجبل المتطم
والفيوم وغيرها وهي تتغذى على الثعابين والحراشي والسحالي
والسلاحف وقيل أنها تحمل السلاحف وتطير بها وتلقى بها فوق
الصخور والأحجار لتتشم العلبة العظمية ثم تهوى عليها وتلتهم
ما تحتويه .

عقاب سعفاء كبرى أو (صقر الأرنب Aquila clanga :

من القواطع إلى مصر شتاء في كثرة بالغة وتشاهد هذه الطيور

في شبه جزيرة سيناء طول العام تقريبا ورغم ذلك لم يبق دليل على تزاوجها فيها ، وتتغذى على الجيف ولو أنها من العقبان .

عقاب خداريه (عقاب سوداء) *Aquila verreauxi* :

من طيور مصر النادرة التي تتغذى على الأسماك وتقطع إلى مصر من أماكن استيطانها في الجنوب من الحبشة والصومال ، وبما هو جدير بالذكر أن أحداها وقعت في الشباك عند قناة السويس .

عقارب مسيرة صغيرة *Hieraaetus pennatus* :

من القواطع إلى مصر حيث تقضى فيها الشتاء من سبتمبر حتى مارس وهي شديدة الفتك بالحمام واليما والديج .

حدأة مصرية *Milvus migrans aegyptius* :

من طيور مصر الأوابد وتمتاز بمنقارها الأصفر .

حدأة سوداء *Milvus migrans migrans* :

تمر بمصر عابرة في رحلتها الخريف والربيع وتمتاز بمنقارها الأسود .

صقر أبيض أو (كوهيه) *Elanus c. caeruleus* :

من طيور مصر المقيمة التي لا تفرح الأراضي المنزرعة وقلبا يرى إلا عند الشروق والغروب حيث يكون الضوء قليلا ، ويبني عشه على الأشجار ويضع فيه أربع بيضات من أواخر فبراير إلى إبريل .

شاهين مغربي *Falco peregrinus pelegrinoides* :

من طيور مصر المقيمة حيث يبيض ويفرخ بها وهو واسع الانتشار في منطقة القاهرة وحلوان والأقصر كما يوجد بالوحدات وهو من أشد الطيور فتكا بالحمام كما أنه يفتك بالطيور الأخرى كاليمام والقنابر والهداهد وغيرها .

الحر *Falco biarmicus tanypterus* :

من طيور مصر المقيمة التي تنتشر فيها وتوجد أعشاشه على جبل المقطم وحلوان وفوق هرم الجيزة الأكبر ويتغذى على صغار الطير غير أن أحب غذاء له الهدهد ويوجد في شبه جزيرة سيناء بكثرة كما يوجد في غرب قناة السويس .

صقر بهيم أو وصقر غروب، *Falco concolor* :

من طيور مصر الأوابد القليلة الانتشار وهو يخرج في الغروب لقتص الحفافيش .

يؤيؤ *Falco aesalon insignis* :

من طيور مصر القواطع الواسعة الانتشار حيث يشاهد فيها حتى منتصف أبريل وهو يقتنص صغار الطير كما يتغذى على الحشرات وليس ثمة دليل على وجوده في شبه جزيرة سيناء .

صقر الجراد «سقساقه» *Falco tinnunculus formis* :

من طيور مصر المقيمة حيث يوجد فيها بكثرة بالغة ويتغذى

على صغار الطير فيكن لها بين الأغصان وينقض عليها ، كما يتغذى على الحشرات وصغار الزواحف ويبني عشه على النخيل وتضع الأنثى من ٣ — ٥ بيضات بيضه عليها بقع بنية داكنة .

صقر الجراد الأوروبي الصغير «عويسق» *Falco naumanni*
naumanni ويشبه صقر الجراد المصري إلا أنه أصغر منه حجما ويقطع إلى مصر في رحلتى الربيع والخريف وغذاؤه الحشرات .

الفرج *Phasianidae*

حجل المغربى *Alectoris b. barbata* : من طيور مصر الأوابد النادرة ويقتصر وجوده على بعض الأودية في صحراء ليبيا وتضع أنثى الحجل من ١٠ — ١٨ بيضة لونها رملى عليه بقع بنية داكنة .

حجل سينائى أو « شينار سينائى » *Alectoris greaca sinatica*
وهو كما تدل التسمية من طيور شبه جزيرة سينا المقيمة وهو يشبه إلى حد كبير الحجل المغربى وتضع الأنثى من ٦ — ١٢ بيضة لونها أخضر باع علىها بقع بنية .

حجل فلسطينى *Ammoperdix heyi heyi* : من طيور مصر المقيمة حيث يوجد فى وديان شبه جزيرة سيناء المنعزلة ويضع

من ٥ - ٧ بيضات تحت الشجيرات الصحراوية ولون البيض رملي مصفر .

حجل مصرى *Ammoperdix heyinicolli* : من طيور مصر الأوابد ويكثر في الطريق الصحراوى ما بين القاهرة والسويس كما يوجد بجوار حلوان .

سمان « سلوى » *Coturnix c. coturnix* طائر معروف يقطع إلى مصر في الربيع والخريف وبعضه يقضى الشتاء في مصر كما أن بعضه يقيم في مصر ويفرخ فيها .

المرعة ودجاج الماء والغمر *Rallidae*

عصفور كلب البحر *Rallus a. aquaticus* يستوطن وادى النطرون ويفرخ فيه كما أن أسرابه تقطع إلى مصر في الشتاء .
مرعة : *Porzana palustris* تمر بمصر عابرة في رحلتى الخريف والربيع ويقضى بعضها الشتاء في مصر .

مرعة بيلون الغربية *Porzana palustris intermedia* من طيور مصر المقيمة حيث تبيض وتفرخ بها كما أنها من القواطع التى تمر في رحلتى الخريف والربيع .

دجاجة الماء *Gallinula ch. Chloropus* من طيور مصر المقيمة حيث توجد في البرك والمستنقعات في الدلتا والفيوم

ووادى النظرون وتبنى أعشاشها بين الأعشاب ، وهى تجيد العوم
والغوص ، ومنها ما يقطع إلى مصر فى الشتاء .

غره Fulica atra atra مقيم فى شىء من الكثرة ويزورها
كذلك شتاءً فى جموع وفيرة وما لاشك فيه أن الطيور المقيمة
تفرخ بمصر .

فرفور Porphyrio alleni تعتبر هذه الطيور أكبر مثل
على الهجرة الشاذة فقد تفرغ إلى مصر فى رحلات غير منتظمة
دون ما اعتبار لفصول الهجرة المعتادة كما أنها قد تهاجر إلى بلاد
لم تكن معروفة فيها وتختبئ هذه الطيور فى الأغصان وتماثلها
إلى حد كبير حتى أن أحد الضباط فى أفريقيا الجنوبية فشل فى
اقتناص بعضها على أنها كانت تعيش فوق الأشجار بالقرب
من منزله .

دجاجة سلطانية Porphyrio madagascariensis من طيور
مصر المقيمة التى أصبحت الآن نادرة ولا توجد إلا فى منطقة
مربوط .

الكوكى Gruidae

رهورمادى كركى Megalornis grus grus من طيور
مصر القواطع التى تشاهد فى بحيرة مربوط .

الحبارية Gruidae

حبارى صغيرة Otis tetrax orientalis من طيور
الصحراء وتجيد العدو وقلبا تطير أمام أعدائها وهى كبيرة الحجم .

حبارى الصحراء المصرى Chlamydotis undulata
من طيور مصر الأوابد فى الصحراء الغربية ويوجد فى وادى
النطرون بكثرة فى كل الفصول ولا يوجد فى الواحات الخارجة
والداخلة فى الشتاء ولكنه يظهر فى الربيع .

قطقاط أبو الرؤوس منطوق صغير Charadrius
dubius curonicus من طيور مصر القواطع كما أن بعضه
يقضى العام كله فى مصر ويفرخ فيها .

قطقاط أبو الرؤوس الاسكندرى Charadrius
alexandrinus cantianus من طيور مصر الأوابد حيث
يوجد بها بكثرة ويضع أربع بيضات فى حفرة سطحية على
الشاطئ .

قطقاط أبو الرؤوس بنى Charadrius
pecuarius allenbyi يستوطن من مصر الفيوم ووادى النطرون ومصر العليا
ويضع بيضه فى حفر على الرمل .

زقزاق شامى Vanellus vanellus من طيور مصر

القواطع في الشتاء وهو طائر معروف باسم الفرخة أم قرون وغذاؤه الحشرات .

زقزاق بلدى Hoplopterus spinosus من طيور مصر المقيمة ويتميز بوجود قنوء حاد في الجناح ويوجد بكثرة في مريوط والسويس وعلى امتداد النيل ويضع بيضه في حفرة يبطنها بقليل من الأعشاب .

كروان الماء Calidris ferruginea يمر بمصر عابراً في رحلتى الخريف والربيع حيث يغشى السواحل والمستنقعات وتمتد رحلة الخريف من أغسطس إلى أكتوبر .

طيوطى أحمر الساق كبير Tringa t. tonanus من طيور مصر القواطع وهو واسع الانتشار ويوجد فيها أينما توفرت أسباب العيش .

طيوطى أحمر الساق أسوى Tringa. totanus terignotac أدخل ضمن قائمة الطيور المصرية لضرب فرد منه في رشيد في ١٩١٧/١٠/٢١ .

طيوطى أخضر Tringa ochropus واسع الانتشار في مصر شتاءً وهو المعروف باسم فرخة الغيظ .

طيوطى Tringa hypoleucos من القواطع إلى مصر شتاءً في جموع كبيرة وهو أصغر أنواع الطبطوى حجماً .

بكاشينه Capellag gallinago يقطع هذا الطائر إلى مصر
في الشتاء في أسراب كبيرة وهو معروف للصيادين باسم البكاشين .
بكاشينة مزوفة Rostraula b. henghalensis من طيور
مصر الأوابد ويمتد وجوده على الدلتا والنيل ويضع بيضه في
حفر يطنها بالأعشاب .

دجاجة الأرض Scolop scolopa r. rusticola زائر شتوي
إلى مصر من أواخر نوفمبر إلى أوائل مارس وهي تختبئ نهاراً
ولا تظهر إلا في الليل لتبحث عن غذائها .

أبو مغازل Himantopus b. himantopus من طيور
مصر المقيمة القليلة ، كما تقطع جموعه الكبيرة إلى مصر في رحلتى
الربيع والخريف ويقضى بعضه الشتاء في مصر ومنقاره مستقيم .

النكات Recurvirostra avosetta : من طيور مصر
المقيمة النادرة التي تنرخ فيها ، كما يتبع إليها شتاءً ، ويتميز
بمنقاره المقوس إلى أعلى .


الجلبل Cursorius c. cursor : من طيور مصر المقيمة
التي تستوطن الصحراء كما يقطع إليها عابراً في رحلتى الربيع
والخريف .

الزقراق المصرى Pluvianus ae Aegyptius كثير في
الوجه القبلى وخاصة في مديرية بنى سويف وهو صديق التمساح

ينظف أسنانه ويتغذى على ما يعلق بهذه الأسنان من الطفيليات ولا يطبق التمساح فاه مخافة أن يضر بصديقة الصغير ويكثر في السودان على النيل الأبيض حيث توجد التماسيح .

كروان الصحراء *Burhinus oedicephalus saharae* :

من طيور مصر الأوابد الليلية التي تظهر بعد غروب الشمس وهو طائر معروف يسمع صفيره العذب في الليل في مصر، ولون أبيض أصفر رملي باهت .



(شكل ٦٠) كروان الصحراء

الكروان السنغالي *Burhinus senegalensis assinilis* :

من طيور مصر الأوابد يشبه الكروان الصحراوي إلا أنه أصغر منه حجما وهو في سلوكه وعاداته كسابقه .

النورسي الأحمر القدمين *Larus r. ridibundus* :

يفد إلى مصر من سبتمبر ويرحل عنها في مايو وهو واسع الانتشار في مصر ويعيش في الثغور ودلتا النيل ويتبع المراكب ويلتقط الفضلات التي تلقى في الماء .

العجمة أو النورس الأبيض العين *Larus leucophthalmus*

من طيور مصر الأوابد حيث يكثر على ساحل البحر الأحمر وجزره ويمتاز بلون القزمية الأبيض ويضع في حفرة تحت الصخور البارزة بيضتين لونهما أصفر بني .

الخرشنة السريعة *Sterna bergii velox* من طيور مصر

الأوابد على ساحل البحر الأحمر وجزره وهو يجيد العوم والغوص للبحث عن السمك وبيضه كبير ذو لون أبيض عليه نقط كبيرة وأخرى صغيرة .

أبو بلحة *Hydroprogne casbia* من طيور مصر الأوابد

على ساحل البحر الأحمر والفيوم وسينا ويمتاز بمنقاره الأحمر الذي يشبه البلحة ويضع البيض في حفر على الشاطئ .

الخطاف النيل *Gelochelidon n. nilotica* من طيور

مصر القواطع الواسعة الانتشار التي تقضى فيها الشتاء ، ويوجد على
سواحلها وفي الداخل وغداؤه الحشرات وصغار الضفادع
والأسماك .

القطا المنقط Pterocles senegallus من طيور مصر
الأوابد حيث يوجد في مناطقها الصحراوية بكثرة ، والآثى منطقة
هلى عكس الذكر .

القطا المصرى Pterocles senegalensis floweri
من طيور مصر الأوابد النادرة حجمه طغير ويوجد في المناطق
الشبه صحراوية ولا يوجد هذا الطائر في غير مصر .

القطا الفلسطيني المتوج Pterocles coronatus vastitas
من طيور مصر القيمة النادرة حيث تستوطن منها المنطقة
الشمالية الشرقية من سيناء .

القطا المتوج Pterocles c. coronatus من طيور مصر
الأوابد النادرة ويوجد في صحراء ليبيا ويشاهد في مرسى مطروح
ووادى النطرون وشرق الدلتا .

القطا الطويل الذنب Pterocles alchata caudacutus
من القواطع النادرة إلى مصر .

الحمامية Columbidae

الحمام البرى المصرى Columba livia schimperi اختلط هنا الطير بالحمام المستأنس وهو واسع الانتشار فى مصر حيث يوجد فى الدلتا ووادى النيل ويفرخ مرتين أو ثلاثة فى العام ما بين مايو وأغسطس .

الحمام البرى الشرقى Columba livia gaddi من طيور مصر الأوابد حيث يبيض ويفرخ فى مرسى مطروح والسلم .

الحمام البرى العربى Columba livia palaestinae من طيور مصر الأوابد الكثيرة حيث يستوطن منها شبه جزيرة سيناء وهو أكبر حجما من الحمام البرى المصرى .

الحمام البرى الداخلى Columba livia dakhlae من طيور مصر المقيمة ويستوطن منها الواحة الداخلة .

اليمام المصرى Streptopelia senegalensis aegyptiaca من طيور مصر الأوابد الواسعة الانتشار ويضع بيضه فى أعشاش يبنها على الأشجار .

اليمام الداخلى Streptopelia s. dakhlae من طيور مصر الأوابد الواسعة الانتشار فى الواحة الداخلة .

الحمام الفيطي Streptopelia turtur من طيور مصر القواطع
الواسعة الانتشار في رحاقي الربيع والخريف وهو معروف
للصيادين حيث يخرجون لصيده في شهر مايو .

القمرى الصيفي Streptopelia turtur isabellina يزور مصر
في الصيف ويفرخ فيها ثم يرحل منها في الخريف صوب الجنوب
وهو طائر معروف .

فصيلة الكوكو Cuculidae

الملك (الكوكو) Centropus senegalensis aegyptius
من طيور مصر الأوابد الموجودة في الفيوم ورشيد وبولاق
ودسوق ولم يعثر عليه في غير هذه الأماكن من مصر ويضع من
ثلاث إلى خمس بيضات في أعشاش يبنيها على النخيل .

وقواق مرقط (طائر الكبر) Clamator glandarius من
طيور مصر المقيمة التي تبيض وتفرخ فيها ولكنه يرحل عنها
في الخريف وهو متطفل لا يبني عشاً ولكنه يضع بيضه في أعشاش
الغراب البلدى ليحتضنه .

البغاوية Psittacidae

الدرة المطوقة المصرية (دودو) Psittacula krameri

أدخلت إلى مصر سنة ١٩١٢ وتعتبر من طيورها المقيمة وتفرخ في الجزيرة والقناطر الخيرية وتضع خمس بيضات لونها أبيض في أعشاش فوق الأشجار وفي شقوق الجدران .

الضؤضية Coraciidae

الغراب الزيتوني Coracias g. garrulus يمر الغراب

الزيتوني أثناء قطوعه إلى الجنوب بمصر في رحلتى الخريف والربيع وهو بحق أجمل الطيور ويعتبر زينة المجموعات العلمية في المتاحف وهو طائر حذر لا يسهل صيده ويغشى حدائق المواالح بكثرة .

طير السمك Ceryle rudis rudis من طيور مصر الأوابد

الواسعة الانتشار ويتغذى على السمك ولونه أبيض وعليه خطوط سود .

صياد السمك Alcedo atthis atthis من طيور مصر

القواطع شتاءً وهو أصغر من طير السمك وألوانه جميلة تختلف

بين الأزرق والبني وهو يوجد في مصر حيث يوجد الماء ويتغذى كذلك على السمك .

الوروار الأوربي Merops apiaster يمر بمصر في رحلتى الربيع والخريف ويغلب فيه اللون الأخضر ويتغذى على الحشرات وخاصة النحل ولذا يعتبر من الطيور الضارة ويوجد أكثر ما يوجد فوق المناحل .

الوروار المصرى Merops orientalis cleopatra من طيور مصر الأوابد يرتب بصغر حجمه ولونه أخضر ويقوم بجولات في الشتاء إلى منطقة قناة السويس حيث الجو أدفاً ويضع من ٤ — ٧ بيضات بيض مستديرة في حفرة .

الوروار العراقى Merops superciliosus presicus تمر جموعه الكبيرة بمصر في رحلتى الخريف والربيع وتبدأ رحلة الخريف من أوائل سبتمبر إلى أواخر أكتوبر ورحلة الربيع من مارس إلى آخر مايو وتنفد قلة منه لتقضى الصيف في مصر حيث تبيض وتفرخ بها .

الهدد الكبير Upupa epops major من طيور مصر الأوابد التى تتمتع بحماية القانون لأنها تتغذى على الحشرات الضارة ويزعم الناس أن الاحتفاظ برأس هذا الطائر يقيهم من الغدر والمصائب وهو زعم باطل يعرض هذا الطائر لفناء محقق .

الهدهد Upapa epops epops من طيور مصر القواطع
شتاءاً ويشبه سابقه إلا أنه أصغر منه حجماً وأبهر لونا .

أم قويق Athene noctua glaux من طيور مصر الأوابد
وهي معروفة تسكن الأماكن الخربة ويتشام منها الناس
وتتغذى على الفيران وصغار الطير والسحالي وهي أكثر ما تكون
نشاطاً في الليل .

الهامة (البومة المصاصة) Tyto a. alba من طيور مصر
الأوابد الواسعة الانتشار حيث توجد في معظم أنحاء مصر
والصحراوات ولا تنشط إلا ليلاً وتظل ساكنة طول نهارها
وتضع بيضها المستدير بين شقوق الصخور .

السبد المصري Caprimulgus ae. aegyptius من طيور
مصر الأوابد — وهو طائر ليلي ويوجد في الأراضي المزروعة
على حافة الصحراء ويمتاز ببيضه بقطبيه الكليين وهو ذولون
أبيض منقط .

السبد الصحراوي Caprimulgus ae. saharae مقيم في
الصحراء ويمثلها في اللون .

السامة المصرية Apus apus pallidus من طيور مصر
الأوابد سريع الطيران يتغذى على الحشرات أثناء طيرانه ويضع
بيضتين مستطيلتين لونهما أبيض .

اللواء (أم الوى) *Jynx t. torquilla* من القواطع إلى مصر حيث يفد إليها في رحلتى الربيع والخريف وله متقار صلب مدبب مخروطى ويجرى على أفرع الشجر كالفيران ويقضى بعض الشتاء في مصر .

قنبرة الغرب الكبيرة *Melanocorypha c. calondre*
من طيور مصر التى تفد إليها في آخر نوفمبر وترحل عنها في آخر يناير وتوجد في شبه جزيرة سيناء وعلى السواحل من السلوم حتى بور سعيد وكذلك في دلتا النيل .

قنبرة قصيرة الأصابع *Calandrella b. brachydactyla*
تمر جموع هذه القنبرة بكثرة عبر مصر في رحلتى الربيع والخريف ويقضى بعضها الشتاء في مصر ويشاهد بكثرة في الفيوم ووادى النطرون والداخلية والخارجية وتبدأ رحلة الخريف في آخر أغسطس وتنتهى رحلة الربيع في أبريل .

قنبرة قصيرة الأصابع صغيرة مصرية *Calandrella r. nicolli*
من طيور مصر الأوابد التى تستوطن شمال الدلتا والمناطق الساحلية بين الإسكندرية وبورسعيد وتبنى أعشاشها في البرارى من جذور النباتات الجافة وغيرها ولون البيض مائل إلى البياض أو أبيض مخضر عليه بقع بنية وتضعه فيما بين أبريل ويوليو وتبيض مرتين في السنة .

قنبرة البادية المصرية Ammomanes d. deserti من طيور
مصر الأوابد التي تستوطن المناطق الصحراوية من قنا
حتى حلفا .

قنبرة متوجة بشوشة Calerida cristata يوجد من هذا
النوع في مصر أربعة أصناف كلها من طيور مصر الأوابد .

قنبرة غامقة بشوشة Calerida c. nigricans يستوطن
هذا الصنف الدلتا ولا يتوغل جنوباً إلى ما وراء القناطر الخيرية
وقليوب وأنشاص ويصل شمالاً حتى ساحل البحر الأبيض بين
فرعى النيل وفي الشتاء يتجول خارج منطقة إفراخه طلباً للدفء
إذ شوهد في الجزيرة والقنطرة وعلى امتداد قناة السويس وتضع
الأتى من ٢ — ٤ بيضات ويبتدىء فصل التفريخ في آخر مارس
وينتهى في آخر مايو .

قنبرة فاتحة بشوشة Calerida cristata maculata
تستوطن الجهات خارج حدود الدلتا ولكنها لا تبلغ الصحراء
وتوجد على ضفتي النيل حتى أسوان وتوجد في الفيوم أيضاً .

قنبرة بشوشة نوبية Calerida cristata haffae تستوطن
المنطقة بين أبي سنبل على شاطئ النيل والشلال الثاني جنوباً
وتضع بيضها حوالى منتصف شهر فبراير .

قنبرة باهتة بشوشة Calerida cristata magna

أستوطن من مصر شبه جزيرة سيناء والمنطقة الساحلية بين السلوم والإسكندرية .

قنبرة بشوشة صغيرة المنقار Calerida theklæ cyrenaicæ

من طيور مصر الأوابد حيث توجد بكثرة في منطقة مرسى مطروح وهي في سلوكها وعاداتها كالقنبرة المتوجة وتتميز عن المتوجة بقصر منقارها .

مكاء غربى Alaemon alaudipes alaudipes من طيور

مصر الأوابد حيث يوجد في الصحراء على امتداد ضفتى النيل من البحر الأبيض المتوسط حتى مشارف السودان كما يوجد في شبه جزيرة سيناء وبني المكاء عشه في الصحراء أو فوق الشجيرات ويحتوى العش عادة على ٢ — ٣ بيضات وقد تصل أحياناً إلى أربع لونها أبيض لبنى وعليها علامات بنفسجية وأخرى بنية والآثى تبيض في أواخر مارس .

قنبرة الصحراء المقرنة Eremophila alpestris bilopha

من طيور مصر الأوابد الصحراوية وهي غاية في الوداعة ولا تتجنب الناس وتضع بيضاً رمادى اللون عليه نقط بنية صغيرة

أبو فضية ريشارد Anthus richardi richardi تفد هذه الطيور بكثرة إلى مصر شتاءً وتنتشر في الدلتا والفيوم .

أبو فضية الصحراء (صمو) Anthus campestris يمر هذا الطائر بمصر وسينا عابراً في رحلتى الربيع والخريف وتبدأ الأولى من فبراير إلى أبريل والثانية من أغسطس إلى أكتوبر وهو كثير في رحلتيه وتشاهد جموعه الكثيرة في شبه جزيرة سيناء والفيوم ووادي النطرون .

أبو فضية الصحراء الرمادي Anthus c. griseus من الطيور الكثيرة الانتشار في مصر وتقطع إليها في رحلتى الخريف والربيع .

أبو فضية الشجر Anthus trivialis trivialis يمر هذا الطائر بكثرة عابراً في رحلتى الخريف والربيع عبر مصر فالأولى تبدأ من أكتوبر حتى نوفمبر والثانية من مارس حتى أبريل .

أبو فضية أحمر الزور Anthus rufogularis تصل جموع هذا الطير الكبيرة إلى مصر وسينا ابتداء من أغسطس ثم يأخذ في الزيادة بعد هذا التاريخ حتى منتصف أكتوبر ، وعندئذ

يأخذ في التنافس لارتحال جموع كبيرة منه إلى الجنوب وهو طائر معروف في مصر ويرى في كل مكان وخاصة في الفيوم .
ووادى النظرون .



(شكل ٢٦) أبو فضية أحمر الزور

أبو فصاده أزرق الرأس *Motacilla flava flava*

يوجد في مصر عابراً في رحلتى الخريف والربيع في جموع كبيرة ويبدأ ظهوره في مصر حوالى نهاية شهر أغسطس كما أن بعضه يقضى الشتاء في مصر ورحلة الربيع تبدأ من منتصف مارس إلى منتصف أبريل .

أبو فصاده مصرى أزرق الرأس *Motacilla flave*

pygmaea من طيور مصر الأوابد ويبنى عشه بين سيقان النبات ويضع فيه من ٣ — ٥ بيضات ويوجد دائماً بالقرب من الماء .

أبو فصاده رمادى *Motacilla cinerea cinerea* من طيور

مصر القواطع التى تقضى الشتاء بها وتنفذ جموعه الكبيرة إلى مصر وشبه جزيرة سينا من شهر أكتوبر وترحل فى مارس ويوجد أثناء الشتاء بكثرة فى شبه جزيرة سينا والفيوم وعلى شاطئ البحر الأبيض وهو قليل فى سينا ووادى النطرون .

أبو فصاده أبيض *Motacilla alba alba* ينفذ إلى مصر

حيث يقضى فيها الشتاء وهو يوجد فى معظم أنحاءها .



(شكل ٢٧) أبو فصاده رمادى

بلبل مصرى Pycnonotus barbatus arsinoe من طيور
مصر المقيمة وغداؤه الثمار والحشرات وغناؤه عذب وهو موجود
في الحدائق ويبنى عشه من الأغصان ويبطنه بالشعر ويضع
فيه من ٣ — ٥ بيضات ويتميز بأن غطائيات الذنب
السفلى بيض .

خاطف الذباب منقط Muscicapa striata striata يمر
بمصر عابراً في رحلتى الربيع والخريف ويشاهد في الدلتا
والفيوم ووادي النطرون وسينا والوجه القبلى .

خاطف الذباب مطوق Muscicapa albicollis albicollis
يفد إلى مصر في الربيع من مارس إلى أبريل وهو واسع الانتشار
ويتغذى على الحشرات أثناء طيرانه .

نفشارة الغرب Phylloscopus t. trochilus توجد في
مصر وسينا عابرة في رحلتى الربيع والخريف وهي كثيرة
في رحلة الخريف حيث تنتشر في الدلتا والفيوم ووادي النطرون
والمنطقة الساحلية غرب الإسكندرية .

سكسكه Phylloscopus c. collybita من طيور مصر
القواطع التي تقضى فيها الشتاء من سبتمبر حتى أبريل .

هازجة القصب الصياحة المصرية *Acrocephalus s.*

stentoreus من طيور مصر المقيمة حيث تعم الحدائق والمزارع وتضع من ٣ — ٤ بيضات في عش تنسجه حول سيقان النباتات.

خنشع الزيتون المصرى *Hypolaïs p. pallida* زائر

صيفي في مصر حيث يمضى بها الربيع والصيف ويبيض ويفرخ فيها ، وهو طائر معروف مشهور في الدلتا والفيوم ووادي النطرون وفي الوجه القبلي حتى بني سويف ويبني هذا الطائر عشه في الحدائق أو في صغير النخيل أو بين فروع النبات المتسلق ويقيمه من الحشائش الجافة وفيما بين أواخر مارس وأبريل يضع من ٣ — ٤ بيضات لونها أبيض بنفسجي باهت وعليه بقع بنية داكنة وتبيض الأثنى مرتين في السنة .

دخلة روبل أو نممة الشجر *Sylvia ruppeli* من طيور

مصر المقيمة حيث يوجد في مرتفعات سيناء الجنوبية والشرقية وتلال المقطم بقرب القاهرة وعلى امتداد الطريق بين مصر والسويس وبالقرب من أسوان والأقصر وعلى امتداد الطريق بين قنا وأسوان ويبني عشه في الصحراء بين أغصان الشجيرات الشوكية وذلك في شهر فبراير ويضع في الفترة ما بين مارس وأبريل من ٤ — ٥ بيضات لونها أبيض عليها بقع حمراء صغيرة ويفرخ مرة واحدة في السنة .

فصية مروحية الذنب (أم قصى) *Cisticola J. cisticola*

من طيور مصر المقيمة وتوجد في كل الدلتا ووادي النيل حتى الأقصر وفي الفيوم ووادي النطرون ومنطقة قناة السويس ويبني هذا الطائر عشه على شكل الفنجال وينسجه بمهارة بين سيقان الأشجار الشوكية والشجيرات ويوجد العش قريباً من الأرض ويضع في الفترة من منتصف فبراير حتى أول يونيو من ٢-٥ بيضات ذات لون أبيض أو أزرق وتوجد عليها نقط أو خطوط بنية محمرة .

فصية الفيوم *Prinia g. gracilis* من طيور مصر الأوابد

التي لا توجد إلا في الفيوم وهي تبني عشها من الحشائش الجافة وتبطنه بأوراق النباتات وتضع الآتى من ٣-٤ بيضات محمرة باهتة عليها بقع بنية محمرة في أوائل مارس .

فصية وادي النطرون *Prinia gracilis natronensis*

من طيور مصر الأوابد التي تستوطن وادي النطرون وهي تشبه سابقتها في السلوك وفي اللون إلا أنها أذكى .

أبو قلنسوة *Sylvia a. attricapilla* تفد هذه الطيور

بكثرة عبر مصر في رحلتى الخريف والربيع ويبقى بعضها ليقضى الشتاء في مصر وسينا .

زريقة فيراني Sylvia c. communis من طيور مصر
القواطع النادرة التي تمر عابرة في رحلتى الخريف والربيع
وهي طيور رشيقة الحركة بادية النشاط بديعة الشدو تتغذى على
الحشرات وبعض ثمار الأشجار

دخله رأساء الفيوم Sylvia melanocephala norrisae
من طيور مصر الأوابد التي لا توجد إلا على بحيرة قارون .

دخله أم نضارة أو دخله غرباء Sylvia c. conspicillata
تستوطن سيناء والصحراء الشرقية وهي ليست قليلة حول الفيوم
ووادى النطرون والأرجح أنها تفرخ في هذه الجهات الأخيرة
بدليل العثور على أعشاش لا ريب في أنها لهذه الطيور وتبنى
أعشاشها فوق الأشجار الصغيرة من الأغصان وتبطنه بالعشب
اللين والشعر .

ثرثارة الشجر المصرية Crateropus fulvus acaciae
من طيور مصر الأوابد التي لا توجد إلا على بحيرة قارون .

ثرثارة فلسطينية Crateropus s. squamiceps يستوطن
من مصر شبه جزيرة سيناء حيث يوجد في وادى الجديرات
ومنطقة السويس .

عصفور الشوك Prunella m. modularis من الطيور
النادرة في مصر في الشتاء .

الببليل الأحمر دخله حميراء Erythropygia g. galactotes

يفقد إلى مصر في الربيع ويقضى فيها الصيف ويبيض ويفرخ بها وهو واسع الانتشار ولا تخلو منه حديقة ويوجد في مصر في الصيف على امتداد مجرى النيل وعلى ساحل سيناء الشمال والمرجح أنه يفرخ في أواسط سيناء وعلى ساحل البحر الأحمر ويوجد كذلك في الفيوم وفي معظم واحات الصحراء الغربية وتظهر جموعه في مصر عند أوائل أبريل وتبارحها في آخر سبتمبر . وتبنى أعشاشها من الجذور الجافة وسيقان الحشائش وتبطنها بالشعر والصوف وتعمد إخفاؤها بين الأسوار النباتية الشائكة وتضع في العش بين أوائل مايو وآخر يونية من ٢ - ٥ بيضات بيض عليها بقع رمادية وتبيض مرتين في السنة .

سمنة مطربة Turdus philomelos philomelos قاطع

شتوى إلى مصر وسيناء في جموع كبيرة ولكنه لم يشاهد في الوجه القبلي والفيوم .

شحرور شامى Furdus merula syriacus يفقد إلى مصر

في الشتاء حيث ينتشر في الدلتا .

سككة Monticola saxatiis يشاهد في مصر عابراً في رحلة

الربيع ويمكنك بها بعض الوقت ولا يوجد في مصر في رحلة الخريف .

أبلىق Oenanthe o. oenanthe يمر بمصر عابراً في رحلتى
الربيع والخريف .

أبلىق البادية المصرى Oenanthe d. deserti من طيور
مصر الأوابد الصحراوية وهو صفير الحجم ويضع بيضه
الأخضر الأبقع في الشقوق .

أبلىق الصحراء Oenanthe d. homochroa يستوطن
من مصر الصحراء الغربية .

أبلىق حزين مصرى Oenanthe l. lugens من طيور
مصر الأوابد التى تستوطن سيناء والصحراء الشرقية كما تستوطن
قلة منه الضفة الغربية لنهر النيل ويضع الأبلىق بيضه في شقوق
الصخور وفي الجحور ولونه أخضر مائل إلى الزرقة عليه نقط
بنية محمرة .

أبلىق أحمر العجز عربى Oenanthe m. brooksbanksi
من طيور مصر الأوابد حيث يستوطن الهضبة الشمالية من
سيناء .

أبلىق أبيض العجز Oenanthe leucopyga مقيم بمصر
في الصحراء الغربية وهو واسع الانتشار وخاصة في الواحات
ويمتد انتشاره إلى وادى النيل وسيناء .

أبلىق أبيض العجز سينائي Oenanthe l. ernes'i من طيور
مصر الأوابد حيث يستوطن المناطق الجبلية في جنوب سيناء
ويحتمل وجوده في جبل علبة .

أبلىق منفلس Oenanthe monacha من طيور مصر
الأوابد حيث يستوطن المناطق الصحراوية من شبه جزيرة سيناء
والتلال المحيطة بالقاهرة وبقرب حلوان وينتشر جنوباً حتى
الأقصر وأسوان .

قلبي أسود الذنب فلسطيني Cercomela m. melanura
مقيم بمصر في الصحراء الغربية وهو واسع الانتشار وخاصة في
الواحات ويمتد انتشاره إلى وادي النيل .

قلبي أسود الذنب Cercomela m. hypura يستوطن
من مصر جبل علبة على ساحل البحر الأحمر .

قلبي منطوق أو قستقة Saxicola torquata rubcola
يوجد في مصر حيث يقضي الشتاء فيها ، وهو واسع الانتشار في
معظم أنحاءها .

هزاز أوروبي Luscinia m. megarhynchos واسع
الانتشار في مصر ولا يغرد فيها رغم كثرة تغريده في مواسمه
الأصلية ويوجد في الحدائق والأراضي المنزرعة بكثرة .

عندليب *Luscinia luscinia* يمر عندليب بمصر عابراً
في رحلتى الخريف والربيع ولكن في قلة ، وهو يغرد في النهار
تفريداً عذباً على عكس الهزاز .

مسهر لبلا ندى *Luscinia s. svecica* قاطع إلى مصر
وسينا في الشتاء ويشاهد بكثرة في معظم أنبائها .

أبو الحناء *Erithacus rubecula rubecula* يقطع إلى
مصر في الشتاء حيث يرى في الدلتا بكثرة وفي المناطق الساحلية
على البحر الأحمر وفي جبل علبه .

خطاف — عصفور الجنة الأوروبي *Hirundo r. rustica*
تمر جموع الخطاف بمصر عابرة في رحلتى الربيع والخريف وهو
يقتنص الحشرات أثناء طيرانها .

خطاف — عصفور الجنة المصري *Hirundo r. savignii*
من طيور مصر الأوابد ويبنى عشه من الطين ويثبته في جدران
المنازل ويبطنه بالريش والصوف ويضع من ثلاث إلى خمس
بيضات ذات لون أبيض وعاليها نقط حمر .

سنونو الصخر الباهت *Riparia r. obsoleta* من طيور
مصر المقيمة حيث يوجد في شبه جزيرة سيناء وحول أهرامات

الجزيرة وعلى ضفتي النيل والبحر الأحمر ويوجد كذلك في الفيوم والواحات الداخلة والخارجة ويبنى عشه في الطين .

سنونو الجروف والشواطئ المصرية Riparia r. shelleyi

زائر صيفي إلى مصر حيث يقضى فيها الربيع والصيف في الدلتا ومنطقة قناة السويس ووادي النطرون ثم يرحل عنها في الشتاء في شهر سبتمبر إلى السودان وساحل البحر الأحمر .

دقناش حردى Lanius minor يوجد في مقهر عابراً في رحلتى الخريف والربيع غير أنه نادر في الأخيرة .

صرد البادية Lanius excubitor elegans من طيور مصر الأوابد حيث يوجد في مناطقها الصحراوية وعلى حدود الأراضي المنزرعة والفيوم والسويس ويبنى عشه من سيقان النباتات الجافة ويبطنه بالصوف ولون البيض أبيض عليه بقع رمادية .

صرد البحر الأحمر Lanius excubitor aucheri من طيور مصر الأوابد التي تستوطن جنوب سيناء وجبل علة على البحر الأحمر .

دقناش أوروبى Lanius s. senator يمر بمصر عابراً في رحلة الخريف والربيع ويكثر في الأخيرة .

دقناش قبضى Lanius nubicus : يمر بمصر عابراً في
رحلاتي الربيع والخريف وهو يفضل الحدائق ويمر على الأفرع
القريبة من الأرض .

دقناش أكل Lanius cristatus collurio : يوجد في
مصر عابراً في رحلاتي الخريف ، أما في رحلة الربيع فلا يرى إلا
في سيناء مما يدل على أنه يتخذ إلى موطنه طريقاً غير طريق النيل
والدلتا وقنا .

دقناش وردى الصدر Rhodophoneus r. cruentus
من طيور مصر المقيمة في جبل علبه على البحر الأحمر .

الصغير Oriolus o oriolus يمر في مصر عابراً في رحلاتي
الخريف والربيع وهو واسع الانتشار جداً في مصر وأكثر
ما يوجد على أشجار التوت .

غراب أسخم مغربي Corvus corax tingitanus من
طيور مصر الأوابد التي تستوطن منطقة السلوم حتى برج العرب
ويضع هذا الطائر من ٣ — ٥ بيضات لونها أصفر باهت تخالطه
زرقة وعليها علامات بنية داكنة .

غراب نوحى Corvus ruficollis من طيور مصر
الصحراوية ويوجد كذلك على ساحل البحر ولون الرأس
والعنق والرداء العلوى والصدر بني أسود وبقية الريش أسود

له بريق أرجواني ويبنى عشه من السيقان ويبطنه بالأوراق الجافة
والصوف فوق قمم الجبال وفي الأودية المهجورة الجافة .

غراب مروحي الذنب Corvus rhipidurus من طيور
مصر الأوابد التي تستوطن شبه جزيرة سيناء وجبل علبه على
البحر الأحمر .

غراب بلدى Corvus c. sardonius من طيور مصر
الأوابد المعروفة ويوجد في كل مكان إلا المناطق الصحراوية
ويضع عشه على الأشجار العالية ويبيض طول السنة تقريباً وهو
ذو دهاء ومكر .

غراب غداف Corvus f. frugilegus قاطع شتوى إلى
مصر حيث يشاهد فيها بين أواخر شهر نوفمبر وأخر شهر يناير .

غراب الزرع Corvus monedula soemmeringii
شوهدت منه أفراد بين يافع وغير يافع في السويس ولذلك
يرجح أنه يفرخ هناك الأمر الذي لم يثبت حتى الآن .

خليش (زرزور أوروبى) Sturnus v. vulgaris
تفد إلى مصر جموعه الكثيرة لتقضى فيها الشتاء وهو يضر
بالمحاصيل لكثرة ما يعمل بمنقاره باحثاً عن غذائه .

تمير عربي Cionyris nabessinicus hellmayri من
طيور مصر الأوابد في جبل عليه .

تمير وادى النيل Nectarinice nectallica من طيور
مصر الأوابد يغشى الحدائق ويمتص رحيق الأزهار وهو من
أجمل طيور مصر حقاً حتى أنه يلقب بالمساة الطائرة ويبني
عشه من أغصان الأشجار ويضع فيها من ٣ — ٤ بيضات
بيضاء اللون .

صعوه متوجة Regulus r. regulus أدخل ضمن قائمة
الطيور المصرية لصيد أربعة أفراد منه في الجزيرة فيما بين سنة
١٩١٠ ، ١٩١٦ وهذا لا يعدو أن يكون شروفاً .

خفيري Chloris c. chlorotica فقد جموعه الكبيرة
إلى مصر وسينا لتقضى الشتاء وقيل أنه آبد في أقصى الشمال
من سينا .

حسون Carduelis c. niedlecki من طيور مصر
الأوابد وأكثر ما يوجد حول القاهرة ويفرد تغريداً عذباً ويضع
من ٤ — ٦ بيضات لونها أبيض به زرقة وتبنى أعشاشها على
الأشجار .

عصفور تفاحى *Acanthis cannabina mediterranea*

زائر شتوى إلى مصر حيث يوجد بكثرة في الدلتا وينتشر جنوباً في الفيوم .

صباح أورو *Serinus canarius serinus* يفسد

إلى مصر في الشتاء وهو من نوع الكنارى وليس له عذوبة صوته .

زمير مصر *Erythrospiza g. githaginea* من طيور

مصر الأوابد الصحراوية ويتغذى كبقية فصيلته على الحبوب ويضع ٤ بيضات في شقوق الأحجار .

زمير سينائى *Erythrospiza g. crassirostris* من طيور

مصر الأوابد التى تستوطن شبه جزيرة سيناء .

زمير مغربى *Erythrospiza g. zedlitzii* من طيور

مصر الأوابد القليلة التى تستوطن تلال شرق النيل وبحوار القاهرة وحلوان .

عصفور وردى سينائى *Erythrura s. synoica*

يستوطن المناطق الجبلية من سيناء إذ يشاهد بكثرة حول جبل كاترينا في هذه البقعة الغنية بالنباتات ويوجد هناك في مناطق يصل ارتفاعها إلى ٢٠٠٠ متر .

عصفور ظالم Fringilla c. coelebs من المهاجرات

الكثيرة إلى مصر حيث تقضى فيها الشتاء (شكل ٢٨) .



(شكل ٢٨) عصفور ظالم

عصفور النيل Passer domesticus niloticus من طيور

مصر الأوابد ويوجد في الدلتا والسويس ووادي النيل حتى
أسوان ويبني عشه في جدران المنازل من القش ويضع فيها خمس
بيضات بيضاوية وعليها نقط بنية ابتداء من شهر مارس حتى
شهر يونية .