

البيضات بين أظفارهم ثم من العاده أن الاطفال المسفار لا يتناولون بخافاة أيديهم عند الشروع في أكل الأطعمة فتباعد البيضات مع الأطعمة فلا تزال الماء وى باقية بأجسامهم (٣) يجب سرعة الذهاب إلى دور المستشفيات حيث هناك يعطى العلاج الخاص بهذه الديدان الذى يحسبها مرة واحدة

(الباب التاسع)

التنية أو الدودة الوحيدة

التنية طفيلة من الطفيليات التى تستحق الذكر فى هذا الموضوع لأنها طفيلة تحتاج إلى علاج نابع بالنسبة لخطورتها على الأشخاص المسابين بها وقد ثبت من الفحص الميكروسكوبى أن بيضتها بيضاوية الشكل صغيرة الحجم سميك الغلاف غامقة اللون اذ بها جنين تظهر منه ستة خطافات كل اثنين متقاربين ثم إبعادها نحو ٤٠ فى ٤٠ ميكرون

أعراضها

(١) ضعف عام فى جسم الشخص المصاب بها

- ٢٠ نزول بعض اجزاء الدودة في براز الافراد المصابين يشبه لب القرع .
- ٢١ اصفرار لون وجه المريض .
- ٢٢ يشكو المريض آلام في المعدة من تأثير الدودة .
- ٢٣ الشراهة في الاكل :

(طرق الوقاية)

- ١ عدم الاختلاط بالمرضى المصابين بها .
- ٢ عدم التبرز في قارعات الطرق العمومية لعدم انتشار العدوى .
- ٣ الامتناع عن أكل الاطعمة التي يسقط عليها الذباب لأنه يساعد على عدوى مرض الدودة الشريطية :
- ٤ سرعة إرسال المرضى المصابين بهم - لنا المرض إلى المستشفيات لاجل معالجتهم حتى لا يتسرب العدوى منهم إلى الاشخاص الاصحاء :