

## بيان الصور

الخلية النباتية ومحتوياتها: (راجع الصورة المرفقة التي في صدر العدد)

- ١ سنتروزوم بنتروسفيرها وتشمعها النجمي Asters
- ٢ نوية النواة — ٣ جدار النواة — ٤ عصير نووي « Karyolymph »
- ٥ شبكة النواة المكورة من اللين والكروماتين — ٦ بلاستيده — ٧ مادة ميتايلازمية راسبة — ٨ كوندريوم — ٩ فجوة — ١٠ غشاء ثا كيوبي — ١١ سيتوبلازما — ١٢ جدار الخلية

### انقسام النواة الغير مباشر

(شكل ٢) ١ — النواة في طور الكون ٢ — النواة في المرحلة المماجة سيرم (ظهر الكروماتين على شكل حبل نحين ملتو على نفسه) ٤٣ — النواة في المرحلة المماجة استرويد (انقسم الحبل الكروماتيني انقساماً عرضياً الى وحدات كروموسومية) وهاتان المرحلتان يمر عنهما بالطور الاول (Prophase) ٦٥٥ — النواة في الطور الثاني المسمى — Metaphase — (انشقاق الكروموسومات طولياً بعد ترتيبها على خط استواء الانقسام فيتضاعف عندها) ٨٤٧ — النواة في الطور المسمى Anaphase (حيث يتجه كل نصف من الكتلة الكروموسومية الى احد القطبين)

٩ — النواة في الطور الاسيرمي المزدوج (حيث تصل كروموسومات كل قطب بعضها ببعض ابان تكون النواتين البنويتين : « Telophase »  
 رسم تخطيطي لانقسام الكروموسومة انقساماً طولياً (اصل النصفه)  
 ا — كروموسوم ابتدأ في الانشقاق طولياً . ب — اصبح الكروموسوم الاصيل كروموسومين ك<sup>١</sup> — ك<sup>١١</sup> ج — اخذ الكروموسومان في الاقتراد والتباعد احدهما عن الآخر مع اتصالهما دائماً بالالياف المنزلية م . د — اتجه كل منهما في اتجاهين متقابلين قاصدين قطبي المنزل  
 (شكل ٣) ١ — يتخذ شكل وتكوين البلاستيده في نبات الاسيروجيرا

Spirogyra شريطة حلزونية الشكل

ب - يمثل الشكل المغزلي لبلاستيدة الاثرسيروس  
 ج - يمثل الشكل الاسطواني ذا الاطراف غير المنتظمة لبلاستيدة الطحلب  
 المسمى *Draparnaldia* الخ  
 (شكل ٤) يمثل الطور الزواجي لفطر الصدا الابيض على نباتات التفصيلة  
 العليبية - *Cystopus Candidus* - يلاحظ مرور اعضاء الكوندريوم  
 من الجاميطة المذكورة *Anth* الى الجاميطة المؤنثة *Oog* مما يثبت وجودها  
 باستمرار في جميع اطوار حياة النبات وانها لا تنشأ من جديد. كذلك نشاهد  
 اندماج نواتي الجاميطين احدهما في الاخرى اذ ان تكوين البيضة  
 (شكل ٥) - جملة حالات تبين طريقة الانقسام التبرعمي في نبات  
 الخيرة المسمى *Saccharomyces cerevisiae* وكيفية تكوين الفاكيول البنوي  
 - ب - من الفاكيول الأبوي - ا - واتصاله عنه اخيراً وذلك بانقسام الاخير  
 ٢ - جزء من هيفا الفطر المسمى *Penicillium glaucum* محترماً على  
 عدد من التفجوات

٣ - جرثومة الفطر مستبنة - يلاحظ انقسام الفاكيوم الاصلي ومرور  
 انتقاله الناتج عن هذا الانقسام الى الانوية الانبائية  
 ٤ و ٥ - طريقة تكوين الكونيديا وكيفية انقسام الفاكيوم الاصلي ووصول  
 الفاكيول البنوي اليها

كل هذا دليل قاطع على ان الفاكيوم من الطوائف المستديرة في الخلية النباتية  
 وذلك بانتقاله هكذا من طور الى آخر في نفس النبات اي انه لا ينشأ من جديد  
 بل ينشأ من آخر وجد قبله املاً  
 (شكل ٦) برهان على استقلال طائفة البلاستيدوم عن طائفة الكوندريوم  
 في نبات السلاجينيل *Selginelle*

١ - خليتان اوليتان لهذا الطحلب : يلاحظ وجود بلاستيدة خضراء  
 واحدة (ب) في كل منهما حول النواة (ن) بينما عدد اعضاء الكوندريوم (كو)  
 كبير اما اعضاء الفاكيوم (ق) قليلة بداخلها اندوكروميدى (ند)  
 ٢ - طور تال لاحدى هاتين الخليتين حيث انقسمت البلاستيدة الاولى  
 الى اثنتين بنويتين ٣ - طور آخر يبين اربع بلاستيدات نتجت عن الانقسام الثاني

للبلاستيدين المتوه عنهما في طور ٢

٤ - طور رابع يوضح الاقسام الثالث للبلاستييدات الاربع الساتفة وهم جراً. اذن يتضح من ذلك ان البلاستيديم قد نشأ والحالة هذه من بلاستيطة واحدة وجدت اصلاً بمخلاف الكوندريوم

٦٥ - احدى الخلايا الجينية لجذير حبة الشعير فيها اعضاء الكوندريوم (كو) مصبوغة بالهيماتوكولين بينما اعضاء الفاكيوم (ق) شفافة

٧ - بعض خلايا باجنينية لجذير زرة الخروع حيث توجد رواسب كروماتينية في القجوات « ند » بينما يوجد الكوندريوم « كو » على حالة عسوية وحببية معاً (شكل ٧) تكوّن الايرون (حبوب اليرونية) في البيومين ثمرة الخروع بعد التفحص الحيوي مستعياً على ذلك باستعمال احدى الصبغات الحية لتفاكيوم وليكن في هذه الحالة الاحمر المعادل Bouge Nentre - وهو جانب من الصفحة الملونة بالاحمر والاسود

من ١ الى ٦ تطورات خلايا الطبقة الخارجية للايومين ومن ٧ الى ٩ خلايا من الطبقة البرنشية (الداخلية) للايومين واطوارها المتتالية اثناء نضج الثمرة :

١ - خلية من ثمرة حديثة التكون جداً بها فاكيول كبير واحد مصطبغاً بالاحمر المعادل - يلاحظ بدء تكوين بعض حبيبات زيتية في السيتوبلازما - ٢ خلية من ثمرة اكبر سناً فيها يرى ان الفاكيوم السالف الذكر قد انقسم وتجزأ الى عدة فجوات وان الحبيبات الزيتية (الشفافة) كثر عددها - ٣ خلية من ثمرة ابيض غلافها وابتداءً ان يتخشب، فيها تحول العصير الفاكيومي الى مادة غروية (كلويدية) التركيب كذا المادة الزيتية آخذة في الانتشار - ٤ و ٥ في هذا الطور قد اسود غلاف الثمرة وتخشب فعلاً - نلاحظ ان القجوات قد اتصلت واندمجت بعضها ببعض وكونت شكلاً شبكياً احمر ايها السيتوبلازما أصبحت مكثفة الحبيبات الزيتية غير المصطبغة الشفافة - ٦ تجزأ الفاكيوم الشبكي الى عدة فجوات كرية الشكل لا تثبت طويلاً فتتحول الى حبوب اليرونية في الثمرة التي تم نضجها كما في طور ٩ - ٧ خلية من الطبقة الايوميونية الداخلية حديثة جداً تحتوي على فاكيوم مائي التركيب - ٨ خلية من نفس الطبقة لثمرة كاد يود غلافها بها عدة فجوات نشأت من اقسام الفاكيوم الكبير السالف الذكر - ٩ خلية اكبر سناً من ثمرة

تم نضحها وامود غلافها واصح ملياً للغاية وتكونت فيها الحبوب الاليرونية (شكل ٨) - وهو الجانب الثاني من الصفحة الملونة بالاحمر والاسود - تطور الاليرون (الحبوب الاليرونية) وتحوطه الى الحوات اثناء انبات ثمرة الخروع : من ٦:١ خلايا الطبقة الخارجية لا ييومين ثمرة الخروع مبينة التطورات المتتالية للاليرون اثناء عملية الانبات

- ١ - احدى خلايا ثمرة الخروع الناضجة ابان الانبات : يلاحظ انها تحتوي على كثير من الحبوب الاليرونية المصبوغة باللون الاحمر المبعثرة بين السيتوبلازما المكتظة بالحبيبات الزيتية ٢ - احدى خلايا الثمرة بعد مضي ستة ايام من عملية الانبات : يشاهد حدوث تغير محموس في شكل الحبوب الاليرونية حيث تأخذ شكلاً غير منتظم deformation ٣ - يلاحظ بعد خروج الجذير ان الحبوب الاليرونية اندمجت بعضها ببعض وكونتفاكوماً شبكياً ٤ - الطور التالي للفحيت يشاهد الفاكيوم على حالة سائل تقريباً آخذاً شكل حبل تخمين (طول الجذير نصف س.م تقريباً) ٥ - تجزأ الفاكيوم السابق الى عدة حوات كروية الشكل ومختلفة الحجم (اصبح طول الجذير مستقيماً واحداً) ٦ - بعد ان يبلغ طول الجذير ٣ س.م. نلاحظ ان تلك الفجوات قد اندمجت بعضها ببعض فكونتفاكوماً كبيراً في وسط الخلية ٧ - خلية برانتيمة البيوميذية فيها الفاكيوم مكروم من حبوب اليرونية منتفخة نوعاً ٨ - حالات متعاقبة لاستحالة الحبوب الاليرونية الى حوات (١) فاكيول متغير قليلاً (ب) يلاحظ ان محتويات الفاكيول المتجزئة قد تجمعت فوق الجدار الفاكيولي (ج) يلاحظ حدوث راسب على سطح محتويات الفاكيول وكذا في تقطين من جداره (د) يشاهد اندماج فاكيولين احدهما بالآخر (شكل ٩) يوجد الكونديريوم في خلايا الحيوان والنبات دائماً فنلاً في شكل (١) يظهر مجسيم اشكاله في خلايا احدى كليتي الضفدعة وكذا في (٢) الذي يمثل بعضاً من خلايا كبدها ثم (٣) يمثل خليتين من الغدة اللعابية في فم الانسان بينما الرابع يبين احدى الخلايا العصبية للخنزير الهندي . اما ه و ٦ فالاول يمثل كونديريوم احدى امكوسات البامتولارياً قسيكولوزا *Pastularia Vesiculosa* والثاني هيئات الطفيل التسمى ساپروليجينا *Saprolegnia* مع كثير من الحبيبات الزيتية (ز)

## التعاون والاقتصاد الزراعي

لما رأيت ما للحركة التعاونية من اتساق الخطى في مصر وما يخطر لها من عظيم الاتري الحياة الاقتصادية والاجتماعية انما افردت هذا الباب لشرح مقالات ورسائل عن كل ما يهم الجيئات التعاونية وانضمامها ويساعد على نشر التعاون وتقدمه . وقلم التحرير يتخير هذه الفرصة لعرب من ترجمه بقدر ما يرسله اليه اعضاء الجيئات التعاونية من رسائل واخبار . وخير الكلام ما قل ودل

### نجاح بعد فشل وغنى بعد فقر

للصبر الصبر مراد البكرى

« نبدأ في هذه الصفحات سلسلة قصص صحيحة الواقعية الآن ان  
اسماء اعلامها واماكنها متغيرة ، والنرض منها استخلاص دروس  
عملية تلقيها علينا اختبارات الآخرين - التحرير »

كانت قرية ميت فضيلة كباتي القرى الصغيرة المنتشرة في ريف مصر الجميل لا يميزها عن غيرها الا فقر اهليها المدقع وقنارة حوازمها ويوتها وقلة سكانها - الذين لا يربون على الالف - وصغر زمانها الذي لا يزيد عن المائتي فدان الا انه بالرغم من كل هذا فان هذه القرية تعد بحق من اجمل بقع الريف المصري ومحيط بها صباح كنيف من اشجار الكافور الباسقة التي تظل من عاليها على ترعة جميلة على شكل نصف دائرة تحمى بينها قرية ميت فضيلة كأنها طفل صغير تزيه وترمقه بعنايتها . . . . . وكان في القرية شيخ وقور يدعى الشيخ نجم الدين فضيلة رئيس اسرة فضيلة العريقة النسب والتي اليها تنسب القرية وهو بحكم شرف محنته وعريق نسبه يسيطر سيطرة روحية على جميع اهالي القرية الذين يعتبرونه بمثابة اب شغوق يركنون اليه ايام الشدائد والمحن . وكان كذلك بالقرية عند بدء هذا التاريخ شخص يدعى فريد افندي مجهول من الجميع الا لدى افراد قلائل من الاهالي الذين لم يزالوا يذكرون انه كان له اكرام نصيب في فشل شركة تجارية كان الغرض منها تمويل اهالي القرية بمحاجلتهم المنزلية ولهذا كان الشيخ نجم الدين يرمقه دائماً بعين الشك والحذر ولا يرتاح ابداً الى احاديثه الطولية الظاهر الجوفاء الجوهر

لم يرض ملته وجيزة على ظهور فريد افندي بين ظهراني القوم ثانياً الا وانضج غرضه وهو العناية لتأسيس جمعية تعاونية تقوم على اساس قانون التعاون ، ولما كان الشيخ نجم