

الفصل الأول

الاحمرار بين التثنيات

هو التهاب حاد يقع في التثنيات الجلدية أحمر اللون مصحوبا بافراز وسلخ في الطبقة البشرية .

العوارض — يبدأ باحمرار في الجلد مع غزارة في العرق ومع الإهمال يسلمخ الجلد وقد يتكون أحيانا بعض حويصلات وبثور ، يقع عادة في ثنايا الإليتين وما بين الفخذين وتحت الثديين والابطين وفي الرقبة عند السمن .

الأسباب — ينشأ عادة عن الحكاكة التي يولدها افرازات مهيبة ولذا يصير المكان صالحا لنمو الميكروبات وعند الإهمال قد يكون السبب وجود بعض حشرات فتحدث العدوى بالميكروب العنقودي ويكثر حصوله عند السمان خاصة الأطفال وتعتبر أحوال الافرازات اللبنية والبول ، كذا الأشخاص المصابون بالبول السكري عرضة للإصابة بالمرض ، وأيضا كثرة استعمال الصابون والماء قد يكون سببا في إحداث إصابة خصوصا اذا كان الصابون قلويا زيادة عن المعتاد .

التشخيص — في مرض الغليان نجد رشحا في الطبقة الجلدية علاوة على الطفح المتنوع مع الحكاكة الشديدة ، وقد يصعب علينا التشخيص في الافرنجي الوراثي الذي يحتم علينا فحص الأغشية والأعضاء التناسلية والعوارض الأخرى فإن لم يكن هناك شيء يرجح أحدها عن الآخر يحسن فحص الدم على طريقة وارمان .

العلاج — يحسن دائما نظافة التثنيات وإزالة ما يعلق بها من الوسخ عند السمان وذلك بمسح هذه الأجزاء بماء الكاونيا مضافا إليها قليل من الماء وفي أحوال أخرى تستعمل مسحوقات قابضة عقب التنظيف ، كأكسيد أوزينات

الزئبق ممزوج بقليل من مسحوق النشاء أو مسحوق الأرز المعطر وعند العامة يستعمل الاسبيداج للأطفال وهو مسحوق طباشيري قابض . وبديهي أن المراهم لا تفيد ، وفي حالة وجود إفراز صديدي يحسن استعمال مطهرات بسيطة دافئة مثل محلول البوريك $\frac{1}{100}$ أو محلول برمنجانات البوتاسيوم بنسبة $\frac{1}{1000}$ ثم تجفف الأجزاء وتوضع المسحوقات ويحسن الفصل بين التثنيات بقطعة من الخرقه ولا ينصح باستعمال حواجز من القطن .

فإن لم ينفذ هذا العلاج يحسن استعمال مس الجزء بمحلول تترات الفضة بنسبة $\frac{1}{100}$ مرة أو مرتين في الأسبوع أو استعمال كمادات باردة من محلول تحت خلات أولبنات الرصاص .

وغنى عن البيان أن تلاحظ الصحة العامة كعلاج البول السكري مثلاً أو إصابات المعدة .