

# افضل البايو

## أمراض الأعصاب

### الحكة العصبية

مرض في وظيفة الجلد يمتاز بحكة شديدة دون ظهور أى عرض جلدى ظاهرى :

العوارض — الأولية منها حكة وتخدیر ونمل موضعى قد تضاعف باختقان وسلخ ورشح وظهور حليبات عدسية نتيجة الحكة الشديدة وقد يكون ذلك موضعيا بالشرح مثلا وأعضاء التناسل خاصة عند الحبالى وجلد الصفن أو فى مواضع مختلفة كما وقد يعم الجسم بأجمعه : ويكثر فى سن الكهولة والشيخوخة ويصحب بحفاف فى الجلد . وان الرغبة فى حك الجلد لا يمكن مقاومتها : وقد تحصل فى أحوال اليرقان ومن المؤكد أن للحالة العصبية الامامة تأثيرا كبيرا فى المرض .

الحكة فى الدبر أكثر الأنواع شيونا وقد تمتد الى ما حوله من الجلد ونادرا تصطحب بشق دبرى وبواسير دبرية وقد تضاعف بداء الغليان أو السرطان . وهناك أيضا حكة الصيف وتظهر فى أشهر الصيف وتزول فى الشتاء وحكة الشتاء وتظهر فى شهر ديسمبر وتمكث الى شهر أبريل ثم تزول وتصيب الأطراف السفلى عادة ولكنها قد تمتد لباقي الجسد : وتأتى للذين هم فى سن المراهقة .

السبب — يمتاز بعض الناس بجلد ذى إحساس فوق العادة : وهذه الخاصية تجعلهم عرضة لمرض الحكة العصبية ويساعد وجودها أيضا سن الكهولة أو الشيخوخة واليرقان والبول السكرى وتعفن فى الأمعاء وزيادة نسبة فى حمض البوليك والحمل ومرض الجهاز التناسلى وتعاطى بعض العقاقير كالكوكايين والأفيون الخ .

وأما في الأحوال المرضية فلوجود الديدان والبواسير والامسك والشقوق تأثير في ظهور حكة الدبر . وظن بعضهم أن السبب ميكروب سبجي وحقن المرضى مصلا منه بدون فائدة . وللبول السكرى ومرض الرحم وللبيضين والحمل والسيلان الأبيض تأثير في ظهور الحكة في الشفرين والبظر والمهبل .

حكة الحمام — تنشأ عن الاستحمام بماء بارد جدا أو حار جدا خصوصا في الأشخاص ذوي الجلد الجاف الخشن .

التشخيص — سهل، ومن الضروري تشخيص المضاعفات .

الانذار — الحكة في عموم الجسم مظلمة الانذار : والحكة المرضية قابلة للتأطيف وللشفاء المؤقت ولكنها عرضة للنكسة .

العلاج — من الضروري معالجة المحرضات وإزالتها على قدر الاستطاعة . ينظم الغذاء فتمنع اللحوم والملحات (الحوادق) ويكثر من الخضراوات وشرب الماء الغير متلويح .

كذا يجب تعاطي اشاي والقهوة والخمر ويؤمر بمسهل : وفي الحكة العامة قد يفيد إعطاء البيروكارين بعد التأكد من حالة القلب ومستحضرات البرومور والكيما ولبينات الجير وساليسيلات الصودا وحقن محلول سكر العنب بنسبة ٦٠٪ بمقدار ثلاثين سنتيمترا مكعبا في الوريد ثلاث دفعات يوميا وينصح بلبس الملابس القطنية والحريرية عوضا عن الصوف وتدفئة الجسم بكثرة الملابس كذا عدم استعمال الصابون في الاستحمام أو الاكثار من الاستحمام نفسه ويحسن غسل الدبر ودهانه بمزج الراسب الأصفر بنسبة ١٪ مرتين يوميا أو مرهما مركبا من :

حمض فينيك ... .. ٠,٤ جرام الى ٠,٨ جرام  
محلول البوتاسيوم الكاوى ٠,٤ » » ٠,٨ »  
فازلين ... .. ٣٠,٠ »

أو مرهما من الكافور والكلورال بنسبة ١٠ ٪ .  
 أو المس مجلول نترات الفضة ١٠ ٪ مرة في الأسبوع .  
 ويفيد استعمال الأشعة المجهولة أو الراديوم في الحكة التناسلية وحكة الدبر  
 فائدة هامة بالتعرض لها مرة في الأسبوع برقع مقدار دون أى خطر .  
 واستعمل بعضهم حقنا موضعية تحت الجلد في حكة الدبر من الكحول نسبة  
 ٩٥ ٪ بنجاح كذا حقن ٥٠ .٠ من الكينا مرة كل بضعة أيام .  
 ويحسن اضافة الرضاخ ( الردة ) أو سلفات المانزيا للساء عند الاستحمام .  
 وأما في الحكة العامة فيستعمل بعضهم غسول المترك الذهبي مضافا اليه حمض  
 الفنيك بنسبة ٢ ٪ الى ١٠ ٪ أو زيت بذر الكان  
 وأيضا :

متول	...	...	...	...	٦,٠	جرام
تيمول	...	...	...	...	٨,٠	»
كلورال	...	...	...	...	٤,٠	»
كلوروفورم	...	...	...	...	٦٠,٠	»
زيت الكافور	...	...	...	...	٨,٠	»
» عنب القطا	...	...	...	...	١٥,٠	»
كحول	...	...	...	...	٢٤٠,٠	»

يمزج ويدهن موضعيا في أى جزء من الجسم .

أو مسحوق الكافور	...	...	...	٤,٠	جرام
أكسيد الزنك	...	...	...	٢٠,٠	»
مسحوق النشا	...	...	...	٦٠,٠	»

ويستعمل مرهم حمض الساليسليك بنسبة ١ ٪ الى ٥ ٪ في الحكة الصيفية  
 بفائدة تذكر أو مرهم من المتول والفنيك بنسبة ٢ ٪ .