

## الفصل السابع

وظائف العناصر الغذائية & اعراض  
نقصها على النبات

obeikandi.com

وظائف العناصر الغذائية واعراض نقصها:

**Essential Nutritional Elements:**

**(Their Physiological Function, Availability and Symptoms of Deficiency and their corrections.**

**وظائف العناصر الغذائية الرئيسية.**

١) مواد بنائية كما في مكونات للنبات والانزيمات وجدران الخلايا.

لما أهم للعناصر للداخلية في بناء المواد فهي:

أ - النتروجين ويدخل في تركيب للبروتينات، الحوامض الامينية، الحوامض النووية (Nucleic Acids) والمركبات النتروجينية القلوية (Alkaloids).

ب- الفسفور ويشترك في تركيب المواد الـ Phospholipids, Nucleoprotein وكذلك و ATP و ADP.

ج - الكبريت ويدخل في تكوين البروتينات والحوامض الامينية وبعض الزيون.

د - الكالسيوم ويشترك في تركيب جدران الخلايا بالمركب Calcium Pectate أو يوجد في فجوات الخلايا النباتية كنتاج عرض للعمليات الفسيولوجية.

٢) التأثير الأزموزي أن الضغط الأزموزي للموجود في العصير الخلوي يكون ناتج من املاح العناصر الغذائية الذائبة فيه.

٣) التأثير على الـ pH والـ Buffer Action في العصير الخلوي:

أ- ان مركبات العناصر الغذائية لها بعض التأثير على الـ pH في العصير الخلوي بالرغم من أن معظم للتأثير على الـ pH ناتج من الحوامض العضوية والمركبات العضوية الاخرى في الانسجة النباتية.

ب- ان نظامي الـ Buffers المهمة والموجودة في النباتات هي Phosphate Buffer و Carbobate Buffer وانها تتكون من امتصاص مركبات الفسفور ومركبات الكربون من الوسط البيئي للنبات بالاضافة إلى اشترك، الايونات الموجبة للعناصر كالكالسيوم والمغنيسيوم واليونات،يوم.

٤) الاشتراك في مساعدة وتنظيم بعض العمليات الحيوية.

أ- الحديد والنحاس والزنك وهي تشارك في مجاميع متصلة ببعض الانزيمات وتسمى هذه للمجاميع (Prosthetic groups).

ب- المغنيسيوم والمنغنيز والكوبلت تعمل هذه كالمحفز (Activations) أو المثبط (inhibitors) في بعض للتفاعلات الحيوية الانزيمية.

٥) تشارك بعض العناصر في عملية التضاد (Antagonism) كما ذكر سابقا.

الوظائف الحيوية الدقيقة للعناصر الغذائية، توفرها واعراض نقصها وكيفية علاجها


من المعلوم أن عناصر الكاربون والهيدروجين والاكسجين تدخل في تركيب المواد البنائية كالبروتينات والكاربوهيدرات وجدران الخلايا وكذلك تدخل في الانزيمات ومنظمات للنمو (Growth Regulations) والحوامض النووية والمواد العضوية الاخرى وكذلك مواد الـ Cofactors الا انها متوفرة دائما للنباتات بشكل ثاني اوكسيد الكاربون والماء ونادرا ما يحدث نقص لأي منها أما العناصر الضرورية الأخرى فهي:

١- النتروجين: يعتبر النتروجين من أهم للعناصر الضرورية بعد العناصر الثلاثة المذكورة سابقا لانه يدخل في تركيب البروتينات والحوامض الأمينية وكذلك القواعد العضوية مثل Purines, pyrimidines وكذلك مركبات الـ porphyrins والـ Coenzymes ومن المعلوم ان القواعد العضوية مثل Pyrimidines, purines هي أقسام ضرورية دلخلة في تركيب الحوامض النووية مثل (Deoxy Ribonucleic acid) DNA وكذلك RNA (Ribonucleic acid) أما الـ Porphyrins فهي تشارك في تكوين المركبات الحيوية المهمة مثل مركبات الكلوروفيل ومركبات Cytochrome وهي مهمة جدا في عمليتين التركيب الضوئي وللتنفس شكل رقم (٧-١) أما الـ Coenzymes فهي مهمة لتنشيط عمل الانزيمات.

وعادة يأخذ النبات النتروجين بشكل ايونات الامونيوم  $NH_4^+$  والنترات  $NO_3^-$  والنتريت  $NO_2^-$  وبعض للمركبات العضوية مثل اليوريا الا ان اغاب هذه للمركبات النتروجينية يجب ان تختزل بتأثير الأنزيم (Nitrate Reductase) (شكل رقم ٢-١٣) إلى امونيا داخل جسم النبات قبل ان تدخل مجرى التمثيل إلى حوامض امينية وبروتين ومركبات عضوية أخرى.


أما أهم التفاعلات الحيوية المسؤولة عن دخول او تمثيل الامونيا إلى مادة عضوية هي:

١- التفاعل الحيوي بين الأمونيا و a - Keto Acid مثل الحامض العضوي - a .Keto (glutamic Acid)




ان هذا للحامض الاميني قد يؤدي إلى تكوين احماض أمينية أخرى بتفاعلات (Transamination) وتتجمع هذه الاحماض الأمينية بعمليات معقدة لتكون البروتين.

٢) التفاعل الحيوي الذي ينتهي بتكوين الـ (Glutamine) وهو نوع من الـ .Amide



ويشترك الـ (Glutamine) في تكوين القاعدة العضوية (Purine) التي تدخل في تكوين (Nucleotides) مثل (Adenosine Triphosphate (ATP), Guanosine Triphosphate (GTP) , Adenosine Diphosphate (ADP) وهي مركبات تشترك في تكوين الأحماض النووية (DNA) و (RNA) بالإضافة إلى انها مركبات مشحونة بالطاقة فتساعد في انجاز التفاعلات الحيوية.

(3) لتفاعل حيوي الذي يؤدي إلى تكوين الملمة العضوية (Carbamyl Phosphate)



والمادة (Carbamyl Phosphate) تشترك في تكوين القاعدة العضوية (Pyrimidine) والتي تدخل في تكوين (Nucleotides) بشكل (Thymidine CTP) (Uridine Cytidine Triphosphate (CTP) (Uridine Triphosphate (UTP) وهي مركبات تدخل في تكوين الأحماض النووية (DNA) و (RNA) كذلك انها مركبات ذات طاقة.

ان معظم الترب هي بحاجة للمركبات النتروجينية لسهولة فقدانه أثناء عملية الغسل وخاصة النتترات او لتحويل بعض مركباته إلى غاز النتروجين المتطاير بتأثير بعض مجبريات التربة للحية ومن الجدير بالذكر ان نقص النتروجين في التربة يؤدي إلى قلة نمو للنبات وظهور أعراض النقص المتمثلة بالاصفرار العام (Chlorosis) لقلة مادة الكلوروفيل في الاوراق القديمة التكوين شكل (٧-٢) ومن الاعراض الاخرى لنقص النتروجين في النبات هي تكوين صبغات أخرى غير الكلوروفيل كالانثوسانين (Anthocyanin) وقد تحدث هذه الحالة في سويقات وعروق أوراق الطماطة عندما ينقص النتروجين في التربة. كما ان الاستاذ عبد الهادي اسماعيل غني وجماعته (١٩٦٣) بينوا بعض أعراض نقص النتروجين التي تظهر على المحاصيل الخضرية كالطماطا مثلاً وأهمها صغر حجم النبات فوق سطح التربة وكبير حجم الجذور نسبياً وتصبح الاوراق صغيرة وتجف أطرافها وفي تقرير للدكتور يوسف حنا ١٩٧٥ أوضح بعض أعراض نقص النتروجين التي تظهر على أشجار الفاكهة ومنها بطئ سرعة النمو وقصر السلامة وقلة عدد وصغر حجم الأزهار والثمار والبذور. هذا وتصحح ظاهرة نقص التربة للنتروجين باضافة الأسمدة النتروجينية كسلفات الامونيوم او فوسفات الامونيوم او اليوريا بمعدلات تختلف باختلاف النباتات وخصوبة للتربة والعوامل الحيوية الاخرى. أما اذا كان النبات نامياً في وسط غذائي ذو كمية كبيرة من المركبات النتروجينية فيظهر للنبات علامات الاخضرار الغامق وكثرة النمو الخضري وضعف السيقان وطرأوة الأوراق مصحوباً بقلّة في نمو المجموعة الجذرية بالاضافة إلى قلة في تكوين الازهار والبذور في النباتات.


ومما تجدر الإشارة إليه هو ان بعض النباتات التي تزدهر في النهار القصير تحتاج لكمية أكثر من الأسمدة النتروجينية لتساعد على الازهار.

## RESPIRATION.

### The Electron Transport System (Simplified)

(Receives  $10 H^+ + 10e^-$  for each pyruvate

Receives  $20 H^+ + 20 e^-$  for each glucose)




شكل رقم (٧-١): رسم تخطيطي لبعض التفاعلات الحيوية في عملية التنفس ويرى اشتراك الـ (Cytochromes) في نقل الالكترونات.

عن: Howard, 1972

## ٢- الفسفور

يشترك الفسفور في تكوين الحوامض النووية والبروتينات النووية (nucleoprotein) وفي الاغشية الخلوية بصورة Phospholipids وكذلك مركبات الـ Coenzymes مثل  $NAD^+$  وتعني (Nicotine amide adenine dinucleotide) و  $NADP^+$  وهي تعني أيضاً (Nicotine amide adenine dinucleotide phosphate) وكذلك  $FAD$  (Flavin adenine dinucleotide) (شكل رقم ٣-٧) وكذلك coenzyme A. بالإضافة إلى المركبات الناقلة للفوسفات وذات الطاقة العالية مثل المركب (PEP) أو Phosphoenol pyruvic acid وكذلك للمركب ذو الطاقة ATP شكل رقم (٤-٧).




شكل رقم (٧-٢): توضيح علامات نقص العناصر الغذائية في نباتات الطماطة أنامية في المحاليل الغذائية.



- A نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي كامل.  
 B نبات للطماطة القصيرة وراثياً للنامية في محلول مغذي كامل.  
 C نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه الفسفور.  
 D نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه البوتاسيوم.  
 E نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه النتروجين.  
 F نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه الكبريت.  
 G نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه الكالسيوم.  
 H نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه الحديد.  
 I نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه المغنيسيوم.  
 J نبات للطماطة العادية النامية في محلول مغذي ينقصه بقية العناصر الغذائية.


عن: د. عبد العظيم كاظم محمد. ١٩٧٣. (Micronutrients)






Flavin adenine dinucleotide (FAD)

شكل رقم (٧-٣): الصيغة التركيبية للمركب  $NADP^+$  (الاعلى) والمركب FAD (الاسفل).



Phosphoenol - pyruvic acid



Adenosine - 5 - triphosphate (ATP)

شكل رقم (٧-٤): تصيغة التركيبية للمركب ذو الطاقة (PEP) Phosphoenol pyruvate الاعلى والمركب ذو الطاقة ATP.




هذا وتوجد المركبات الفوسفاتية بكثرة في الانسجة المرستيمية ذات الفعاليات الحيوية العالية ومن الجدير بالذكر ان الفسفور يوجد في التربة بشكل مركبات عضوية وغير عضوية وتجري على المركبات العضوية الفسفورية تحلات تؤدي إلى تحرر الفسفور غير العضوي في التربة كما قد تلتصق (adsorbed) ليونات الفوسفات بشدة على الطور الصلب solid phase في مكونات التربة مسبباً تركيزاً واطناً من الفوسفات في التربة (Olsen, 1953).

وكذا أثبتت تجارب Mc Auliffe et al, 1948 ان نسبة الفسفور المشع (P 32) في الطور الصلب إلى الفسفور المشع في الطور السائل تزداد بمرور الوقت عند اضافة فوسفات غير عضوية محتوية على (P 32) إلى التربة كما في الشكل رقم (٧-٥).

ان توفر الفسفور في التربة يعتمد على العوامل التالية:



١- تفاعل التربة pH كما ذكر سابقاً الـ pH يؤثر على تكوين ثلاثة أشكال مختلفة لأيونات الفوسفات في محلول التربة. فعندما تكون ظروف التربة حامضية تكثر الايونات (H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) وحيدة الشحنة السالبة أما اذا ارتفع الـ pH إلى المدى المعتدل (٧,٢٠) لذا تصود الايونات السالبة الشائبة المشحنة HPO<sub>4</sub><sup>-2</sup> أما

الفوسفات الثلاثية الشحنة ( $PO_4^{3-}$ ) فتوجد في الظروف القاعدية والتفاعلات التالية تبين تأثير الـ pH على تكوين حامض اللسفوريك كما أشار إليها Conn and Stumpf, 1967




ومن هذه المعادلات الأيونية نستنتج أنه عندما يكون الـ pH حوالي (7.2) في محلول التربة توزع أيونات  $H_2PO_4^{-}$ ,  $HPO_4^{2-}$  بشكل متكافئ وان هذين الشكلين من أيونات الفوسفات هما اللذان يستطيع النبات امتصاصهما عادة.

٢- كميات الحديد والالمنيوم المذابة: لذا أصبحت ظروف التربة حامضية جدا فان مركبات الحديد والألومنيوم ترمب الفوسفات كمركبات الحديد والالمنيوم الفوسفاتية والتي تكون غير متوفرة للنبات عادة: (Cole and Jackson, 1950) (Kittrick and Jackson, 1954) والمعادلات الكيميائية التالية توضح كيفية حدوث التفاعل الكيميائي.




٣- وجود الكالسيوم ان كثرة الكالسيوم وخاصة كاربونات الكالسيوم  $CaCO_3$  في التربة تؤدي إلى تكوين الشكل غير القابل للذوبان من فوسفات الكالسيوم  $(Ca_3(PO_4)_2)$ .



شكل رقم (٧-٥): تغير نسبة الفسفور المشع في الطور الصلب (P 32 in Solid Phase) إلى الفسفور المشع في الطور السائل (P 32 in liquid Phase) بمرور الزمن بعد إضافة كمية قليلة من الفوسفات غير العضوية الحاوية على (P 32) ويلاحظ ازدياد (P 32) في الطور الصلب. عن: McAuliffe et al, 1948

#### ٤- تبادل الأيونات السالبة Anion Exchange

يحدث تبادل الأيونات السالبة بين دقائق الطين الغروية وأيونات الفوسفات حيث يتبادل مع أيون اليندروكسيل (OH<sup>-</sup>) المتصق على سطح الدقائق الطينية.



ولأجل ارجاع التفاعل إلى اليسار يجب اضافة مركبات الكالسيوم lime للتربة حيث ان ليونات الكربونات تحل محل ليونات الفوسفات التي تصبح عندئذ متوفرة للنبات.

٥- وجود الكائنات الحية المجهرية: ان وجود اعداداً كبيرة متوفرة من الكائنات الحية المجهرية في التربة سوف تقلل كمية الفسفور بالتربة بصورة مؤقتة نتيجة إلى استهلاك المركبات الفوسفورية غير العضوية في غذائها إلى ان تموت هذه الكائنات الحية وتتفكح لجسامها ويرجع الفسفور للتربة ولكن بصورة متوفرة للنبات.

ان النبات الذي يأخذ الفسفور بشكل  $H_2PO_4^-$  او  $HPO_4^{2-}$  سوف يستعمله في عملياته الحيوية (التمثيل) من اجل تكوين المواد العضوية وقد يحدث التمثيل لما في انسجة الجذر او بعد انتقالها في نسجة الخشب إلى اللغصن الخضري او الاوراق.


أما النباتات المصابة بنقص الفسفور فتظهر اعراضاً قد تكون مشابهة لأعراض نقص النتروجين شكل (٧-٢) غير ان النباتات المصابة بنقص الفسفور تصبح داكنة الخضرة وتتجمع في أوراقها صبغة الـ Anthocyanin أحياناً. وقد يقل كذلك نمو الجذر كما قد يتأخر نضج الحاصل وتتكون بقع بيضاء على الأوراق وسريقاتها والثمار. تظهر عادة اعراض النقص على الاوراق القديمة لأن المركبات الفوسفورية تنتقل وتحول بسهولة من الاوراق والأعضاء النباتية القديمة إلى الاوراق الحديثة والأزهار المتفتحة والبيور المتطورة وعندما تظهر علامات نقص للفسفور فيجب اضافة بعض الأسمدة الفوسفاتية مثل السوبر فوسفات او فوسفات الامونيوم او الأسمدة المركبة بمعدلات تختلف باختلاف النبات والتربة والعوامل الجوية.

### ٣- البوتاسيوم:

يعادل توزيع البوتاسيوم ونقله من الاقسام القديمة إلى الأجزاء الحديثة النمو في حالات نقص البوتاسيوم في التربة كما هي الحال في النتروجين والفسفور وبالرغم من ان البوتاسيوم لا يشترك في تركيب الأجزاء النباتية الا ان نمو النبات وتطوره لا يحدث طبيعياً بغياب البوتاسيوم ويعتقد ان البوتاسيوم يشترك (بطريقة

ما غير معروفة) في اغلب العمليات الفسيولوجية السبعة مثل تكوين البروتينات، صنع الكلوروفيل، التركيب الضوئي، امتصاص أوراق النباتات للماء، تمثيل للكاربوهيدرات ومحفزاً لبعض الأنزيمات كالانزيم Pyruvate kinase التي تساعد في هضم الكاربوهيدرات.

هذا ويوجد البوتاسيوم في التربة بشكل مثبت (fixed) أو قابل للتبادل بالإضافة إلى شكل ذائب وعلى الرغم من أن أكثرية البوتاسيوم الموجود في التربة هو بالشكل غير المتبادل إلا أن توفر البوتاسيوم من معادن حاوية عليه مثل Muscovite, Illite, Biotite يحدث



شكل رقم (٦-٢): تصميم يبين حالات وجود البوتاسيوم بصورة ذائبة - قابلة للتبادل - مثبتة ومرتبطة بشبكة (Lattice) في معدن illite.

طبقة من السيليكات والاكسجين Si - O

طبقة من الالمنيوم والاكسجين H - O - OH

أيونات البوتاسيوم الذائبة في محلول التربة.

أيونات البوتاسيوم القابلة للتبادل.

أيونات البوتاسيوم المثبتة (Fixed).

أيونات البوتاسيوم المرتبطة بشبكة lattice.

عن: Wildander, 1958

عادة من جراء الـ (Weathering) وقد تبين Wiklander, 1958 كيفية حصول عملية تثبيت البوتاسيوم وتحرره بالشكل المتوفر للنبات.


فخلال عمليتي الغسل (Leaching) و (Weathering) يحدث تحرر قسم من أيونات البوتاسيوم الداخلة في شكل Lattice وتحتل الأماكن الفارغة بواسطة أيونات الهيدرونيوم  $H_3O^+$  أو المغنيسيوم أو الكالسيوم كما في شكل رقم (٧-٦).

أما في حالة إضافة مركبات البوتاسيوم كسماد بوتاسي للتربة فإن أيونات البوتاسيوم المضافة تحل محل أيونات المغنيسيوم والكالسيوم... الخ وتصبح مثبتة بدرجة أقل من أيونات البوتاسيوم الأصلية وعند حدوث التوازن تكون حالات البوتاسيوم كالآتي:



ومما هو جدير بالفكر ان امتصاص البوتاسيوم الذائب من قبل النبات يؤدي إلى تحويل التفاعل إلى جهة اليسار لغرض حصول توازن كيميائي جديد.

هذا وتمتص جذور النباتات البوتاسيوم بشكل ليونات البوتاسيوم  $K^+$  التي تكون مركباته متوفرة في أغلب الترب بكميات كافية وبصورة عامة فان مقدار البوتاسيوم في التربة أعلى من مقدار المركبات النيتروجينية والفوسفاتية ولذا قلت كمية البوتاسيوم في التربة وهذا نادرا ما يحدث فان علامات نقص البوتاسيوم في النبات تظهر على شكل اسمرار واصفرار وجفاف حافات الأوراق شكل (٧-٦) وكذلك تصبح النباتات غير مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة ومعرضة للاصابة ببعض الأمراض النباتية وتصحح حالات النقص باضافة كلوريد البوتاسيوم او كبريتات البوتاسيوم بمعدلات تعتمد على التربة والنبات والظروف المناخية الأخرى.



٤- الكبريت

شكل رقم (٧-٦) الصيغة التركيبية الاميني Cysteine.

يشارك في تركيب بعض الحوامض الامينية مثل Cysteine شكل رقم (٧-٧) و Methionine... الخ.

التي تتحد مع احماض امينية أخرى لتكوين البروتين وكذلك يشترك للكبريت في تكوين بعض المركبات العضوية المهمة مثل Coenzyme A شكل رقم (٧-٨) للدخلة في العمليات الحيوية في التنفس وفي بعض الفيتامينات مثل Liopic acid, Thiamin, Biotin شكل رقم (٧-٩، ب، ج) وهي أجزاء من فيتامين B للمعدن والتي تشترك في التفاعلات الحيوية. ويتدخل الكبريت في عملية صنع الكلوروفيل ولو أنه لا يشترك في تركيبه.

بالإضافة إلى ذلك فالكبريت يدخل في مكونات بعض الزيوت التي تعطي الصفات الحريفة في الثوم والخردل وبعض النباتات الأخرى.

يُمتص الكبريت بواسطة جذور النبات بشكل أيونات الكبريتات التي يعتقد بانها تتبادل مع أيونات الهيدروكسيل الموجودة في دقائق الطين بعملية تبادل الأيونات السالبة anion exchange.

كما ان كمية قليلة من الكبريت تؤخذ بشكل ثاني اوكسيد عن طريق الاوراق (Always et al, 1937) ان الكبريتات الممتصة تنتقل إلى الغصن الخضري دون أن يحدث أي تغير عليها ومن ثم تختزل غالبيتها إلى مجموعة (-SH) أو Sulfhydryl قبل ان تدخل مجرى التمثيل حيث تشترك في تركيب البروتينات والمواد الحية الأخرى.


وكما هو الحال بالنسبة لعملية اختزال (CO<sub>2</sub>) في التركيب الضوئي والنترات (NO<sub>3</sub>) اللتان تحتاجان إلى طاقة اختزال SO<sub>4</sub><sup>-2</sup> إلى Sulfide (S<sup>-2</sup>) تحتاج إلى طاقة حسب المعادلة التالية:




ويطلق على عملية اختزال الكبريتات إلى السلفايد (الكبريتيد) (Sulfide) ومن ثم تصبح قابلة للتمثيل بـ (Sulfate Assimilation) وتشمل عدة تفاعلات حيوية مهمة وهي:




٤- إلى الـ (Protein Dithiol) يحترل مادة (PAPS) بواسطة الإنزيم المعقد



٥- إن الـ (Protein Thiosulfite) هو سام جداً لذلك يختزل بسرعة بسعة (٦) للكثرونات قد تجهز من ثلاثة (Moles) من (NADPH<sub>2</sub>) وبمساعدة الإنزيم (Sulfite Reductase).



٦- والآن يمكن أن ينقل أيون السلفايد (Sulfide) إلى أحد المركبات مثل (O - Acetyl Serine) ليكون للحامض الأميني (Cysteine) ويحدث التفاعل بمساعدة الإنزيم (Cysteine Synthetase).




O - Acetyl Serine


Cysteine

Acetic Acid


ثم إن المركب (Protein Cofactor) بشكل (Dithiol) يستطيع أن يعيد الكرة مع (PAPS).  
هنا وقد توجد ميكانيكية لاختزال وتمثيل السلفت مقارنة لهذه المشروحة.



↓  
↓



↓



شكل رقم (٧-٩): الفيتامينات التي يدخل الكبريت في تركيبها.

أ- فيتامين (Biotin).

ب- فيتامين (B<sub>1</sub>) أو (Thiamin).



ج- فيتامين (lipoic Acid).

عن: Conn and Stumpf, 1967

هذا ويعتبر الكبريت من العناصر القابلة للنقل من جزء لآخر في النبات ولبدأ يعتقد بأن المركبات الكبريتية العضوية قد تتحول إلى مركبات كبريتية غير عضوية كالكبريتات ومن ثم يعاد توزيعها ثانية للنبات.

أما الكبريت فيوجد بصورة رئيسية في القسم العضوي من التربة (Quastel, 1963).

والكبريت العضوي يصبح متوفراً للنبات بعملية الأكسدة الحيوية بفعل الأحياء المجهرية كما في المعادلات للكميائية التي وضعها Wiklander et al. 1950.



وقد يوجد في بعض المعادن مثل Cobaltite, Pyrite, Epsomite, Gypsum وقليلاً من الكبريتات  $SO_4^{=}$  في التربة.

أما بالنسبة لوجود الكبريت في العراق ولا سيما المنطقة الشمالية فقد وجد بشكل عنصر الكبريت داخلاً في بعض المعادن الكبريتية كصخور اللايمستون Limestone والدولومايت Dolomite ومارل Marl وقدرت الكميات المتوفرة في حقل المشراق بـ (٢٠٠) مليون طن (Al - Samarrie, 1975) كما توجد كميات هائلة من الكبريت في منطقة حمام العليل.

كما يوجد مصدر آخر لكبريت التربة وهو الكبريت الموجود في الهواء الجوي والذي يتصاعد من البراكين والمصانع وعندما تتساقط الأمطار تنوب بعض مركبات الكبريت وينزل للتربة (Wilson, 1926). هذا ويوجد الكبريت في معظم الترب بشكل كبريتات الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ولهذا فنادر ما نلاحظ ظهور علامات نقص الكبريت في النباتات التي ان وجدت فهي تشبه علامات نقص للنروجين وتشمل صعر الساب واصفرار عام في أوراق النباتات وخاصة

الأوراق الحديثة التكوين شكل رقم (٧-٢) وفي هذه الحالة تضاف كبريتات الكالسيوم لتعويض نقص الكبريت أو رش النباتات بمحلول كبريتات الحديدوز.

#### ٥- المقتسيوم:

إن هذا العنصر يشترك في حدوث عمليتي التركيب الضوئي وتمثيل الكربوهيدرات فبالنسبة للعملية الأولى يدخل المقتسيوم في تركيب الكلوروفيل وهو يقع تقريباً في وسط جزيئة الكلوروفيل، أما بالنسبة للعملية الحيوية الثانية فالمعروف بأن العديد من أنزيمات تمثيل الكربوهيدرات تحتاج إلى المقتسيوم كمحفز لعملها ويعتبر توفّر المقتسيوم ومادة ATP مهمات في عملية هم للكربوهيدرات كذلك يعتبر وجود المقتسيوم ضرورياً لتنظيم تجمع جسيمات الـ Ribosomes المكونة من Ribonucleoproteins والمهمة في عملية تكوين البروتينات.

هذا ويمتص النبات المقتسيوم بشكل أيونات ( $Mg^{++}$ ) ويعتبر العنصر سهل الانتقال من الأجزاء النباتية القديمة إلى الأجزاء الحديثة النمو ومن الطبيعي أن نقص المقتسيوم في التربة يؤدي إلى قلة الكلوروفيل الذي يظهر على شكل اصفرار ما بين عروق الأوراق شكل رقم (٧-٢). ومما هو جدير بالذكر أن أغلب الترب حاوية على كمية كافية من مركبات المقتسيوم، فالمقتسيوم موجود في التربة بشكل ذائب وقابل للتبادل وبشكل مثبت Bould, 1963. كما اعتبرت كبريتات المقتسيوم هي أكثر مركبات المقتسيوم لانتشاراً في التربة والتي تبقى غير صالحة للنبات حتى تتم عملية الـ Weathering ويتحرر المقتسيوم بالشكل الذائب.

كما لخص الباحثون Longstaff and Graham, 1951 مدى قابلية توفّر المقتسيوم في الجدول رقم (٧-١) والذي يدل على أن نمو نبات فول الصويا الطبيعي يحدث في مركبات المقتسيوم Olivine و Dolomite و Magnesite.

وفي حالات نقص المقتسيوم في التربة وهي حالة نادرة جداً تضاف كبريتات المقتسيوم والكالسيوم الممزوجين.

جدول رقم (٧-١). امتصاص المغنيسيوم بواسطة نبات فول الصويا من بعض التربة عن: Longstaff and Graham, 151


المتن	النسبة المئوية للمغنيسيوم في النبات	امتصاص لمغنيسيوم مايزولم / نبات ناضج في سنفطة واحدة	حالة نمو النبات
لمسيطر	٠,١٦	١٦	توجد اعراض من نقص المغنيسيوم.
Control Horublende	٠,١٥	١٧,٥	توجد اعراض من نقص المغنيسيوم.
Talc	٠,١٩	٢١,٢	توجد اعراض من نقص المغنيسيوم.
Magnesite	٠,٢٠	٤١,٨	النمو طبيعي
Olivine	٠,٢٤	٤٧,١	النمو طبيعي
Dolomite	٠,٢٩	٥١,٨	النمو طبيعي

#### ٦- الكالسيوم

يوجد للكالسيوم في جدران الخلايا بشكل مركب Calcium pectate دخلا في تكوين للصفحة الوسطى Middle lamella بين جدران الخلايا والذي يعمل على تملك لجدران الأولية للخلايا المتجاورة ولهذا فالكالسيوم ضروري جداً لانتقال ونمو الخلايا المرسومية في البراعم الورقية والزهرية والقمة النامية للساق والجذر لكثرة تقصم الخلايا وتكوين جدران الخلايا الجديدة في هذه الانسجة. لضافة إلى ذلك للكالسيوم يؤثر في انتقال الكاربوهيدرات في الانسجة النباتية أيضاً.


كما ان ههما كبيراً من مركبات الكالسيوم موجودة في فجوات الخلايا (Vacuoles) للنباتية بشكل رولسب لوكزالات للكالسيوم وقد توجد لوكزالات للكالسيوم وكاربونات للكالسيوم مترسبة على طول الحزم الوعائية في الأوراق.

هذا ويمتص النبات الكالسيوم بشكل أيونات  $Ca^{++}$  وهو قليل التحول في الأنسجة النباتية القديمة إلى الحديثة. وعلى الرغم من ان أيونات الكالسيوم هي الايونات الموجبة القابلة للتبادل في التربة الخصبة غير ان أغلبية الكالسيوم الموجودة في التربة هو من النوع غير القابل للتبادل بشكل مركبات الـ anorthine أما أيونات الكالسيوم القابلة للتبادل فهي عادة ملتصقة على سطح دقائق الطين كما في الشكل رقم (٧-١٠) الذي يوضح ظاهرة cation exchange في الحالات الحامضية او المعتدلة الحموضة حيث تعتبر الترب الحامضية جداً حاوية على كميات قليلة من الكالسيوم.



شكل رقم (٧-١٠): تأثير توفر الكالسيوم على دقائق الطين في الترب الحامضية حيث تتبادل ايونات الكالسيوم مع ايونات الهيدروجين (Cation exchange).

ومن الجدير ذكره ان طريقة الـ liming تستعمل لمعالجة الترب الحامضية وذلك باضافة مركبات الكالسيوم بشكل لوكسيد او كربوناته (Millar et al, 1951) كما في المعادلة.



وتستعمل مادة الجبس (CaSO<sub>4</sub>) لاستصلاح الاراضي المالحة وقلوية  
 لأزالة أيونات للصوديوم للعالقة على دقائق الطين في الترب المالحة (الصبخة)  
 وفي أثناء غسل للتربة لأزالة أملاح الصوديوم.




هذا ويجب ازالة الكميات الزائدة من Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> بوجود المبالز والا يحدث  
 التفاعل العكسي وتصبح للتربة مالحة مرة أخرى.

ان اهم اعراض نقص الكالسيوم هي قلة نمو الانسجة المرستيمية في انبراعم  
 المختلفة والقمة النامية للساق والجذر ونهايات الاوراق ومن ثم موت هذه الاوراق  
 شكل رقم (٧-٢) وتصحح حالات نقص للكالسيوم باضافة الجبس (CaSO<sub>4</sub>)  
 ممزوجا مع بعض الأسمدة الحيوانية أو للكيماوية.

#### ٧- الحديد

يشارك الحديد في وظائف للعمليات الحيوية المعمة للنبات فمثلاً دور الحديد  
 كعامل مساعد في تكوين الكلوروفيل في النبات كذلك وجد ان الحديد يشترك في

مركبات حيوية مهمة مثل الـ Cytochromes شكل رقم (٧-١١) التي تدخل في عمليتي التركيب الضوئي والتنفس شكل رقم (٧-١) وكذلك مركب الـ Ferredoxin المهم في عملية التركيب الضوئي وعملية اختزال للنترات إلى لمونيا والمساة Nitrate Reduction. ويمتص للنبات الحديد بشكله الايوني  $Fe^{++}$  أو بشكل مركب عضوي معقد عن طريق الجذور أو قد يؤخذ عن طريق الاوراق عند رش النباتات



شكل رقم (٧-١٢): الصيغة التركيبية للسايٲوكروم Cytochrome الحاوي على الحديد.

بمركبات الحديد مثل كبريتات الحديدوز. وتتميز النباتات التي هي بحاجة للحديد بظهور اصفرار ما بين العروق في الاوراق الحديثة التكوين اشبه بما يحدث عند نقص المغنيسيوم باستثناء ظهور هذه الاعراض في الاوراق الحديثة التكوين شكل رقم (٥) هذا ويعتبر الحديد من العناصر القليلة الانتقال لان مركباته قليلة الذوبان كذلك تعتبر معظم التربة غنية بمركبات الحديد وخاصة أكاسيد الحديد  $Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$  والكبريتيدات (Bould, 1963) ان توفر الحديد للنبات يعتمد على تفاعل التربة pH حيث تتوفر مركباته في التربة الحامضية لانيها تصبح قابلة للذوبان وقد تضاف لهذا الغرض بعض المركبات ذات التأثير الحامضي عند تحللها

بالماء مثل سلفات الامونيوم لما في حالات نقص الحديد في التربة فتضاف كبريتات الحديدوز لها.

#### ٨- الكلور

يمتص النبات الكلور من التربة بصورة ايوناته  $Cl^-$  التي ربما توجد في الخلايا بهذه الصورة دون ان يشترك في التراكيب العضوية للخلايا ويعتقد بان لحدى وظائف الكلور الرئيسية هي تحفيزه لاحدى انزيمات التركيب الضوئي مثل مساعده في عملية تحلل الماء ضوئيا (Photolysis) شكل رقم (٤٢). بيد ان ميكانيكية هذه التفاعلات لازالت غامضة. ونادراً ما ينقص التربة العراقية عنصر الكلور.

ان اهم اعراض نقص الكلور في النباتات هي ذبول الأوراق واصفرارها وربما تصبح منخورة necrotic وقد تصبح الجذور قليلة النمو.

#### ٩- المنغنيز


يؤخذ المنغنيز من قبل النباتات بشكل ايوناته  $Mn^{++}$  التي يعتقد بانها توجد بحالة ايونية داخل الخلايا النباتية كما هو الحال في الكلور كما ان النباتات تحتاج المنغنيز بكميات قليلة جداً لان كثرتة تؤدي إلى نوع من التسمم Toxicity أما وظائف المنغنيز للنبات فهي متعددة ومنها تحفيز بعض الأنزيمات المتعلقة في تكوين الاحماض الشحمية وفي تكوين الحوامض النووية وكذلك في انزيمات التنفس المشتركة في دورة Kerbs cycle كما انه يدخل في عملية التركيب الضوئي وخاصة دورة تحلل الماء ضوئياً وخروج الأوكسجين شكل رقم (٦-١).

ويعتبر المنغنيز من العناصر القليلة الحركة والانتقال في النبات وتتوقف حركته على الظروف المحيطة خاصة ما يتعلق بالـ pH والعناصر الثقيلة الأخرى ولذلك فقلة المنغنيز تؤدي إلى ظهور الاعراض على الأوراق الحديثة التكوين والتي تشمل تشوهات مختلفة ويقع رمادية اللون في الأوراق.

هذا وقد أظهرت تجارب (Leeper, 1947) بان أيونات المنغنيز الموجودة في التربة توجد بثلاثة أشكال منها الثنائية للشحنة (Bivalent) والثلاثية للشحنة (Trivalent) والرابعة (Tetravalent).

كما ان الشكل الأول هو القابل للتبادل والمتوفر للنبات وكذلك يوجد المغنيز بشكل غير متوفر ومتحدداً مع المركبات العضوية.


ومن الجدير نكره ان تهوية التربة سوف تساعد على تكوين الشكل المؤكسد ( $Mn^{+4}$ ) وغير المتوفر للنبات كما قد تحدث الأكسدة حيويًا (Mann and Quastel, 1946) كما في المعادلات التالية:



ان أكثر الترب حاوية على كميات كافية من مركبات المغنيز ولكن توفرها للنبات يعتمد على تفاعل التربة pH وبصورة خاصة بين (٥,٥ - ٦,٥) لذلك قد يتلافى نقص المغنيز باضافة الكبريت او كبريتات (سلفات) الامونيا او اضافة كبريتات المغنيز إلى التربة او رشاً على الأوراق.

#### ١٠- البورون:

يمتص النبات البورون باحدى أشكاله الايونية المختلفة مثل:



وهو من العناصر التي يحتاجها النبات بكميات قليلة جداً أما وظائف البورون فتعتبر غامضة وقد يلعب البورون دوراً مهماً في تكوين البروتينات وكذلك يؤثر بطريقة ما في اشراك الكالسيوم والبوتاسيوم في العمليات الحيوية كما انه ساهم في نقل الكربوهيدرات ولقد وجد ان نقل السكر في اللحاء يتعلق بكمية البورون كما ان البقوايات تحتاج إلى البورون لتكوين العقد الجذرية.

هذا ويعتبر البورون من العناصر الثقيلة الانتقال في النبات لذلك يصعب اعادة توزيعه من أنسجة كتيمة لآخرى جديدة عندما تحدث حالات نقص البورون للنادرة جداً والتي تشمل تشوهات مختلفة راجعة إلى انحلال الأنسجة لداخلية وموتها في النبات كما ان الازهار قد لا تتكون.

ويعتبر البورون منتشراً في أغلب التربة بشكل قابل وغير قابل للتبادل مثل مركب حامض البوريك  $H_3BO_3$  او بورات الكالسيوم والمغنيسيوم كما يوجد بكثرة في التربة العراقية والمياه الجوفية كما ان القسم الذائب من البورون قليل جداً وقد وجد ان لارتفاع pH في التربة يؤدي إلى تقليل توفر البورون للنبات بسبب عدم ذوبان مركباته بيد ان (Drake, 1941) ادعى بأن توفر البورون للنبات لا يتأثر بتفاعل للتربة.

وقد تضاف مركبات البورون لتلأفي نقصه في التربة كبورات الصوديوم او حامض البوريك وقد تستعمل البوراكس  $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$  رشاً على النبات او اضافته للتربة.

## ١١- الزنك

يمتص النبات للزنك بهيئة ايوناته  $Zn^{+2}$  وهو من العناصر التي يحتاجها بكمية قليلة جداً. ويعتقد بان للزنك دوراً في تكوين الكلوروفيل او في تكوين هرمون الـ Indole 3 - acetic acid or Auxin (IAA) وكذلك في ازهار النباتات كما ان للزنك ويشترك في تركيب بعض الأنزيمات مثل Carbonic anhydrase وأنزيم Alcohol dehydrogenase بالاضافة إلى أنزيم carboxylase الذي يسبب تثبيث  $CO_2$ .

ومما هو جدير بالذكر ان حالات نقص للزنك في النبات كثيرة الاحتمال ويؤدي للنقص إلى نوع من التشوه مثل قصر الأوراق وللمساق فيسمى النبات (Rosette) وكذلك تشوه حافة الأوراق وتلون ما بين عروق الأوراق بلون أصفر أو اصفر مائل للبياض احياناً، هذا ويعتبر للزنك بصورة عامة غير متوفر بكميات كافية في التربة كما اشارت تجارب (Bould, 1963) بان للزنك يوجد في المعادن

الحديدية المنغنيز مثل (Magnetite) و Biotite وكذلك Hornblende وان عملية Weathering تحرر للزنك بشكل ايونات موجبة ثنائية الشحنة والتي تلتصق على دقائق الطين والمادة العضوية وتكون قابلة للتبادل في التربة.

ويؤثر تفاعل التربة pH على توفر الزنك في التربة ووجد كذلك ان توفر الزنك يقل عند ازدياد الـ pH (Camp, 1945) كما ان الزنك قد يكون مركبات غير ذائبة مع فوسفات الكالسيوم الهيدروجينية ويمكن تلافى نقص الزنك باضافة كبريتات الخارصين للتربة او رشا على الأوراق.

## ١٢ - النحاس

يمتص النبات النحاس بشكل أيون النحاسيك  $Cu^{++}$  وقبلا بشكل ايون النحاسوز  $Cu^{+}$  وهو ضروري بكميات قليلة جداً لنمو النبات.

والنحاس يلعب دورا مهما في العمليات الحيوية في النبات فيو يدخل في عملية الاكسدة والاختزال في سلسلة الـ Electron Transport Chain في التنفس الهوائي. وكذلك يشترك في تكوين بعض الانزيمات المتعلقة بالاكسدة والاختزال مثل Ascorbic acid oxidase Phenolase and Laccase وهو قسم مهم في المركب Plastocyanin دورا مهما في عملية نقل الالكترونات من الماء إلى  $NADP^{+}$  في التركيب الضوئي كما ان النحاس دورا مهما في عملية تثبيت النتروجين Nitrogen Fixation.

هذا وان نقص النحاس يؤدي إلى تكوين انسجة منخورة Necrotic وميتة في نهايات الأوراق الحديثة التكوين وقد ينتشر موت الانسجة على طول حافات الأوراق.

يوجد النحاس بصورة رئيسية في الصخور المعننية كمركب  $CuFeS_2$  والذي يكون المصدر الرئيسي لكبريتيد النحاس في التربة (Bould, 1963).

أما كمية مركبات النحاس الذائبة في التربة فقليلة جداً. هذا ويعتبر أيون النحاسيك هو الملتصق على غرويات التربة الطينية والمواد القابلة للتبادل.

أما النحاس الموجود في التربة فقد يُولف مركبات معقدة ثابتة مع للمواد العضوية في التربة ويصبح غير قابلة للتبادل (Steenbjerg, 1950) ويُعتبر الترب المتعادلة والقلوية غير مفقورة للنحاس الا ان التربة الحامضية قد تقتر للنحاس ذلك تضاف كبريتات للنحاس للتربة لتلافي النقص او ترش الأوراق بها.

### ١٣- المولبيدينيوم

ان المولبيدينيوم قد يمتص بشكل أيون المولبيدات  $MoO_4^{2-}$  وهو من العناصر الضرورية جداً التي يحتاجها النبات بكميات قليلة.

هذا ويعتقد بان للمولبيدينيوم دورا فعالا في نقل الالكترونات أثناء عملية اختزال النترات إلى امونيا بواسطة مجموعة انزيمات Nitrate Reductase وهو كذلك يساهم في تثبيت النتروجين الحيوي Nitrogen fixation.

أما اعراض نقص المولبيدينيوم فقد تبتدى باصفرار ما بين عروق الاوراق السفلى وتبعها ومن ثم تحلل وموت الأنسجة الموجودة في حافات الاوراق والتفاف الاوراق كما ان تكوين الازهار يقل.

يوجد للمولبيدينيوم في التربة بثلاث أشكال هي الشكل الذائب في محلول التربة كأيون المولبيدات  $MoO_4^{2-}$  والمولبيدات الاحادية الشحنة  $HMoo^-4$  كذلك يوجد الشكل للملتصق على دقائق الطين القابل للتبادل والشكل غير القابل للتبادل كجزء من مادة عضوية أو معدنية.


كما ان قسماً من المولبيدينيوم الموجود في التربة يكون على ثلاثة أشكال من الاكاسيد هي  $MoO_3$  و  $MoO_2$  و  $Mo_2O_5$  وتعتبر هذه الاشكال الثلاثة غير متوفرة للنبات باستثناء الشكل للمؤكسد ومما تجدر الإشارة إليه ان حالة تأكسد عنصر المولبيدينيوم تجعله أكثر توفراً للنبات بعكس المنغنيز حيث يصبح الشكل المختزل هو المتوفر للنبات.

كما قد تتبادل ايونات المولبيدات  $MoO_4^{2-}$  مع ايونات الهيدروكسيل  $OH^-$  الموجودة في دقائق التربة كذلك يلاحظ أنه بعكس العناصر الصغرى يصبح توفر المولبيدينيوم قليلاً في التربة الحامضية (Barshad, 1951) لذلك تضاف كاربونات

للكاسيوم لرفع الـ pH بقصد جعله متوفرا للنبات وقد تضاف موليبدات للصوديوم  $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  أو موليبدات الامونيوم للتربة لتلافي نقص العنصر .

#### ١٤ - الكوبلت

ان احتياجُ النبات للكوبلت لم يثبت بصورة قطعية بيد أن النباتات المضيئة للبكتريا المثبتة للنتروجين تحتاج الكوبلت وخاصة في العقد الجذرية Evans and Kliever, 1964 غير ان (Wilson and Nicholas, 1967) نشروا تقريرا بان النباتات غير البقولية كالحنطة تحتاج الكوبلت لنموها. هذا وقد ثبت أن الكوبلت أحد مكونات فيتامين  $\text{B}_{12}$  (شكل رقم ٧-١٢) .



شكل رقم (٧-١٢): الصيغة التركيبية للمركب فيتامين  $\text{B}_{12}$ .

## العناصر شبة الضرورية

وهي العناصر التي تحتاجها بعض النباتات وتحت ظروف معينة من النمر  
(Regland, 1970).

### (١) الصوديوم:

يعتبر الصوديوم ضروريا لبعض النباتات الملحية (Alriplex sP) وقد يكون مهما في تثبيت الـ (pH) البروتينات (Protein Stabilization) ما يعتبر الصوديوم ضروريا لعدد من الأنسنة للزرقاء الخضراء لتنامية في المياه العذبة أو المالحة. أما في النباتات الرائية فقد يلعب الصوديوم دورا محفزا في بعض العمليات الحيوية على الرغم من عدم وجود توفره.

### (٢) اليود:

يعتبر ضروريا لبعض الأنسنة الحمراء والسمراء التي تمتص اليود وتكون للمركبات العضوية للحاوية على اليود.

### (٣) الفناديوم:

تجمع عدة أنسنة بحرية وبعض النباتات الرائية هذا للعنصر السام على الرغم من عدم توفر المعلومات بشأن تجمع الفناديوم في تلك النباتات.

### (٤) السيليكون:

يتجمع هذا العنصر في عدد من النباتات بشكل حبيبات السيليكا وخاصة في عدد من الحشائش. ويلعب دورا ثانويا في النقل والعمليات الحيوية.

### بعض العناصر الأخرى

ان هذه العناصر لا يحتاجها النبات ولكنها يمكن أن تدخل مجرى العمليات الحيوية في حالة تجهيزها للنبات وهي غالبا ما تكون سامة للنبات أو الحيوانات أكلة للنباتات وتشمل:

### (١) السيلينيوم Selenium

وهو يشبه الكبريت وقد يدخل في تركيب الاحماض الامينية بدلا من الكبريت ولهذا تصبح هذه الاحماض الامينية للحاوية على السيلينيوم مائعة (Inhibitors) في

تكوين البروتينات بالرغم من أن بعض النباتات لا تتأثر بوجوده كثيراً. مثل العشب  
(Astragalus sp.) ويمنب هذا النبات تسمم للحيوانات في استراليا.

### ٢) البروم:

يتجمع في بعض الأشنات الحمراء وقد يتحول إلى مركبات عضوية في هذه  
النباتات كما أنه قد يعوض تأثير الكلور في عدد الأنواع النباتية وهو سام بدرجة  
قليلة جداً لأنواع أخرى من النباتات.

### ٣) الفلور:

يتجمع بشكل أيونات ( $F^-$ ) في نباتات مختلفة مثل نبات *Camellia sinensis*  
ويتحول إلى مركبات عضوية في قسم قليل من النباتات وهذه المركبات سامة  
جدا للحيوانات.

### ٤) السترونتيوم: Strontium

ينافس الكالسيوم ويحل محله في عدد من الأشنات. يتكون النظير (Isotope)  
 $^{90}Sr$  من التفجيرات النووية ويكون هذا للنظير ذو طاقة عالية وذو (half life)  
طويلة جداً ويتساقط على الحشائش والادغال والتي تأكلها الابقار والاغنام ثم يظهر  
 $^{90}Sr$  في حليب هذه الحيوانات الذي يستعمل كغذاء للإنسان ويتجمع في عظام  
الانسان مسبباً للتشوهات.