

الباب الثالث عشر فقد الوعي

- يرجع فقد الوعي أو الإغماء إلى عدم قيام المخ بوظيفته وهذا يتسبب عن:
- ١ - قلة الدم الذى يصل إلى المخ فينتج الإغماء - سقوط المريض - الصدمة.
 - ٢ - قلة كمية الأكسجين فى الدم كما يحدث عندما يعترض أى عارض للتنفس.
 - ٣ - إصابة فى المخ.
 - ٤ - مرض فى المخ.



الملاج:

- ١ - يستدعى الطبيب فوراً.
- ٢ - إذا كان المريض حاضر اللون نرفع الرأس والكتفان وإلا فيبقى المريض فى وضع مسطح.
- ٣ - محاولة إيقاف النزيف (ما عدًا من الأذن).
- ٤ - تفك جميع الملابس الضاغطة عند الرقبة والصدر والوسط.
- ٥ - محاولة جعل التنفس طبيعى، بإدارة الرأس إلى أحد الجانبين مع جعل الرقبة مستقيمة والذقن أمامًا والفم خال وتزال الرغاوى إن وجدت وكذلك الدماء وتزال الأسنان الطبيعية إن وجدت.
- ٦ - فتح الأبواب والشبابيك - يمنع التجمهر حوله.
- ٧ - تستعمل وسائل الدفء - يغطى بالبطاطين أو بالطو وتوضع زجاجة ماء ساخن حوله.
- ٨ - عدم إعطاء المريض أى شىء عن طريق الفم مادام فاقد الوعي.

الصدمة:


تحدث الصدمة في جميع أحوال الإصابات ، الصعق الكهربائي، النزيف الشديد، الهبوط الحاد بالقلب، فقد الجسم كمية كبيرة من السوائل، الحساسية.


العلامات والأعراض

- ١- يكون المريض شاحب اللون. فى بعض الأحيان لا يتمكن المصاب من الحركة.
- ٢- صعوبة التنفس.
- ٣- ضعف النبض.
- ٤- شعور المريض بالبرودة. عرق فوق الجبهة والأنف والقم.

الإسعاف:

- ١ - يرقد المريض والرأس منخفضة.
- ٢ - يوقف أى النزيف.
- ٣ - يغطى المصاب بالبطاطين - وضع زجاجات ماء ساخن.
- ٤ - يجب ملاحظة وجود هواء كاف وليس تيارات هوائية.
- ٥ - فك جميع الملابس الضاغطة.
- ٦ - ترفع النقالة أو السرير حوالى ٨ بوصة.
- ٧ - يعطى المصاب شاي ساخن محلى إذا كان فى وعيه.
- ٨ - الإتصال فوراً بالإسعاف
- ٩ - مراقبة التنفس والنبض للتدخل إن لزم الأمر





- يحسن تقديم العلاج الآتى فى أى إصابة حتى لا تحدث الصدمة:
- ١ - ينقل المريض من مكان الحادث ويجلس أو ينام حسب الظروف.
- ٢ - الاحتفاظ بالدفع ويعطى سوائل ساخنة.
- ٣ - التحدث فى مواضيع تبعد تفكير المريض عن الحادث.

الإغماء:

يحدث من:

- ١ - سوء التهوية.
- ٢ - الجوع أو التخممة.
- ٣ - المفاجآت المحزنة أو المفرحة.
- ٤ - شدة النزيف.
- ٥ - المناظر المؤلمة أو الروائح الكريهة.



العلامات والأعراض

- شحوب لون الوجه
- شعور المصاب بالدوخة والقيء
- ضعف النبض
- سرعة التنفس



- ١ - فك جميع الملابس الضاغطة على العنق والصدر والوسط.
- ٢ - أما أن يرقد المصاب على ظهره مسطحاً أو يثني وسطه أماماً ورأسه لأسفل.
- ٣ - استعمال التهوية الجيدة.
- ٤ - استعمال روائح منبهة كالنوشادر الخفيف.
- ٥ - إعطاء المريض ماء بارداً أو ساخن عندما يعود إلى وعيه.
- ٦ - إذا كان السبب الجوع - يعطى المصاب شيء خفيف من الأكل - بسكوت أو خبز وزبد.
- ٧ - يلزم المصاب الراحة التامة في مكان مظلل إذا حدث ذلك في الخارج.
- ٨ - إذا فقد وعيه يعالج بوضعه في وضع الصدمة .

تشنجات الأطفال

غالبًا تحدث من ارتفاع درجة الحرارة

العلامات والأعراض

يتصلب جسم الطفل ويتقوس الظهر وتغرب العينان
ويظهر بياض العين فقط

الإسعاف:

- ١ - يستدعى الطبيب.
- ٢ - خلع ملابس الطفل ووضعه في حمام دافئ مع وضع كمادات باردة على الرأس.
- ٣ - يلف بملابس قطنية خفيفة ويوضع بالفراش.
- ٤ - قم بحماية المصاب وذلك بإبعاد أى مصدر خطر، لا تحاول وقف التشنج أو وضع شىء بالفم.

