

الباب الثاني

أهم الأمراض التي تصيب القطط والكلاب وكيفية التعامل معها

الفصل الأول:

- الكشف الطبى على الحيوان
- علامات المرض فى القطط والكلاب

الفصل الثانى:

- أمراض الجهاز الهضمى

الفصل الثالث:

- أمراض الجهاز التنفسى

الفصل الرابع:

- أمراض الجلد والأطراف

الفصل الخامس:

- الأمراض المعدية

الفصل السادس:

- بعض الأمراض والمشاكل العامة

الفصل الأول

- الكشف الطبى على الحيوان
- علامات المرض فى القطط والكلاب
- أهم الأمراض التى قد تصيب القطط والكلاب وكيفية التعامل معها

الفصل الأول

النقاط الهامة عند فحص الحيوان

1. الفحص الدقيق والكامل للحيوان المريض يساعد إلى حد كبير في التشخيص السليم للإصابة أو المرض. وكذلك الفحص الكامل للحيوان السليم يساعد على الاطمئنان ومتابعة الحالة الصحية للحيوان في مراحل العمر المختلفة.
2. يراعى عند الكشف على الحيوان أخذ درجات الحرارة والنبض والتنفس، ومعدلاتها الطبيعية هي:

القطط	الكلاب	
37.5 - 39.2 م	36.8 - 38.6 م	درجة الحرارة
90 - 110 لكل دقيقة	70 - 90 لكل دقيقة	النبض
15 - 30 لكل دقيقة	20 - 30 لكل دقيقة	التنفس

المعلومات الخفيفة..


يتم قياس درجة الحرارة باستعمال الترمومتر ووضعه فى فتحة الشرج كما هو مبين بالشكل رقم (20).

3. يتم قياس النبض من الشريان الفخذى (Femoral A.) فى الجهة الداخلية من الرجل الخلفية فى منطقة الفخذ أو عن طريق سماع صوت ضربات القلب بواسطة السماعة الطبية كما هو مبين بالشكل (21).


4. يتم فحص الجهاز العظمى للحيوان وملاحظة الحيوان أثناء المشى لاكتشاف أى إصابات فى الجهاز العظمى التى تظهر غالباً فى صورة عرج أو اضطرابات أثناء المشى أو التدريب.

5. يراعى أخذ تاريخ الحالة من صاحب الحيوان بالكامل مع فحص البيئة المحيطة بالحيوان والمكان الذى يتواجد فيه. وذلك من حيث درجة حرارة المكان - الرطوبة - ودرجة النظافة أو وجود أى أجسام غريبة فى البيئة المحيطة بالحيوان.

6. يراعى كذلك الفحص الدقيق لجميع أجهزة الجسم للوصول إلى التشخيص الدقيق والسليم.



شكل رقم (20)



شكل رقم (21)

علامات المرض على القطط والكلاب

هناك أعراض أو علامات عامة يمكن ملاحظتها على الحيوان المريض فى حين ان هناك أعراض أخرى لا يمكن كشفها إلا عن طريق الكشف الطبى الإكلينيكى أو المعملى أو باستعمال الأجهزة التشخيصية وذلك بالاستعانة بالطبيب البيطرى المتخصص ولكن عموماً الأعراض العامة التى قد تدل على المرض بعضها كما يلى:

1. فقدان كلى أو جزئى فى الشهية.
2. تغير فى النمط السلوكى لدى الحيوان.
3. انعزال الحيوان وخمول وكسل عام.
4. وجود بعض الافرازات من الأنف أو الفم أو العين أو الاذن.
5. نهجان وكحة أو عطس.
6. زيادة فى حجم البطن.
7. احمرار فى الأغشية المخاطية المبطنة للعين أو الفم.
8. التحديق أثناء عملية التبول أو التبرز.

9. تغير في شكل ونوعية البراز على سبيل المثال جاف جداً في حالات الإمساك أو به كمية كبيرة من السوائل في حالات الإسهال.
10. عرج أو المشي بطريقة غير طبيعية.
11. عدم الاستجابة لأوامر صاحب أو مدرب الحيوان.
12. وجود رائحة كريهة جداً من الفم.
13. وجود حشرات خارجية أو تساقط في الشعر.
14. هرش أو حكة.
15. ريالة أو تساقط الأكل من الفم.
16. القيء أو الاسهال.
17. وجود أى أعراض عصبية مثل الارتعاشات أو التشنجات.
18. وجود أى إفرازات صديدية من الفتحات التناسلية.
19. وجود أى تضخمات في مناطق الجسم المختلفة.
20. ارتفاع في درجة حرارة الحيوان.

الفصل الثاني

— أمراض الجهاز الهضمي

الفصل الثاني

أمراض الجهاز الهضمي

التهاب الحلق واللسان واللثة

هو عبارة عن التهاب الغشاء المخاطي المبطن للفم ويمكن أن يصاحبه التهاب في اللسان واللثة حسب درجة المرض.

الأسباب:

1. أكل الأشياء الحارة أو الباردة ذات الحرارة أو البرودة الزيادة مثل الشرية الساخنة.
2. لعق الأشياء الحارقة أو بعض المواد الكيميائية مثل اليود أو البوتاس.
3. الأجسام الغريبة مثل الشوك أو العظم عندما يترك بين اللثة أو الأسنان.
4. الجروح في اللسان أو اللثة.


المعلومات الخفيفة..

5. الأسنان المدببة.

6. بعض الأمراض المعدية قد يصاحبها التهاب فى الغشاء المبطن للفم مل حصبة الكلاب أو بعض الأمراض الأخرى مثل أمراض الكلى.

الأعراض:

1. سيلان فى اللعاب كما هو مبين بالشكل رقم (22).



شكل رقم (22)

2. فقدان فى الشهية.

3. وجود رائحة كريهة للفم.

4. تساقط الأكل من الفم أثناء عملية المضغ.

5. صعوبة في عملية المضغ والبلع.
6. زيادة رغبة الحيوان على شرب المياه.
7. عند فتح الفم تلاحظ وجود احمرار أو التهاب في الفم من الداخل وقد يكون مصاحبها وجود قرح على الغشاء المخاطي المبطن للفم ويمكن رؤية الأجسام الغريبة الموجودة بالفم التي قد تكون مسببة لذلك.
8. ارتفاع درجة حرارة الحيوان في حالة حدوث عدوى أو الإصابة بإحدى الأمراض المعدية كما ذكرنا مثل حصبة الكلاب.
9. نجد صعوبة عند فتح فم الحيوان وذلك من الألم الذي يسببه التهاب الحلق.

العلاج:

(أ) العلاج الموضعي: باستعمال بعض المستحضرات الموضعية مثل تانتوم الأخضر أو الأصفر مضمضة للفم يتم غسيل الفم من مرتين إلى ثلاثة مرات يومياً أو استعمال ماء الأكسجين 2٪ أو باستعمال الجلوسرين الطبي.

يمكن استعمال العلاج الموضعي مثل:

1. شراب التوت (المسة الزرقاء).

المعلومات الخفيفة..

2. ميكوناز جيل للغم Myconaz Jel

3. تانتم الأخضر أو الاصفر Tantum

4. ماء الأكسجين 2٪.

(ب) العلاج العام:

1 - مضاد حيوى مثل:

- قليوسيف 250 مليجرام كل 6 ساعات لمدة 3 أيام Velosefe 250mg
- أى - موكسى E - mox 250 mg لمدة 3 ايام شراب مقدار ملعقة شاي 4 مرات يومياً.
- فيتامين ب أو مخلوط فيتامينات لرفع مناعة الحيوان مثل:
- فاروكس Varolex شراب ملعقة كبيرة مرتين يومياً.
- مالتى سانستول Multisanistol شراب مرة كل يوم.
- استعمال شراب التوت بمعدل 3 - 5 سم بالغة مرة صباحاً ومساءً.
- استعمال النيستاتين شراب مرة كل يوم لمدة 3 - 5 أيام أو حتى تحسن الحيوان ويظهر ذلك فى تحسنه فى عملية الأكل وتوقف اللعاب الزائد.
- يمكن استشارة الطبيب البيطرى المختص فى حالة عدم الاستجابة.

التهاب اللوزتين (اللوز) Tonsillitis

تلعب اللوزتين دوراً مهماً في مناعة الحيوان وهما عبارة عن تجمع من الأنسجة الليمفاوية عند مؤخرة اللسان ويمكن الكشف عنهم باستعمال خافض اللسان لتحديد نوع ودرجة الالتهاب.

الأسباب:

1. يمكن أن تحدث كمضاعفات لالتهاب الحلق واللسان.
2. مضاعفات لالتهاب الزور أو البلعوم.
3. الإصابة البكتيرية بميكروب الاستربتوكوكسى هي موليتكم.
4. وجود بعض الأجسام الغريبة الملوثة في الفم.

الأعراض:

1. ارتفاع في درجة حرارة الحيوان قد تستمر لمدة 5 أيام متتالية.
2. ألم شديد بالفم والزور مع وجود سيلان في اللعاب.
3. رائحة كريهة من الفم.
4. صعوبة واضحة في البلع حسب درجة الالتهاب.
5. فقدان في الشهية نتيجة لصعوبة البلع وارتفاع درجة حرارة الحيوان.

المعلومات الخفيفة..

6. عند فتح اللسان والكشف عن اللوزتين نجد احتقان والتهاب في اللوزتين مع وجود تجمع صديدي بهما.
7. هبوط وضعف عام في الحالة الصحية والبدنية للحيوان.
8. في الحالات المهمة قد يؤدي إلى انتشار الإصابة إلى المفاصل مسببة التهاب في المفاصل أو التهاب رئوي ويصل إلى عضلة القلب مسبباً الحمى الروماتيزمية ووفاة الحيوان.

العلاج:

1. يمكن تعليق محاليل للحيوان مثل: ديكتروز 5 % Dextrose 5 %وريد 100 - 200 سم يومياً لتفادي مضاعفات فقدان الشهية وصعوبة البلع والجفاف.
2. حقن أدينوبلوكس فورت Adenoplex - Fort أمبوله كل 48 ساعة أو تراي بي Tri - B بالعضل.
3. مضاد حيوي ويفضل: أي - موكس كلاف 250 - 500 مليجرام كل 6 - 8 ساعات يومياً بالفم 35 - سم بواسطة سرنجة بلاستيك بدون سن.
4. استعمال غسول للفم مثل التانم الأخضر ثلاث مرات يومياً.

5. يمكن استعمال نيويوتك حقن 1/2 زجاجة عضل كل 12 ساعة.
6. في حالة عدم الاستجابة يمكن استشارة الطبيب البيطري المختص لتفادي المضاعفات أو اللجوء في بعض الأحيان إلى الحل الجراحي واستئصال اللوزتين جراحياً.

الالتهاب المعدى وقرح المعدة: Castritis & Gastric ulcer

الأسباب:

1. أكل كميات كبيرة من الطعام وبالأخص في المواليد الصغيرة وبالأخص بعد فترة الفطام.
2. أكل طعام فاسد أو معلبات منتهية الصلاحية.
3. أكل بعض الأشياء الغير قابلة للهضم مثل الصوف أو الشعر.
4. الحساسية من بعض المأكولات مثل الحيوانات التي عندها حساسية ضد البيض أو اللبن أو الأسماك.
5. بعض الأدوية عند إعطائها بكميات كبيرة مثل الأسبرين.
6. بعض الأمراض المعدية قد يصاحبها التهاب بالمعدة مثل حصبة الكلاب أو الالتهاب الكبدى أو التهاب البنكرياس.
7. الفشل الكلوى.

المعلومات الخفيفة..

8. الإصابة ببعض الديدان المعوية.

الأعراض:

1. القيء مع الألم في البطن.

2. العطش الشديد وقابلية ورغبة الحيوان في شرب كميات كبيرة من المياه.

3. الجفاف الشديد ودخول العين للداخل وكرمشة الجلد وضعف عام.

4. فقدان في الشهية وبالأخص في الحالات المصحوبة بارتفاع في درجة حرارة الجسم..

5. القيء ممكن أن يكون به دم (مدمم) في بعض الحالات.

6. الالتهاب المعدي ممكن أن يكون مصاحبه إسهال، هذا لو كانت الأمعاء ملتهبة أيضاً.

العلاج:

1. توقف الأكل لمدة 24 ساعة أو من 12 - 24 ساعة.

2. نسمح للحيوان بلعق قطع من الثلج.

3. بعض المهدئات أو مضاد القيء مثل:

ففي طب ورعاية الحيوانات الأليفة

- بريميبران Primberan: حقنة واحدة عضل وتكرر عند اللزوم أو شراب ملعقة 5 سم 3 مرات يومياً من نفس المستحضر (شراب).
- كورتجين ب Cortigen B6 6: حقن واحد كل 12 ساعة حتى اختفاء الأعراض.
- فومبي ستوب Vomi - stop: حبوب أو شراب 3 مرات يومياً.
- أكواثيرا Aquasera شراب لمدة 3 أيام 3 مرات يومياً.
- يمكن عمل غسيل معدى بواسطة استعمال بيكربونات الصوديوم 2.٪.
- مضاد حيوى واسع المدى لتفادى حدوث الاصابات الثانوية بالبكتريا فيمكن إعطاء:
أمبسيللين شراب كل 6 ساعات.
- ديوراسيف شراب كل 6 ساعات لمدة 3 - 5 أيام أو حتى تحسن الأعراض.
- 4. بالنسبة للأكل يمكن إعطاء شربة أو لبن مغلى بعد 24 ساعة من بداية العلاج.
- 5. يمكن إعطاء لبن مع بيض مع سكر.

المعلومات الخفيفة..

6. يمكن الرجوع لنظام الأكل المتبع قبل حدوث المرض تدريجياً لمدة 3 - 5 أيام لتفادي حدوث انتكاسة فى المرض نتيجة للتغير المفاجئ.

الالتهاب المعوى (الإسهال) : Enteritis or Diarrhoea

إن من أخطر الأمراض التى قد تصيب القطط أو الكلاب هو التهاب الأمعاء والذي يكون مصحوباً غالباً بإسهال مما يؤدي إلى جفاف الحيوان او الهبوط الحاد والانخفاض الحاد فى الحالة الصحية للحيوان وقد يؤدي على الوفاة بالأخص فى الحيوانات الرضيعة.

الأسباب:

1. هذا المرض تعددت أسبابه فمنها أسباب مرتبطة بالنظام الغذائي للحيوان أو ببعض الإصابات البكتيرية أو الفيروسية أو عن طريق بعض الأدوية.
2. أكل الأطعمة الفاسدة.
3. بعض الأمراض المعدية مثل الحصبة والالتهاب الكبدى أو الإصابة بفيروس الباركو.
4. الإصابة بميكروب الاى كولاي أو السالمونيلا.

5. رضاعة الحيوانات الرضيعة من حلمات ملوثة ولذا ينصح دائماً بنظافة حلمات الأم عند الرضاعة.
6. يمكن للحيوانات الصغيرة (الرضيعة) أن تأخذ العدوى من الأمهات التي كانت مصابة بحالة إسهال فيما قبل.
7. الإصابة ببعض الديدان التي قد تصيب القناة الهضمية للقطط والكلاب على سبيل المثال الإسكارس أو الدودة دبوسية.
8. التغيير المفاجئ في نظام الأكل على سبيل المثال التغيير المفاجئ من عليقة تحتوى على نسبة عالية من البروتينات مثل اللحوم إلى عليقة تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو العكس ولذلك ينصح دائماً بالتغيير التدريجى في النظام الغذائى.
9. مضاعفات للالتهاب المعدى الذى تم ذكره فيما قبل.

الأعراض:

1. إسهال مع قيء.
2. تجد أن الحيوان ميال للرقاد على أى مكان بارد مثل البلاط أو السيراميك او حتى الأماكن المبللة.
3. ألم شديد بالبطن وبالأخص عند فحص الحيوان.

المعلومات الخفيفة..

4. فقدان جزئى أو كلى فى الشهية.
5. جفاف وهزال وضعف عام نتيجة للجفاف.
6. البراز قد يكون مدمم فى بعض الحالات أو يحتوى على صديد أو مخاط أو بعض من أجزاء الطعام الغير مهضوم.
7. الرغبة فى شرب كميات كبيرة من الماء.
8. ارتفاع فى درجة حرارة الجسم فى حالة الإصابة ببعض الأمراض المعدية التى تسبب الإسهال.
9. بعض الأحيان وجود يرقات أو ديدان كاملة فى البراز فى حالة الإصابة بديدان القناة الهضمية.
10. زيادة فى عدد ضربات القلب.
11. ألم شديد عند لمس أو فحص منطقة البطن.
12. تلوث الفخذين والذيل بالبراز.
13. بعض الحالات يكون هناك تحذيق مع عملية التبرز.

العلاج:

1. إيقاف الأكل تماماً لمدة تتراوح ما بين 12 - 24 ساعة.
2. توفير كميات كافية من المياه النظيفة.

ففي طب ورعاية الحيوانات الأليفة

3. إعطاء محلول معالجة الجفاف بمعدل $\frac{1}{2}$ كيس كل 6 ساعات لتفادي حدوث الجفاف ويتم تجريعه للحيوان بواسطة سرنجة بدون سن أو عن طريق الببرونة في حالة الإصابة في الحيوانات الرضعية.
4. يمكن تعليق محاليل في الحالات الشديدة:
 - ديكستروز 5 % 100 - 300 سم وريد أو تحت الجلد أو حتى بالفم كل 12 - 24 ساعة.
 - محلول ملح 0.09 % 100 - 300 سم وريد أو حتى بالفم.
5. مضاد حيوى واسع المدى مثل:
 - فيلوسيف 500 شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
 - ديوار سيف 500 شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
 - يوناسين 750 شراب ملعقة مرتين يومياً.
6. بعض المستحضرات الجاهزة مثل:
 - كابكت Kapect شراب ملعقة كبيرة كل 8 - 12 ساعة
 - سمكتا Semecta بودرة تضاف محتويات باكو على 20 سم ماء تجرع للحيوان مرتين أو ثلاثة يومياً.

المعلومات الخفيفة..

- ستريبتوكين Streptroquine شراب ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً.
- 7. إعطاء أدوية لتوقف القيء مثل التي تم ذكرها من قبل فى التهاب المعدى (كورتيجين ب1 50 - 100 أو بريمبران أو فومى ستوب).
- 8. استشارة الطبيب البيطرى المتخصص فى حالة عدم الاستجابة.

الإمساك Constipation

الأسباب:

1. التهاب الحويصلات الشرجية التى سوف يتم تناولها فيما بعد.
2. نقص فى كميات الألياف وعدم اتزان العليقة أو التغير المفاجئ فى النظام الغذائى.
3. التهاب غدة البروستاتا عند الذكور.
4. أورام الحوض.
5. الشق الشرجى أو وجود جروح فى المستقيم أو فى فتحة الشرج.
6. نقص عنصر البوتاسيوم.
7. بعض الأدوية قد تؤدى إلى الإمساك عند استعمالها بكميات أو بجرعات كبيرة مثل مضادات الهستامين ومدرات البول.
8. الضعف العام وحالات الجفاف غالباً ما تكون مصاحبة بالإمساك.

الأعراض:

1. صعوبة في عملية التبرز وقد تكون معها تحذيق والم شديد بالأخص في حالات وجود جروح أو شقوق في المستقيم أو التهاب في الحويصلات الشرجية.
2. محاولات عديدة لعملية التبرز (زيادة عدد مرات التبرز).
3. جفاف شديد في شكل البراز وقد تكون كميته قليلة عن المعتاد.
4. البراز قد يكون مصحوب بوجود مخاط أو إفرازات دموية أو صديد.
5. ممكن في بعض الحالات يكون معه قيء.
6. غالباً ما تكون درجة حرارة الجسم طبيعية إلا إذا كانت مصحوبة بعدوى بكتيرية.
7. ألم شديد عند وضع أو جس المستقيم بالإصبع.

العلاج:

1. إعطاء ملينات مثل:
- بيكولاكس 10 - 20 Bicolax نقطة على $\frac{1}{4}$ كوب ماء 2 - 3 مرات ويكرر عند اللزوم.

المعلومات الخفيفة..

- جلسرين لبوس Glycerin للأطفال واحدة 3 مرات يومياً.
- بيكولاكس نقط 10 - 15 نقطة ويكرر عند اللزوم.
- نورمالاكس نقط.
- لأكسولاك شراب ملعقة 3 مرات يومياً ويكرر عند اللزوم.
- 2. عمل حقنة شرجية باستعمال 0.5 - 1.5 لتر ماء دافئ بالصابون ومحلول الملح بمعدل 5 - 10 سم / كجم من وزن الحيوان.
- 3. إعطاء أكل خفيف وسهل الهضم مثل الشربة أو اللبن مع تجنب إعطاء العظم طوال فترة المرض والعلاج.
- 4. ممكن نعطى أملاح معدنية وفيتامينات بالأخص فى الحيوان الهزيل مثل:
 - ميكافيت 10سم يومياً بالفم.
 - سانيسترول شراب 10سم يومياً بالفم.
 - سيفارول شراب 3 مرات يومياً.
 - فارولكس س شراب 3 مرات يومياً.
 - بولى فيت نقط 10 - 15 نقطة يومياً.
- 5. زيت أكل أو زيت بارافين أو زيت خروع (شربة) (15 - 20سم

للقطط، 30 - 50 سم للكلاب) بالفم أو عن طريق الحقنة الشرجية.

6. معالجة الأسباب التي تم ذكرها من قبل مثل التهاب الجيوب الشرجية أو التهاب البروستاتا.

7. استشارة الطبيب البيطري في حالة عدم الاستجابة.

التهاب الجيوب أو الحويصلات الشرجية: Anal - Sacculitis

يوجد هناك حويصلتان على كل جانب من فتحة الشرج ذات أهمية كبيرة في إفراز مادة شمعية أو دهنية لتسهيل عملية خروج البراز من المستقيم وكثيراً ما تلتهب هذه الحويصلات وتسبب آلام شديدة وصعوبة في عملية التبرز وغالباً ما تكون مصحوبة بإمساك شديد.

الأعراض:

1. التهاب وتورم في منطقة فتحة الشرج.
2. وجود إفرازات صديدية ذات رائحة كريهة من فتحة الشرج أو إفرازات دموية.
3. إمساك وصعوبة في عملية التبرز مع تحزيق شديد.
4. ألم شديد وقلة في منطقة الشرج بالأخص في الأرض.

المعلومات الخفيفة..

5. ارتفاع حرارة المستقيم عند الجس بالإصبع مع وجود ألم شديد أثناء الجس.

6. صراخ شديد مع عملية التبرز ولعق منطقة فتحة الشرج بعد التبرز.

العلاج:

1. بمطهر وليكن ماء أكسجين - أو سييتوسيد - أو سافلون ويتم تطهير الحويصلات وتفرغها جيداً من الصديد.

2. دهان مرهم مضاد حيوى مرتين أسبوعياً لمدة 3 اسابيع ويمكن استعمال - تيراميسين مرهم للجلد. جارمايسين مرهم للجلد.

- ليجنوكاين مرهم مسكن ومخدر موضعى.

- فيوسيدرم مرهم.

- فيوسيدين كريم.

- فاركوسين كريم.

3. مضاد حيوى بالحقن ويفضل مستحضرات البنسلين أو الكلورمفينيكول مثل:

- سيدوستين زجاجة، ½ زجاجة كل 12 ساعة عضل لمدة 5 أيام أو

حتى تحسن الحالة - بنسلين جـ صوديوم ½ كل 12 ساعة عضل.

- أو ييومكس 250 ملليجرام ملعقة 3 مرات يومياً.
- أموكسيل فورت 250 ملليجرام ملعقة 3 مرات يومياً.
- ستريتوفينيكول شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
- 1. التدخل الجراحي باستئصال الحويصلات الشرجية.
- 2. يمكن دهان فتحة الشرج بمادة ملينة أو كريم لتسهيل عملية التبرز ويمكن استعمال زيت البارافين في حالة وجود إمساك.
- 3. يتم فحص الحويصلات الشرجية عن طريق الطبيب البيطري المختص.

إصابات المريء:

كما هو معروف أن المريء هو القناة أو العضو المسئول عن نقل الطعام من التجويف الفمى بعد مضغه وطحنه إلى المعدة لعملية الهضم وبالتالي أى مرض فى المريء قد ينعكس على عملية البلع والهضم والصحة العامة للحيوان والملاحظ أن معظم مشاكل المريء تشابه فى أعراضه إلا أنها تكون مختلفة من حيث الأسباب وطرق العلاج.

(أ) انسداد المريء: Choke

غالباً ما يكون نتيجة لوجود قطعة من الطعام أو الأشياء الغريبة مثل

المعلومات الخفيفة..

لعب الأطفال أو الكرات البلاستيكية وانحشارها داخل المريء مما قد يؤدي إلى انسداده بالكامل والاختناق وموت الحيوان.

التهاب إحدى الغدد الليمفاوية المحيطة أو القريبة من المريء بعض السرطانات أو الأورام

الأعراض:

1. أعراض تشبه الاختناق.
2. استرجاع الأكل بعد البلع مباشرة وقد يسترجع الماء أيضاً في حالة الانسداد الكامل للمريء.
3. أعراض عصبية مثل الهياج وتغيير في السلوك الطبيعي للحيوان.
4. سيلان من اللعاب بصورة ملفتة للنظر.
5. محاولات للبلع قد تكون مصحوبة بقيء.
6. انتفاخ في حالة استمرار الحالة لفترة طويلة.

العلاج:

1. يمكن دفع أو جذب الشيء الغريب الذي أدى إلى انسداد المريء من الداخل باستعمال جفت طويل وفتاحة الفم.

ففي طب ورعاية الحيوانات الأليفة

2. يمكن التدخل الجراحي بعمل شق جراحي في المريء بمساعدة الطبيب البيطري المتخصص.
3. يمكن إعطاء ملينات بالفم لتساعد على انزلاق الجسم الغريب نحو المعدة.

(ب) التهاب المريء: Esophagitis

الأسباب:

1. شرب أو أكل طعام ساخن جداً.
2. الإصابة البكتيرية.
3. الجروح القديمة في المريء.

الأعراض:

1. سيلان في اللعاب.
2. صعوبة في البلع مع ألم شديد.
3. قيء بعد البلع مباشرة.
4. احتمال وجود ورم أو انتفاخ في الناحية اليسرى من الرقبة.

المعلومات الخفيفة..

5. عند جس الناحية اليسرى للرقبة نجدها مرتفعة في درجة حرارتها مع ألم شديد.

6. ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع فقدان في الشهية.

العلاج:

1. مضاد حيوى واسع المدى مثل:

- فيلوسيف 500 مليجرام $\frac{1}{2}$ زجاجة عضل كل 12 ساعة.

- سيفوبيد $\frac{1}{2}$ جرام $\frac{1}{2}$ زجاجة عضل كل 12 ساعة.

2. إيقاف الأكل لمدة 24 ساعة مع حقن فيتامينات لتعويض عملية إيقاف الأكل فيمكن إعطاء:

- فارولكس حقن 3 سم عضل كل يوم.

- تراى بى حقنة عضل كل يوم.

- أدينوبليكس فورتى أمبولة عضل كل 48 ساعة.

3. مسكنات للألم مثل كيتولاك أمبولات واحدة عضل كل يوم.

4. يمكن وضع الأكل فى مكان عالى للحيوان مما يؤدى إلى سهولة

البلع عن طريق الجاذبية الأرضية.

5. استشارة الطبيب البيطري في حالة عدم الاستجابة.

أمراض أو إصابات الكبد:

- الكبد من أهم الأعضاء الموجودة في القناة أو الجهاز الهضمي حيث أن له دور هام وأساسي في عملية التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات والكربوهيدرات كما ان له دور دفاعي هام للجسم وبالتالي إصابات أو أمراض الكبد تنعكس على الصحة العامة للحيوان وفي حالة الإهمال قد تؤدي إلى الوفاة.
- من خلال الدراسات العديدة على أمراض وإصابات الكبد تلاحظ أن أعراض الأمراض المختلفة للكبد على حد كبير متشابهة ولذا فقد تم تجميعها معاً بحيث لو كانت موجودة فيجب فحص الكبد جيداً واستشارة الطبيب البيطري المتخصص لتحديد نوع الإصابة ووضع الخطوط العريضة والدقيقة للعلاج إلا أنه قد أدرجنا أيضاً بعض الاحتياطات العامة في حالة الشك في وجود إصابة أو إحدى أمراض الكبد كما هو آتى:

الأعراض:

1. ألم شديد فى البطن وبالأخص فى الناحية اليمنى من البطن وبالأخص عند عملية الجس تحت منطقة الضلوع فى الناحية اليمنى.
2. استسقاء فى البطن.
3. نوبات من الاسهال والامساك بصورة متبادلة يعنى إسهال ثم إمساك والعكس.
4. خمول وضعف عام للحيوان وجفاف.
5. اصفرار فى لون الغشاء المخاطى أو ملتحمة العين وقد ينتشر اللون الأصفر إلى الجسم كله فى حالات الإصابة الشديدة نتيجة لزيادة نسبة الصفراء فى الدم وأنسجة الجسم.
6. بعض الأعراض العصبية.
7. نجد تغيرات فى شكل ولون البراز وغالباً ما يأخذ اللون الأصفر نتيجة لزيادة نسبة الصفراء.
8. يمكن التأكد من المرض عن طريق استشارة الطبيب البيطرى

المختص للتشخيص بالكشف الإكلينيكي أو بالموجات فوق الصوتية أو عمل تحاليل وظائف كبد للتأكد من المرض.

9. ترنح في المشي مع سيلان في اللعاب.

10. نوبات من الإغماء.

الاحتياطات الواجب اتخاذها للحيوان المريض بالكبد:

1. يفضل إعطاء طعام ذات نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر ويحتوى على نسبة قليلة من البروتين والدهون لعدم إجهاد الكبد.

2. يمكن إعطاء مستحضرات فيتامين ب المركب عن طريق الحقن بالعضل أو بالفم مثال:

- تراى بى حقن أمبولة عضل كل 48 ساعة.

- فارولكس شراب ملعقة 4 مرات يومياً.

- أدينوليكس فورت أمبولة عضل.

- فارولكس مع خلاصة الكبد 3سم عضل كل 48 ساعة.

3. إيقاف ملح الطعام من الأكل لتفادى حدوث الاستسقاء في البطن أو في أماكن أخرى من الجسم.

المعلومات الخفيفة..

4. يمكن إعطاء مدرات البول بالحقن فى العضل ووريد أو بالفم:

- لاسيكس حقن 1 - 2 سم عضل أو وريد كل 48 ساعة.

- لاسيكس حبوب 1/2 حبة صباحاً أو مساءً.

- الداكتون حبوب حبة كل 24 ساعة

- أديمبكس حبوب حبة كل 24 ساعة.

5. جلو كوز بالفم 5 - 10 سم 3 - 5 مرات يومياً.

6. مضاد حيوى واسع المدى كما ذكر من قبل.

7. يمكن إعطاء فيتامين ك:

- امرى - ك أمبول: أمبولة عضل كل 48 ساعة.

- كابرون أمبول: أمبولة عضل كل 48 ساعة

obeikandi.com

الفصل الثالث

١- أمراض الجهاز التنفسي

الفصل الثالث

أمراض الجهاز التنفسي

التهاب الجيوب الأنفية Sinusitis

التهاب الجيوب الأنفية من أشهر أمراض الجهاز التنفسي وأكثرها حدوثاً في الكلاب والقطط وغالباً ما تكون نتيجة لإصابات بكتيرية أو فطرية أو نتيجة لوجود جروح في الجيوب الأنفية أو نتيجة لمضاعفات لحالات الإصابة بأمراض القناة التنفسية العليا للقطط والكلاب مثل التهاب الزور أو وجود أجسام غريبة بالجيوب الأنفية.

الأعراض:

1. عطس شديد مع وجود ورم أو التهاب في منطقة الوجه مع ارتفاع في درجة حرارتها.
2. إفرازات أنفية من مائية سائلة إلى مخاطية لزجة حسب درجة الالتهاب وتظهر هذه الإفرازات بالأخضر عند انخفاض رأس الحيوان إلى أسفل وتكون هذه الإفرازات من ناحية واحدة أو من

المعلومات الخفيفة..

الناحيتين من فتحتى الأنف حسب مكان الإصابة.

3. درجة حرارة الجسم قد تكون طبيعية أو مرتفعة ارتفاع طفيف.
4. فقدان كلى أو جزئى فى الشهية مع ضعف عام وانخفاض فى وزن الحيوان وهزال وأنيما.
5. يمكن التأكد من هذه الأعراض بواسطة استشارة الطبيب البيطرى المختص لإجراء الفحوصات اللازمة مثل عمل منظار أو أشعة على الرأس.
6. التأثير على الصوت الطبيعى (النباح أو العواء) للحيوان.
7. ألم شديد من لمس أو جس منطقة الوجه.

العلاج:

1. مضاد حيوى واسع المدى مثل:
 - بنسلين 1 زجاجة عضل كل 12 ساعة.
 - سيفوفيد 1/2 جرام 1/2 حقنة كل 12 ساعة عضل.
 - يوناسين 1 جرام 1/2 حقنة كل 24 ساعة.
 - يوناسين شراب 4 مرات يومياً.
 - ستريم شراب ملعقة كل 6 ساعات.

2. مضادات للالتهاب (كمسكن): - فينادون شراب ملعقة كل 8 ساعات.

- ديكسازون 3 مرات يومياً. - أولفين
- ميجلوكسين 1 سم / 15ك عضل كل 48 ساعة.
- ديكلوفين لبوس كل 24 ساعة أو حقن 1/2 أمبولة عضل كل 12 ساعة.

3. مزيل للاحتقان يمكن إعطائه بالأنف مثل:

- بروزلين نقط للأنف 3 - 5 نقطة بالأنف 3 مرات يومياً.
- أتروفين نقط للأنف 3 - 5 نقطة 3 مرات يومياً.
- أتروفين بابي سالين نقط للأنف 3 - 5 نقط بالأنف 3 مرات يومياً.

4. في حالة عدم الاستجابة للعلاج السابق (تظهر الاستجابة في صورة تحسن شهية الحيوان للأكل مع توقف في الإفرازات الأنفية ورجوع درجة حرارة الجسم إلى معدلاتها الطبيعية) فيجب استشارة الطبيب البيطري المتخصص وذلك لاحتمال وجود زائدة لحمية (لاحمية) بالأنف أو جسم غريب يجب إزالته جراحياً.

التهاب الغشاء المخاطي المبطن للأنف (الرشح) Rhinitis

إن من العلامات الصحية عند القطط والكلاب هو عدم وجود إفرازات من فتحتى الأنف مع جفاف فى خرطومة الحيوان وبالتالي وجود إفرازات أو ارتشاحات أنفية قد تكون مؤشراً عاماً لوجود مرض فى القناة التنفسية وبالأخص فى التجويف الأنفى ومن أشهرها هو التهاب الغشاء المخاطي للأنف الذى قد يسببه استنشاق بعض الأدخنة المهيجة أو الأتربة أو بعض الإصابات البكتيرية أو الحساسية ضد بعض الأدوية أو المأكولات أو نتيجة لنزلات البرد.

الأعراض:

1. وجود ارتشاحات أو إفرازات أنفية غالباً ما تكون مائية سائلة.
2. حرقان وحكة شديدة فى منطقة الأنف وخرطومة الحيوان.
3. درجة حرارة الجسم قد تكون طبيعية.
4. عند الكشف على الأنف بواسطة مصدر ضوئى أو منظار أنفى نجد وجود احتقان فى الغشاء المخاطي المبطن للأنف تختلف درجته حسب درجة المرض.
5. الالتهاب قد يكون فى ناحية واحدة أو الناحيتين من الأنف.

العلاج:

1. مزيل للاحتقان مثل:

- أتروفين فقط للأنف 3 - 7 نقط بالأنف 3 مرات يومياً.
- أتروفين بابي سالين نقط للأنف 3 - 5 نقط بالأنف 3 مرات يومياً.
- بروزلين نقط للأنف 3 نقط بالأنف 3 مرات يومياً.
- رينوستوب نقط للأنف.
- نازوتال رذاذ للأنف.

2. مضاد للهستامين مثل:

- هيستامين شراب ملعقة صباحاً ومساءً.
- أفيل شراب ملعقة كل 12 ساعة أو 3 مرات يومياً حسب شدة الحالة.
- أفيل أمبولات أمبولة $\times 2$ سم: 1 سم عضل كل 12 ساعة.
- فينادون شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
- ابيدون شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
- ساين أب شراب 3 مرات يومياً.

3. مضاد حيوى مثل:

- كيبوركس 500 مليجرام شراب ملعقة (5سم) كل 8 ساعات.

المعلومات الخفيفة..

- ستريم ملعقة كل 8 ساعات.
- زاداتين ملعقة كل 8 ساعات.
- نيوبيوتك حقن 1/2 زجاجة عضل كل 12 ساعة.
- فيلوسيف 1/2 جرام: 1/2 زجاجة عضل كل 12 ساعة.
- غسيل الأنف بمحلول ملح 0.09 ٪ لإزالة أى إفرازات أو أجسام غريبة وتكرر كل 24 ساعة.

النزيف الأنفى Epistaxis

الأسباب:

1. الخبطات أو الارتطام فى أجسام صلبة فى منطقة الانف أو الرأس.
2. استعمال خاطئ لمناظير الجهاز التنفسى.
3. ارتفاع فى ضغط الدم.
4. نقص فى عنصر الكالسيوم أو فيتامين ك3.
5. انفجار فى لحمية الأنف.
6. بعض أمراض القناة التنفسية السفلى قد يكون مصاحبها نزيف من الأنف.

الأعراض:

1. نزيف من الأنف سواء من فتحة واحدة أو من فتحتي الأنف.

العلاج:

1. وضع كمادات ماء بارد على منطقة الرأس مع رفع الرأس إلى أعلى.
2. وضع قطعة من القطن مشبعة بمادة الأدرينالين في الأنف لتوقف النزيف ويراعى عدم حقن الأدرينالين في العضل أو الوريد لتجنب ارتفاع ضغط الدم وزيادة النزيف.
3. إعطاء موقوفات للنزيف عن طريق الحقن بالعضل أو الوريد مثل:
 - كابرون أمبولات 1/2 أمبولة عضل أو وريد وتكرر عند اللزوم
 - دايسنون أمبولات أمبولة عضل وتكرر عند اللزوم.
 - ميثاروجين أمبولات أمبولة عضل وتكرر عند اللزوم.
 - أمري - ك أمبولات أمبولة عضل كل 24 ساعة.
4. إعطاء بعض مستحضرات الكالسيوم التي تساعد في إيقاف النزيف كعامل مساعد للتجلط مثل:
 - دي - كال - بي 12 شراب 3 مرات يومياً (5سم).
 - دي - كال - بي 12 أمبولات 1 - 3 أمبولة عضل يومياً.

المعلومات الخفيفة..

- كاليسيوم بور جلوكونات بالوريد 1/2 - 1 أمبولة.

5. التعامل مع رأس الحيوان بشيء من الحذر وعدم تواجد الحيوان في مكان مغلق ومكتوم.

نزلات البرد (الالتهاب الشعبى والالتهاب الرئوى أو الكحة المزمنة):

الأسباب:

1. إصابة بكتيرية.
2. بعض المواد المهيجة أو الاجسام الغريبة أو استنشاق بعض الأتربة التى قد تؤدى إلى تدمير الغشاء المخاطى المبطن للشعب الهوائى مما يؤدى إلى التهابها.
3. بعض التحصينات قد تكون مصحوبة بالتهاب شعبى خفيف مثل التحصين ضد حصبة الكلاب والالتهاب الكبدى المعدى.
4. الاصابة بفيروس البارافلورنزا أو ميكروب الميكوبلازما.
5. استنشاق المبيدات الحشرية أو بعض الاتربة أو الادخنة المهيجة للغشاء المخاطى المبطن للقناة التنفسية.
6. بعض الاضطرابات أو التغيرات المفاجئة التى قد يتعرض لها الحيوان وبالأخص التغيرات المفاجئة فى الطقس مثل التعرض لموجة برد مفاجئة.

الأعراض:

1. كحة وتظهر غالباً في صورة مزمنة وتزداد ليلاً.
2. غالباً تكون الكحة جافة وفي صورة نوبات مصحوبة بامتداد في الرقبة وقد يصحبها قيء.
3. وجود لعاب في صورة رغوية من الفم بعد الكحة أو معها.
4. زيادة الكحة بالأخص بعد التدريب أو التغير في الجو.
5. بعض الحالات تصدر صوت يشبه صوت الشخير مع التنفس.
6. غالباً ما تكون الشهية ودرجة الحرارة إلى حد ما طبيعية.
7. يمكن تأكيد التشخيص باستشارة الطبيب البيطري المتخصص لعمل الفحوصات الإكلينيكية الخاصة بالسماعة الطبية أو بإجراء عمل أشعة بالصدر أو تحاليل للغازات الموجودة بالدم أو عمل مزرعة بكتيرية من خلال عينات البلغم.
8. إفرازات أنفية - صعوبة في التنفس - نهجان.

العلاج:

1. يمكن أن تشفى الحالة تلقائياً لمجرد وضع الحيوان في مكان دافئ وجيد التهوية وبالأخص في الحيوانات الكبيرة.

المعلومات الخفيفة..

2. مستحضرات السلفا مفيدة جداً في هذه الحالات مثل استعمال:

- ستريم شراب ملعقة 4 مرات يومياً.

3. مضاد حيوى واسع المدى لتجنب حدوث الإصابة البكتيرية

الثانوية مثل إعطاء:

- كيبوركس 500 ملجرام شراب 3 مرات يومياً.

- إيموكس كلاف 250 ملجرام 3 مرات يومياً.

- زادانين شراب 3 مرات يومياً.

4. موسع للشعب الهوائية مثل (مهدئ للسعال).

- برونكوفان شراب

- توسيفان شراب

- توبلكسيل شراب 3 مرات يومياً لمدة 5 أيام.

- إزيلين شراب

- سيريتول شراب

- برونكس نقط: 15 نقطة / ¼ كوب ماء 3 مرات يومياً.

5. مضاد للهستامين مع مضاد للالتهاب:

- هستارين شراب ملعقة 3 مرات يومياً.

- أفيل شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
- ديكسازون شراب 3 مرات يومياً.
- ديكلوفلين أمبولات 1/2 أمبولة عضل كل 12 ساعة
- فينادون شراب لمدة 5 أيام.
- 6. يمكن إعطاء محاليل بالوريد مثل: رينجرز لاكتات 100 - 200 سم يومياً لتجنب حدوث الجفاف.
- 7. أملاح معدنية مع فيتامينات لزيادة مناعة الحيوان:
 - سيفارول شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
 - تريفارول شراب أو أقراص 3 مرات يومياً.
 - أدينوبلكس فورث أمبولات أمبولة عضل كل 48 ساعة.
 - مالتى سانستول شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
 - ميكسافيت شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
- 8. فى الحالات الشديدة والتي لا تستجيب للعلاج السابق يفضل استشارة الطبيب البيطرى المتخصص وربما تكون الحالة تستدعى عمل تنفس صناعى باستعمال جهاز النابيلزر.

الأزمة الشعبية فى الققط : Bronchial Asthma

هذا المرض يحدث فى الققط فقط ويتميز بوجود صعوبة فى التنفس بصورة مفاجئة مع زفير طويل وكحة مع زرقة فى الجسم وفى الأغشية المخاطية بالأخص فى العين.

- تكون الحالة الذهنية للققط طبيعية ولكنه يفضل الرقاد وعدم الحركة والمجهود.
- درجة حرارة الجسم غالباً ما تكون طبيعية إلا أنها قد ترتفع ارتفاع طفيف فى بعض الحالات نتيجة للصعوبة فى التنفس والمجهود الذى يبذله الحيوان فى استخراج الزفير والكحة.
- السبب الرئيسى لهذه الحالات غير محدد بدقة حتى الآن لكن يعتقد لدرجة كبيرة أنه نتيجة لحالات الحساسية وبالأخص الغبار والأدخنة المهيجة.

العلاج:

1. تعتبر مضادات الالتهاب والهستامين من أفضل العلاجات فى هذه الحالات مثل:
- فينادون شراب 5سم 3 - 5 مرات يومياً لمدة تمتد إلى 5 أيام.

- هيستارين شراب لمدة 5 أيام 5 سم 3 مرات يومياً.
- حقن مثل:
- ديكلوفان أمبولات 1/2 أمبولة عضل كل 24 ساعة لمدة 3 - 5 أيام.
- ديكساميثازون أمبول أمبول 1/2 أمبولة كل يوم عضل لمدة 3 أيام.
- سوليو كورتيف أمبولة كل 24 ساعة لمدة 3 أيام.
- افيل امبولات 1/2 أمبولة عضل كل يوم لمدة 4 أيام.
- 2. وضع الحيوان في مكان دافئ وجيد التهوية ولو كانت الحالة شديدة يمكن تعليق أكسجين للحيوان عن طريق النابيليزر (جهاز خاص بذلك).
- 3. إعطاء مهدآت للكحة وموسع للشعب الهوائية مثل:
- برونكوفلين شراب 3 مرات يومياً بجرعات 5 سم بالفم لمدة 3 - 5 أيام أو حتى تحسن الحالة.
- إيزيلين شراب 3 مرات يومياً (5 سم).
- توسيفان شراب 5 سم 3 مرات يومياً لمدة 3 - 5 أيام أو حتى تحسن الحالة.
- كوفلين شراب ملعقة 3 مرات يومياً.

المعلومات الخفيفة..

- برنكو شراب ملعقة 3 مرات يومياً.
- بيسلفون شراب ملعقة 3 مرات يومياً.

1. يمكن إعطاء أترويين سلفات بمعدل 1سم/10ك من وزن الحيوان ولكن بعض الأبحاث لا تفضله لأنه قد يؤدي إلى جفاف في الأغشية المخاطية المبطنة للقناة التنفسية إلا أنه قد يعطى نتائج إيجابية بصورة واضحة في تحسن الحيوان واختفاء الأعراض بسرعة.

2. في حالة الخوف من حدوث المضاعفات التي قد تؤدي إلى حدوث التهاب رئوى أو شعبي ممكن أن نعطي مضاد حيوى واسع المدى على سبيل الاحتياط لمنع حدوث أى إصابات بكتيرية ثانوية ينشأ عنها التهابات فى أماكن مختلفة فى القناة التنفسية فيما بعد وقد تم ذكر أمثلة كثيرة من المضادات الحيوية واسعة المدى فى أمراض كثيرة من قبل.

obeikandi.com

الفصل الرابع

— أمراض الجلد والأطراف

الفصل الرابع

أمراض الجلد والأطراف

جلد القطط

الإصابة بالبراغيث من أشهر أمراض الجلد التي تصيب القطط إلى جانب الإصابة بالقوبة (Ring worm) وتكمن مشكلة الإصابة بالبراغيث أو بالقوبة في القطط في أنها يمكن أن تنتقل إلى الإنسان أو تسبب العدوى للحيوانات الأخرى.

والسؤال الآن:

(1) لماذا تمثل أمراض الجلد مشكلة في القطط؟

- غالباً ما تصاب القطط بالبراغيث أكثر من الكلاب وتؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الراحة عند القطط بالإضافة أنها تسبب نوع من الحساسية عند القطط يجعلها تهersh وتحك الجلد مما يؤدي إلى التهاب الجلد في بعض الأحيان وتساقط الشعر.

- تكمن مشكلة القوبة في القطط في أنها تنتقل إلى الإنسان لدرجة أنه

المعلومات الخفيفة..

فى بعض الأبحاث وجد أن إصابة قطة واحدة بالقوبة يمكن أن يكون سبب فى انتقال المرض إلى مدرسة كاملة من الأطفال.

(2) ما هى الأعراض التى يمكن أن يلاحظها صاحب القطة؟

- من السهل جداً على صاحب القطة أن يكتشف إصابة القطة بمرض جلدى ممكن أن يلاحظ وجود البراغيث على الحيوان أو وجود بقع أو خطوط من الصلع أو تساقط الشعر مع وجود قشور فى هذه الأماكن.

- يمكن ملاحظة هذه الأعراض بالأخص فى منطقة البطن أو الأرجل الخلفية أو فى منطقة الزيل، بالأخص فى مقدمة الزيل.

- وجود مناطق من الجلد بها احمرار أو زيادة فى سمك الجلد من زيادة حكة أو هرش القطة فى الأماكن المصابة.

- يمكن ظهور بعض الأورام فى جلد القطط بالأخص فى منطقة الأذن أو الأنف نظراً لأن سمك الجلد فى هذه المناطق يكون قليل وبالتالي ممكن للقطط أن تتعرض لحدوث بعض الأورام فى هذه الأماكن من أشعة الشمس.

(3) كيف يمكن للطبيب البيطرى الكشف على الجلد؟

- للكشف على جلد القطة لابد للطبيب البيطرى الكشف على الحيوان بالكامل مما قد يسهل على الطبيب البيطرى فى التعرف على المشكلة بسهولة أو قد يساعد ذلك فى التشخيص.

- إحدى الاختبارات السهلة التي يمكن عملها بسهولة بواسطة تمشيط شعر القطة بالمشط ثم وضع المواد الموجودة أو العالقة في المشط على ورقة بيضاء وبالتالي يمكن بسهولة رؤية البراغيث أو بقايا براز البراغيث بسهولة. ويمكن تبليل قطعة الورق البيضاء بالماء بحيث لو وجد بها بقع حمراء أو دموية يكون هذا عبارة عن دم القطة نتيجة للإصابة بالبراغيث.

- لو لم يساعد اختبار المشط في التشخيص فيمكن للطبيب البيطري أخذ عينة من قشور جلد القطة (Skin scaping) وفحصها تحت الميكروسكوب الضوئي وهذا الاختبار لا يسبب ألم للقطة ويمكن عند فحص العينة تحت الميكروسكوب يمكن رؤية بعض الطفيليات مثل البراغيث أو القمل أو معرفة ما إذا كان تصفيف الشعر نتيجة لهرش وحكة القطة للجلد.

- بعض الأحيان التي لا يكون فيها معروف تمام سبب المرض الجلدي فيمكن للطبيب البيطري عمل مزرعة بكتيرية أو فطرية أو يمكن أخذ عينة من الوريد الفخذي أو الوريد الودجى بالعنق وفحصها في معمل التحاليل للتعرف على السبب.

(4) ما هي الوسائل والطرق الوقائية والعلاجية لأمراض الجلد في القطط؟

- مما لا شك فيه أن العلاج يعتمد في الأساس على التشخيص ولذا فإن تشخيص المرض مهم جداً لوضع الخطوط الأساسية للعلاج.

المعلومات الخفيفة..

- عموماً فى الققط التى تعانى من هرش وحكة مع ظهور أو عدم ظهور مناطق من تساقط الشعر أو الصلع يوصى باستعمال أى مضاد للبراغيث مع الاستحمام بصورة منتظمة ويمكن استعمال مضاد البراغيث بصورة دورية.
- تغذية الحيوان بصورة منتظمة ودورية.
- فحص القطة بصورة منتظمة ودورية.
- معظم أمراض الجلد فى الققط يمكن التحكم فيها وضع حدوثها عن طريق الوقاية والفحص الدورى للحيوان.

التهاب الجلد الشمسى فى الققط: Feline Solar Dermatitis

هو إحدى أمراض الجلد التى غالباً ما تصيب الققط ذات اللون الأبيض أو الألوان الأخرى وبالأخص التى لها أذن بيضاء نتيجة للتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. والسبب الرئيسى غير محدد بدقة حتى الآن لكن حدوث المرض يتطلب التعرض للشمس لفترات طويلة ولذا فهذا أكثر حدوثاً فى المناطق الدافئة التى تسطع فيها الشمس لفترات طويلة (فصل الصيف).

الأعراض:

1. احمرار فى الجلد.
2. تساقط الشعر وقشور مع هرش وحكة فى الحالات الشديدة (الحادة).
3. يُعتبر عامل مساعد لحدوث أورام الجلد فى الققط.

العلاج:

1. عدم تعرض الحيوان لأشعة الشمس.
2. المراهم المضادة للالتهاب كاستعمال موضعي على المناطق المصابة مثل:
 - أولفين مرهم
 - تيراكورتيريل مرهم مرتين يومياً
 - بان ديرمال كريم
3. مستحضرات الكورتيزون بالحقن مثل:
 - سوليوكورتيف أمبول: 1/2 أمبولة كل يوم عضل حتى اختفاء الأعراض.
 - ديكلوفان أمبول: 1/2 أمبولة عضل كل يوم لمدة 3 - 5 أيام متتالية.
4. لو وصلت الحالة إلى ظهور أورام في الجلد فيجب استشارة الطبيب البيطري المختص لإزالتها جراحياً واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جلد الكلاب

- أمراض الجلد في الكلاب كثيرة الظهور ولكن لا تؤدي إلى الوفاة ولكن كثيراً منها ما يظهر بصورة مزمنة ويصعب علاجها ولكن عموماً يمكن الوقاية من أمراض الجلد في الكلاب بوسائل عديدة مثل الفحص

المعلومات الخفيفة..

الدورى والنظافة المستمرة والأكل المتوازن.

- عند ظهور أى أعراض تشير إلى إصابة الكلب بمرض جلدى مثل تساقط الشعر والهرش والقرح ووجود قشور فى الشعر لابد من استشارة الطبيب البيطرى مباشرة لأن هناك العديد من أمراض الجلد التى تشابه إلى حد كبير فى الأعراض مما يجعل تشخيصها صعب.

- من أشهر الأمراض التى تصيب جلد الكلاب:

تقيحات الجلد (Pyodermas)

- غالباً ما يكون نتيجة للإصابة بالبكتريا العنقودية (Staphylococca) أو بعض الأنواع الأخرى من البكتريا.

- غالباً ما يظهر بصورة فردية وغير معدى للحيوانات الأخرى أو للإنسان.

* الأعراض:

1. هرش أو حكة فى مناطق التقيحات.
2. فى بداية المرض يظهر لون أصفر ثم يتحول إلى احمرار مع دم فى مناطق الإصابة.
3. ظهور بعض القشور والقرح فى بعض الحالات.
4. تساقط للشعر مع ظهور رائحة كريهة فى مناطق الإصابة.

5. أي منطقة في الجسم يمكن أن تتعرض للإصابة بتقيحات الجلد Poydermas.

6. الكلاب السمينية أكثر عرضة للإصابة بتقيحات الجلد.

7. الأماكن الأكثر عرضة لظهور الأعراض في منطقة الذقن والوجه والشفيتين والمهبل.

8. يمكن ظهور الأعراض فيما بين الأصابع أو منطقة البطن في الكلاب الصغيرة.

* التشخيص:

يعتمد أساساً على تاريخ الحالة وظهور الأعراض ويمكن عمل مزرعة بكتيرية واختبار الحساسية لتحديد نوع المضاد الحيوى الأكثر فاعلية لكل حالة.

* العلاج:

1. إزالة الشعر في المناطق المصابة.

2. غسيل الحيوان بالكامل بالشامبو الذى يحتوى على مضاد حيوى.

3. يمكن وضع مضاد حيوى مرهم أو كريم على مناطق الإصابة مثل التيرامايسين مرهم أو كريم للجلد.

4. يمكن إعطاء مضاد حيوى عن طريق الحقن أو بالفم لمدة 3 - 5

المعلومات الخفيفة..

أسابيع متتالية.

5. يمكن استعمال أربطة من الشاش المعقم فى مناطق الإصابة بالأخص فى منطقة الرجلين.

6. يمكن استعمال بعض المطهرات فى مناطق الإصابة مثل السافلون - ستيافلون أو بيتادين للجلد أو يمكن استعمال بعض الشامبوهات التى تحتوى فى تركيبها على مطهرات للجلد.

7. يراعى عدم استعمال الكورتيزون ومستحضراته فى مثل هذه الحالات.

8. لابد من المتابعة المستمرة لدى الطبيب البيطرى لتفادى رجوع المرض مرة أخرى.

التهاب جلد الأنف الشمسى فى الكلاب: Nasal - Solar Dermatitis

من أكثر الأمراض شيوعاً فى الكلاب وبالأخص فى سلالة الكولى (Collei) والشفيرد الألمانى (German shepherds) وأيلش كورجى (Welsh Corgi) وسلالات أخرى كثيرة وأيضاً السبب الرئيسى غير محدد بدقة إلا أنه حدوث المرض يتطلب التعرض للشمس ولذا فهو أكثر حدوثاً فى فصل الصيف ويمكن أن يعاود الظهور كل عام.

الأعراض:

1. احمرار وحكة وتشوه في منطقة الأنف بالأخص.
2. قد تنتشر الأعراض إلى جفون العين والشفتان وقد تظهر داخل الفم في صورة احمرار والتهاب في اللثة.
3. غالباً ما تظهر الأعراض حول فتحتي الأنف أو عند منبت الشعر المحيط بالأنف إلا أنه قد تظهر الأعراض في أماكن أخرى من الجسم في الحالات الشديدة الحادة أو الحالات التي لم يتم علاجها بسرعة.
4. يمكن أن تظهر الأعراض عند زاويتي الفم.
5. لو ظهرت الأعراض في جفون العين قد يصاحبها التهاب في ملتحمة العين واحمرار في الغشاء المخاطي المبطن للجفون.

العلاج:

1. التقليل من التعرض لأشعة الشمس.
2. تقليل الالتهاب والحكة بواسطة مستحضرات الكورتيزون أو المراهم المضادة للالتهاب كما تم ذكرها من قبل في مرض التهاب الجلد الشمسي في القطط فيمكن استعمال نفس الأدوية.
3. إعطاء مضاد حيوى واسع المدى لتفادى حدوث الإصابات البكتيرية الثانوية.

المعلومات الخفيفة..

- فيلوسيف 250 شراب 4 مرات يومياً.
- كيبوركس 500 شراب 4 مرات يومياً.
- يوناسين شراب 750 3 مرات يومياً.
- 4. كمادات الماء البارد على المناطق التى ظهر فى الأعراض.
- 5. لو ظهرت الأعراض فى العين لابد من تطهير العين بالماء الدافئ ووضع إحدى المستحضرات الآتية:
- تيراكورتيريل مستحلب أو مرهم مرتين يومياً.
- توبرين قطرة أو مرهم 3 مرات يومياً.
- تيراميسين مرهم للعين 3 مرات يومياً.
- 6. قد يستمر العلاج لفترة تمتد إلى شهر ويمكن تكراره على فترات متباعدة فيما بعد.

الجرب فى الكلاب والقطط Mange:

الجرب من أخطر الأمراض التى قد تصيب القطط والكلاب حيث أنه يؤدى إلى فقدان المنظر الجمالى للحيوان علاوة على الهرش والحكة التى تؤدى إلى الضعف العام والأنيميا وتجعل الحيوان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

الأعراض:

1. هرش وحكة شديدة في أماكن مختلفة من الجسم.
2. تساقط الشعر مع وجود قشور على الجلد شكل (23).
3. كرمشة في الجلد بالأخص في مناطق الهرش والصلع.
4. أكثر شيوعاً في سن من 3 - 6 شهور.
5. في الحالات المهملة قد يصاحبها التهابات صديدية في الجلد Pyoderma وبالأخص بين الأصابع وتكون مؤلمة جداً للحيوان.



شكل رقم (23)

المعلومات الخفيفة..

العلاج:

1. فى حالة الحيوانات ذات الشعر الطويل أو الكثيف ينصح بقص الشعر.

2. يمكن استعمال بعض المستحضرات الموضعية على المناطق

المصابة كالتى:

- مرهم كبريت 5 - 10 ٪ دهان

- سكاين مرهم مرتين يومياً

- بنزانييل مرهم

- أيوراكس غسول

3. استحمام الحيوان مرة كل أسبوع لمدة 4 اسابيع بالماء ويكون

الماء محتوى على إحدى مستحضرات الحشرات الخارجية مثل

نوليس.

4. استحمام الحيوان كل يومين بالشامبو المناسب الذى يستعمله

الحيوان باستمرار وتنظيف الجلد جيداً من أى قشور.

5. فى حالة وجود تجمعات صديدية يراعى تطهير الأماكن المصابة

بمطهر مناسب مثل:

- سافلون - ستيافلون

- بيتادين مطهر للجلد - ماء أكسجين
- 6. مع استعمال مرهم مضاد حيوى بالأخص بين الأصابع مثل:
 - جاراميسين مرهم للجلد
 - تيراميسين مرهم للجلد
 - ديرموفيت مرهم للجلد مرتين يومياً
 - بان ديرمال مرهم للجلد
 - مع إعطاء مضاد حيوى بالفم
- وينصح بإعطاء إحدى مستحضرات البتسلين مثل:
 - فلومكس 250 مليجرام: ملعقة 3 مرات يومياً.
 - بيومكس 250 مليجرام: ملعقة 3 مرات يومياً.
 - أى - موكسى شراب 250 ملجرام
 - أى - موكسى كلاف شراب 250 مليجرام: ملعقة كل 8 ساعات لمدة 5 أيام.
 - أموكسيل فورت شراب لمدة 5 أيام.
- 7. حقن إحدى مستحضرات الإيفرمكتين كالآتى:
 - إيفوماك سوبر

المعلومات الخفيفة..

- إيفين
- ديكوماكس
- إيفرمك 1سم / 20ك تحت الجلد
- أيفوماكس ويكرر بعد أسبوعين
- نصرومكتين
- إيفرمكتين بلس
- 8. فى حالة الهرش أو الحكة الشديدة يمكن إعطاء مستحضرات الكورتيزون:
- سوليو كورتيف
- فورتا كورتين أمبولة كل 48 ساعة
- ديكساميثازون وتكرر عند اللزوم
- ديكوفان

القوبة (Ring worm)

القوبة من أشهر الأمراض الفطرية التى تصيب الجلد فى الكلاب وبالأخص فى الأعمار الصغيرة ويصحبها الفطر الذى يسمى ميكروسبورام microsporum أو ترايكوفايتون trichophyton.

* الأعراض:

1. غالباً ما تظهر الأعراض في الأعمار الصغيرة في منطقة الوجه والرجلين ومنطقة الأظافر.
2. غالباً ما تظهر الأعراض في صورة دوائر من الشعر المتساقط ووجود قشور مع عدم حكة أو هرش في مناطق الإصابة.
3. يمكن للأعراض أن تظهر في مناطق أخرى من الجسم.
4. القوبة من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان وبالأخص الأطفال ولذا يجب وضع الحيوان المصاب في مكان معزول بعيداً عن الأطفال حتى العلاج.

* التشخيص:

1. من خلال الأعراض وتاريخ الحالة.
2. الفحص الجيد عن طريق الطبيب البيطري.
3. يمكن عمل مزرعة فطرية أو عمل اختبار كحط الجلد skin scraping والفحص تحت الميكروسكوب.

* العلاج:

1. إزالة الشعر في مناطق الإصابة والمناطق المحيطة.
2. استحمام الحيوان بالشامبوهات التي بها مضاد فطري مثل بيتادين شامبو.

المعلومات الخفيفة..

3. يمكن استعمال مرهم الكبريت فى مناطق الإصابة.
4. عزل الحيوان تماماً عن باقى القطط والكلاب وكذلك الأطفال طوال فترة العلاج قد تستمر حتى شهرين.
5. مراعاة غسيل الأيدي جيداً بعد التعامل مع الكلب المصاب.
6. ينصح بعدم إعطاء مضاد حيوى فى مثل هذه الحالات.

الحشرات الخارجية Ectoparasites

تصاب القطط والكلاب بكثير من أنواع الطفيليات والحشرات الخارجية ومنها الحشرات التى ترى بالعين المجردة مثل النمل والبراغيث ومنها ما لا يرى بالعين وهو غالباً يسبب الجرب الذى تم ذكره فيما سبق، غالباً ما توجد البراغيث فى فصل الصيف والإصابة بالطفيليات الخارجية والحشرات تكمن خطورتها فى نقل كثير من الأمراض إلى القطط والكلاب بخلاف أنها عامل مساعد بالإصابة ببعض أنواع الحساسية بالإضافة إلى انخفاض معامل التحويل والنمو عند الحيوان.

الأعراض:

1. وجود البراغيث أو النمل على الحيوان.
2. يمكن رؤية براز النمل او البراغيث كتجمعات سمراء ويمكن إزالتها بالفوطة المبللة بالماء.
3. ضعف عام وأنيميا.

4. أعراض الحساسية في بعض الأحيان.
5. مؤخرة الذيل من أكثر الأماكن شيوعاً لتوجد البراغيث والنمل.
6. هرش وحكة مع عدم استقرار الحيوان.
7. يمكن للبراغيث أن تصيب الإنسان.
8. الحمل يمكن أن يوجد في أى مكان لدرجة وجوده داخل الأذن.

العلاج:

1. يفضل قص شعر الحيوان المصاب.
2. يمكن إزالة النمل باليد.
3. تغطيس الحيوان في محلول يحتوى على إحدى المبيدات الحشرية الملائمة مثل:
 - ديازينون 1سم / لتر ماء ويراعى عدم دخول الرش في الفم أو الأنف أو الأعين وفي حالة حدوث حالات تسمم نتيجة لزيادة التركيز أو دخول بعض كميات المبيد في الفم أو الأنف يمكن إعطاء مستحضرات الأتروبين سلفات بالحقن في العضل أو الوريد أو تحت الجلد.
4. يراعى عدم استعمال الطرق التقليدية القديمة والتي كان يستعمل فيها رش الحيوان بالكبروسين أو البنزين يجب تجنبها.
5. يمكن تغطيس الحيوان كما سبق ذكره مرة كل أسبوع لمدة 4 - 6 أسابيع.

المعلومات الخفيفة..

6. غسيل واستحمام الحيوان بالشامبو أو بالماء والصابون مرتين كل أسبوع.

الأكن حب الشباب Acne:

يظهر هذا المرض فى بداية فترة البلوغ ما بين 3 - 12 أسبوع مع العمر ويظهر فى صورة بثرات أو حبوب ذات رؤوس سمراء فى منطقة الذقن أو الشفاه. تظهر غالباً فى الكلاب ذات الشعر القصير نظراً لأن هذه النوعية يكون الجلد فيها غنى بالغدد الدهنية.

السلالات الأكثر إصابة بهذا المرض هى:

- دوبرمان Doberman

- بوكسر Boxer

- بولدج الانجليزى English bulldoge

- الشيفرد الألمانى German shepherd

وقد يستمر بعد فترة النضج والبلوغ.

- يبدأ المرض باحمرار فى منطقة الذقن والشفاه يليها ظهور حبوب صغيرة ثم تجمع صديد وتظهر البثرات (حب الشباب).
- يمكن أن تظهر البثرات فى منطقة البطن أو منطقة الفخذ من الجهة الداخلية (نادراً ما تحدث).

العلاج:

1. غالباً ما تشفى تلقائياً مع تقدم العمر في الحالات المتوسطة.
2. الحالات الشديدة:
 - أ) غسيل منطقة الذقن والشفاه بالشامبو يومياً مما يساعد على إزالة طبقة الدهن المصاحبة للبثرات مما يساعد على تقليل انتشار البثرات.
 - ب) مضاد حيوى موضعى مثل تتراسيكلين مرهم أو كريم مرة كل يوم
 - ج) يمكن إعطاء نيتراسيكلين أو كلورامفيكول بالفم:
 - سترينوفينكول شراب 3 مرات يومياً.
 - نيتراسيكلين أقراص 4 مرات يومياً.
 - د) يمكن إعطاء استروجين بجرعات صغيرة في الحالات التي تستمر لفترة طويلة ويمكن إعطائه للذكور والإناث: فولون أمبولات 1سم كل 3 أيام عضل.
 - هـ) يمكن إعطاء بعض المستحضرات الجاهزة كعلاج موضعى مثل:
 - أكن فرى كريم Acne free
 - أو أكرينوكسيد - 5 جيل Akrenoxid - 5 gel

الفصل الخامس

١- الأمراض المعدية

الفصل الخامس

الأمراض المعدية

تتعرض القطط والكلاب للإصابة بالعديد من الأمراض المعدية التي قد تؤدي إلى وفاة الحيوان أو انتشاره في باقي الحيوانات مثل.

- 1 - السعار
- 2 - الالتهاب الكبدي الوبائي
- 3 - حصبة الكلاب
- 4 - الإصابة والعدوى بديدان القناة الهضمية

السعار Rabies

السعار من أشهر وأخطر الأمراض التي تصيب القطط والكلاب وتكمن خطورته في خطورة الحيوان المصاب على المجتمع المحيط به وسهولة انتقال هذا المرض الخطير إلى الإنسان عن طريق العض، وأيضاً تكمن خطورته في أنه مرض فيروسي لا علاج له إلا عن طريق الاحتياطات الأولية عن طريق تحصين الحيوانات في السنة الأولى من العمر ومتابعة برنامج التحصين المتبع.

المعلومات الخفيفة..

الأعراض:

1. تغير واضح فى سلوك الحيوان (غالباً ما يصبح السلوك أكثر عنفاً وشراسة).
2. اتساع فى حدقة العين مع ارتفاع فى درجة الحرارة فى المراحل الأولى من المرض مع غياب رد فعل قرنية العين.
3. الخوف من الضوء والعصبية وزيادة درجة الشراسة.
4. شهية غير طبيعية لدرجة أن الحيوان يأكل أشياء غريبة مثل الخشب أو الحديد.
5. المشى بطريقة غير محددة مع ترنح فى المشى.
6. ارتباك وشلل فى عضلات البلعوم مما يؤدي إلى صعوبة البلع وسيلان من اللعاب وإصدار صوت مخيف وغريب.
7. تشنجات وتنتهى بوفاة الحيوان فى خلال 10 - 14 يوم منذ ظهور الأعراض.

قد تنتقل الإصابة عن طريق العض من حيوان مصاب.

العلاج:

لا يوجد له علاج لأنه مرض فيروسي.

الوقاية:

1. التحصين: عند عمر 3 - 4 شهور بالتحصين الحي ليعطى مناعة قد تستمر إلى 3 سنوات.
2. عند الإصابة: لو أصيب حيوان محصن فيجب تطهير الجرح بمطهر مناسب وليكن:
 - بيتادين مطهر للجلد.
 - ماء أكسجين - ماء وصابون
 - متابعة الحيوان لمدة 30 يوم وربما تظهر عليه الأعراض مرة أخرى.
 - لابد من استشارة الطبيب البيطري المختص فوراً.
 - يعاد تحصين الحيوان مرة أخرى
 - حبس الحيوان المصاب في مكان منفرد وتجنب تعرضه لأي أشخاص أو حيوانات أخرى طوال فترة المراقبة.
 - يجب تبليغ السلطات أو الهيئات المختصة بالوقاية من مرض السعار لتفادي انتشار المرض.

التهاب الكبدى الوبائى فى الكلاب Infectious canine hepatitis ICH

الأعراض:

1. التهاب فى العين (العين الزرقاء).
2. يمكن الاصابة فى الشهور الأولى من العمر لكن يمكن أن يسبب وفيات فى الكلاب الكبيرة عند عمر حتى 13 عام.
3. الفيروس المسبب للمرض يوجد فى كل أنسجة وإفرازات الحيوان المصاب (اللعاب - البراز . . . الخ) وبالتالي عند توقع الاصابة فى إحدى الحيوانات فلا بد من عزله تماماً عن باقى الحيوانات (فى حالة التربية فى مجموعات).
4. الطريقة المثلى للإصابة به هو أكل طعام ملوث ببول حيوان مصاب إلا أن الفيروس يموت بسهولة بالتطهير أو التسخين.
5. ارتفاع فى درجة الحرارة مع فقدان فى الشهية.

العلاج:

1. لا يوجد علاج خاص بمرض التهاب الكبدى الوبائى C.AV
- 1 - نظراً لأنه مرض فيروسى لكن لو ظهرت الأعراض لابد من اتباع الآتى:

ففي طب ورعاية الحيوانات الأليفة

إعطاء مرهم موضعي في العين أو قطرة لتقليل الالتهاب والألم مثل:

- توبرين قطرة للعين 3 مرات يومياً.
- أوكيومفينيكول قطرة للعين 3 مرات يومياً.
- أوبتوستين قطرة للعين 3 مرات يومياً.
- أوكيوميثيل قطرة للعين 3 مرات يومياً.

في حالة استمرار الحيوان في الانقطاع عن الأكل فلا بد من إعطاء محاليل:

- ديكستروز 5٪ ورید.
- جلوكوز 5٪ ورید.
- محلول رينجرز ورید
- مع فيتامين ب المركب مثل:
- ديوفيت أمبولة كل 4 أيام عضل.
- بيوفيت أمبولة كل 4 أيام عضل.
- تراي بي أمبولة كل 48 ساعة.

يمكن إعطاء مضاد حيوي واسع المدى لتفادي حدوث أي إصابات بكتيرية ثانوية:

المعلومات الخفيفة..

- بيومكس 250 مجم كل 6 ساعات شراب.
- ميكوسيف 500 مجم كل 8 ساعات شراب.
- ديوراسيف 500 كل 8 ساعات شراب.

التحصين من المرض:

يمكن تحصين الحيوانات فى ميعاد تحصين حصبى الكلاب ويكرر التحصين كل عام.

يوجد تحصينات تجمع بين حصبى الكلاب التهاب الكبدى الوبائى (الأدينو فيروس) وهذا أفضل.

يمكن تحصين الكلاب الصغيرة بعد الفطام عند سن 8 - 9 اسابيع بجرعة أولى يليها جرعة منشطة بعد أسبوعين ثم يكرر التحصين كل عام.

يمكن التحصين عند سن 3 شهور ويكرر كل عام.

حصبة الكلاب:

- حصبى الكلاب من أكثر الأمراض شيوعاً وظهوراً فى الكلاب نظراً لأنها ممكن تحدث فى أكثر من فترة عمرية حيث أنها أكثر شيوعاً من أى سن حتى 16 عام من العمر وبالتالى معظم حياة الحيوان يكون عرضة للإصابة بالحصبى.
- ينتقل المرض غالباً عن طريق تناول طعام ملوث بإفرازات من

- حيوان آخر مصاب ويمكن للحصبة أن تحدث متزامنة مع أمراض أخرى كثيرة كالإنفلونزا أو النزلات المعوية أو الالتهاب الرئوي.
- المرض أكثر شيوعاً في الأجر والصغيرة بالأخص في فترة التسنين (من عمر 3.5 - 6 شهور من العمر) وبالأخص للحيوانات الغير محصنة ضد المرض أو التي تتعرض لظروف تؤدي إلى خلل أو ضعف في مناعة الحيوان مثل حالات النقص الغذائي أو الإصابة بأمراض أخرى تؤثر على مناعة الحيوان.

الأعراض:

1. فقدان في الشهية مع ارتفاع درجة حرارة الحيوان ودرجة الحرارة تكون مرتفعة جداً في الفترة الأولى من المرض قد تصل إلى 40°م أو يزيد ثم تنخفض بعد أيام قليلة.
2. إسهال وممكن أن يكون مدمم مع تحزيق.
3. إفرازات مخاطية من الأنف والعين.
4. التهابات صديدية في الجلد بالأخص في منطقة Groin area ما بين الفخذين.
5. كحة خفيفة مع رعشة في الجسم وتشنجات.
6. قىء وفي بعض الحالات ممكن أن يصاب الحيوان بعدم الرؤية.

المعلومات الخفيفة..

7. فى حالات الحصبة لو أخذت عينة دم وتم قياس سرعة الترسيب (ESR) نجده عالى جداً مما يؤكد حدوث الإصابة بالمرض بالاضافة إلى الأعراض التى تم ذكرها من قبل.

العلاج:

بمجرد إصابة الحيوان بالحصبة يتجه نظراً فى العلاج إلى:

1. المحافظة على الحيوان من حدوث أى إصابات بكتيرية ثانوية لتفادى مضاعفاتها.

2. تحسين الحالة الصحية للحيوان والحالة الغذائية لزيادة كفاءته المناعية وجعله قادراً على إنتاج الأجسام المضادة الكافية لصد المرض، لكن عموماً يمكن اتباع الخطوات الآتية فى حالة الإصابة (مع ملاحظة أن هذا المرض فيروسى ولا يوجد به علاج خاصاً).

1) التحصين الفورى بتحصين الخاص الجامع (تحصين الالتهاب الكبدى + حصبى الكلاب) فى الوريد مباشرة مع ملاحظة أن هذا التحصين آمن للحقن فى الوريد وفى أى عمر.

2) حقن فيتامين ب المركب بمعدل 1سم للحيوان الذى يزن حوالى 10ك، 2سم للحيوان الذى يزن أكثر من 10ك يومياً لمدة 4 أيام.

- فارولكس حقن بالعضل 2 سم عضل كل 48 ساعة.

- تراى بى أمبولات: أمبولة عضل كل يوم.
- ديو فيت ب12: حقنة عضل كل يوم لمدة 4 ايام.
- أدينو بلكس فورت أمبولات: واحدة عضل لمدة 4 أيام.
- (3) حقن فيتامين ج (سى) بنفس معدل حقن فيتامين (ب)
- سيفارول حقن 1 - 2 سم ورید أو عضل يومياً لمدة 4 أيام.
- (4) إعطاء زيت بارافين أو زيت خروج 100سم بالفم لتفريغ القناة الهضمية من اى مواد سامة أو عمل حقنة شرجية بالماء والصابون بمعدل 5 - 10سم / كيلو من وزن الحيوان.
- (5) يمكن إعطاء محاليل مثل (جلوكوز 5 ٪ / ديكستروز 5 ٪ ورید) أو محلول معالجة الجفاف فى الحيوانات التى تعاني من حالات الجفاف الشديد نتيجة للإسهال.
- (6) إعطاء مضاد حيوى ويفضل مستحضرات السلفا دايميثاكزون والكلورامفينيكول مثل:
- كولى بريم بالفم شراب ملعقة 4 مرات يومياً.
- ستریم بالفم شراب ملعقة 4 مرات يومياً.
- سيدوستيين حقن: حقنة عضل كل يوم لمدة تتراوح ما بين 4 - 6

المعلومات الخفيفة..

أيام حتى تحسن الأعراض .

7) يمكن تنظيف العين والأنف من الإفرازات المخاطية الموجودة بها

باستعمال محلول الملح المخفف 0.9 % Saline sol.

وفي الحالات الشديدة يمكن استعمال إحدى أنواع قطرات العين مثل:

- أيزومفيكول نقط للعين مرتين يومياً.

- بروزلين نقط للعين مرتين يومياً.

- كلورامفنكول نقط للعين مرتين يومياً.

- أو كيومفينكول نقط للعين مرتين يومياً.

الوقاية: يمكن التحصين عند عمر 6 - 8 أسابيع ثم يعطى جرعة

منشطة بعد 4 أسابيع وتكرر كل عام جرعة وقائية.

الإصابة والعدوى بديدان القناة الهضمية:

• تتعرض القطط والكلاب للإصابة بكثير من أنواع الديدان

الشريطية أو الاسطوانية وتسبب لها مشاكل عديدة من أشهرها

الاسهال وتقليل الوزن وخلل في عملية التحويل الغذائي ومن

أشهر هذه الأنواع الدودة البوسية (Oxyuris Canis) أو

الإسكارس..

الأعراض:

1. إسهال شديد مع جفاف.
2. زيادة معدل الأكل بدون زيادة مع معدل الوزن.
3. تساقط في الشعر أو أن تجد أن الشعر سهل النزاع.
4. فحص أو ألم خفيف في البطن مع نفخ أو قيء في بعض الحالات.
5. يمكن رؤية أجزاء من الديدان على الجزء الخلفي من الحيوان أو براز الحيوان أو حول فتحة الشرج للحيوان ويمكن التأكد من ذلك عن طريق استشارة الطبيب البيطري المختص لإجراء تحليل البراز وتحديد نوع الديدان بالضبط لإعطاء العلاج المناسب والمخصص لهذا النوع.
6. يمكن انتقال إحدى أنواع الديدان (الديدان الخطافية) من مشيمة الأم الحامل إلى الأجنة وبالتالي تولد الأجنة مصابة بهذا النوع من الديدان مما يؤثر على النمو والصحة العامة للحيوان.*ضعف عام وأنيما.

العلاج:

- إعطاء طارد أو مضاد للديدان وفي هذه الحالات التي لا تعتمد على تشخيص نوع الديدان الموجودة بالضبط (عن طريق فحص

المعلومات الخفيفة..

البراز) فلا بد من إعطاء طارد للديدان واسع المدى مثل:

*سترات البييرازين شراب ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً.

*فلوفير شراب ملعقة 3 مرات يومياً.

*فلوفير مال شراب او أقراص ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً أو قرص

صباحاً كل يوم.

7. يمكن إعطاء خليط من الفيتامينات والأملاح المعدنية علاوة على

(بالإضافة إلى) طارد الديدان مثل:

*ميكسافيت 20 نقطة يومياً مرتين.

- مالتى سانيسول بالحديد ملعقة صباحاً ومساءً.

8. يمكن إعطاء أدوية لإيقاف القيء (مضادة للقيء) فى حالة وجود

قيء مع ملاحظة أن يمكن أو يفضل إعطاء طارد الديدان على

معدة خالية عن طريق 12 ساعة صيام قبل إعطاء العلاج.

الوقاية:

يمكن التحصين عن طريق إعطاء طارد للديدان عند عمر 6 - 8 أسابيع

ثم يعطى جرعة منشطة بعد 4 أسابيع وتكرر كل عام جرعة وقائية.

obeikandi.com

الفصل السادس

١- أمراض الجهاز التناسلي

الفصل السادس

مشاكل الجهاز التناسلي

إنقلاب الرحم Uterine prolapse

- حالات إنقلاب الرحم نادرة الحدوث وتختلف درجتها من إنقلاب الرحم بالكامل وفيها يكون مرتين الرحم منقلبين خارج المهبل أو يكون الإنقلاب جزئياً.

- حالات الولادة التي يسبقها نزلات معوية أو إمساك تكون أكثر عرضة للإصابة في مجالات إنقلاب الرحم نظراً للتحديق الذي يتعرض له الحيوان في هذه الحالات ولذا دائماً ينصح بالمحافظة على الأم الحامل من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

* العلاج:

1. الهدف الأساسي في العلاج هو إعادة الرحم إلى وضعه الطبيعي مع المحافظة عليه لتجنب حدوث أى نزيف أو تمزقات في الرحم او في أربطة الرحم.

المعلومات الخفيفة..

2. يتم العلاج غالباً تحت تأثير المخضر الكلى باستعمال مستحضر الثيوبتال صوديوم بالحقن فى الوريد.
3. يتم غسيل الرحم جيداً بمستحضر يحتوى على مضاد حيوى وفى حالات وجود انتفاخ فى الرحم يتم الغسيل بمحلول جلوكوز أو محلول ملح مركز (جلوكوز 25 ٪ أو محلول ملح 0.09 ٪) مع التدليك الخفيف للرحم.
4. يتم إعادة الرحم إلى وضعه الطبيعى من المهبل بداية من الجزئ الأمامى من الرحم مع وضع مضاد حيوى فى الرحم بالإضافة إلى حقن مضاد حيوى لمدة 5 - 7 أيام.

مثل:

- ديوراسيف 1/2 جم (توزع على 24 ساعة) جرعة كل 12 ساعة.
- فيلوسيف 1/2 جم (توزع على 24 ساعة) جرعة كل 12 ساعة.

تجمع صديدي فى الرحم Pyometria

- تجمع كميات فى الرحم بعد الولادة من الحالات كثيرة الحدوث فى القطط والكلاب.
- أكثر شيوعاً فى الحيوانات متوسطة العمر أو الكبيرة فى العمر.
- تظهر حالات التجمع الصديدي بالرحم (Pyometia) فى

صورتين إحداهما تكون بصورة مفتوحة ومنها يوجد إفرازات مهبلية صديدية في حين الصورة المغلقة لا يكون فيها إفرازات مهبلية وغالباً هذه الصورة تكون مصحوبة بالتهابات في جدار الرحم metritis.

* الأعراض:

1. بعض الحالات تمر بدون ظهور أعراض واضحة.
2. ارتفاع درجة حرارة الجسم.
3. عطش شديد مع رغبة في شرب كميات من الماء (Polydypsie).
4. زيادة كمية البول مع كسل وضعف عام.
5. ضعف في الأرجل الخلفية.
6. قيء شديد مع وجود إفرازات صديد من المهبل.

* التشخيص:

- يعتمد التشخيص أساساً على عملية الفحص بالموجات فوق الصوتية إلى جانب عمل بعض التحاليل مثل زيادة كبيرة في عدد كرات الدم البيضاء وبالأخص النيوتروفيل (Neutrophilia).
- زيادة وظائف الكلية (يوريا - كرياتينين).

* العلاج:

1. ففضل إجراء عملية جراحية باستئصال المبيض "Overiohys-trectomy" ويراعى إعطاء محاليل طوال فترة العملية مثل "رينجر" أو "محلول ملح" بمعدل 10 - 20 سم/ك/ ساعة.
2. يمكن إجراء غسيل للرحم بالمضادات الحيوية أو بعض المطهرات مثل مستحضر البيتادين مطهر مهبل.
3. يمكن إعطاء مستحضرات الديكساميثازون أثناء إجراء الجراحة لتجنب حدوث السكتات القلبية.
4. يراعى متابعة الحيوان متابعة جيدة بعد العملية لفترة تمتد إلى 20 يوم.

الحمل الكاذب False pregnancy

- حالات الحمل الكاذب كثيرة الحدوث فى الكلاب بنسبة قد تصل إلى 75 ٪ إلا أن السبب الرئيسى فى حالات الحمل الكاذب غير معروف بدقة حتى الآن.
- الأعراض قد تظهر فى صورة وجود سائل مائى أو لزج يشبه اللبن فى الغدد اللبنية مع وجود تضخم فى الحلمات التى قد تكون مصحوبة بالألم عند لمسها.

- بعض الحيوانات تقوم بعمل بيت للولادة.
- أحياناً يظهر بعض أعراض ما قبل الولادة مثل زيادة أو فقدان الشهية
- القيء - اسهال.

* العلاج:

- العلاج قد يكون غير ضروري في معظم حالات الحمل الكاذب.
- عمل كمادات بالماء الفاتر أو البارد على حلمات الحيوان.
- يمكن إعطاء بعض المهدئات مثل:
- يتورازين أقراص - أميولات.
- كامبيام 1.5 - 3 ملليجرام أقراص $\frac{1}{2}$ قرص كل يوم.
- يمكن إعطاء هرمون الذكورة (تستستيرون) testosterone
- بجرعات تتراوح من حتى $\frac{1}{2}$ ملليجرام/ الكيلوجرام من وزن الحيوان
- يوميّاً بالعضل أو بالفم لمدة تتراوح من 5 - 7 أيام.
- ينصح بإجراء جرام استئصال المبايض في حالات تكرار حالات الحمل الكاذب.

التهاب أو سرطان غدة البروستاتا فى الذكور

أ - التهاب غدة البروستاتا: قد يحدث فى أى عمر فى ذكور القطط والكلاب وغالباً ما يكون بسبب عدوى أو إصابة بكتيرية.

ب - تظهر الأعراض فى صورة:

1 - فقدان فى الشهية.

2 - كسل عام وضعف.

3 - قيء مع ارتفاع فى درجات الحرارة.

4 - ألم شديد جداً عند جس البطن أو بالأخص عند عملية الفحص عن طريق المستقيم أو فتحة الشرج.

5 - صعوبة شديدة جداً عند التبول أو التبرز مع صياح شديد أثناء التبول أو التبرز وغالباً ما يكون هناك إمساك.

6 - وجود قطرات من سوائل صديدية من القضيب بعد أو قبل التبول.

ج - يعتمد التشخيص أساساً على: تاريخ الحالة والأعراض وكذلك الفحص الإكلينيكي للحيوان بالإضافة إلى بعض التحاليل مثل زيادة واضحة فى كرات الدم البيضاء وأيضاً استعمال الأشعة التشخيصية.

د - العلاج:

(1) مضاد حيوى لمدة تتراوح من 4 - 6 أسابيع.

- يونسين - ارثرومايسين

- ديوراسيف - تتراسيكلين

* أموكسيسيكلاف.

وينصح بعمل مزرعة بكتيرية لتحديد انسب أنواع المضادات الحيوية التى يمكن استعمالها.

(2) يمكن إعطاء مستحضرات الاستروجين "Estrogen".

* لتقليل افرازات غدة البروستاتا:

- فولون - 5 أمبولات واحدة عضل كل 3 أيام.

- بريمالين 0.625 أو 1.250 مليجرام أقراص.

- قرص كل يوم لمدة شهر.

(3) يمكن إجراء الخصى (استئصال الخصيتين) جراحياً.

الفصل السابع

— | - بعض الأمراض والمشاكل العامة

الفصل السابع

بعض الأمراض والمشاكل العامة

مشاكل نقص الوزن:

(1) كثيراً ما يقابل مربى القطط والكلاب مشكلة الاستمرار في نقص الوزن بدون سبب مرض عضوي واضح. كثيراً من الأبحاث العلمية تناولت هذه المشكلة ووجدت أنها كثيرة الحدوث في كلاب الحراسة، والكلاب التي تعمل في الجيش والشرطة نظراً لتعرض هذه الكلاب إلى قدر كبير جداً من الضغوط والشد العصبي مما يؤدي إلى نقص على الأقل 10 ٪ من كمية الطاقة اللازمة للجسم.

(2) تظهر هذه الحالات أيضاً في القطط والكلاب التي تعتمد اعتماد كبير في الوجبات على الأطعمة المجففة نظراً لاحتواء مثل هذه النوعية من الأطعمة على نسبة صغيرة من الدهون مما يجعلها أيضاً غير مقبولة من ناحية الطعم والمذاق عند كثير من الحيوانات.

(3) تظهر هذه الحالات أيضاً في الطقس الحار نظراً لعدم قابلية

المعلومات الخفيفة..

الحيوان على تناول كميات كافية من الطعام والاقبال الشديد على شرب الماء.

الشكل رقم (24) يوضح حالة كلب يعاني من نقص فى الوزن.

(4) يمكن التغلب على مشكلة نقص الوزن كالآتى:

1 - تقديم طعام عالى فى السرعات الحرارية.



شكل رقم (24)

القيء

القيء من أكثر المشاكل حدوثاً في القطط والكلاب وبالأخص بعد فترة الفطام أو أثناء الحمل في بعض الحيوانات وقد تم ذكر القيء تعرض في كثير من الأمراض السابقة مثل التهاب المعوى أو المعدى أو أمراض الكبد.

وعموماً أسباب القيء يمكن جمعها فيما يلي:

- 1 - إصابات الزور والمرئ.
- 2 - التهابات وإصابات وقرح المعدة.
- 3 - التهاب المعوى.
- 4 - انسداد الأمعاء أو الإثني عشر.
- 5 - قيء طبيعى في أثناء فترة الحمل في بعض الحيوانات.
- 6 - أمراض إصابات الكبد.
- 7 - بعض أمراض الجهاز البولى مثل الفشل الكلوى او زيادة نسبة اليوريا في الدم (Uremia).
- 8 - بعض أمراض المخ مثل الإلتهاب السحائى (Meningitis).
- 9 - أمراض البنكرياس.
- 10 - الإصابة بمرض السكر (Diabetes) بالأخص في المراحل

المعلومات الخفيفة..

المتقدمة منه.

11 - التغير المفاجئ فى نظام الأكل . 12 - أكل طعام فاسد.

ويمكن التعامل مع مشكلة القيء بصفة عامة كالآتى:

1 - إيقاف الأكل لمدة تتراوح م بين 12 - 24 ساعة.

2 - إعطاء كميات من السوائل نتيجة للقيء فيمكن إعطاء محلول

معالجة الجفاف بمعدل $1 - \frac{1}{2}$ كيس كل 8 ساعات يومياً أو يمكن تعليق محاليل بالوريد مثل جلو كوز 5٪.

3 - إعطاء مضاد للقيء ويفضل بالحقن فى العضل أو الوريد مثل

بريمبران - كورتجين ب6 حقن كل 12 ساعة وتكرر عند اللزوم، مضاد للتقلصات مثل بوسكوبان $1 - \frac{1}{2}$ عضل ووريد ويمكن عند اللزوم.

4 - يتم فحص الحيوان جيداً لتحديد السبب الرئيسى للقيء ثم يتم

التعامل معه كما ذكر من قبل فى فصل أمراض الجهاز الهضمى.

* ملاحظة هامة: ويمكن إجراء اختبار سهل جداً يسمى اختبار اللحمية

وهو عن طريق إعطاء الحيوان المريض قطعة من اللحمية وملاحظة الحيوان

لتحديد ميعاد القيء كما يلى:

(أ) القيء بعد البلع مباشرة يدل على أن سبب القيء هو مرض أو إصابة

فى منطقة الزور أو المريء.

(ب) القيء بعد البلع $1/3 - 1/2$ ساعة يدل على أن سبب القيء ناتج عن مرض أو إصابة في المعدة.

(ج) القيء بعد البلع $3/4 - 1$ ساعة يدل على أن سبب القيء غالباً ما يكون نتيجة لوجود مرض أو إصابة في الأمعاء والإثني عشر.

وبالتالي من خلال هذا الاختبار يمكن تحديد نوع ومكان المشكلة إلى حد كبير.

وفاة الأم ورعاية يتامي القطط والكلاب

1 - كثيراً ما يقابل مربى وهواة تربية القطط والكلاب مشكلة موت الأم وبالتالي مشكلة رعاية وتربية الحيوانات الصغيرة عند موت الأم (اليتامي).

2 - مشكلة التعامل وتربية اليتامي من القطط والكلاب تعتمد إلى حد كبير على عمر هذه الحيوانات عند وفاة الأم فكلما كان العمر صغير كلما كانت الرعاية أكبر.

3 - مثل هذه الحيوانات (اليتامي) تحتاج إلى تدفئة ورعاية صحية بصورة مستمرة.

4 - بالنسبة للتغذية لبن الأبقار يعتبر أنسب الألبان التي يمكن إعطاؤه ليتامي القطط والكلاب وكذلك ألبان الأطفال الجافة ويمكن استعمال لبن الأبقار كالاتي:

المعلومات الخفيفة..

- بالنسبة للكلاب:

800 سم لبن

200 سم قشطة

صفار بيضة

ملعقة من مسحوق العظم أو أى مصدر آخر للكالسيوم.

ويتم خلطها جيداً فى الخلاط ويتم إعطاؤه للحيوان كل 3 - 4 ساعات يومياً بمعدل 15 - 20 ٪ من وزن الحيوان فى الاسابيع الثلاثة الأولى ويتم زيادة الكمية إلى 35 - 40 ٪ من وزن الحيوان بعد ذلك وتتم الرضاعة بواسطة الحلقات الصناعية. هذا يعنى لو كان الحيوان وزن 1 كيلو بالتالى يمكن إعطائه 150 - 200 سم فى المرة وترداد مع زيادة الوزن.

- بالنسبة للقطة:

يتم استعمال لبن الابقار مع الماء بنسبة 1:3


- مع إضافة 2 ملعقة شاي من سكر الجلوكوز مع 1/2 ملعقة من القشطة وكذلك يتم خلطها جيداً وإعطاؤها للحيوان كل 3 - 4 ساعات يومياً.
- 5 - يراعى أن يكون اللبن فى درجة حرارة تتراوح بين 35 - 39°م.
- 6 - لو ظهرت بعض المشاكل مثل الاسهال أو الإمساك أو الانتفاخ فلا بد من استشارة الطبيب وأخذ رأى الطبيب البيطرى المختص.
- 7 - يمكن استعمال الأمهات البديلة عن طريق وضع الحيوانات

اليتامى مع أم حديثة الولادة.

- 8 - التدفئة من أهم النقاط التي لا بد من الاهتمام بها حيث درجة الحرارة لا تقل عن 32°م فى الأيام الاولى ويتم تخفيفها تدريجياً حتى 21°م.
- 9 - تجفيف الحيوان بعد الولادة باستعمال فوطة جافة كما بالشكل (25).
- 10 - يمكن إطعام صغار الحيوانات بواسطة سرنجة كما بالشكل (26).



شكل رقم (26)



شكل رقم (25)

التهاب الأذن Otitis:

الأسباب:

- 1 - غالباً ما تكون مضاعفات لجرب الأذنين.
- 2 - بعض الأجسام الغريبة.
- 3 - إصابات بكتيرية.

الأعراض:

- 1 - يهز الحيوان رأسه باستمرار.
- 2 - حكة شديدة فى منطقة الأذن عن طريق القدمين.
- 3 - فقدان فى الشهية فى بعض الأحيان بالأخص المصحوبة بعدوى بكتيرية.
- 4 - يقوم الطبيب البيطرى بالتشخيص عن طريق استعمال منظار الأذن auriscope كما بالشكل (27).



شكل رقم (27)

العلاج:

- 1 - تنظيف الأذن بالأخص في حالات الإصابة بالجرب.
- 2 - وضع نقط مضاد حيوى بالأذن مثل أوتوكالم Autocalm 3 مرات يومياً.
- 3 - مضاد للالتهاب مثل الفولتارين أو فينادون شراب 3سم مرتين يومياً.

التهاب الجلد من رباط العنق: Collar Dermatitis

التهاب الجلد حول رابطة العنق من المشاكل الأكثر حدوثاً في الكلاب أو القطط التي ترتدى رابطة العنق وبالأخص لفترات طويلة.

الأعراض:

- 1 - احمرار حول الرقبة - تساقط الشعر في منطقة الرقبة.
- 2 - تقرحات وتقيحات حول رابطة العنق.
- 3 - ورم في الرقبة.
- 4 - حكة في منطقة الرقبة.
- 5 - الأعراض تختلف حسب درجة الالتهاب.

المعلومات الخفيفة..

العلاج:

- 1 - إزالة رابطة العنق.
- 2 - وضع مرهم مضاد حيوى ومضاد للالتهاب فى منطقة الالتهاب مثل تيراكورتيرل مرهم أو جاراميسين مرهم.
- 3 - يمكن حقن جرعات من مضاد الالتهاب مثل:
 - سوليوكورتيف أمبولة كل 48 ساعة بالعضل.
 - فولتارين أمبولة: أمبولة عضل كل يوم.
- 4 - تغير المضاد الحيوى إن لم يوجد استجابة بعد 7 - 10 ايام من استعماله.

زيادة الافرازات الدمعية عند القطط والكلاب

الأسباب:

- 1 - التعرض لبعض الأدخنة أو الروائح السيئة أو المواد الملتهبة أو أدخنة المصانع.
- 2 - تظهر بوضوح فى السلالات الملونة أقل منها فى السلالات البيضاء.
- 3 - بعض المشاكل أو العيوب الخلقية فى القنوات والغدد الدمعية.
- 4 - الالتهاب البكتيرى أو الفيروسى للملتحمة Conjunctivitis

5 - بعض العيوب الخلقية في شعر الرموش.

6 - التعرض للأتربة أو بعض المواد التي تؤدي إلى حساسية في العين.

7 - كدمات في العين من الشجار أو أثناء التدريب.

الأعراض:

1 - ظهور دموع مائية بصورة مستمرة من العين.

2 - الأعراض قد تكون في عين واحدة أو في الاثنين.

3 - بعض الحالات يصاحبها احمرار في العين والجفون.

4 - صعوبة في الرؤية في بعض الحالات.

5 - حكة في الجفون وحول العين.

6 - ظهور خط تحت العين في الوجه من أثر الدموع المستمرة ويكون

أكثر وضوحاً في السلالات الملونة عنه في السلالات البيضاء.

العلاج:

استعمال بعض المطهرات حول العين مثل ماء الأكسجين أو حامض

البوريك 2٪ غسول للعين باستعمال قطعة من القطن كما هو مبين بالشكل (28).

1 - استعمال قطرات مستحضرات النتراسيكلين أو المراهم مثل:

تيراكورتريل مرهم - قطرة - معلق 3 مرات يومياً أو تيراميسين مرهم للعين

المعلومات الخفيفة..

3 مرات يومياً.

2 - تجنب تعرض الحيوان للأتربة والغبار أو الأدخنة.



شكل رقم (28)

الكساح ولين العظام

(أ) الكساح (في الصغار)

الكساح من الأمراض التي يتعرض إليها صغار القطط والكلاب وبالأخص التي يتم تربيتها في مكان بعيد عن الشمس هذا يعني عدم تعرض الحيوانات الصغيرة أو حديثة الولادة لأشعة الشمس.

حالات النقص الغذائي بالأخص الفوسفور - فيتامين د أو الكالسيوم بالأخص في فترة النمو.

الأعراض:

- 1 - التواء في العظام الطويلة للأقدام.
- 2 - عرج مع تورم في نهايات العظام والمفاصل.
- 3 - يمكن تشخيصها بواسطة الأشعة.

العلاج:

- 1 - لابد من إعطاء الأطعمة الغنية بفيتامين د والفوسفور والكالسيوم مثل السمك - البيض.
- 2 - تعرض الحيوان لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د.
- 3 - يمكن حقن أو إعطاء بعض مستحضرات الكالسيوم وفيتامين د مثل:

المعلومات الخفيفة..

- دى - كال ب12 شراب أو بالحقن.

- ديفارول - إس أمبول.

- أوسكال شراب - حبوب

4 - يمكن عمل جبيرة فى الحالات الشديدة.

(ب) لين العظام (فى الكبار)

كثيراً ما تحدث فى الحيوانات الكبيرة ويزداد معدل ظهورها مع تقدم السن وتكون أكثر شيوعاً فى الحيوانات ذات الوزن الثقيل.

تظهر الأعراض فى أكثر من مفصل من مفاصل الجسم بالأخص مفصل الكتف والركبتين.

الأعراض:

1. ظهور عرج واضح بالأخص فى الحيوانات ذات الوزن الكبير.

2. رفض الحيوان لعمليات القفز والجري والتدريب.

3. يزداد الألم والعرج فى البرد وانخفاض درجة حرارة الجو ومع التدريب.

4. يتم تشخيصها بواسطة الطبيب البيطرى بعد الكشف الدقيق على المفاصل بالإضافة إلى عمل أشعة.

العلاج:

1. راحة كاملة للحيوان المريض.
2. الحيوان السمين لابد من إنزال الوزن باتباع نظام غذائي معين.
3. مضادات للالتهاب مثل مستحضرات الاسبرين أو ديكلوفين حقن أو شراب وذلك لتخفيف نسبة ودرجة الألم.
4. التدخل الجراحي يعطى نتائج أفضل.
5. علماً بأن احتياجات الكلاب من الكالسيوم والفوسفور فى اليوم كالآتى:

الفترة العمرية	كالسيوم	فوسفور
فترة النمو	350 مليجرام / كجم من وزن الحيوان	440 ملجرام / كجم من وزن الحيوان
فترة البلوغ	265 مليجرام / كجم من وزن الحيوان	220 ملجرام / كجم من وزن الحيوان

علماً بأن الجرام = 1000 مليجرام.

مع ملاحظة أن بعض الأطعمة تحتوى على كميات كبيرة من الكالسيوم

المعلومات الخفيفة..

والفوسفور التي يمكن تقديمه لتعويض النقص في هذه العناصر مثل:

الكبد - لحوم الجاموس - اللبن

الكسور

كثيراً ما تحدث الكسور في القطط والكلاب وتختلف من شرخ إلى كسر ويمكن تقسيم الكسور إلى:

- كسر بسيط: وفيه يكون الجلد سليم في موضع الكسر ويكون جزء العظم المكسور دائري أو مستقيم.

- كسر مركب: وفيه يكون الجلد مفتوح في موضع الكسر ويمكن رؤية أو لمس نهايات العظام المكسورة.

- كسر معقد: وفيه يكون الجلد مفتوح في موضع الكسر بالإضافة إلى تهتك في الأوعية الدموية أو الأعصاب أو بعض الأعضاء الأخرى الموجودة في منطقة الكسر.

- كسر متعدد: وفيه تكون العظام المكسورة بها أكثر من جزء مكسور.

الأعراض:

1. فقد في وظيفة العظام المكسورة (فقد جزئي أو كلي).

2. ألم شديد جداً في منطقة الكسر.

3. ورم في منطقة الكسر نتيجة لتهدك بعض الأوعية الدموية في المنطقة المحيطة بالكسر.
4. حركة غير طبيعية وقد تكون مصحوبة بعرج أو قد تصل إلى درجة عدم مقدرة الحيوان على وضع الرجل المكسورة على الأرض أو تحميل الجسم عليها.
5. تشوه في شكل منطقة العظام المكسورة.
6. وجود صوت احتكاك العظام المكسورة في منطقة الكسر، مع ملاحظة أن كل هذه الأعراض ليس شرطاً أن تكون موجودة كلها في جميع أنواع الكسور.

التشخيص:

من خلال الأعراض وتاريخ الحالة مثل تعرض الحيوان لحادثة أو عنف بالإضافة إلى تأكيد التشخيص بواسطة الأشعة واستشارة الطبيب البيطري المتخصص.

العلاج:


الهدف الأساسي من علاج الكسور هو بالدرجة الأولى المحافظة على العظام المكسورة لتجنب تطور نوع الكسر من بسيط إلى مركب أو من مركب إلى معقد . . . الخ مع تخفيف الألم الشديد الذي يعاني منه الحيوان

المعلومات الخفيفة..

فى حالات الكسور.

1. منع حدوث نزيف أو أى تلوث فى منطقة الكسر.
2. لابد من المحافظة على الحيوان فى مكان هادئ مع تقليل حركة الحيوان إلى حد كبير.
3. تثبيت العظام المكسورة جراحياً بواسطة الطبيب البيطرى تحت تأثير المخدر الكلى.
4. يمكن تثبيت العظام المكسورة من الخارج بواسطة استعمال قطعة من الخشب أو الألومنيوم مع عمل جبيرة أو جبس باستعمال القطن والشاش مع ملاحظة عدم ربط الجبيرة بصورة شديدة لتجنب حدوث زرقه أو تورم فى منطقة الكسر (الشكل رقم 29).
5. لو حدث أى تورم حول منطقة الجبيرة أو الجبس فلا بد من فك الجبيرة أو الجبس وإعادة عمله مرة أخرى بطريقة أقل من المرة الأولى.
6. يمكن إجراء عملية جراحية لاستعمال وتركيب شرائح أو مسامير داخلية، مع ملاحظة أنه يوجد جبس طبي جاهز باسم جيسونا Gypsona

7. يتم فك الرباط أو الجبس بعد 30 - 45 يوم حسب درجة الكسر ويتم بعدها فترة العلاج الطبيعي.



شكل رقم (29)

المراجع References

1. Benjaming L. and Lynette. A. (1985): "Canine and feline behavior therapy". Lea & febiger.
2. Chandler, E.A. et al. (1985): "Canine Medicine and Therapeutics". 3rd. Ed. 1995.
3. Dabas, Y.P.S. (2003): "All about dogs". 3rd Ed. 2003. Published by: International Book Distributing Co. (IBDC).
4. Eddie Straiton (1991): "Cats their health and care". 2nd Ed. 1991, Published Ferming Press Books. 4 Friars Courtyard, 30 - 32 Princes Streat Ipswich IPIIR. U.K.
5. John Bower & David Youngs (1994): "The dog owner's veterinary Handbook" 1994.
6. Kelly, W.R. (1984): "Vet. Clinical Diagnosis". 3rd Ed.

Bailliere Tindall Lendone.

7. National Academy of Science. National Research Council (NRC): Nutrient requirements of dogs Washington, D.C., National Academy Science 1962, 1972.
8. Robert, W. and Kirk, D.V.M. (1974): "Current veterinary therapy". V. small animal practice. 5th Ed. 1974.
9. Steven, E. Crow and Selly, O. Walshaw (1987): "Manual of Clinical Procedures in the dog and cat". 1987.

عزيزى القارئ . . .

نرجو من أعزائنا القراء تدوين أى ملاحظات أو إضافات أو تعديلات ترونها وإرسالها على العنوان التالى وسوف تكون آراء ومقترحات أعزائنا القراء موضع اهتمام وتقدير فى الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى .

والله ولى التوفيق،

العنوان

جامعة بنها

كلية الطب البيطرى بمشتهر

قسم طب الحيوان (الأمراض الباطنة)

د/ حبر الغنى هفناوى حبر الغنى

E - mail: Abdelghany_hefnawy@Yahoo.com