

## الجهاز التنفسي


### respiratory system

يقوم الجهاز التنفسي بتزويد خلايا الجسم بأكسوجين الهواء وتخليص خلايا الجسم من ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات التنفس الخلوي .

يمكن تقسيم الجهاز التنفسي من الناحية الوظيفية إلى جزئين :

- الجزء التوصيلي **conducting part** : يتكون من الأنف nose البلعوم الأنفي nasopharynx الحنجرة larynx القصبة الهوائية trachea الشعب الهوائية bronchi .
- الجزء التنفسي **respiratory part** : يبدأ الجزء التنفسي عند نهاية الشعبات الصغيرة لممرات التوصيل بالرئات المكونة من العديد بالحوصلات والحويصلات المملوءة بالهواء .

تجويف الأنف **nasal cavity** :



يتكون التجويف الأنفي من غرفتين متوازيتين كل واحدة منهما لها فتحة أمامية :  
المنخر naris وخلفية : المحارة choana التي تفتح في البلعوم الأنفي ، ينقسم التجويف  
الأنفي بنائيا ووظيفيا إلى ما يلي :

### (1) الدهليز vestibule :

أول 1.5 سم من الجزء التوصيلي الذي يلي فتحة الأنف الخارجية مباشرة  
وتتصل بطائته بالجلد الخارجي ، مبطن بنسيج طلائي حرشفي مصنف متقرن ،  
يعمل الشعر على حجز جزء كبير من الأجسام العالقة في الهواء الداخل ، تتواجد  
غدد دهنية .


(2) في منطقة الانتقال من الدهليز إلى الجزء التنفسي للتجويف الأنفي يصبح  
نسيج البطانة أولا طلائية حرشفية مصففة ثم عمودية مصففة كاذبة ومهدبة .  
هذا النوع من الطلائية المخصص للجزء التوصيلي يشار إليه بالطلائية التنفسية .  
توجد خلايا كأسية منتجة للمخاط .

سطح الأجزاء الجانبية من التجويف الأنفي به ثنيات بواسطة نتوء عظمي  
يسمى المحارة conchae ، هذه الثنيات تزيد من مساحة سطح التجويف الأنفي  
وتتسبب في حدوث دوامة في الهواء المار ، مثل هذا النظام يساعد على تكييف  
الهواء ( تبريده أو تدفئته ) .

(3) الأنسجة في الطبقة العليا من التجويف الأنفي والغشاء الأنفي يكونان المنطقة  
الشمية olfactory region تنمو الأهداب في النسيج الطلائي للمنطقة الشمية  
من الخلايا الشمسية ، وبالرغم من ان التركيب الداخلى لأهداب الأنف يماثل  
إلى حد كبير الأهداب العادية إلا أنها غير متحركة ( وذلك لغياب أذرعة  
الحركين dynein : بروتين تكوين أصابع الهدب الضروري للحركة ) . يغطي  
غشاء الخلية سطح الهدب المتضمنة مستقبلات شمية olfactory receptor الذى  
يستجيب للروائح الصادرة من الأجسام ، تتجمع محاور الخلايا الشمية في حزم

بالطبقة الخاصة . تستقبل الخلايا الشمية وفروعها دعما ميكانيكيا وأيضا ( متعلق بالأبيض ) من الخلايا الدعامية supporting cells . الخلايا القاعدية تنقسم وتتمايز إلى خلايا شمّية أو خلايا دعامية .

### الخلايا الشمية olfactory cells :



الخلايا الشمية مشار إليها بالأسهم

هي خلايا عصبية ثنائية القطب توجد أجسامها بين الأجزاء الأجزاء الداخلية من الخلايا والدعامية ، لها فرع خارجي صغير ( شجيرة ) ينتهي بانتفاخ يخرج منه 10 - 12 هدب ، اما الفرع الداخلي ( المحور ) فينفذ من الغشاء القاعدي ليكون مع الفروع الأخرى العصب الشمي .

### الخلايا الدعامية supporting cells :

هي خلايا طلائية عمودية لكل منها جزء داخلي رفيع وجزء خارجي عريض توجد فيه النواة ، توجد بها حبيبات صبغية تضيء على المنطقة الشمية لونا خاصا .

## البلعوم pharynx :

البلعوم يصل التجويف الأنفى بالحنجرة . وفقا لقوى الاحتكاك التى يتعرض لها النسيج الطلائى فإن البلعوم يكون إما مبطنا بطلائية تنفسية أو بطلائية حرشفية مصففة التى تغطى أيضا أسطح التجويف الأنفى والمرىء ، خلايا لمفاوية كثيرا ما تتراكم تحت طلائية البلعوم .

التجويف الأنفى والبلعوم يشكلان معا الممرات التنفسية العليا .

## الجيوب الأنفية nasal sinuses :

هى أزواج من الفجوات الهوائية الموجودة في عظام الجمجمة الجبهية frontal والفكية maxillary والوتدية sphenoid والغربالية ethmoid وتبطن الجيوب الأنفية بطبقة من النسيج الطلائى التنفسى وتحتة طبقة من النسيج الضام المفكك .

## البلعوم الأنفى nasopharynx :

هو جزء البلعوم الذى يصل بين الفتحة الداخلية من تجويف الأنف والحنجرة ، له سطحان ، سطح خلفى له بطانة تنفسية ، و سطح أمامى بطانته طلائية مصففة حرشفية .

## الحنجرة larynx :

الحنجرة تصل البلعوم بالقصبة الهوائية . الأحبال الصوتية للحنجرة تتحكم في تدفق الهواء وتسمح بإنتاج الصوت . الأحبال الصوتية مبطنة بنسيج طلائى حرشفى مصفف وتشمل عضلة والأربطة اللازمة للتحكم في شدة الصوت . يوجد في الطبقة الخاصة للحنجرة غدد مختلطة ومجموعة من الغضاريف بعضها زجاجى والبعض الآخر مرن ، يوجد في جدار الحنجرة نوعان من العضلات الداخلية منها تتصل بالغضاريف فتغير اتساع الحنجرة وتتحكم في حدة الصوت ، أما العضلات الخارجية فتتحرك الحنجرة نحو لسان المزمار أثناء البلع .

التجويف الأفقى - المنطقة الشمية



القصبه الهوائية trachea :

القصبه الهوائية أنبوبة قصيرة مفتوحة على الدوام . القطر حوالى 2 سم .

الطلاتية - المخاطية - تحت المخاطية :

القصبه الهوائية مبطنه بطلاتية تنفسه ، يتنوع عدد الخلايا الكأسية ويتوقف على الحالة الطبيعية ودرجة التهيج للنسيج الطلائى الذى يزيد من إفراز الخلايا الكأسية . بالإضافة إلى الخلايا القاعدية والخلايا المهذبة والخلايا الكأسية يحتوى النسيج الطلائى التنفسى على خلايا فرشائية وطلاتية داخلية الإفراز ( أو خلايا حبيبية صغيرة - الوظيفة غير واضحة ) .

يشار إلى النسيج الطلائى والطبقة الخاصة التى تقع تحتها بالمخاطية . تتكون الطبقة الخاصة من نسيج ضام مفكك مع العديد من الألياف المرنة التى تتكاثف عند الحافة العميقة للطبقة الخاصة لتكوين غشاء مرن . يشكل الغشاء المرن الحدود بين المخاطية والنسيج الضام الواقع تحتها ( التى تسمى تحت المخاطية ) .

غضاريف القصبة الهوائية tracheal cartilages القصبة الهوائية مدعمة بحوالى 16 - 20 غضروف هلالى الشكل على شكل حرف C . تتصل النهايات الحرة الظهرية للغضروف بأشرطة من عضلة ملساء traschealis muscle وألياف نسيج ضام . تربط وحدات الغضاريف ألياف نسيج ضام مرن وألياف طويلة من الكولاجين وتسمح بإطالة وتقصير القصبة الهوائية . على سبيل المثال ما يحدث عند البلع أو تحريك الرقبة . ربما تتحجر ( تتحول إلى عظم ) غضاريف القصبة الهوائية بتقدم العمر .

القصبة الهوائية



بدءاً من القصبة الهوائية تتعرض ممرات الهواء إلى سلسلة من التفرعات نوجزها فيما يلي :

✕ تتفرع القصبة الهوائية إلى فرعين : شعبة جهة اليمين وأخرى يسرى تسمى

الشعب الرئيسية primary bronchi .

✕ تتفرع الشعب الرئيسية إلى فروع ( 3 للرئة اليمنى ، 2 للرئة اليسرى )

يسمى كل فرع labor bronchi .

✕ يتفرع كل فرع من labor bronchi إلى قطع قصبية segmental bronchi

( 8 في الرئة اليسرى ، 10 في الرئة اليمنى ) .

✕ تتفرع كل قطعة إلى شعبيات bronchioles .

✕ تتفرع الشعبيات إلى شعبيات طرفية terminal bronchioles .

✕ تتفرع الشعبيات الطرفية إلى شعبيات تنفسية respiratory bronchioles .

✕ تتفرع الشعبيات التنفسية إلى قنوات حوصلية alveolar ducts .

✕ تتفرع القنوات الحوصلية إلى أكياس حوصلية alveolar sacs .

✕ تتفرع الأكياس الحوصلية إلى حويصلات alveoli .

التفرعات فوق مستوى الشعبيات التنفسية توجد ضمن الجزء التوصيلي للجهاز

التنفسى . التفرعات أسفل الشعبيات التنفسية توجد في جزء التبادل الغازى .

طلائية التنفس respiratory epithelium :

تعاريف :

الغشاء المخاطى mucosa – mucous membrane :

يتكون النسيج المخاطى من طلائية وطبقة خاصة ، يتميز الغشاء المخاطى للقناة

الهضمية فقط بوجود عضلة ملساء muscularis mucosa .

المخاط mucus

إفراز رائق لزج للغشاء المخاطى يتكون من موسين ( المخاطين mucin )

وخلايا طلائية ومختلف أملاح غير عضوية معلقة في الماء .

يوجد في الغشاء المخاطى خلايا كاسية هي المسؤلة عن إفراز المخاط .

الغشاء المخاطى لمعظم الجزء التوصيلي من الجهاز التنفسى مبطن بخلايا طلائية عمودية مصففة كاذبة يشار إليها عادة بطلائية التنفس ، في المساحات التى تتعرض لدوامه من الهواء يكون الغشاء المخاطى مبطنا بنسيج مكون من خلايا طلائية حرشفية مصففة .

تحتوى الطلائية التنفسية على 6 أنواع من الخلايا :

- 1) خلايا مهدبة ciliated cells : وهى خلايا عمودية يتغطى سطحها القمى بجوالى 300 هذب ، تتحرك الأهداب في انسجام وتوافق لكنس المخاط والأجسام الغريبة العالقة به في الاتجاه نحو البلعوم .
- 2) الخلايا الكاسية goblet cells : هى غدد مخاطية وحيدة الخلية تنتشر بين الخلايا المهدبة ، لها نواة قاعدية .
- 3) الخلايا القاعدية basal cells : توجد على طول الصفيحة القاعدية ، قمتها لا تصل إلى التجويف ولذا فإنها تعطى الانطباع بأنها مصففة كاذبة .
- 4) خلايا فرشائية brush cells : خلايا عمودية قمتها مغطاة بمخيمات كامدة .
- 5) خلايا حبيبية صغيرة تماثل الخلايا الصم في بطانة القناة الهضمية enteroendocrine cells .
- 6) خلايا كلارا Clara cells : شائعة التواجد في الجزء التنفسى من الجهاز التنفسى وهى غير مهدبة . خلايا مكعبية تتميز بقمة تشبه القبة ، تقوم هذه الخلايا بإفراز مادة باسطة للسطح surfactant تمنع الحويصلات من الانغلاق وذلك بخفض التوتر السطحي للسائل المغلف لها .

الرئة Lung :

يوجد في القفص الصدرى رئة على كل جانب ، كل رئة مقسمة بنسيج ضام إلى فصوص وفصيصات ، يمكن رؤية الفصوص ( ثلاثة في الرئة اليمنى وفصان في

الرئة اليسرى) بسهولة ، في الثدييات مثل الإنسان يطوق كل رئة بطانة من التجويف الرئوي الخاص بها ، بطانة التجويف عبارة عن نسيج طلائية وسطية مصلية تعرف بالبللورا ( غشاء الجنب pleura ) . يسمى الجزء من غشاء الجنب الملاصق بالرئة البللورى الحشوى visceral pleura بينما يسمى الجزء الملاصق بالقفص الصدرى من الداخل البللورى الجدارى parietal pleura . المسافة بين الغشاء البللورى الحشوى والجدارى تسمى التجويف البللورى pleural cavity . كل رئة لها سرة hilum تدخل منها الأوعية الدموية والشعب الهوائية ويتنشر منها اللنسيج الضام الغنى بالألياف المرنة والألياف الشبكية ليكون أرضية الرئة .تتكون لحمية الرئة parenchyma من حويصلات التى عندها تحدث معظم عمليات التبادل الغازى .



## طلائية التبادل الغازى :

يتكون النسيج الطلائى للجزء التنفسى من الجهاز التنفسى من النموذج 1  
type 1 pneumocytes والنموذج 2 type 2 pneumocytes :

### النموذج 1 type 1 pneumocytes :

حرفشى . تتجمع عضيات الخلية حول النواة تاركة مساحة خارج النواة التى  
تدعم انتشار الهواء وهى تكون مجتمعة 95% من سطح الرئة .

### والنموذج 2 type 2 pneumocytes :

مكعبية الشكل أو هرمية الشكل لها نواة نشطة وسيتوبلازم يحتوى على  
العضيات اللازمة لتصنيع البروتينات والدهون ويوجد على سطحها خميلات  
قصيرة . تقوم هذه الخلايا بافراز مادة باسطة للسطح surfactant تمنع انغلاق  
الحويصلات وذلك بخفض التوتر السطى للسائل المغلف لها .


### الشعب Bronchi :


تتفرع الشعبة الرئيسة بمجرد دخولها الرئة بالنظام السابق شرحه ، تركيب  
جدار الشعب الداخلية يختلف اختلافا جوهريا عن تركيب جدار الشعب الخارجية .  
حيث يوجد فى الطبقة الليفية لجدار الشعب صفائح غضروفية غير متصلة ، يوجد فى  
جدار الشعب غدد لمفاوية

### الشعبيات Bronchioles :

تبدأ الشعبيات من نهاية الشعب ، جدار الشعبيات لا يحتوى على أى  
غضاريف كما لا يحتوى على عقيدات لمفاوية بعكس جدار الشعب الذى يحتوى  
على غضاريف وعقيدات لمفاوية ، النسيج الطلائى عمودى مهدب مع الاختفاء  
التدرجى للخلايا الكأسية كلما تقلص قطر الشعبة ، يوجد بين الخلايا الطلائية فى  
الشعبيات خلايا كلارا ( راجع الصفحات السابقة ) ، تدخل آخر التفرعات

الشعبية تدخل آخر الشعبيات إلى الفصيصات حيث تخرج منها الشعبيات التنفسية التي لها جدر تشبه جدر الشعبيات الا أنها اكثر رقة وخلاياها تصبح مكعبية وغير مهدبة . يخرج من الشعبيات التنفسية القنوات الحوصلية Alveolar ducts تفتح فيها الحويصلات .





شعبية

#### الحويصلات alveoli :

يتكون جدار الحويصلة من نوعين الخلايا النوع الأول 1 والنوع الثاني 2 ( راجع الصفحات السابقة ) . تتصل الحويصلات مع بعضها عن طريق ثقبوب ، وقد تتصل الحويصلة بشعبية عن طريق ثقبوب مماثلة وبذلك يستمر مرور الهواء إلى الحويصلات عن طريق مسارات بديلة .