

## الباب السابع

### جبر كثيرات الحدود ونظرية المعادلات

#### Algebra of Polynomials

#### (١.٧) مقدمة :

**تعريف :** التعبير  $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$  الذي يعتمد على المتغير  $x$  يسمى كثيرة حدود Polynomial أو متعددة حدود من درجة  $n$  في المتغير  $x$  حيث  $(a_0 \neq 0)$  حيث  $a_0, a_1, \dots, a_n$  عوامل كثيرة الحدود وجميعها أعداد حقيقية أو مركبة،  $n$  عدد صحيح غير سالب.

كثيرة الحدود من الدرجة الصفرية عبارة عن العدد البسيط المختلف عن الصفر  $a_0$  (مقدار ثابت لا يعتمد على أي متغير).

عادة تستخدم الرموز  $f(x), q(x), \phi(x)$  للتعبير عن كثيرات الحدود. ويقال أن  $f(x)$  كثيرة حدود من درجة  $n$  وتكتب في الصورة

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

إذا أعطينا كثيرتي حدود من درجة  $n$  على الصورة  $f(x), \theta(x)$  يقال أنهما متساويتين فيما بينهما إذا تساوت عوامل متغيراتها المرفوعة لنفس القوى، مجموع أو الفرق بين كثيرتي حدود أيضاً عواملها تساوي مجموع (أو الفرق) بين عوامل المتغير المرفوع لنفس القوى فمثلاً إذا كانت

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 1, \theta(x) = x^2 + 1$$

فإن

$$f(x) + \theta(x) = x^3 - 3x^2 + x + 2, f(x) - \theta(x) = x^3 - 5x^2 + x$$

كذلك حاصل ضرب أي كثيرتي حدود هو أيضاً كثيرة حدود درجتها تساوي

مجموع درجتي كثيرات الحدود فمثلاً إذا كانت

$$f(x) = x^2 - 3x + 2, \theta(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$f(x) \theta(x) = (x^2 - 3x + 2)(x^2 + 2x - 3) \quad \text{فان}$$

$$= x^4 - x^3 - 7x^2 + 13x - 6$$

وأخيراً بالنسبة لقسمة كثيرة حدود على أخرى يمكننا القول بأنه على وجه العموم ليس من الممكن دائماً قسمة كثيرة حدود على أخرى بدون باقي:

**(٢.١.٧) نظرية الباقي Remainder Theorem:** أي كثيرة حدود  $f(x)$

يمكن قسمتها على كثيرة حدود  $\theta(x) / \theta(x) \neq 0$  ويكون هناك باقي  $r(x)$

ومن ثم يمكن التعبير عن  $f(x)$  بالشكل التالي  $f(x) = \theta(x) \cdot q(x) + r(x)$

حيث كل من  $\theta(x) \cdot q(x)$  كثيرات حدود معلومة وأن درجة كثيرة الحدود  $r(x)$

أقل من درجة كثيرة الحدود  $\theta(x)$  وكثيرة الحدود  $r(x)$  هي باقى خارج قسمة

كثيرة الحدود  $f(x)$  على كثيرة الحدود  $\theta(x)$ ، إذا كانت  $r(x) = 0$  يقال أن كثيرة

الحدود  $f(x)$  تقبل القسمة على كثيرة الحدود  $\theta(x)$  بدون باقى ومن ثم فإن

$$f(x) = \theta(x) q(x)$$

ويقال أن  $\theta(x)$  تقسم  $f(x)$  divide وأن  $\theta(x), q(x)$  عوامل  $\theta(x)$  divisors للدالة

$f(x)$  وفي هذه الحالة يقال أن  $f(x)$  قابلة للتحليل reducible.

إذا كانت  $\theta(x)$  كثيرة حدود من الدرجة الصفرية فإن  $f(x)$  تقبل القسمة على

$\theta(x)$  بدون باقى.

وإذا كانت درجة  $f(x)$  أقل من درجة  $\theta(x)$  فإن خارج القسمة Quotient  $q(x)$

يساوي الصفر والباقي Remainder يكون نفس كثيرة الحدود  $f(x)$  أي أن

$$q(x) = 0, f(x) = r(x)$$

النظرية السابقة تسمى نظرية خارج القسمة Division Algorithm.

مثال (١): نعتبر  $f(x) = x^3 - 1$ ,  $g(x) = x^2 + x + 1$

نلاحظ هنا أن

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + x + 1)(x - 1) \\ \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{(x^2 + x + 1)(x - 1)}{x^2 + x + 1} = x - 1 \end{aligned}$$

أي أن  $r(x) = 0$ ,  $q(x) = x - 1$

مثال (٢): ليكن  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ ,  $g(x) = x^2 - 4x - 1$

وهنا نجد أن  $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$  حيث

$$q(x) = 2, r(x) = 5x + 3$$

(٣.١.٧) طريقة هورنر للقسمة: Homer's method of synthetic division

والآن ندرس الطريقة التي بما يمكننا الحصول على  $q(x)$  في حالة كون

$g(x)$  كثيرة حدود من الدرجة الأولى (طريقة هورنر) نعتبر لذلك

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n,$$

$$g(x) = x - b \quad (\text{quotient})$$

نبدأ بكتابة عوامل  $f(x)$  في ترتيب تنازلي بالنسبة لقوى المتغير  $x$  في الصف الأول.

في الصف الثاني وعلى يسار  $a_0$  نكتب العدد  $b$  أسفل العدد  $a_0$ , نكتب العدد

مرة ثانية ثم يليه العدد  $b_1 = a_0 b + a_1$  أسفل العدد  $a_1$  ثم العدد  $b_2 = b_1 b + a_2$

أسفل العدد  $a_2$  وهكذا وأخيراً أسفل العدد  $a_n$  نكتب العدد  $b_n = b_{n-1} b + a_n$

ومن ثم يكون خارج القسمة أي كثيرة الحدود  $q(x)$  هي

$$q(x) = a_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \dots + b_{n-1}$$

والباقي هو  $r = b_n$

	$a_0$	$a_1$	$a_2$	$\dots$	$a_{n-1}$	$a_n$
$b$	$a_0$	$b_1$	$b_2$	$\dots$	$b_{n-1}$	$b_n$

مثال (٢) أوجد الباقي وخارج قسمة  $f(x) = 2x^3 - 3x + 5$  على  $g(x) = x - 4$ .

الحل: بتكوين الشكل السابق نجد أن

	2	0	-3	5
4	2	8	29	121

أي أن  $f(x) = (x - 4)(2x^2 + 8x + 29) + 121$

وبالتالي يكون  $q(x) = 2x^2 + 8x + 29$ ,  $r = 121$

إذا كان المقسوم عليه على الصورة  $g(x) = ax + b$  حيث  $a \neq 0$  ففي هذه الحالة

يمكن اعتبار كثيرة الحدود  $g_1(x)$  كالآتي:  $g_1(x) = x - \left(-\frac{b}{a}\right)$

ومن ثم فإذا كانت  $q(x)$ ,  $r$  خارج القسمة والباقي نتيجة قسمة كثيرة الحدود  $f(x)$

على  $g(x)$  فإن  $q_1(x)$ ,  $r_1$  هي خارج القسمة والباقي نتيجة قسمة كثيرة الحدود

$f(x)$  على  $g_1(x)$  ومن ثم فإن  $q(x) = \frac{1}{a} q_1(x)$ ,  $r = r_1$

وذلك لأن

$$\begin{aligned} f(x) &= q(x)g(x) + r \\ &= q(x) \cdot a g_1(x) + r \\ &= q_1(x)g_1(x) + r_1 \end{aligned}$$

مثال (٣):

$$g(x) = 2x + 5, f(x) = x^3 - 2x^2 - 10x + 3$$

الحل: نعتبر  $a = 2$ ,  $g_1(x) = x - \left(-\frac{5}{2}\right)$  ومن ثم

	1	-2	-10	3
$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{9}{2}$	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{8}$

$$q(x) = \frac{1}{2} \left( x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{5}{4} \right) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{5}{8}, r = -\frac{1}{8}$$

الباقي  $r$  نتيجة خارج قسمة أي كثيرة حدود  $f(x)$  على كثيرة الحدود من الدرجة الأولى  $g(x)$  أو العامل  $g(x) = x - b$  divisor نحصل عليه مباشرة نتيجة وضع

$$f(x) = (x-b)q(x) + r \text{ لأن ذلك لأن } r = b$$

بوضع  $x=b$  نحصل على  $f(b) = r$

مثال (٤): إذا كانت  $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + x + 1$  أوجد قيمة  $f(x)$  عند  $x = -3$ .

الحل: نستخدم طريقة هورنر

	1	-2	1	1	1
-3	1	-5	16	-47	142

$$f(-3) = 142 \text{ أي أن}$$

(٤.١.٧) مفكوك كثيرات الحدود بدلالة قوى الفروق:

لأي كثيرة حدود

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \quad (*)$$

وأي عدد  $a$  يمكننا كتابة  $f(x)$  كمفكوك بدلالة قوى المقدار  $(x-a)$  وليس  $x$  كالاتي

$$f(x) = b_0 (x-a)^n + b_1 (x-a)^{n-1} + \dots + b_n = \sum_{r=0}^n b_r (x-a)^{n-r} \quad (**)$$

ولكي نحصل على العوامل  $b_0, b_1, \dots, b_n$  نلاحظ أولاً  $b_n = f(a)$  أي أن  $b_n$  هو الباقي نتيجة قسمة  $f(x)$  على  $(x-a)$  وخارج القسمة هو كثيرة حدود  $q(x)$  يمكننا الحصول عليها باستخدام طريقة هورنر.

لو قسمنا كثيرة الحدود  $q(x)$  على نفس المقدار  $(x-a)$  نحصل على كثيرة حدود جديدة  $q_1(x)$  والباقي هو  $b_{n-1}$  ثم بقسمة  $q_1(x)$  على نفس المقدار  $(x-a)$  نحصل على كثيرة حدود جديدة  $q_2(x)$  والباقي هو  $b_{n-2}$  وهكذا.

مثال (٥): نعتبر  $a=3$  ,  $f(x) = x^4 - 5x^3 - 3x^2 + 9$

طريقة الحصول على العوامل  $b_1, b_2, \dots, b_5$  كالاتي

	1	-5	-3	0	9	
3	1	-2	-9	-27	-72	$b_4$
	1	1	-6	-45		$b_3$
	1	4	6			$b_2$
	1	7				$b_1$
	1					$b_0$

ومن ثم فإن المعاملات  $b_i$  هي الموجودة على القطر من أسفل إلى أعلى بالترتيب

$$f(x) = (x-3)^4 + 7(x-3)^3 + 6(x-3)^2 - 45(x-3) - 72$$

وكما نلاحظ أن عوامل مفكوك الدالة  $f(x)$  بدلالة قوى الفرق  $(x-a)$  ترتبط

بمشتقات هذه الدالة عند النقطة  $x=a$  : بالعلاقات الآتية :

$$b_n = f(a), b_{n-1} = \frac{f'(a)}{1!}, b_{n-2} = \frac{f''(a)}{2!}, \dots, b_0 = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \text{ أو } b_{n-r} = \frac{f^{(r)}(a)}{r!}$$

هذه المعاملات تناظر معاملات  $(x-a)$  في مفكوك تيلور للدالة  $f(x)$  أي

$$f(x) = \sum_{r=0}^n (x-a)^r \frac{f^{(r)}(a)}{r!}$$

السابقة يمكننا الحصول على قيم المشتقات المختلفة لكثيرة الحدود المعطاة وذلك عند النقطة  $a$  وهي القيم الآتية :

$$f'(3) = -45, f''(3) = 6.2! = 12, f'''(3) = 7.3! = 42, f^{(4)}(3) = 4! = 24$$

الطريقة السابقة المستخدمة تسمح لنا بالحصول على الكسور الجزئية لأي كسر كما بالمثل التالي:

مثال (٦) : أكتب الكسر  $\phi(x) = \frac{x^2 + x + 1}{(x+2)^4}$  في صورة مجموع كسور جزئية.

الحل: نفرض أن بسط هذا الكسر هو كثيرة الحدود  $f(x)$  أي أن  $f(x) = x^2 + x + 1$

ونحاول الآن الحصول على مفكوك لكثيرة الحدود هذه بدلالة قوى الفرق  $(x-(-2))$  لذلك نستخدم طريقة هورنر ومن ثم فإن

	1	1	1
-2	1	-1	3
	1	-3	
	1		

أي أن مفكوك  $f(x)$  بدلالة قوى  $(x+2)$  المختلفة هو

$$f(x) = (x+2)^2 - 3(x+2) + 3$$

ومن ذلك الحصول على :

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \frac{f(x)}{(x+2)^4} = \frac{(x+2)^2 - 3(x+2) + 3}{(x+2)^4} \\ &= \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{3}{(x+2)^3} + \frac{3}{(x+2)^4} \end{aligned}$$

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أنه إذا كان لدينا كثيرة الحدود (\*\*\*) والمراد الحصول على كثيرة الحدود (\*) والإجابة هي أننا نستخدم طريقة هورنر بعملية عكسية أي من أسفل إلى أعلى بدون وضع معاملات (\*\*\*) على القطر.

### (٥.١.٧) القاسم المشترك الأعظم لكثيرات الحدود :

Greatest Common divisor (G. C. D)

إذا كانت كل من كثيرات الحدود  $f(x)$  و  $g(x)$  تقبل القسمة بدون باقى على كثيرة الحدود  $\phi(x)$  فإن  $\phi(x)$  تسمى القاسم المشترك العام لكثيرات الحدود  $f(x)$  و  $g(x)$ .

تعريف: القاسم المشترك العام  $d(x)$  الذي يقبل القسمة بدون باقى على كل قاسم مشترك لكل من كثيرات الحدود  $f(x)$ ,  $g(x)$  يسمى القاسم المشترك الأعظم لكثيرات الحدود  $f(x)$ ,  $g(x)$  ونرمز له بالرمز  $d(x)$  وبالاختصار (G.C.D) ويكتب في الصورة  $d(x) = (f(x), g(x))$

مثال (٧) : أوجد القاسم المشترك الأعظم لكثيرتي الحدود

$$f(x) = x^2 - x \quad , \quad g(x) = x^2 + 1 \quad (1)$$

$$d(x) = (f(x), g(x)) = x - 1$$

وإذا كانت

$$f(x) = 6x + 12 \quad , \quad g(x) = 4x - 2 \quad (2)$$

$$d(x) = 1 \quad \text{فان وهكذا.}$$

إذا اعطينا كل من كثيرات الحدود  $f(x)$ ,  $g(x)$  في صورة حاصل ضرب معاملات خطية مرفوعة لقوى

$$f(x) = a_0 (x - \alpha_1)^{k_1} \dots (x - \alpha_p)^{k_p} (x - \beta_1)^{m_1} \dots (x - \beta_r)^{m_r}$$

$$g(x) = b_0 (x - \alpha_1)^{\ell_1} \dots (x - \alpha_p)^{\ell_p} (x - \gamma_1)^{\nu_1} \dots (x - \gamma_s)^{\nu_s}$$

وإذا كانت جميع الأعداد  $\alpha_i, \beta_a, \gamma_r$  مختلفة فيما بينها فإن

$$d(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \dots (x - \alpha_p)^{m_p}$$

لكل  $j = 1, 2, \dots, p$  حيث  $m_i$  أقل من  $\ell_j, k_j$

مثال (٨): نعتبر

$$f(x) = (x-1)^3 (x+2)^2 (x-5)^8, g(x) = (x-1)(x+2)^4 (x+7)(x+1)^2$$

$$d(x) = (x-1)(x+2)^2 \text{ فإن}$$

أما إذا أعطينا كثيرات الحدود  $f(x), g(x)$  في صورة مفكوكات بدلالة قوى  $x$  المختلفة أي عواملها غير معلومة فلنحصل على القاسم المشترك الأعظم نتبع الطرق المعروفة (جبر اقليدس).

لذلك نقسم  $f(x)$  على كثيرة الحدود  $g(x)$  فنحصل على خارج القسمة  $q_1(x)$  وباقي خارج القسمة  $r_1(x)$ ، إذا لم يكن  $r_1(x)$  مساوياً للصفر. نقسم كثيرة الحدود  $g(x)$  على الباقي  $r_1(x)$  فنحصل على خارج القسمة  $q_2(x)$  والباقي ككثيرة حدود جديدة  $r_2(x)$ ، إذا لم يكن  $r_2(x)$  مساوياً للصفر نقسم  $r_1(x)$  على  $r_2(x)$  وهكذا إلى أن نصل إلى الحالة التي يكون فيها باقي خارج القسمة مساوياً للصفر.

ويكون القاسم المشترك الأعظم هو آخر باقي خارج القسمة غير مساو للصفر ومن الواضح أنه إذا كان  $r_1(x) = 0$  فإن القاسم المشترك الأعظم لكثيرات الحدود

$$g(x), f(x) \text{ هو } g(x)$$

$$f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x + 4, g(x) = x^2 - x - 1 \text{ نعتبر (٩):}$$

الحل: نلاحظ أن

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^3 - 2x^2 - 3x + x^2 + 4x + 4 \\ &= 3x(x^2 - x - 1) + x^2 - x - 1 + 5x + 5 \\ &= 3x(x^2 - x - 1) + (x^2 - x - 1) + 5(x + 1) \\ &= (x^2 - x - 1)(3x + 1) + 5(x + 1) \\ &= g(x)(3x + 1) + 5(x + 1) \end{aligned}$$

أي أن  $f(x)$  تقبل القسمة على  $g(x)$ ، خارج القسمة هو  $q(x) = 3x + 1$  والباقي  $r_1(x) = 5(x + 1) \neq 0$  نحصل على

$$\begin{aligned} g(x) = x^2 - x - 1 &= x^2 + x - 2x - 1 = \frac{x}{5}(5x + 5) - 2x - 2 + 1 \\ &= \frac{x}{5}(5x + 5) - \frac{2}{5}(5x + 5) + 1 = \frac{1}{5}(5x + 5)(x - 2) + 1 \\ &= \frac{1}{5}(x - 2)r_1(x) + 1 \end{aligned}$$

أي أن  $g(x)$  تقبل القسمة على  $r_1(x)$  حيث خارج القسمة هو

$q_2(x) = \frac{1}{5}(x - 2)$  والباقي  $r_2 = 1 \neq 0$  وحيث أن  $r_1$  تقبل القسمة على  $r_2$  بدون

باق فإن القاسم المشترك الأعظم لكثيرات الحدود  $f(x), g(x)$  هو  $r_2 = 1$

أي أن  $d(x) = (f(x), g(x)) = 1$

### (٦.١.٧) الارتباط البسيط لكثيرات الحدود:

يقال لكثيرات الحدود  $f(x), g(x)$  أهم مرتبطين ارتباطاً خطياً بسيطاً إذا

كان العامل المشترك الأعظم لهما  $d(x)$  يساوي الوحدة. وكما سنعلم فيما بعد أن

أي كثيرتي حدود مرتبطين ارتباطاً بسيطاً لا يوجد بينهما جذور مشتركة.

مثال (١٠): كثيرات الحدود  $g(x) = x^2 - 4x + 1$ ,  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$

مرتبطتين ارتباط بسيط لأن (G.C.D) لهما مساوي الوحدة.

ونعطي الآن بعض الخواص للارتباط البسيط بين كثيرات الحدود بدون برهان.

١- إذا كان  $d(x) = (f(x), g(x))$  فإن كثيرات الحدود

$$g_1(x) = \frac{g(x)}{d(x)}, f_1(x) = \frac{f(x)}{d(x)}$$

تكون مرتبطة ارتباط بسيط.

٢- إذا كانت كثيرة الحدود  $\phi(x)$  مرتبطة ارتباط بسيط مع كل من  $f(x), g(x)$

فإنها تكون مرتبطة ارتباط بسيط أيضاً مع كثيرة الحدود المكونة من حاصل

ضرب  $f(x), g(x)$ .

٣- إذا كان حاصل ضرب كثيرات الحدود  $f(x), g(x)$  يقبل القسمة بدون باقي

على كثيرة الحدود  $\phi(x)$  وكانت  $f(x), \phi(x)$  مرتبطتين ارتباط بسيط فإن

$g(x)$  تقبل القسمة على  $\phi(x)$ .

٤- وأخيراً إذا كانت كثيرة الحدود  $f(x)$  تقبل القسمة على كل من كثيرات

الحدود  $g(x), \phi(x)$  المرتبطتين ارتباط بسيط فإن  $f(x)$  تقبل القسمة على

حاصل ضربهما.

وعموماً إذا كانت  $d(x)$  هي كثيرة الحدود كقاسم مشترك أعظم لكثيرات

الحدود  $f(x), g(x)$  فإن

$$d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x) \quad (1)$$

حيث كل من  $v(x), u(x)$  كثيرات حدود معلومة فإذا كانت  $f(x), g(x)$  مرتبطتين

ارتباط بسيط فإن  $1 = f(x)u(x) + g(x)v(x)$

إذا كانت كثيرات الحدود  $f(x)$ ,  $g(x)$  غير صفريّة فإنه يمكن اختيار  $u(x)$  بحيث تكون درجتها أقل من درجة كثيرة الحدود  $g(x)$  ودرجة  $v(x)$  أقل من درجة  $f(x)$  ولكي نعين كثيرات الحدود  $u(x)$ ,  $v(x)$  في العلاقة (1) نجد أنه من المناسب اعتبار كثيرات الحدود  $f_1(x) = \frac{f(x)}{d(x)}$ ,  $g_1(x) = \frac{g(x)}{d(x)}$  بدلا من  $f(x)$ ,  $g(x)$  في العلاقة (1).

ويجب أولاً اختيار  $u(x)$ ,  $v(x)$  بحيث تحقق العلاقة الآتية

$$1 = f_1(x)u(x) + g_1(x)v(x) \quad (2)$$

**وهذا يمكن إجرائه كالتالي:** إذا كانت  $f_1(x)$ ,  $g_1(x)$  كثيرات حدود من الدرجة الصفريّة فإن  $u(x)$ ,  $v(x)$  تكون مرتبطة ارتباط بسيط فمثلاً إذا كان  $g_1(x) = a \neq 0$  يمكن اختيار  $u = 0$ ,  $v = \frac{1}{a}$  أما إذا كانت درجات كثيرات الحدود  $f_1(x)$ ,  $g_1(x)$  موجبة. ففي هذه الحالة يجب اختيار  $u(x)$ ,  $v(x)$  ذات المعاملات الغير معلومة بحيث تكون درجة  $u(x)$  أقل من درجة  $g_1(x)$  ودرجة  $v(x)$  أقل من درجة  $f_1(x)$  ثم بمساوات الحدود في طرفي العلاقة (2) يمكننا الحصول على معاملات  $u(x)$ ,  $v(x)$ .

والآن إذا ضربت طرفي العلاقة (2) في المقدار  $d(x)$  نحصل على العلاقة (1) بنفس كثيرات الحدود  $u(x)$ ,  $v(x)$  كما في العلاقة (2) وبهذه الطريقة نحصل على  $u(x)$  بحيث تكون درجتها أقل من الفرق بين درجتي كثيرات الحدود  $g(x)$ ,  $d(x)$  ودرجة  $v(x)$  تكون أقل من الفرق بين درجتي  $f(x)$ ,  $d(x)$  وذلك إذا كانت درجات هذه الفروق غير مساوية للصفر. بذلك يمكننا تعيين كثيرات الحدود  $u(x)$ ,  $v(x)$ .

مثال (١١): اعتبر

$$f(x) = x^7 - 2x^6 - x^5 - 11x^4 - 6x^3 - 4x^2 + 5x + 14 ,$$

$$g(x) = x^2 + x + 2$$

لهذه كثيرات الحدود نجد أن  $d(x) = g(x)$  (G. C. D) ومن ثم فإن

$$u(x) = 0 , v(x) = 1$$

مثال (١٢): أعتبر

$$f(x) = 3x^5 - 4x^4 + x^3 - 3x^2 + 4x - 1$$

$$g(x) = 3x^5 + 5x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x - 1$$

القاسم المشترك الأعظم  $d(x)$  لكثيرات الحدود هذه هو

$$d(x) = 3x^3 + 2x^2 + 2x - 1$$

$$f_1(x) = x^2 - 2x + 1 , g_1(x) = x^2 + x - 1 \text{ أي أن}$$

والآن نكتب العلاقة (2) لكثيرات الحدود  $f_1(x), g_1(x)$  على الصورة

$$1 = (x^2 - 2x + 1)(ax + b) + (x^2 + x - 1)(a_1x + b_1)$$

بمساواة معاملات الطرفين نحصل على

$$a + a_1 = 0$$

$$b - 2a + b_1 + a_1 = 0$$

$$-2b + a + b_1 - a_1 = 0$$

$$b - b_1 = 0$$

$$a = 3, a_1 = -3, b = 5, b_1 = 4 \text{ ومنها نحصل على}$$

$$d(x) = f(x)(3x + 5) + g(x)(-3x + 4)$$

أي أن

### ٧.١.٧) جذور كثيرات الحدود:

إذا أعطينا كثيرات الحدود  $f(x)$  وكانت قيمتها عند  $x=c$  مساوية للصفر فإنه يقال أن العدد  $c$  هو جذر من جذور كثيرة الحدود وأن  $f(x) = 0$  حيث  $x=c$  وأي كثيرة حدود غير صفرية عواملها أي أعداد (حقيقية أو مركبة)، يوجد لها على الأقل جذر حقيقي أو مركب (النظرية الأساسية لجبر الأعداد المركبة).  
**نظرية (بدون برهان):** لكثيرة الحدود  $f(x)$  يوجد لها الجذر  $c$  إذا كان وكان فقط  $f(x)$  تقبل القسمة على المقدار  $x-c$  بدون باقي (هذه النظرية الأساسية في جبر كثيرات الحدود Fundamental theorem of algebra (البرهان خارج نطاق الدراسة).

وفي هذه الحالة نجد أن  $f(x) = q(x)(x-c)$  حيث  $q(x)$  خارج قسمة كثيرة الحدود  $f(x)$  على المقدار  $(x-c)$  وهي كثيرة حدود درجتها أقل من درجة كثيرة الحدود  $f(x)$  بمقدار الوحدة.

### حالات خاصة:

وإذا كانت كثيرة الحدود  $f(x)$  تقبل القسمة على المقدار  $(x-c)^2$  بدون باقي يقال أن لكثيرة الحدود هذه أن لها جذر مكرر  $c$ .

وعموماً إذا كانت  $f(x)$  تقبل القسمة بدون باقي على المقدار  $(x-c)^k$  فإنه يقال لكثيرة الحدود  $f(x)$  يوجد لها جذر  $c$  مكرر  $k$  من المرات. Equal or multiple or repeated roots. وفي هذه الحالة  $f(x)$  لا تقبل القسمة على المقدار  $(x-c)^{k+1}$  وإلا كان الجذر  $c$  مكرر  $k+1$  من المرات وهكذا.

ولكي نختبر كون العدد  $c$  جذر لكثيرة الحدود  $f(x)$  وعدد مرات تكراره، تتبع لذلك طريقة هورنر المعروفة :

مثال (١٣) : اختبر تكرار الجذر  $x = 4$  بالنسبة لكثيرة الحدود

$$f(x) = x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x + 16$$

الحل : باستخدام طريقة هورنر نجد أن

	1	-7	9	8	16
4	1	-3	-3	-4	0
	1	1	1	0	
	1	5	21		
	1	9			

من ذلك يمكننا القول بأن العدد 4 هو جذر لكثيرة الحدود  $f(x)$  وهو مكرر مرتين.

**تعريف:** لأي كثيرة حدود  $f(x)$  العدد  $c$  يعتبر جذر مكرر لها  $k$  من المرات إذا كانت قيمة كثيرة الحدود هذه ومشتقاتها المتتالية حتى الرتبة  $k-1$  تكون مساوية للصفر عند  $x=c$  ,  $f^{(k)}(c) \neq 0$  , وحيث أن المشتقات المتتالية لأي كثيرة حدود من درجة  $n$  ما هي إلا كثيرات حدود درجاتها تتناقص بالتدرج بمقدار الوحدة فإن الجذر المكرر  $k$  من المرات لكثيرة الحدود  $f(x)$  يكون مكرر  $k-1$  من المرات لمشتقاتها الأولى  $f'(x)$  ومكرر  $k-2$  من المرات لمشتقاتها الثانية  $f''(x)$  ... وهكذا.

ومن ثم إذا كانت  $d(x)$  هي كثيرة الحدود والقاسم المشترك الأعظم لكثيرة الحدود  $f(x)$  ومشتقاتها الأولى  $f'(x)$  فإن كثيرة الحدود  $\frac{f(x)}{d(x)} = \phi(x)$  يكون لها

نفس الجذر المكرر لكثيرة الحدود  $f(x)$  ولكنه جذر واحد غير مكرر.

جميع هذه الحقائق السابقة تسمح لنا بالحصول على الجذور المختلفة لأي

كثيرة حدود وذلك بالحصول على جذور كثيرة الحدود  $\phi(x)$  المناظرة لها والتي درجتها أقل من درجة  $f(x)$  وذلك إذا كانت  $d(x)$  ليست كثيرة حدود صفرية.

مثال (١٤) : نعتبر كثيرة الحدود  $f(x) = x^5 - 5x^4 - 5x^3 + 45x^2 - 108x$

الحل:  $f'(x) = 5x^4 - 20x^3 - 15x^2 + 90x$

والقاسم المشترك الأعلى لكل من  $f(x)$ ,  $f'(x)$  هو  $d(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$

ومن ثم فإن  $\phi(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = x^2 - x - 6$  وجذورها هي  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = 3$

والتي هي نفسها جذور لكثيرة الحدود الأصلية  $f(x)$  غير أنها جذور مكررة ويمكننا تحديد هذا التكرار باستخدام طريقة هورنر.

والآن نبين طريقة أخرى باستخدامها يمكننا تعيين جذور أي كثيرة حدود  $f(x)$  وعدد تكرار كل جذر منها.

نفرض أن  $d_1(x)$  هو (G. C. D) لكثيرات الحدود  $f(x)$ ,  $f'(x)$

$d_2(x)$  هو (G. C. D) لكثيرات الحدود  $d_1(x)$ ,  $d_1'(x)$

$d_3(x)$  هو (G. C. D) لكثيرات الحدود  $d_2(x)$ ,  $d_2'(x)$  وهكذا.

ثم بوضع  $v_1(x) = \frac{f(x)}{d_1(x)}$ ,  $v_2(x) = \frac{d_1(x)}{d_2(x)}$ , ...,  $v_s(x) = \frac{d_{s-1}(x)}{d_s(x)}$

وإذا فرضنا في النهاية  $F_1(x) = \frac{v_1(x)}{v_2(x)}$ ,  $F_2(x) = \frac{v_2(x)}{v_3(x)}$ , ...,  $F_s(x) = v_s(x)$

فإن لكثيرات الحدود  $F_1(x)$ ,  $F_2(x)$ , ...,  $F_s(x)$  يوجد لها جذور بسيطة غير مكررة.

وأن جميع جذور كثيرة الحدود  $F_1(x)$  هي أيضاً جذور بسيطة لكثيرة الحدود  $f(x)$  وجذور كثيرة الحدود  $F_2(x)$  هي الجذور المكررة مرتين لكثيرة الحدود  $f(x)$  ...

وجذور كثيرة الحدود  $F_s(x)$  هي الجذور المكررة  $s$  من المرات لكثيرة الحدود  $f(x)$  وأن لكثيرة الحدود  $f(x)$  لا يوجد لها جذور مكررة أكثر من  $s$  مرة.

مثال (١٥) : أوجد الجذور المكررة للمعادلة

$$f(x) = x^5 + 6x^4 + 13x^3 + 14x^2 + 12x + 8 = 0$$

الحل:

$$f'(x) = 5x^4 + 24x^3 + 39x^2 + 28x + 12,$$

$$d_1(x) = x^2 + 4x, d_2(x) = x + 2, d_3(x) = 1$$

$$v_1(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2, v_2(x) = x + 2, v_3(x) = x + 2$$

$$F_1(x) = x^2 + 1, F_2(x) = 1, F_3(x) = x + 2$$

ومن ثم فإن لكثيرة الحدود المعطاه يكون لها الجذور البسيطة  $\pm i$  والجذر -2 مكرر ثلاث مرات.

مثال (١٦) : أوجد جذور المعادلة  $x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x + 26 = 0$

إذا علم أن لها جذور مكررة.

الحل : نفرض أن

$$f(x) = x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x + 36$$

$$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 22x + 12 = 2(2x^3 - 3x^2 - 11x + 16)$$

$$= 2(2x^2(x-3) + (3x-2)(x-3))$$
$$= 2((x-3)(2x^2 + 3x - 2)) = 2((x-3)(2x-1)(x+2))$$

أي أن جذور المعادلة  $f(x) = 0$  هي  $x = 3, x = \frac{1}{2}, x = -2$

فإذا كانت المعادلة  $f(x) = 0$  لها جذور مكررة فهذا الجذر المكرر هو أحد الجذور

$3, \frac{1}{2}, -2$  نختبر هذه الجذور بالنسبة للمعادلة  $f(x) = 0$  فنجد أن

$$f(3) = 0, f(-2) = 0$$

أي أن الجذر 3 هو جذر مكرر للمعادلة  $f(x)$  كذلك الجذر -2 هو جذر مكرر لها

وحيث أن المعادلة  $f(x)$  هي معادلة من الدرجة الرابعة فإن جذورها هي

$$-2, -2, 3, 3$$

**نظرية (بدون برهان):** في كثيرة الحدود ذات المعاملات الحقيقية الجذور

المركبة  $\alpha + i\beta$  تحدث مترافقة.

مثال (١٧): أوجد جذور المعادلة  $x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 2x - 5 = 0$

إذا علم أن أحد جذورها هو  $1 + 2i$

الحل: باستخدام النظرية السابقة نجد أن الجذور المركبة عادة تحدث مترافقة فإن

$1 - 2i$  يكون جذر للمعادلة المعطاة بفرض أن  $1 + 2i$  جذر لها ومن ثم فإن  $f(x) =$

$$\phi(x) (x-1-2i)(x-1+2i)$$

حيث  $\phi(x)$  كثيرة حدود من الدرجة الثانية.

لأن المعادلة المعطاة هي كثيرة حدود من الدرجة الرابعة أي يجب أن يكون

لها أربعة جذور، كما أن  $\phi(x)$  هي القاسم المشترك الأعظم لكثيرة الحدود  $f(x)$

والمقدار

$$(x-1-2i)(x-1+2i) = (x-1)^2 - (2i)^2 \\ = (x-1)^2 + 4 = x^2 - 2x + 5$$

وحيث أن

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 2x - 5 = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x^2 + 2x - 5 \\ = x^2(x^2 - 2x + 5) - (x^2 - 2x + 5) = (x^2 - 1)(x^2 - 2x + 5)$$

$$\phi(x) = x^2 - 1 \text{ أي أن}$$

ومن ثم فإن جذور المعادلة المعطاة هي  $1 + 2i, 1 - 2i, 1, -1$

### نتائج هامة :

١- بما أن  $\alpha + i\beta$  جذر للمعادلة  $f(x)$  فإن  $\alpha - i\beta$  جذر آخر. إذن العدد الكلي

للجذور المركبة في أي معادلة ذات معاملات حقيقية يجب أن يكون زوجي.

إذن أي معادلة ذات درجة فردية يجب أن تحتوي على الأقل جذر حقيقي

واحد.

٢- إذا كان  $\alpha + i\beta, \beta \neq 0$  جذر مكرر  $k$  من المرات فإن  $\alpha - i\beta$  جذر مكرر

$k$  من المرات للمعادلة  $f(x) = 0$  ذات المعاملات الحقيقية.

نظرية (بدون برهان): في المعادلة  $f(x)$  ذات المعاملات التي تنتمي لمجموعة

الأعداد القياسية Rational numbers ولها جذر في صورة عدد غير قياسي

irrational root  $\alpha + \sqrt{\beta}$  حيث  $\alpha, \beta$  أعداد قياسية،  $\beta > 0$ ، ليست مربع

عدد قياسي فإن المعادلة لها جذر مرافق في صورة عدد غير قياسي على الصورة

$$\alpha - \sqrt{\beta}$$

مثال (١٨): أوجد معادلة ذات أصغر درجة والتي لها معاملات حقيقية ولها الجذران

$$1+2i, 3-i$$

الحل: بما أن جذور للمعادلة المطلوبة. إذن  $3-i, 1+2i$  جذور لها أيضاً.

إذن المعادلة المناظرة هي  $(x-1-2i)(x-1+2i)(x-3+i)(x-3-i) = 0$

$$\text{أو } x^4 - 8x^3 + 27x^2 - 50x + 50 = 0$$

مثال (١٩): كون المعادلة ذات المعاملات القياسية والتي لها جذر  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ .

الحل: بما أن جذر  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  فإن  $\sqrt{2} + \sqrt{3}, -\sqrt{2} + \sqrt{3}, -\sqrt{2} - \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt{3}$  جذور

أيضاً للمعادلة المطلوبة. إذن المعادلة المطلوبة هي

$$(x - \sqrt{2} - \sqrt{3})(x - \sqrt{2} + \sqrt{3})(x + \sqrt{2} + \sqrt{3})(x + \sqrt{2} - \sqrt{3}) = 0$$

$$\text{أو } x^4 - 10x^2 + 1 = 0$$

حل آخر: نفرض أن  $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ، إذن  $x - \sqrt{2} = \sqrt{3}$  وبالتربيع نحصل على

$$x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 3 \text{ أو } x^2 - 2\sqrt{2}x - 1 = 2\sqrt{2}x \text{ وبالتربيع نحصل على}$$

$$x^4 - 10x^2 + 1 = 0 \text{ أو } (x^2 - 1)^2 = 8x^2$$

مثال (٢٠): أوجد جذور المعادلة  $f(x) = x^4 + x^3 - 25x^2 + 41x + 66 = 0$  إذا

علم أن لها جذر  $3 + i\sqrt{2}$ .

الحل: بما أن  $3 + i\sqrt{2}$  جذر، إذن  $3 - i\sqrt{2}$  جذر.

إذن  $x - 3 + i\sqrt{2}, x - 3 - i\sqrt{2}$  عوامل للمعادلة المعطاة وكذلك فإن حاصل

ضربهم عامل أيضاً أي أن  $f(x) = (x - 3 + i\sqrt{2})(x - 3 - i\sqrt{2})q(x)$  حيث  $q(x)$

كثيرة حدود من الدرجة الثانية.

إذن  $f(x) = (x^2 - 6x + 11)q(x)$  ، باقي جذور المعادلة  $f(x)$  يعطى من  $q(x)$  ،  
نحصل عليه بالقسمة الاقليدية لكثيرة الحدود  $f(x)$  على  $x^2 - 6x + 11$  ومنها تكون

$$q(x) = x^2 + 7x + 6$$

$$q(x) = x^2 + 7x + 6 = (x+6)(x+1) = 0$$
 المعادلة

$$x = -6 , x = -1$$
 هي

$$-1, -6, 3+i\sqrt{2}, 3-i\sqrt{2}$$
 هي الجذور

مثال (٢١) : إذا كان  $1, \alpha, \beta, \gamma, \delta$  هي جذور المعادلة  $x^5 - 1 = 0$  أثبت أن

$$(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)(1-\delta) = 5$$

الحل : بما أن  $1, \alpha, \beta, \gamma, \delta$  هي جذور للمعادلة  $x^5 - 1 = 0$  فإن

$$x^5 - 1 = (x-1)(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta)$$
 إذن

$$x^5 - 1 = (x-1)(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta)$$

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \frac{x^5 - 1}{x - 1}$$
 بالقسمة على  $x-1$  فإن

أي أن

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta) \quad (*)$$

وهي صالحة لجميع قيم  $x$  ، بوضع  $x=1$  في (\*) نحصل على المطلوب.

### (٢.٧) العلاقات بين معاملات كثيرة الحدود وجذورها المختلفة: -

The relation between the roots and coefficients of a general polynomials equation

أعتبر  $x_1, x_2, \dots, x_n$  هي جذور المعادلة المناظرة لكثيرة الحدود

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n , a_0 \neq 0$$

فإن العلاقة بين الجذور  $x_1, x_2, \dots, x_n$  للمعادلة  $f(x) = 0$  والمعاملات

هي كالاتي  $a_0, a_1, \dots, a_n$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_1}{a_0},$$

$$x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_1 x_n + x_2 x_3 + \dots = \sum_{i \neq j} x_i x_j = \frac{a_2}{a_0},$$

$$x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + \dots + x_{n-2} x_{n-1} x_n = \sum_{i \neq j \neq k} x_i x_j x_k = -\frac{a_3}{a_0},$$

...

$$x_1 x_2 x_3 \dots x_{n-1} + x_1 x_2 \dots x_{n-2} x_n + \dots + x_2 x_3 \dots x_n = (-1)^{n-1} \frac{a_{n-1}}{a_0},$$

$$x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$$

أي أن مجموع الجذور يساوي خارج قسمة معامل  $x^{n-1}$  على معامل  $x^n$  تسبقه إشارة سالبة.

مجموع حاصل ضرب الجذور مثنى مثنى يساوي خارج قسمة معامل  $x^{n-2}$  على معامل  $x^n$ .

مجموع حاصل ضرب الجذور ثلاثاً ثلاثاً يساوي خارج قسمة معامل  $x^{n-3}$  على معامل  $x^n$  تسبقه إشارة سالبة ... وهكذا.

حاصل ضرب الجذور جميعها يساوي خارج قسمة الحد المطلق على معامل  $x^n$  تسبقه الإشارة  $(-1)^n$ .

وعموماً يمكننا كتابة العلاقة الآتية الصحيحة لجميع  $k$  الممكنة

$$\sigma_k = \sum_{i_1 \neq i_2 \neq \dots \neq i_k} x_{i_1} x_{i_2} x_{i_3} \dots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}, k=1,2,\dots,n$$

$$\sigma_1 = -\frac{a_1}{a_0}, \sigma_2 = \frac{a_2}{a_0}, \dots, \sigma_k = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}, \dots, \sigma_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0} \quad \text{أي أن}$$

ومن ثم فإن المعادلة من الدرجة النونية (كثيرة الحدود النونية) والتي جذورها  $x_1, x_2, \dots, x_n$  تأخذ في النهاية الصورة

$$x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \sigma_2 x^{n-2} - \dots + (-1)^n \sigma_n = 0 \quad (*)$$

مثال (١): إذا كانت  $x_1, x_2, \dots, x_n$  هي جذور كثيرة الحدود الصفرية

$$f(x) = 0$$

$$\text{أوجد } \sum_{i=1}^n x_i^2 x_j, \sum_{i=1}^n x_i^2, \sum_{i=1}^n x_i x_j^2, \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2}$$

الحل: إذا اعتبرنا مربع مجموع جذور هذه المعادلة أي

$$\sigma_1^2 = \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} x_i x_j = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2\sigma_2$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 \quad \text{ومنها نحصل على}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = \frac{a_1^2 - 2a_0 a_2}{a_0^2} \quad \text{ولكن } \sigma_1 = -\frac{a_1}{a_0}, \sigma_2 = \frac{a_2}{a_0} \quad \text{أي أن}$$

ثانياً:

$$\sigma_1 \sigma_2 = \left( \sum x_i \right) \left( \sum_{i \neq j} x_i x_j \right)$$

$$= (x_1 + x_2 + \dots + x_n)(x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n)$$

$$= x_1 (x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_1 x_n + x_2 x_3 + x_2 x_4 + \dots + x_{n-1} x_n)$$

$$+ x_2 (\dots) + x_3 (\dots) + \dots + x_n (\dots)$$

$$= x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 \dots x_1^2 x_n + (x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + \dots) + \dots$$

$$+ x_1 x_{n-1} x_n + (x_1 x_2^2 + \dots x_1 x_2 x_n) + (x_3^2 x_3 + \dots)$$

$$+ x_2 x_{n-1} x_n + \dots$$

$$+ (x_n x_1 x_2 + x_n x_1 x_3 \dots x_1 x_n^2) + (x_n x_2 x_3 + \dots + x_2 x_n^2) + \dots x_{n-1} x_n^2$$

$$= \sum x_i^2 x_j + 3 \sum x_i x_j x_2$$

$$= \sum x_i^2 x_j + 3 \sigma_3$$

أي أن

$$\sum x_i^2 x_j = \sigma_1 \sigma_2 - 3 \sigma_3$$

$$= -\frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{a_2}{a_0} + 3 \frac{a_3}{a_0} = -\frac{a_1 a_2}{a_0^2} + 3 \frac{a_3}{a_0}$$

**ثالثاً:** للحصول على  $\sum \frac{1}{x_i^2}$  نلاحظ أنه إذا أردنا الحصول على المعادلة التي

جذورها هي مقلوبات جذور المعادلة  $f(x)$  نستخدم التعويض  $\frac{1}{x}$  بدلاً من  $x$  في

$$\frac{a_0}{x^n} + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{x} + a_n = 0$$

$$\text{أو } a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

باستخدام العلاقة بين المعاملات والجذور نجد أن  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} = \left(\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)^2 - 2 \frac{a_{n-2}}{a_n}$

**وأخيراً للحصول على  $\sum x_i x_j^2$**

$$\text{نجد أن } \left(\sum x_i\right) \left(\sum \frac{1}{x_j^2}\right) = \left(\sum \frac{1}{x_i}\right) + \sum_{i=j} \frac{x_i}{x_j^2}$$

$$\begin{aligned} \sum \frac{x_i}{x_j^2} &= \sum x_i x_j^{-2} = (\sum x_i) \left( \sum \frac{1}{x_j^2} \right) - \sum \frac{1}{x_i} \\ &= \left( -\frac{a_1}{a_0} \right) \left( \left( \frac{a_{n-1}}{a_n} \right)^2 - 2 \frac{a_{n-2}}{a_n} \right) + \frac{a_{n-1}}{a_n} \\ &= \frac{1}{a_0 a_n^2} (2 a_{n-2} a_n a_1 - a_{n-1}^2 a_1 + a_n a_{n-1} a_0) \end{aligned}$$

### حالات خاصة :

١- إذا كان  $\alpha, \beta$  جذور للمعادلة  $ax^2 + bx + c = 0$  فإن

$$\sigma_1 = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \sigma_2 = \alpha \beta = \frac{c}{a}$$

٢- إذا كان  $\alpha, \beta, \gamma$  جذور للمعادلة  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  فإن

$$\sigma_1 = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}, \quad \sigma_2 = \alpha \beta + \alpha \gamma + \beta \gamma = \frac{c}{a},$$

$$\sigma_3 = \alpha \beta \gamma = -\frac{d}{a}$$

ملاحظة: أحياناً من المناسب كتابة  $\sigma_2 = \alpha(\beta + \gamma) + \beta \gamma$

٣- إذا كان  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  هي جذور للمعادلة  $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$

فإن

$$\sigma_1 = \alpha + \beta + \gamma + \delta = -\frac{b}{a},$$

$$\sigma_2 = \alpha \beta + \alpha \gamma + \alpha \delta + \beta \gamma + \beta \delta + \gamma \delta = \frac{c}{a}$$

$$\sigma_3 = \alpha \beta \gamma + \alpha \beta \delta + \alpha \gamma \delta + \beta \gamma \delta = -\frac{d}{a}$$

$$\sigma_4 = \alpha \beta \gamma \delta = \frac{e}{a}$$

ملاحظة: أحياناً من المناسب كتابة

$$\sigma_2 = (\alpha + \beta)(\gamma + \delta) + \alpha\beta + \gamma\delta$$

$$\sigma_2 = \alpha\beta(\gamma + \delta) + \gamma\delta(\alpha + \beta)$$

٤- إذا كانت ثلاث جذور في توالي عددي Arithmetic progression فإنها

$$\alpha - \beta, \alpha, \alpha + \beta$$

٥- إذا كانت أربع جذور في توالي عددي فإننا نأخذها بهذا الشكل

$$\alpha - 3\beta, \alpha - \beta, \alpha + \beta, \alpha + 3\beta$$

٦- إذا كان ثلاث جذور في توالي هندسي Geometric Progression فإننا

$$\frac{\alpha}{\beta}, \alpha, \alpha\beta$$

٧- إذا كانت أربع جذور في توالي هندسي فيكون لها الصورة  $\frac{\alpha}{\beta^2}, \frac{\alpha}{\beta}, \alpha, \alpha\beta$

مثال (٢): أوجد جذور المعادلة  $f(x) = x^3 - 5x^2 - 16x + 80 = 0$  إذا علم أن مجموع جذرين لها يساوي صفر.

الحل: نفرض أن الجذور هي  $\alpha, \beta, \gamma$  فإن  $\beta + \gamma = 0$  ومن العلاقات التي تربط

$$\sigma_1 = \alpha + \beta + \gamma = 5$$

إذن  $\alpha = 5$  ومنها يكون  $x - 5$  عامل من عوامل  $f(x)$  وبقسمة  $f(x)$  على  $x - 5$

بطريقة هورنر نحصل على  $x^2 = 16$  إذن الجذور هي  $4, -4, 5$ .

مثال (٣): أوجد جذور المعادلة  $x^3 - 9x^2 + 23x - 15 = 0$  إذا علم أن الجذور في

توالي عددي.

الحل: نفرض أن الجذور هي  $\alpha - \beta, \alpha, \alpha + \beta$

$$\therefore \sigma_1 = \alpha - \beta + \alpha + \alpha + \beta = 9$$

إذن  $\alpha = 3$ ، وبالقسمة على  $x - 3$  نحصل على باقي الجذور وهي 1, 5 أي أن جذور المعادلة المعطاة هي 1, 3, 5.

مثال (٤): أوجد جذور المعادلة  $2x^3 - 9x^2 + 12x - 4 = 0$  إذا علم أن لها جذر مكرر مرتين.

الحل: نفرض أن جذور المعادلة هي  $\alpha, \alpha, \beta$  ومن المعادلة يكون  $\sigma_1 = \frac{9}{2}$  ومنها

$$2\alpha + \beta = \frac{9}{2} \quad (1)$$

$$\alpha^2 + 2\alpha\beta = 6 \quad (2) \text{ ومنها } \sigma_2 = \frac{12}{2}$$

$$\alpha^2\beta = 2 \quad (3) \text{ ومنها } \sigma_3 = \frac{4}{2}$$

بحل المعادلات (1), (2), (3) آتياً نحصل على الجذور  $2, 2, \frac{1}{2}$

### تحويل المعادلات Transformations of equations

١- أحياناً يلزم معرفة جذور معادلة ما ترتبط بجذور المعادلة

$$f(x) = \sum_{r=0}^n a_r x^{n-r} = 0 \quad (1)$$

فمثلاً المعادلة التي لها جذور تختلف في الإشارة عن جذور المعادلة (1) نحصل عليها

$$f(x) = \sum_{r=0}^n a_r (-x)^{n-r} = \sum_{r=0}^n (-1)^{n-r} a_r x^{n-r} = 0 \text{ إذن } x = -y \text{ أو } y = -x$$

٢- المعادلة التي جذورها تساوي مضاعفات جذور المعادلة (1). نفرض

$$x = \frac{y}{m} \text{ أو } y = m x \text{ أن}$$

$$\begin{aligned} \therefore f\left(\frac{y}{n}\right) &= \sum_{r=0}^n a_r \left(\frac{y}{n}\right)^{n-r} = \sum_{r=0}^n m^{r-n} a_r y^{n-r} \\ &= a_0 y^n + m a_1 y^{n-1} + m^2 a_2 y^{n-2} + \dots + m^n a_n = 0 \end{aligned}$$

٣- المعادلة التي جذورها تساوي مقلوبات جذور المعادلة (1) نحصل عليها

$$\text{بالتعويض } x = \frac{1}{y} \text{ أو } y = \frac{1}{x} \text{ إذن}$$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{y}\right) &= \sum_{r=0}^n a_r \left(\frac{1}{y}\right)^{n-r} = \sum_{r=0}^n a_r y^{r-n} \\ &= a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \dots + a_{n-1} y^{n-1} + a_n y^n = 0 \end{aligned}$$

٤- المعادلة التي جذورها تقل بمقدار h عن جذور المعادلة (1) نحصل عليها

بالتعويض  $y = x - h$  أي كتابة المعادلة (1) بدلالة قوى  $x-h$  كما سبق أن عرفناه

$$f(x) = b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n = 0 \text{ باستخدام طريقة هورنر على الصورة}$$

حيث  $b_0, b_1, \dots, b_n$  نحصل عليها بقسمة  $f(x)$  في (1) على  $x-h$  عدد n من

المرات بطريقة هورنر (انظر مثال (٥) في (١.٤)).

٥- التحويل الموجود في (4) يستخدم في حذف الحد الثاني (معامل  $x^{n-1}$  يساوي

صفر) من المعادلة  $f(x) = 0$  وذلك بوضع  $x = y + h$  تصبح المعادلة على الصورة

$$\sum_{i=0}^n a_i (y+h)^{n-i} = 0$$

لحذف الحد الثاني أي نضع  $y^{n-1}$  يساوي صفراً بعد فك الحدود والتجميع نجد أن

$$\therefore h = -\frac{a_1}{n a_0} \text{ ، معامل } y^{n-1} \text{ هو } a_1 + n h a_0 = 0$$

إذن المعادلة الخالية من الحد الثاني هي المعادلة التي جذورها تقل بمقدار  $-\frac{a_1}{n a_0}$  عن جذور المعادلة الأصلية.

مثال (٥): احذف الحد الثاني من المعادلة  $x^3 + 6x^2 - 7x - 4 = 0$

الحل: يجب إنقاص جذور المعادلة المعطاة بمقدار

$$h = -\frac{a_1}{n a_0}, n=3, a_1=6, h=-2$$

وباتباع طريقة هورنر أي بالقسمة على  $(-2)$   $x+2 = x$  ثلاث مرات ونحصل على

$$x^3 - 11x + 26 = 0$$
 المعادلة المطلوبة

مثال (٦): احذف الحد الثاني من المعادلة  $x^4 - 8x^3 + x^2 - x + 3 = 0$

الحل: لحذف الحد الثاني من المعادلة المعطاة يكافئ الحصول على معادلة جذورها

تنقص بمقدار  $h = -\frac{a_1}{n a_0} = 2$ ، أي بقسمة المعادلة المعطاة على المقدار  $x-2$  أربع

$$x^4 - 23x^2 - 61x - 43 = 0$$
 مرات بطريقة هورنر ونحصل على

(٣.٧) حل معادلات الدرجة الثالثة : Cubic equation

نعتبر معادلة الدرجة الثالثة العامة  $a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 = 0$

طريقة كاردان Cardan's method: تتلخص طريقة كاردان في حل

معادلات الدرجة الثالثة في التالي

(i) نجعل معامل أكبر أس هو الوحدة وذلك بالقسمة على  $a_0$  حيث أنها لا تساوي

الصفر ومن ثم نحصل على المعادلة

$$x^3 + b_1 x^2 + b_2 x + b_3 = 0 \quad (1)$$

نلاشي الحد الثاني من هذه المعادلة وذلك بتكوين المعادلة ذات الدرجة الثالثة التي جذورها تنقص بمقدار  $\frac{b_1}{3}$  عن جذور المعادلة الأصلية (1) وبمعنى آخر نكون

$$x_1 - \frac{b_1}{3}, x_2 - \frac{b_1}{3}, x_3 - \frac{b_1}{3}$$
 هي جذورها هي

حيث  $x_3, x_2, x_1$  هي جذور المعادلة (1) — وهذا نحصل عليه باستخدام طريقة هورنر المعروفة.

نفرض أن المعادلة التي حصلنا عليها هي

$$y^3 + p y + q = 0 \quad (2)$$

(ii) نستخدم التعويض  $y = L + m$  وبالتكعيب نحصل على

$$\begin{aligned} y^3 &= L^3 + 3L^2 m + 3L m^2 + m^3 \\ &= L^3 + m^3 + 3L m (L + m) = (L^3 + m^3) + 3L m y \end{aligned}$$

أي أن

$$y^3 - 3L m y - (L^3 + m^3) = 0 \quad (3)$$

بمقارنة المعادلات (2), (3) نحصل على

$$p = -3L m \quad (4)$$

$$q = -(L^3 + m^3) \quad (5)$$

$$\text{من (4) نجد أن } L = -\frac{p}{3m} \text{ أو ما يكافئ } L^3 = -\frac{p^3}{27m^3}$$

$$\text{بالتعويض في (5) نحصل على } -q = L^3 - \frac{p^3}{27L^3} \text{ أو ما يكافئ } -qL^3 = L^6 - \frac{p^3}{27}$$

بوضع  $s = L^3$  نحصل على :

$$s^2 + q s - \frac{p^3}{27} = 0 \quad (6)$$

وهذه معادلة من الدرجة الثانية في  $s$  جذورها تعطى بالعلاقات الآتية :

$$s = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}, \quad = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}$$

أي أن

$$s_1 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}, \quad s_2 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}$$

وإذا اعتبرنا الجذور التكعيبية لهذه القيم نحصل على ثلاث قيم جذرية للجذر  $s_1$

هي  $L_1, L_2, L_3$

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

وثلاث قيم جذرية للجذر الثاني  $m_1, m_2, m_3$

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

ومن ثم تكون جذور المعادلة (2) في الصورة  $L_i + m_j$ ,  $i, j=1, 2, 3$

ويكون اختيارنا للقيم  $L_i, m_j$  بحيث تحقق العلاقة (4) أي حاصل الضرب

$L_i m_j$  يساوي  $-\frac{p}{3}$  وهذا يمكن إيجاده بسهولة.

(iii) وأخيراً إذا كانت  $y_1, y_2, y_3$  هي جذور المعادلة (2) فإن جذور المعادلة (1)

$$\text{هي } y_1 - \frac{b_1}{3}, y_2 - \frac{b_1}{3}, y_3 - \frac{b_1}{3}$$

مثال (١): أوجد جذور المعادلة  $x^3 + 3x^2 - 6x + 20 = 0$

الحل: باستخدام طريقة هورنر يمكننا الحصول على مفكوك لكثيرة الحدود هذه

بدلالة الفرق  $x-1$  كالآتي :

	1	3	-6	20
-1	1	2	-8	25
	1	1	-9	
	1	0		
	1			

$$b_1 = 3$$

وتكون المعادلة هي  $y^3 - 9y + 28 = 0$  حيث  $p = -9, q = 28$

نكون المقدارين

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} = \sqrt[3]{-14 + \sqrt{196 - 27}} = \sqrt[3]{-1}$$

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} = \sqrt[3]{-14 + \sqrt{196 - 27}} = \sqrt[3]{-27} = 3\sqrt[3]{-1}$$

جذور المتدار الأول هي  $-1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

والجذور المناظرة للمقدار الثاني هي  $-3, \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$

والجذور المناظرة التي حاصل ضربها يساوي 3 هي  $-1, -3$

$$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$$

$$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$$

أي أن جذور المعادلة  $y^3 - 9y + 28 = 0$  هي  $-4, 2 - \sqrt{3}i, 2 + \sqrt{3}i$

ومن ثم فإن جذور المعادلة المعطاة تكون  $-5, 1 - \sqrt{3}i, 1 + \sqrt{3}i$

مثال (٢) : أوجد جذور المعادلة  $x^3 - 3x - 2i = 0$

الحل: في هذه المعادلة نلاحظ أن الحد الثاني الذي يحتوي  $x^2$  أساساً غير موجود —

كما نلاحظ أن  $p = 3, q = -2i$

$$\therefore \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 = i^2 + 1 = 0$$

ومن ثم فإن جذور المعادلة هي  $i, i, -2i$

إذا كانت معاملات المعادلة المعطاة من الدرجة الثالثة جميعها حقيقية يمكننا

الحصول على جذور هذه المعادلة دون اللجوء إلى استخدام صيغ كاردان كالآتي:

(حالات خاصة):

$$D = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 < 0$$

فإن جميع جذور المعادلة  $y^3 + py + q = 0$  حقيقية وتعطى من العلاقة الآتية :

$$y_k = 2\sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \frac{\phi + 2\pi k}{3}, \quad k=1, 2, 3$$

$$\cos \phi = -\frac{q}{2} \sqrt{-\left(\frac{3}{p}\right)^3}$$

حيث  $\phi$  تعطى من العلاقة

مثال (٣) : أوجد جذور المعادلة  $y^3 - 3y + 1 = 0$

الحل: نلاحظ هنا أن  $D = \frac{1}{4} - 1 < 0$ ، إذن  $\cos \phi = -\frac{1}{2} \sqrt{1} = -\frac{1}{2}$  أي أن  $\phi = \frac{2}{3}\pi$

ومن ثم فإن الجذور هي  $y_k = 2 \cos \frac{\frac{2}{3}\pi + 2k\pi}{3}, k=1, 2, 3$  أي

$$y_1 = 2 \cos 160^\circ \cong -1,880, y_2 = 2 \cos 280^\circ \cong 0,348,$$

$$y_3 = 2 \cos 40^\circ \cong 1,532$$

الحالة الثانية: إذا كان  $D > 0$  فإن للمعادلة  $y^3 + py + q = 0$  يكون جذور

حقيقي واحد وجذران مترافقان. وهذه الجذور تعطى بالعلاقات الآتية :

$$y_1 = -\frac{2\sqrt{\frac{p}{3}}}{\sin 2\phi}, y_{2,3} = \frac{\sqrt{\frac{p}{3}}}{\sin 2\phi} + i\sqrt{-p} \cotan 2\phi$$

$$\tan \rho = \sqrt[3]{\tan \frac{w}{2}}, \sin w = \frac{2}{q} \sqrt{-\left(\frac{p}{3}\right)^3} \text{ حيث}$$

وذلك إذا كانت  $p < q$ ,

$$y_1 = -2\sqrt{\frac{p}{3}} \cotan 2\phi, y_2 = \sqrt{\frac{p}{3}} \cotan 2\phi \pm \frac{i\sqrt{p}}{\sin 2\phi}$$

$$p > 0 \text{ حيث } \tan \phi = \sqrt[3]{\tan \frac{w}{2}}, \tan w = \frac{2}{q} \sqrt{\left(\frac{p}{3}\right)^3}$$

مثال (٤) : حل المعادلة  $y^3 - 9y + 12 = 0$

$$D = 36 - 27 > 0, p = -9 < 0 \text{ الحل :}$$

ومن ثم نجد أن :

$$\sin w = \frac{2}{12} \sqrt{33} = \frac{\sqrt{3}}{2}, w = 60^\circ$$

$$\tan \phi = \sqrt[3]{\tan 30^\circ} \cong 0,833, \phi \cong 39^\circ 50'$$

$$\sin 2\phi \cong 0,984, \cotan 2\phi \cong 0,182$$

أي أن :

$$y_1 \cong -\frac{2\sqrt{3}}{0,984} \cong -3,52, y_{2,3} \cong \frac{\sqrt{3}}{0,984} \pm i.3.0,182 \cong 1,76 \pm 0,546i$$

والحالة الثالثة: إذا كانت  $D=0$  فإن للمعادلة المعطاة تكون جميع الجذور

حقيقية بحيث يكون جذران منهم منطبقان.

### ٤.٧) حل معادلات الدرجة الرابعة Bi-quadratic equation

اعتبر المعادلة من الدرجة الرابعة

$$x^4 + b_1 x^3 + b_2 x^2 + b_3 x + b_4 = 0 \quad (1)$$

وذلك بعد القسمة على معامل  $x^4$ .

طريقة فيراري Ferrari's method: لحل معادلات من الدرجة الرابعة

تتلخص في الآتي :

نكتب المعادلة (1) في الصورة  $x^4 + b_1 x^3 = -(b_2 x^2 + b_3 x + b_4)$

ندخل العدد  $m$  على طرفي هذه العلاقة كالتالي :

$$\begin{aligned} \left(x^2 + \frac{b_1}{2}x + m\right)^2 &= -(b_2 x^2 + b_3 x + b_4) + \frac{b_1^2}{4}x^2 + \\ &+ 2x^2 m + b_1 x m + m^2 \\ &= \left(2m - b_2 + \frac{b_1^2}{4}\right)x^2 + (b_1 m - b_3)x + m^2 - b_4 \\ &= a^2 x^2 + 2 a b x + b^2 = (a x + b)^2 \end{aligned} \quad (2)$$

حيث

$$\left. \begin{aligned} a^2 &= 2m - b_2 + \frac{b_1^2}{4}, \\ b^2 &= m^2 - b_4, \quad 2ab = b_1 m - b_3 \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

من المعادلات (3) نظراً لأن  $(ab)^2 = a^2 b^2$  نحصل على

$$\frac{1}{4}(b_1 m - b_3)^2 = \left(2m - b_2 + \frac{b_1^2}{4}\right)(m^2 - b_4) \quad (4)$$

ولكن بالنظر إلى هذه المعادلة نلاحظ أنها معادلة من الدرجة الثالثة في  $m$  في وذلك باعتبار أن  $b_1, b_2, b_3$  ثوابت — وبمكنا الحصول على حل هذه المعادلة باستخدام طريقة كاردان أو بأي طريقة أخرى ثم بالتعويض عن قيمة أي جذر من جذور هذه المعادلة في (3) نحصل على قيم  $a, b$  المناظرة.

ثم أخيراً بالتعويض عن قيم  $a, b$  في المعادلة (2) بعد أخذ الجذر التربيعي للطرفين نحصل على معادلتين كل منهما من الدرجة الثانية في  $x$ .  
بحل كل معادلة على حده نحصل على جذرين لها — مجموعة هذه الجذور الأربعة تمثل جذور المعادلة المعطاة (1).

مثال (١) : حل المعادلة الآتية  $x^4 + 4x^3 - 6x^2 + 20x + 8 = 0$

الحل : نضع المعادلة المعطاة في الصورة  $x^4 + 4x^3 = 6x^2 - 20x - 8$

$$(m + x^2 + 2x)^3 = 6x^2 - 20x - 8 + 4x^2 + 2mx^2 + 4mx^2 + m^2$$

$$= 10x^2 + 2mx^2 - 20x + 4mx + m^2 -$$

$$= 2(5+m)x^2 - 4(m-5)x + m^2 - 8$$

$$= a^2x^2 + 2abx + b^2$$

$$a^2 = 2(5+m), b^2 = m^2 - 8, 2ab = -4(m-5)$$
 أي أن

$$(5+m)(m^2 - 8) = 2(m-5)^2$$
 ومنها نحصل على

$$m^3 + 3m^2 + 12m - 90 = 0$$
 أي أن (\*)

والآن لحل هذه المعادلة من الدرجة الثالثة نلاحظ أن الحد المطلق يساوي حاصل ضرب الجذور الثلاثة. فمثلاً العامل 3 هو أحد عوامل العدد 90- لذلك نختبر الجذر

3 بالنسبة لهذه المعادلة فنجد أن

	1	3	12	-90
3	1	6	30	0

أي أن العدد 3 هو جذر للمعادلة (\*) ومن ثم بالتعويض عن قيمة هذا الجذر في

$$\text{المعادلة } (x^2 + 2x + m)^2 = 2(5+m)x^2 - 4(m-5)x + m^2 - 8$$

$$\text{نحصل على } (x^2 + 2x + 3)^2 = 16x^2 + 8x + 1 = (4x + 1)^2$$

$$\text{ومن هنا نحصل على } x^2 + 2x + 3 = 4x + 1, x^2 + 2x + 3 = -4x - 1$$

$$\text{أي أن } x^2 - 2x + 2 = 0, x^2 + 6x + 4 = 0$$

بحل هذه المعادلات من الدرجة الثانية نحصل على الجذور الأربعة للمعادلة المعطاة

$$\text{وهي } x_{1,2} = 1 \pm i, x_{2,3} = -3 \pm \sqrt{5}$$

مثال (٢): أوجد جذور المعادلة  $x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24 = 0$  بطريقة

فراري.

$$\text{الحل: من المعادلة المعطاة نحصل على } x^4 - 10x^3 = -35x^2 + 50x - 24$$

بإكمال المربع نجد أن

$$(x^2 - 5x)^2 = -10x^2 + 50x - 24 \quad (1)$$

$$\text{أو } (x^2 - 5x + \lambda)^2 = (x^2 - 5x)^2 + 2\lambda(x^2 - 5x) + \lambda^2$$

ومن (1) نحصل على

$$(x^2 - 5x + \lambda)^2 = (2\lambda - 10)x^2 + (50 - 10\lambda)x + \lambda^2 - 24 \quad (2)$$

نختار  $\lambda$  بحيث يكون الطرف الأيمن في (2) مقدار مربع أي المميز للطرف الأيمن

يساوي صفر، إذن

$$(50 - 10\lambda)^2 - 4(2\lambda - 10)(\lambda^2 - 24) = 0 \quad (*)$$

واضح أن  $\lambda = 5$  أحد جذور المعادلة (\*).

بوضع  $\lambda = 5$  في (2) نحصل على  $(x^2 - 5x + 5)^2 = 1$

إذن  $x^2 - 5x + 5 = \pm 1$  أو ما يكافئ  $x^2 - 5x + 6 = 0$  or  $x^2 - 5x + 4 = 0$

والجذور هي 1, 4, 2, 3.

مثال (٣): أوجد جذور المعادلة  $2x^4 + 6x^3 - 3x^2 + 2 = 0$  بطريقة فراري.

الحل: المعادلة المعطاة تأخذ الصورة

$$x^4 + 3x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 0x + 1 = 0 \quad (1)$$

بضرب جذور المعادلة (1) في 2 أي بضرب حدود المعادلة (1) في المقادير

$$x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 0x + 16 = 0 \text{ نحصل على } 1, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4$$

$$\therefore x^4 + 6x^3 = 6x^2 - 16 \quad (2)$$

نضع الطرف الأيسر في صورة مقدار مربع أي  $x^2 + 16x^3 + 9x^2 = 15x^2 - 16$

$$\text{أو } (x^2 + 3x)^2 = 15x^2 - 16$$

إذن

$$(x^2 + 3x + \lambda)^2 = (15 + 2\lambda)x^2 + 6\lambda x + \lambda^2 - 16 \quad (3)$$

نختار  $\lambda$  بحيث يكون الطرف الأيمن في (3) مربع تام أي أن مميز الطرف الأيمن

يساوي صفراً.

$$\text{إذن } \lambda^3 + 3\lambda^2 - 16\lambda - 120 = 0 \text{ أو } 36\lambda^2 - 4(15 + 2\lambda)(\lambda^2 - 16) = 0$$

واضح أن  $\lambda = 5$  جذر لها، بوضع  $\lambda = 5$  في (3) نحصل على

$$(x^2 + 3x + 5)^2 = (5x + 3)^2$$

أو  $x^2 + 3x + 5 = \pm(5x + 3)$  والجذور هي  $-2 \pm \sqrt{2}$ ،  $\frac{1}{2}(1 \pm i)$

ملاحظة: دائماً نختار جذور للمميز بحيث يساوي صفراً.

هذا الجذر نحصل عليه بالتخمين العلمي Scientific Guess أي أن  $\lambda$  هي أحد عوامل الحد المطلق في شرط المميز يساوي صفراً.

ولهذا نفرض بعض النتائج الهامة للتخمين عن جذر :-

١- إذا كانت جذور المعادلة  $f(x) = 0$  جميعها حقيقية فإن المعاملات  $a_i$  يجب أن تكون مترددة الإشارة (موجب - سالب) وإذا كانت الجذور جميعها سالبة فإن المعاملات يجب أن تكون جميعها موجبة.

٢- من العلاقة  $\sigma_n = (-1)^n a_n$  نستنتج أن أي جذر صحيح للمعادلة  $f(x) = 0$  والتي جميع معاملاتها أعداد صحيحة ومعامل  $x^n$  فيها الوحدة. يكون عاملاً من عوامل الحد المطلق  $a_n$  أي أن  $a_n$  يقبل القسمة على كل جذر من جذور المعادلة بدون باقي.

مثال (٤): أوجد جذور المعادلة  $x^4 - x^2 - 4x - 4 = 0$ .

الحل: حيث أن  $a_n = 4$  فإن بعض الجذور تقع داخل المجموعة  $\{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}$  فمثلاً  $x=2$  يحقق المعادلة المعطاة وبالتالي فهو جذر. بالقسمة على  $x-2$  نحصل على معادلة من الدرجة الثالثة حدها المطلق يساوي 2 على الصورة

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = 0$$

إذن بعض جذورها ينتمي إلى المجموعة  $\{\pm 1, \pm 2\}$ . واضح أن  $x=-1$  جذر لها بالقسمة على  $x+1$  نحصل على  $x^2 + x + 2 = 0$  وجذورها  $(-1 \pm \sqrt{7}i)$  وبالتالي

جذور المعادلة المعطاة هي  $-1, 2, (-1 + \sqrt{7}i)/2$

### تمارين (٧)

(١) استخدم طريقة هورنر في حساب  $f(x_0)$  عند النقطة  $x_0$  المبينة

(i)  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 10x + 16$  ,  $x_0 = 4$

(ii)  $f(x) = x^5 + (1+2i)x^4 - (1+3i)x^2 + 7$  ,  $x_0 = -2 - i$

(٢) استخدم طريقة هورنر في الحصول على مفكوكات كثيرات الحدود الآتية بدلالة قوى  $(x - x_0)$ .

(i)  $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 1$  ,  $x_0 = -1$

(ii)  $f(x) = x^5$  ,  $x_0 = 1$

(iii)  $f(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 50x + 90$  ,  $x_0 = 2$

(vi)  $f(x) = x^4 + 2ix^3 - (1+i)x^2 - 3x + 7 + 7 + i$  ,  $x_0 = -i$

(v)  $f(x) = x^4 + (3-8i)x^3 - (21-18i)x^2 - (33-20i)x + 7 + 18i$ ,  
 $x_0 = 1 - 2i$

(٣) باستخدام طريقة هورنر في الحصول على الكسور الجزئية للكسرين الآتيين

a)  $\frac{x^3 - x + 1}{(x-2)^5}$  ,

b)  $\frac{x^4 - 2x^2 + 3}{(x+1)^5}$

(٤) استخدم طريقة هورنر (بطريقة عكسية) في الحصول على مفكوك السدوال الآتية بدلالة قوى  $x$  التصاعديّة

a)  $(x+3)^4 - (x+3)^3 + 1$  ,

b)  $(x-2)^4 + 4(x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 10(x-2) + 20$

(٥) أوجد قيم كثيرات الحدود الآتية ومشتقاتها الممكنة عند النقطة  $x = x_0$

a)  $f(x) = x^5 - 4x^3 + 6x^2 - 8x + 10$  ,  $x_0 = 2$

b)  $f(x) = x^4 - 3ix^3 - 4x^2 + 5ix - 1, x_0 = 1 + 2i$

(٦) ما هو عدد تكرار الجذور المعطاة لكثيرات الحدود المناظرة

(i) الجذر 2 لكثيرة الحدود  $x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8$

(ii) الجذر -2 لكثيرة الحدود  $x^5 + 7x^4 + 16x^3 + 8x^2 - 16x - 16$

(٧) عين قيمة a التي تجعل لكثيرة الحدود  $x^5 - ax^2 - ax + 1$  الجذر -1 مكرر

ليس أقل من مرتين.

(٨) عين قيمة A, B التي تجعل لكثيرة الحدود  $Ax^4 + Bx^3 + 1$  تقبل القسمة

بدون باق على  $(x-1)^2$ .

٩— عين قيم A, B التي تجعل لكثيرة الحدود  $Ax^{n+1} + Bx^n + 1$  تقبل القسمة

على  $(x-2)^2$  بدون باق.

(١٠) أثبت أن الشرط الضروري والكافي لكي تقبل لكثيرة الحدود

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

على المقدار  $(x-1)^{k+1}$  هو

$$a_0 + a_1 + \dots + a_n = 0, \quad a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = 0$$

$$a_1 + 4a_2 + \dots + n^2 a_n = 0, \quad a_1 + 2^k a_2 + \dots + n^k a_n = 0$$

١٢— عين عن طريقة الاختبار لكثيرات الحدود  $M_1(x), M_2(x)$  التي تحقق

$$f_1(x)M_1(x) + f_2(x)M_2(x) = 1$$
 حيث  $f_1, f_2$  تعطى من

(i)  $f_1(x) = 3x^3 - 2x^2 + x + 2, f_2(x) = x^2 - x + 1$

(ii)  $f_1(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, f_2(x) = x^2 - x - 1$

(iii)  $f_1(x) = x^5 - 5x^4 - 2x^3 + 12x^2 - 2x + 12,$

$$f_2(x) = x^3 - 5x^2 - 3x + 17$$

(iv)  $f_1(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 5x + 2, f_2(x) = 2x^3 + x^2 - x - 1$

(v)  $f_1(x) = 3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 2x + 1$  ,  $f_2(x) = 3x^3 - 2x^2 + x$

(vi)  $f_1(x) = x^5 + 5x^4 + 9x^3 + 7x^2 + 5x + 1$

$f_2(x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x + 1$

(١٢) حل المعادلات الآتية :

(i)  $x^3 - 6x + 9 = 0$  ,

(v)  $x^3 + 18x + 5 = 0$  ,

(ii)  $x^3 + 12x + 63 = 0$  ,

(vi)  $x^3 + 9x - 26 = 0$  ,

(iii)  $x^3 - 6x + 4 = 0$

(vii)  $x^3 + 45x - 38 = 0$  ,

(iv)  $x^3 + 6x + 2 = 0$  ,

(x)  $x^3 + 24x - 50 = 0$  ,

(١٣) حل المعادلات الآتية :

(i)  $x^3 + 9x^2 + 18x + 28 = 0$  , (ii)  $x^3 + 6x^2 + 30x + 28 = 0$  ,

(iii)  $x^3 + 3x^2 + 6x + 4 = 0$  , (iv)  $x^3 + 3x^2 - 3x - 1 = 0$  ,

(v)  $x^3 - 6x^2 + 57x - 196 = 0$  , (vi)  $x^3 - 3x^2 - 3x + 11 = 0$  ,

(١٤) حل المعادلات الآتية :

(i)  $x^3 + 3x - 2i = 0$  , (ii)  $x^3 - 61x + 4(1-i) = 0$  ,

(iii)  $x^3 - 3abfgx + f^2ga^3 + fg^2b^3 = 0$

(١٥) أثبت أن  $(x_1 - x_2)^2 (x_1 - x_3)^2 (x_2 - x_3)^2 = -4p^2 - 27q^2$

حيث  $x_1, x_2, x_3$  هي جذور المعادلة  $x^3 + px + q = 0$

(١٦) حل المعادلات الآتية:

(i)  $x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 4x - 8 = 0$  (ii)  $x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 6x - 13 = 0$

(iii)  $x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 2 = 0$  (iv)  $x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 2x - 1 = 0$

(v)  $x^4 - 3x^3 + x^2 + 4x - 6 = 0$  (vi)  $x^4 - 6x^3 + 6x^2 + 27x - 55 = 0$

(vii)  $x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 2x + 3 = 0$  (viii)  $x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x - 10 = 0$

(ix)  $x^4 + 2x^3 + 8x^2 + 2x + 7 = 0$

(١٧) أوجد قيم  $a, b$  بحيث يكون  $x-1, x-3$  عوامل لكثيرة الحدود

$$f(x) = 2x^4 - 7x^3 + ax + b$$

(١٨) إذا كان  $ax^3 + bx + c$  لها عامل في الصورة  $x^2 + kx + 1$  بين أن

$$a^2 - c^2 = ab$$

(١٩) إذا كانت  $1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$  جذور للمعادلة  $x^n - 1 = 0$  فأثبت أن

$$(1 - \alpha_1)(1 - \alpha_2) \dots (1 - \alpha_{n-1}) = n$$

(٢٠) كون معادلة ذات أقل درجة لها معاملات قياسية إذا كان أحد جذورها

$$\sqrt{2} + \sqrt{5}$$

(٢١) أوجد جذور المعادلة  $x^4 + 5x^3 - 30x^2 - 40x + 64 = 0$  إذا علم أن

جذورها في توالي هندسي.

(٢٢) أوجد جذور المعادلة  $x^4 + 2x^3 - 21x^2 - 22x + 4 = 0$  إذا علم أن

جذورها في توالي عددي.

(٢٣) أوجد شرط أن تكون جذور المعادلة  $x^3 - ax^2 + p = 0$  في توالي عددي.

(٢٤) أوجد شرط أن تكون جذور المعادلة  $px^3 + qx^2 + rx + 5 = 0$  في توالي

هندسي.

(٢٥) حول المعادلة  $ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d = 0$  إلى معادلة أخرى فيها معامل

$$x^2$$
 يساوي صفر.

(٢٦) أوجد جذور المعادلة  $16x^4 - 8x + 3 = 0$  إذا علم أن لها جذران متساويان.

(٢٧) أوجد المعادلة التي جذورها تقل بمقدار 2 عن جذور المعادلة

$$x^4 - 3x^2 + 6x - 8 = 0$$