

حرف (ر)

- رَأْبُ : إصلاح، ترميم.
- رَأْبُ الإِحْلِيل : جراحة ترميمية تجري على الإحليل لعلاج الجروح، أو التشوهات.
- رَأْبُ الأَذُن : جراحة ترميمية للأذن الخارجية لإصلاح خلل، أو تشوه.
- رَأْبُ الأَفْتِيَةِ اللِّعَابِيَةِ : جراحة ترميمية للأفتية اللعابية.
- رَأْبُ أَمِّ الدَّم : ترقيع داخلي لأم الدم، جراحة لعلاج جذري لأم الدم حيث يفتح كيس أم الدم ويستفزع محتواه وتغلق الفتحة الداخلية بخيوط مستمرة.
- رَأْبُ الأنْف : التصليح الجراحي لتشوه في الأنف ناتج عن جرح، أو مرض، أو خلل خلقي.
- رَأْبُ البُلْعُوم : جراحة ترميمية للبلعوم.
- رَأْبُ السَّبَوَائِب : توسيع البواب الضيق مرضياً، أو القناة التشنجية البوابية بواسطة جراحة ترميمية، عادة من خلال شق طولي يخاط عرضياً ويقرن أحياناً بإزالة قرحة.
- رَأْبُ السَّبُوق : جراحة ترميمية تجري على بوق الرحم.
- رَأْبُ الثَّدْي : استخدام الجراحة الترميمية في آفات أو تشوهات الثدي.
- رَأْبُ الثَّرْب : استعمال بقع من الثرب كطعم لتقوية خطوط القطب بعد تفاقر أعضاء بطينية مجوفة أو لتقوية خطوط الإغلاق بعد تصليح قرحة ثاقبة.
- رَأْبُ الجَافِيَةِ : جراحة ترميمية في الأم الجافية.
- رَأْبُ الجَفْن : جراحة ترميمية لتصليح، أو تشكيل جفن، أو أي جزء منه.
- رَأْبُ الحَالِب : جراحة ترميمية على الحالب خاصة لإزالة تضيق.
- رَأْبُ الحَالِبِ والحَوِيضَةِ : جراحة ترميمية في الحالب وحويضة الكلوة.
- رَأْبُ الحَقِّ : جراحة ترميمية في الحق.
- رَأْبُ الحَنْجَرَةِ : جراحة ترميمية لإصلاح خلل في الحنجرة.
- رَأْبُ الحَنَك : جراحة ترميمية للحنك.
- رَأْبُ الحَوِيضَةِ : جراحة ترميمية في حويضة الكلوة.
- رَأْبُ الخَصِيَةِ : جراحة ترميمية في الخصية.
- رَأْبُ الدهليز : جراحة ترميمية لأي دهليز.
- رَأْبُ الرِّبَاط : جراحة ترميمية لأي رباط.
- رَأْبُ الرَّحِم : جراحة ترميمية في الرحم.
- رَأْبُ الرُّغَامِي : جراحة ترميمية في الرغامى.
- رَأْبُ الرَّقَبَةِ : جراحة ترميمية في الرقبة.
- رَأْبُ الرِّكَاب : جراحة ترميمية في ركاب الأذن.
- رَأْبُ السِّنَخ : جراحة ترميمية في السنخ.
- رَأْبُ الشَّرِيَان : جراحة الشريان الترميمية، طريقة علاج في بعض حالات أم الدم الأساسية حيث تشكل جدران الكيس إلى أوعية جديدة، رفو أم الدم الداخلي.
- رَأْبُ صَدْرِي : جراحة ترميمية لتأمين هبوط دائم للثدي في حالات السل الرئوي المزمن المترافق مع

رَأْبُ الْقَرْحِيَّةِ : جراحة ترميمية للقرحجية وإزاحة كيسة بالذات.

رَأْبُ قَنَاة الصَّفراء : أي جراحة ترميمية على قَنَاة الصَّفراء؛ مثلاً جراحة ناصور صفراوي
رَأْبُ اللُّثَّة : جراحة لترميم حافة اللثة.

رَأْبُ اللِّحَاط : جراحة ترميمية في لحاظ الجفن.

رَأْبُ اللِّفَافَةِ : جراحة ترميمية على اللفافة.

رَأْبُ اللِّهَاءَةِ : جراحة ترميمية في اللهاة والحلق الرخو.

رَأْبُ المَبْيَض : جراحة ترميمية في المبيض.

رَأْبُ المَثَانَةِ : أي جراحة لترميم أو تصليح المثانة.

رَأْبُ المَثَانَةِ بِاللِّفَافَةِ : جراحة ترميمية للمثانة باستعمال قطعة من اللفانفي.

رَأْبُ المَحْفَظَةِ : جراحة ترميمية لمحفظة مفصل.

رَأْبُ المُدَوَّر : إزالة وإعادة تثبيت المدور الكبير كجزء من عملية ترميمية لنهاية الفخذ العلوية.

رَأْبُ المَرِيءِ : جراحة ترميمية لأي جزء أو تشوه في المريء، وتوسع فتحة الفؤاد.

رَأْبُ المُسْتَقِيم : جراحة ترميمية في المستقيم والشرج.

رَأْبُ المَصْنَرَةِ : جراحة ترميمية لأي مصرة عضلية.

رَأْبُ المَعِدَةِ : جراحة ترميمية لأي خلل، أو تشوه في المعدة.

التصاقات وفي بعض الأمراض الرئوية الأخرى، وتكون من استئصال كلي، أو جزئي لعدد من الأضلاع مما يؤدي إلى هبوط جدار الصدر وإلغاء التجويف البلوري ويمكن تسميتها حسب موقعها في القمة، أو القص الأمامي، أو الخلفي...الخ.

رَأْبُ الصَّفَنِ : جراحة ترميمية في الصفن.

رَأْبُ الصَّلْبَةِ : ترميم الصلبة جراحياً.

رَأْبُ الصَّمَام : جراحة ترميمية في الصمام أو الصمامات خاصة في أحد صمامات القلب.

رَأْبُ الطَّبَكَةِ : جراحة ترميمية في التجويف الطبلي والخشاء وتشمل إعادة بناء آليات السمع.

رَأْبُ العِجَان : جراحة ترميمية في العجان.

رَأْبُ العَصَب : جراحة ترميمية لعصب، أو الأعصاب.

رَأْبُ عَضَلِي : جراحة ترميمية في أنسجة العضل.

رَأْبُ العَظْم : جراحة ترميمية في العظم.

رَأْبُ عُنُقِ الرَّحِم : جراحة ترميمية لعنق الرحم.

رَأْبُ الغُضُرُوف : جراحة ترميمية للغضروف.

رَأْبُ الفَتَق : ترميم جراحي للفتق.

رَأْبُ الفَم : جراحة ترميمية للفم.

رَأْبُ فَمِ السَّبُوق : جراحة يجري فيها فتح فتحة بطنية جديدة في بوق الرحم.

رَأْبُ الفُؤَاد : جراحة ترميمية يجري فيها تحرير تضيق فتحة الفؤاد.

رَأْبُ قُوَّةِ الرَّحِم : جراحة ترميمية لقوَّة الرحم.

رَأْبُ القَرْنِيَّة : جراحة ترميمية لقرنية العين.

رابعة الحَمَلُ : المرأة التي تلد طفلها الرابع، أو التي ولدت أربعة أطفال.

راتين : الراتنج ١- مادة لزجة تخرج من لحاء بعض الأشجار كالصنوبر ونحوه وتكون مختلطة بالصمغ والزيت. ٢- مجموعة من المواد الصلبة ونصف الصلبة ليس لها نقطة غليان محددة ولا تذوب في الماء، ولكن عادة تذوب في الكحول والكلوروفورم والأثير وهي خليط من أحماض الراتنج والكحول والفنول والإسترات ومواد أخرى.

راتين مُبَادِل الشوارد : راتين اصطناعي قابل للتأين وقد يكون حامضياً، أو قاعدياً، ويمكن مبادلة الشوارد غير المستقرة لشوارد أخرى ذات شحنة مشابهة في المحلول، ويمكن بهذه الطريقة يمكن إزالة الأملاح اللاعضوية من المحلول كلياً، وتستخدم هذه الخاصية في تحضير مياه الشرب من مياه البحر بدون تقطير، وتعرف الراتينات التي تمتص الجذور الحمضية السالبة من المحلول كراتينات مبادلة للصواعد، ويمكن لهذه الشوارد مثلاً أن تربط حمض الهيدروكلوريك والبيسين في المعدة، وأن تحررها مرة أخرى في الوسط القاعدي للأمعاء الدقيقة وتستخدم هذه الحقيقة في علاج فرط الحموضة، وتزيل الراتينات المبادلة للهوابط الشوارد المعدنية والجذور الموجبة من المحلول نتيجة وجود مجموعات COOH، أو الـ SO₂-OH على سطح الراتين. والراتينات الكربوكسيلين تربط الصواعد على جميع مستويات الباهاء فوق ٥ وراتينات السلفونيك تربط الصواعد حتى درجة الباهاء ٣.

رَأَبُ المِفْصَل : جراحة لترميم الجزء الوظيفي لمفصل إما بالتصليح أو بزرع مفصل صناعي.

رَأَبُ المِفْصَل الحرقفي : تثبيت خارج المفصل للحوض بواسطة طعم عظمي يمر من العظم الحرقفي إلى المدور الكبير.

رَأَبُ المُنْتَحمة : جراحة ترميمية للمنتحمة.

رَأَبُ من الذات : ترميم عضو، أو جزء مريض، أو مجروح بمادة مأخوذة من موضع آخر في نفس الجسم، التطعيم الذاتي.

رَأَبُ المِهْبِل : جراحة ترميمية في المهبل.

رَأَبُ المِهْبِل والمثانة : جراحة ترميمية لإصلاح جدار المهبل والمثانة.

رَأَبُ المِهْبِل والعجان : جراحة ترميمية لتصليح وإعادة تشكيل المهبل والعجان.

رَأَبُ الموق : جراحة ترميمية ثقب، الجفن والموق.

رَأَبُ الوتر : جراحة ترميمية على وتر.

رَأَبُ الوجه : أي جراحة ترميمية في الوجه.

رَأَبُ الوريد : جراحة لإصلاح وترميم وريد إذا تعطل، أو جرح.

رَأَبُ الوعاء : جراحة لترميم وعاء دموي مريض، أو مجروح.

رَأَبِي : يتعلق بالرأب، تجميلي.

رَأِبُ : نظام تقليدي للدلالة على وجود اتصال بين الذرات، أو مجموعة من الذرات في معادلة معينة.

رَاجِبِيَّةٌ مَنْفُوخَةٌ : راجبة؛ مؤنث راجب : مفصل أحد الأصابع، سل العظام حيث تتمدد العظمة وترق قشرتها.

رَاجِعٌ : الممرض أو الآفة، يعود إلى الظهور من وقت لآخر.

رَاجِنَةٌ : اصطلاح يستعمل ليشمل المواد المشابهة للمضادات المسؤولة عن تفاعلات الحساسية.

رَاجِنِي : يتعلق بالراجنة، نسبة إليها.

رَاحَةٌ : نقيض التعب، الابتعاد عن الجهد العضلي والنفسي.

رَاحَةُ الْيَدِ : باطن اليد.

رَاحِي : نسبة إلى راحة اليد.

رَادٌّ : وحدة امتصاص الأشعة المؤينة ويساوي ٠,٠١ جول /كغم.

رَادٌّ : الجزء العريض رباعي الأضلاع من الفك السفلي الذي يرتسم أعلى من النهاية الخلفية للجسم خلف الأسنان الخلفية، وهو مسطح من الخارج إلى الداخل ويمثل سطحين إثنيين الوحشي والإنسي وحد خلفي وأمامي وفيه تتفرز كتلة عضلات المضغ.

رَادِفٌ : كان ردفاً له، تابعاً، مساعداً.

رَادِيُوم : عنصر أبيض لامع ذو نشاط إشعاعي عدده الذري ٨٨، يتآكل بالتعرض للهواء ويشبه الكالسيوم في نشاطه الكيماوي، يوجد في البيتبلند (أكسيد الراديوم) والكارنوتيت ومركبات الراديوم، يستمد العنصر من انحلال اليورانيوم لينتج الرادون ثم عدة أملاح من الراديوم ثم الرصاص، يصعب استخلاص الراديوم من خاماته لوجوده فيها بكميات

تافهة، يستخدم لعلاج السرطان وعمل دهانات معدنية مضيئة.

رَأْرَأَةٌ : ١- قلب حدقته وحدد نظره، حرك عينيه وأدارهما. ٢- حالة تبدو العينان فيها أنها تتحرك بطريقة منتظمة نوعاً ما، من جانب إلى آخر ومن فوق لتحت، أو بطريقة دائرية.

رَأْرَأَةٌ بَصْرِيَّةٌ حَرَكِيَّةٌ : رَأْرَأَةٌ ناتجة عن متابعة حركة أشياء متحركة مثلاً بالنظر من نافذة قطار متحرك، أو متابعة العلامة السوداء على ظل دائرة، وتستعمل الأخيرة في الفحوصات السريرية والنفسية.

رَازِي : أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي ٨٦٥-٩٢٥م، طبيب وكيميائي وفيلسوف مسلم، ولد بالري بفارس ودرس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. ظل حجه في الطب حتى القرن السابع عشر، عمل رئيساً لأطباء بيمارستان الري الرسمي، ثم رئيساً للبيمارستان العضدي ببغداد. ألف كثير من الرسائل في شتى الأمراض أشهرها الحاوي، والمنصوري، وهو مبتكر الكحول وإستعمالاته في الطب والخيوط الجراحية وأشياء أخرى كثيرة.

رَازِي : يتعلق بالرأرة، أو يتأثر بها.

رَأْسٌ : ١- جزء من جسم الحيوان يحمل أعضاء الحس والقسم ومدخل جهاز التنفس ويتصل بالجذع مباشرة. ٢- يصف أعلى كل شئ، وأصل كل شئ، مثلاً أصل العضلات.

رَأْسُ الضِّلَعِ : الطرف الخلفي للضلع الذي يتم فصل مع جسم الفقرة الصدرية على الوجه المفصلي.

رَأْسُ الْبَرَبِخْ : الجزء الأعلى المتوسع من البربخ.

رَأْسُ الْفَخْذِ : النهاية العليا النصف دائرية للفخذ، التي تتمفصل مع الحق، وهي ناعمة ماعدا الثلمة المركزية حيث يكون الرباط المدور.

رَأْسُ الشَّظِيَّةِ : الجزء العلوي من الشظية وهي تحمل وجهاً للتمفصل مع القصبة.

رَأْسُ الْعَضُدِ : السطح المدور في النهاية العليا للعضد وتتمفصل مع التجويف الحقي للكتف.

رَأْسُ الْمَدْوَسَةِ : توسع أوردة سطح البطن والسررة حولها مع بروز الأوردة ومنع مرور الدم إلى التجاويف الداخلية تنشأ من انسداد الوريد اليابي، حيث ينشأ دوران رديف من الوريد اليابي إلى الوريد الأجوف السفلي. المدوسة : الحية ذات الشعر من أساطير اليونان.

رَأْسُ الْعِصْلَةِ : اصطلاح يستخدم لوصف أي جزء من أصل العضلة التي لها أكثر من أصل.

رَأْسُ الْمُعْتَكَلَةِ : ذلك الجزء من المعتكلة الذي يقع في عروة العفج.

رَأْسُ الْكُعْبَرَةِ : الجزء الأعلى من الكعبرة والذي يتمفصل مع وابلّة العضد من فوق وإنسياً مع الزند.

رَأْسُ السَّرِكَابِ : ذلك الجزء من الركاب (من عظام الأذن الداخلية) الذي يتمفصل مع العقدة العدسية الشكل لعظمة السندان.

رَأْسُ الْقَعْبِ : الجزء السفلي من القعب الذي يتحد مع جسم القعب بواسطة رقبة والذي يتمفصل مع العظم الزورقي، معلق القعب والرباط القعبي الزورقي راحياً.

رَأْسُ السَّرْنَدِ : الجزء المدور للنهاية السفلى من الزند ويحمل سطحاً مفصلياً سفلياً للقرص المفصلي في مفصل الرسغ وسطح مفصلي هلالتي على الجانبين الأمامي والوحيشي والمحاط المفصلي للثلمة الكعبرية للزند.

رَأْسُ مُؤَنَفٍ : وحش بأنف يشبه الأنبوب، أو ثنية من الجلد تشبه الأنف وعين دائرية تحته.

الرَّأْسَاءُ : جنس من الديدان الشريطية حيث يكون الكلب هو الثوي المقر عندها. تطرح بيوضها مع السبراز فإذا تناولتها الحيوانات العشبية كالخراف والبقرة والجمال والخيول، أو تناولها الإنسان فقت البيوض في أمعائها وانتقلت الأجنة إلى جميع نسيج الجسم وبصورة خاصة إلى النسيج العصبي حيث تتشكل كيسة مرأسة. وتسبب أعراضاً تشبه أعراض الورم الدماغى البطيء النمو وتعالج بالاستئصال جراحياً.

رَأْسِي : ١- يتعلق بالرأس، نسبة له. ٢- يشير إلى المحور، فوق تحت، عمودي.

رَأْسِي ذَنْبِي : يشير إلى محور الإنسان الطولي من الرأس إلى الذنب.

رَأْسِيّاً : نسبة إلى الرأس.

رَأْشِدٌ : ١- قانونياً، الذي بلغ السن القانونية التي يستكمل فيها المرء أهليته ومسئوليته ٢- ناضج كلياً حسب القوانين الطبيعية، بحيث يكون قادراً على أي عمل، أو وظيفة نفسية.

رَأْصَةً : ضد يتفاعل ويتراص مع جسيمات تحمل مستضدات على سطحها كالحلايا والجراثيم، أو جسيمات مجهولة مغطاة بمستضدات، ويسبب الضد

الأنواع المختلفة، وتعمل الخلايا كمستضدات وتثير إنتاج الأضداد.

رَاصَّة دَمَوِيَّة ذاتِيَّة : راصات موجودة في

مصل، أو مصورة شخص ويمكن تحت ظروف معينة أن تكس كرياتته الدموية نفسها.

رَاصَّة دَمَوِيَّة غَيْرِيَّة : وهي راصات تكس

خلايا أنواع أخرى من الحيوانات ويمكن أن تكون طبيعية، أو مصطنعة.

رَاصَّة ذاتِيَّة : مادة تتكون في الدم وتسبب تكس

الكريات الحمراء لنفس الشخص.

رَاصَّة شَامِلَة : راصة في مفصل دم تسبب تكس

الكريات الحمر التابعة لجميع فئات الدم في نفس النوع.

رَاصَّة غَيْرِيَّة : راصة في دم حيوان قادرة على

تكس الكريات الحمراء لحيوان من نوع مختلف.

رَاضٍ : يسبب الرض.

رَاضِيخ : يسبب رضخ، أو جرح.

رَاعِش : يسبب الرعشة.

رَاعُوم : مرض نادر كالزكام (مرض يصيب

الخيول فيسيل مخاطها) يحدث في بورما، ماليزيا،

سريلانكا و جوا، وقد شخص لأول مرة في برلين

عام ١٩٤٧م سببها الفانفريل و تموري وتنتج

أعراضاً متنوعة خاصة الإسهال والإنشامية

وخراجات متعددة في الكبد.

رَافِع : أي عضلة، أو بنيان له وظيفة رفع.

رَافِع الضَّغْط : مادة قادرة على رفع ضغط الدم في

الإنسان.

التصاق المستضدات إلى كتل مرئية، يستخدم هذا التكس للجسيمات لاكتشاف أضداد معينة ولمعرفة الجراثيم.

رَاصَّة بارِدة : راصات تتفاعل فقط في درجة

حرارة منخفضة، تشاهد في أمصال المرضى الذين

يعانون من ذات الرئة اللانوعية وفي حالات دموية معينة.

رَاصَّة جَسَدِيَّة : راصة ناتجة عن كل من

الكائنات المتحركة وغير المحركة كرد على

مواد مستضدة في جسد الجرثومة وخاصة عند

الأخيرة.

رَاصَّة سَوَظِيَّة : راصة خاصة للمواد السوطية

للجراثيم المتحركة.

رَاصَّة ضِدِّ الرِّيسوس : مضادات مناسبة

لمسترسات من نظام الريسوس وهناك خصوصيات

كثيرة مسيطر عليها من قبل بؤرة حبينة واحدة وأهم

نوعية مهمة سريرياً هي ضد "د" (Anti D RH₊)

مع الكريات الحمر اسمها الريسوس الإيجابي لأنها

تحمل المسترص؛ D .

رَاصَّة إِسْوِيَّة : راصة في دم شخص تتراص مع

خلايا دموية حمراء لشخص آخر من نفس النوع،

وتكتسب هذه الرصاصات أهمية في تصنيف زمر الدم

واختبارات لتمييز الأنواع.

رَاصَّة جُرْثُومِيَّة : راصة دموية تنتج بفعل

الجراثيم.

رَاصَّة دَمَوِيَّة : ضد في المصل يستمر الكريات

الحمراء. ويمكن مشاهدتها طبيعياً، أو يمكن إثارتها

بحقن كريات حمراء من نوع معين في عدد من

في الحماط والجراثيم والنبات والحيوان، وهي غير متطابقة لأن كل قاعدة نووي هي جزء أساسي لرمزة واحدة فقط لا غير.

رَامُوزٌ ثَلَاثِي : راموز ثمانية الحمض النووي والذي يترجم إلى متتالية أحماض أمينية بواسطة الجهاز الريبوسومي.

رَانْفَة : ١- طرف غضروف الأذن ج : روائف.

٢- كرة الإبهام، أو الجانب الوحشي لراحة اليد.

٣- العضلات الرانفة : العضلات القصيرة المتندبة والمبعدة القصيرة والعضلة المقابلة لإبهام اليد.

رَانْفِي : يتعلّق بالرانفة في اليد.

راولفية شعبانية : نباتات طبية من الدفليات (خانق الكلب) وهو مهدئ ومنوم يستخدم بشكل واسع في الهند للتتويج وأنواع خاصة من الجنون ومن أشهر عقاقيره الرزيين والأجملين. راو ولف ليونارد. نباتي ألماني أوغسبورغ (١٥٤٠ - ١٥٩٦)

رَاوُث : جنس أشجار كبار معمرة طبية من فصيلة البوطاطيات من أنواعه الريباس، أوراقه كبيرة مرة الطعم يزرع لعروق الأوراق اللحمية السمكية التي تستعمل في الفطائر، أما صحائف الأوراق فسامة.

رَاثِحَة : النسيم المستشق طيباً كان، أو خبيثاً ج: رائحات وروائح. وتقسم الروائح إلى فاكهي، زهري حاد، راتحي، لاذع وقحجي، ولحاسة الشم أهمية في التشخيص الطبي الفوري حيث يمكن معرفة كثير من الجراثيم بواسطة روائحها.

رِبَاطٌ : ١- ما يربط. ٢- مجموعة من الألياف الضامة ذات الاتجاه الواحد التي تربط رؤوس العظام عند المفاصل أو تثبت الأعضاء في مكانها

رَافِعَة : ١- كل عضلة ترفع كالرافعة الجفنية ورافعة الشفة العليا. ٢- آلة لرفع قطعة عظم مضغوطة. ٣- قضيب صلب يتحرك حول نقطة قاسية تسمى نقطة الارتكاز ويسهل رفع الأثقال ٤- آلة لرفع السيارات ونحوها عن الأرض.

رَاكِدٌ : كل ثابت في مكانه، في حالة راحة عكس متحرك.

رَامِخٌ : ١- ذو الرمح ٢- يقطع ويمزق، يجرح.

رَامِزَة : ١- شحمة في عين الركبة وهما رامزتان. ٢- أصغر وحدة للمعلومات الوراثية التي تحددها ثمانية حمض أميني واحد في تركيب عديدات الببتيد في الخلايا الحية، نووي ثلاثية على خيط "دنا" الذي يحدد حمض أميني معين في التركيب الخلوي للبروتين.

رَامُوزٌ : ١- النموذج ٢- نظام مجموعات الرموز بمعان مفصلة لحمل المعلومات بطريقة مختصرة.

رَامُوزُ الجينات : نظام المعلومات في خلية حية الذي يرشد آلية تركيب عديدات الببتيد لوضع حمض أميني معين كرد على ترتيب النوويد في المادة الجينية، ويتألف من ٦٤ متتالية من ثلاثية السنويد (تسمى الرامزة)، منها ٦١ تحدد الأحماض الأمينية العشرين التي تشاهد في البروتين وثلاثة تسمى (رامزة نهائية) تقطع زيادة أي حمض أميني إلى سلسلة نامية من النوويد، وينحل الراموز نظراً لأن معظم الأحماض الأمينية مرمزة بأكثر من راموز، فمثلاً هناك ٦ راموزات لكل من الحموض الأمينية، أرجينين والسيرين، واللوسين ولكن واحدة لكل من التريبتوفان والميتونين. وهي عامة ومنتشرة

كما في الأحشاء، حيث يقوي طبقة، أو طبقتين من الصفاق بوظيفة الرباط. ٣- أي تكثيف للغلالة والأنسجة الضامة لها وظيفة داعمة، أو رابطة.

رِبَاطٌ إِضَافِي : رباط يتميز عن محفظة المفصل ويخدم تقوية الاتحاد بين عظمتين.

رِبَاطٌ حَلَقِي : رباط دائري كما في رأس العضد، والرباط الذي يربط طرفي حلقة الرغامى ويغلقها من الخلف.

رِبَاطٌ قَاعِدَةُ الرِّكَاب : رباط دائري ليفي مرن يصل بين قاعدة الركاب إلى محيط الناقذة الدهليزية.

رِبَاطٌ قَوْسِي : أي رباط له شكل قوسي.

رِبَاطٌ كَاذِبٌ : اصطلاح يصف الصفاق وانعكاسه من قمة الحدود الوحشية للمثانة، إلى جدران الحوض ويتكون كل واحد من طبقة واحدة وقيمتها كداعمة تساوي صفر.

رِبَاطٌ عَرِيضٌ : ثنية مزدوجة من الصفاق يمتد حتى كلا الجانبين من الحد الوحشي للرحم إلى الجدار الجانبي للحوض، ويحتوي على المبيض وقناة الرحم والأربطة والأوعية.

رِبَاطٌ مُحِظِّي : رد مغلف للمفاصل الزليلية يتكون من نسج ليفي أبيض، وله في العادة اتصال خطي مع العظام المتكونة في، أو قرب حدود غضروفها المفصلي وله غالباً موضع، أو اثنين متخنيين موضعياً تكون الأربطة.

رِبَاطٌ مَائِلٌ : الحبل المائل، رباط ليفي يمر جانبياً وسفلياً من بروز الكعبرة إلى الزند.

رِبَاطٌ مَدْوَرٌ : أي رباط له شكل دائري.

رِبَاطٌ مَرْكَزِي : الخيط الانتهائي، استمرار الحبل الشوكي، يتكون بشكل رئيسي من الأم الحنون، أسفل الفقرة القطنية الثانية، وتنام على الجزء السفلي للفتاة الشوكية، وقد يتصل بسمحاق العصعص.

رِبَاطٌ مُعَلَّقٌ لِلإِبِط : امتداد للفاقة الترقوية الصدرية تحت الحد السفلي للعضلة الصدرية الصغيرة ليتحد مع الأرضية اللفافية للإبط.

رِبَاطٌ مُعَلَّقٌ لِلْعَدْسَةِ : الجزء الأمامي من النطيفة الهدبية من الجسم الزجاجي الذي يمتزج مع محفظة العدسة البلورية للعين.

رِبَاطٌ مُعَلَّقٌ لِلْمَبِيض : الجزء العلوي الجانبي من الرباط العريض للرحم، الذي يمر من النهاية البوقية للمبيض إلى الصفاق فوق الأوعية الحرقفية الخارجية، ويحتوي على أوعية وأعصاب المبيض.

رِبَاطٌ قَوْسِي وَحْشِي : قوس ليفي يجسر العضلة المربعة القطنية، وتشكل منشأ الحجاب الحاجز، القوس القطني الضلعي الوحشي.

رِبَاطٌ قَوْسِي إِنْسِي : قوس ليفي يجسر العضلة القطنية وتشكل منشأ الحجاب الحاجز والقوس القطني الضلعي.

رِبَاطٌ قَوْسِي نَاصِفٌ : رباط وترتي يجسر الفتحة الأبهرية للحجاب الحاجز ويتحد مع السيقان على الجانبين.

رِبَاطٌ قَوْسِي عَاتِي : أحد الأربطة العانية التي تربط عظمي العانة معاً في الارتفاق العاني.

رِبَاطٌ عَقَبِي نَرْدِي : الجزء الإنسي للعضلة المشعبة، الذي يمتد بين الجزء الأمامي لظهر العقب، والجزء الخلفي الإنسي للعظم النرددي.

رِبَاطٌ عَقْبِي شَطْوِي : حزمة قوية ضيقة تسير من ذروة الكعب الوحشي إلى الأسفل، والخلف إلى السطح الوحشي للعقب.

رِبَاطٌ عَقْبِي زُورَقِي : الجزء الوحشي ، جزء من الوتر المشتعب، الذي يمتد بين الجزء الأمامي لظهر العقب والزاوية الوحشية لعظم الزورق. للجزء الظهري رباط ضعيف يصل بين الوجهين الظهريين للعظمتين وللجزء الراجي، رباط قوي غضروفي ليفي يمتد بين معلق العقب الراجي والإنسي للعظم الزورقي. الرباط الرفاز.

رِبَاطٌ رَأْسُ الْفَخْذِ : رباط مسطح ومثلث الشكل ترتبط ذروته بنقرة رأس الفخذ، وترتبط قاعدته بالرباط المعترض وحواف التلمة الحقي، يقع الرباط داخل المفصل ويحاط بغشاء زليلي.

رِبَاطٌ رُسْنِي كُغْبَرِي : رباط يمتد من ذروة الناتئ الإبري للكعبرة إلى حبة العظم الزورقي، وعمله الحد من حركات تقريب المفصل، وإصابته كثيرة. ويشكل وتر العضلة مبعدة الإبهام الطويلة، الرباط الوحشي الفعال لهذا المفصل.

رِبَاطٌ جَاتِبِي شَطْوِي : وهو رباط يشبه الحبل يرتبط من الأعلى باللقمة الوحشية للفخذ وفي الأسفل برأس الشظية ويقع وتر العضلة المأبضية بين الرباط الغضروفي الهلالي الوحشي.

رِبَاطٌ جَاتِبِي كُغْبَرِي : الرباط الذي يمر من ذروة النتوء الإبري للكعبرة إلى العظم القاربي، وتمتد بعض الألياف إلى العظم المربعي.

رِبَاطٌ جَاتِبِي ظَنْبُوبِي : رباط مسطح يمر من لقمة الفخذ إلى الظنبوب.

رِبَاطٌ زَنْدِي : حزمة تمتد بين النتوء الإبري للزند والحمصي الشكل والعظام المثلية.

رِبَاطٌ حَلْقِي دَرَقِي : الجزء الإنسي للغشاء الحلقي الدرقسي الذي يمتد بين الحد السفلي للدرق والحد العلوي للغضروف الحلقي.

رِبَاطٌ مَتَصَالِبٌ أَمَامِي رُكْبِي : رباط قوي في داخل محفظة مفصل الركبة، يتصل إلى الأسفل بالمنطقة التي أمام البروز بين اللقمتين للظنبوب وإلى الأعلى بالجزء الخلفي للجانب الإنسي للقمة الوحشية للفخذ.

رِبَاطٌ مَتَصَالِبٌ فَقْهِي : بنية متصالبة يتكون جزؤها الأفقي من السرباط المستعرض للفقعة، ويتشكل جزؤها العامودي من رباطين، الساق العلوية والسفلية التي تمر بالتتالي من الرباط المستعرض إلى الحد الأمامي للثقبية العظمى وخلف جسم المحور.

رِبَاطٌ مُسَنَّ : امتداد وحشي من الأم الحنون الشوكية، التي تصل مع الأم الجافية في الفجوات بين الأعصاب الشوكية، بواسطة حدودها الوحشية المسننة، وتمتد من الثقبية العظمى إلى الفقرة القطنية الأولى.

رِبَاطٌ أَصْفَر : مجموعة من الأربطة الصفراء المرنة التي تربط الفقرات الظهرية معاً.

رِبَاطٌ كَبْدِي قَوْلُونِي : امتداد اتفاقي إلى يمين الثرب الصغير، ويمتد من الغدة الصفراء إلى زاوية القولون اليميني.

رِبَاطٌ كَبْدِي عَفْجِي : الجزء اليميني من الثرب الصغير الذي يمتد بين العفج والكبد.

رِبَاطُ كَبِدِي مَعْدِي : جزء من الثرب الصغير يمتد بين المعدة والكبد.

رِبَاطُ كَبِدِي كَلَوِي : التثنية الصفاقية التي تصل بين السطح السفلي للكبد إلى أمام الكلوة اليمنى، وهي الطبقة السفلى للرباط التاجي للكبد، إذا ما انعكست على القطب العلوي للكلوة اليمنى، بدلاً من انعكاسها إلى الحجاب الحاجز.

رِبَاطُ خَرْقَفِي فَخْذِي : رباط مثلث جزؤه المركزي رقيق يعطي مظهر الـ Y المعكوسة، ومتصل بقمته مع الشوكة الحرقفية الأمامية السفلى والحد الحقي، وقاعدته متصلة مع الخط بين المنوري في عظم الفخذ.

رِبَاطُ خَرْقَفِي قَطَنِي : الحد السفلي المثخن للصحافة الأمامية من الغلالة القطنية، التي تمتد بين النتوء المستعرض للفقرة القطنية الخامسة، والشفة الداخلية لعرف الحرقفة.

رِبَاطُ سِنْدَانِي عُلَوِي : ثنية من الغشاء المخاطي تمر من السندان إلى سقف التجويف الأنفي.

رِبَاطُ إِرْبِي : الحد السفلي المثخن من سفاق العضلة المائلة الخارجية التي تجسر الفجوة بين الشوكة الحرقفية الأمامية العليا وبين البروز العاني.

رِبَاطُ بَيْنِ السِّنَاسِينَ : مجموعة من الأربطة تصل بين النتوءات الشوكية الفقارية معاً.

رِبَاطُ إِنْسَكِي فَخْذِي : رباط مثلث يمتزج مع المحفظة المفصليّة لمفصل الورك وتتصل قاعدته مع عظم الإسك بقرب الحق وقمته مع السطح الإنسي للمنور الكبير.

رِبَاطُ جُوبِي : الجزء العاني من الرباط الإربي.

رِبَاطُ عَرِيضٍ رَحِمِي : ثنية مزدوجة من الصفاق تمتد على جانبي الرحم، من الحد الوحشي للرحم إلى الجدار الجانبي للحوض ويحتوي على المبيض والبوق وأربطة وأوعية (انظر الرباط العريض).

رِبَاطُ مَطْرَقِي أَمَامِي : رباط يتكون من جزأين رباط هيكل الذي يمر من النتوء الأمامي خلال الشق الصخري الأذني إلى شوكة العظم الوتري، والرباط الأمامي لهيلمهولتز، الذي يمر من الجانب الأمامي للمطرقة فوق النتوء الأمامي إلى الشوكة الطيلية العظمي.

رِبَاطُ إِنْسِي : الرباط الدالي، الرباط الإنسي لمفصل الكاحل، وهو رباط قوي جداً يرتبط عند ذروته بحواف وذروة الكعب الإنسي، وفي الأسفل ترتبط الألياف العميقة، بالباحة غير المفصليّة على السطح الإنسي من جسم العقب، وترتبط الألياف السطحية، بالجانب الإنسي من العقب ومعلق العقب والرباط العقبي الزورقي الأخمصي وأحدوية العظم الزورقي.

أَرْبُطَةُ سِنْعِيَّةٍ ظَهْرِيَّةٍ : ثخن في الجانب الظهري للمحفظات الرسغية السنعية.

أَرْبُطَةُ بَيْنِ عِظَامِ السِّنْعِ : أربطة تصل الحدود القريبة للعظم الكبير والعظم الكلابي إلى الأجزاء المناسبة من قواعد العظام السنعية الثالثة والرابعة.

أَرْبُطَةُ سِنْعِيَّةٍ رَاحِيَّةٍ : ثخن في الجانب الراحي للمحفظات الرسغية السنعية.

أَرْبُطَةُ مِشْطِيَّةٍ ظَهْرِيَّةٍ : أربطة رفيعة مستعرضة توحد قواعد العظام المشطية الأربعة على سطحها الظهري.

أَرِبْطَة بين عظام المشط : أربطة كثيفة توحد السطوح المتجاورة للقواعد الوحشية المشطية أسفل المفاصل.

أَرِبْطَة مِشْطِيَة أَخْمَصِيَة : أربطة كثيفة مستعرضة توحد القواعد الأربعة المشطية على سطحها الأخمصي.

رِبَاطٌ قَفَوِي : حاجز رياضي وسطي أو مثلث في مؤخرة الرقبة وتتصل قاعدته بالحافة الخارجية القذالية، وقمته مع الفقرة الرقبية السابعة، أو يتصل حده الأمامي مع النتوءات الشوكية الرقبية بينما يصل حده الخلفي تقريباً إلى السطح.

أَرِبْطَة رَاحِيَة : بنيت ليفية غضروفية سميكة متصلة بشدة إلى قاعدة كل سلامة دانية، معمقة الجراب لرأس السنع الملائم وتشع مع الأربطة الجانبية والأنسجة المستعرضة العميقة للراحة والأععاد الليفية المتتية.

رِبَاطٌ رُضْفِي : هو رباط يرتبط في الأعلى بالحافة السفلية للرضفة والداغصة وفي الأسفل بحديبة الظنوب ويشكل في الحقيقة استمرار الجزء المركزي لوتر مربعة الرؤوس الفخذية المشترك، ويفصل عن الغشاء الزليلي للمفصل بالوسادة الشحمية تحت الرضفة وعن الظنوب بجراب صغير، ويفصل الجراب تحت الرضفة السطحي الرباط الرضفي عن الجلد.

رِبَاطٌ حُمْصِي كِلَابِي : امتداد رباطي من وتر انفراز عضلة المثنية الزندية للرسغ التي تمر من العظم الحمصي إلى كلاب العظم الكلابي.

رِبَاطٌ أَخْمَصِي طَوِيل : صفيحة لها تكوين ليفي غضروفي تقوي الجانب الراحي للمحفظة، وهي تتصل بشدة مع السلامة وبخفة إلى السنع وذلك الرباط في إصبع القدم الكبير تطور في داخله عظمين سسمانيين.

رِبَاطٌ مَأْبِضِي قَوْسِي : الرباط القوسي للركبة، حزمة من الألياف من اللقيمة الوحشية لعظم الفخذ، والتي تقوس فوق وتر العضلة المأبضية لتتبع في المحفظة خلفياً.

رِبَاطٌ مَأْبِضِي مَائِل : مساهمة من وتر انفراز العضلة الغشائية النصف إلى الجزء الخلفي من محفظة مفصل الركبة.

رِبَاطٌ عَاتِي مَتَائِي : ١- وحشياً، امتداد للغلالة الحوضية التي تمتد من الجانب الوحشي للموثة إلى جانب جدار الحوض. ٢- إنسياً، امتداد مشابه يصل الجانب الأمامي للغلالة مع ظهر العظم المعاني قريب من الارتفاق.

رِبَاطٌ رِنَوِي : تشية مزدوجة من الجنبية تحت جذر الرنة، تصل السطح الإنسي للرنة مع التامور.

رِبَاطٌ مَرَبَّع : حزمة الألياف الرقيقة للرباط الخلفي من الثلمة الكعبرية للزند إلى رقبة الكعبرة.

رِبَاطٌ عَجْزِي شَوْكِي : شريط مثلث متصل بقمته مع الشوكة الإسكية وبقاعدته إلى الحدود الوحشية للقطع العجزية السفلى والمصعصية العليا.

رِبَاطٌ إِبْرِي لَامِي : شريط ليفي يمر من ذروة النتوء الإبري للعظم الصدغي إلى القرن الأصغر للعظم اللامي، وهو بقية القوس الغضروفي اللامي.

رِبَاطٌ فَوْقَ السِّنَانِ : مجموعة من الأشرطة الليافية التي تصل ذروات النتوءات الشوكية للفقرات وهي تساعد في المنطقة الرقبية على تكون الرباط القوي.

رِبَاطٌ مُعَلَّقٌ لِلْبَطْرِ : شريط ليفي يمر من الارتفاق العاني إلى جسم البظر.

أَرِبْطَةٌ مُعَلَّقةٌ لِلنَّدَى : أربطة من نسيج ليفي تقرب السندي إلى الجلد الواقع فوقه، وإلى الغلالة تحته على العضلة الصدرية الكبيرة وتسمى أيضاً أربطة "كوبر".

رِبَاطٌ قَعْبِي شَطْوِي أَمَامِي : يسير من الحافة الأمامية للكعب الوحشي إلى السطح الوحشي للكعب. **رِبَاطٌ قَعْبِي شَطْوِي خَلْفِي** : يسير من الجانب الإنسي للكعب الوحشي إلى الحذبة الخلفية من الكعب.

رِبَاطٌ قَعْبِي زَوْرَقِي : شريط يسير من الجانب الظهري لرقبة الكعب إلى الجهة المقابلة للعظم الزورقي.

أَرِبْطَةٌ بَيْنَ عِظَامِ الرِّصْغِ : هي الأربطة التي تربط بين السطوح المناصفة للعظام الرصفية وتشمل الأربطة؛ الإسفيني النردي، وبين الإسفيني، والقعبي العقبى، وهي جميعها بين العظام.

أَرِبْطَةٌ رُصْنِيَّةٌ أَخْمَصِيَّةٌ : ١- الرباط الطويل ؛ وهو حزمة قوية من الألياف متصلة من الخلف مع السطح الراجي للكعب وإلى الأمام مع العظم النردي وقواعد العظام المشطية الأربعة، ٢- والرباط القصير؛ وهو حزمة ضخمة تمتد بين النهاية

الأمامية للسطح الراجي للكعب والسطح الراجي للعظم النردي وتقع في عمق الرباط الراجي الطويل.

رِبَاطٌ مُدَوَّرٌ كَبْدِي : شريط ليفي، بقية الوريد السري اليساري للجنين، ويمر من السرة في الحافة الحرة للرباط المنجلي إلى الفرع اليساري للوريد البابي.

رِبَاطٌ مُدَوَّرٌ رَحْمِي : شريط ليفي عضلي يتصل بالحافة الوحشية للرحم سفلياً وأمام البوق الرحمي، ويمر جانبياً في الرباط العريض ويعبر القناة الإربية ليتصل مع جلد الشفر الكبير، وهو بقايا رسن الخصية.

رِبَاطٌ ظَنْبُوبِي شَطْوِي أَمَامِي : شريط مائل يصل الحواف القريبة للظنبوب والشفية، أمام الأربطة بين العظمية.

رِبَاطٌ ظَنْبُوبِي شَطْوِي : شريط شبيه للشرائط الأمامي يتموضع خلفياً ويتصل جزؤه السفلي والأعمق مع الرباط المستعرض ويتمفصل مع الكعب.

رِبَاطٌ مُسْتَعْرِضٌ رُكْبِي : حزمة من الألياف التي تمر بين الأطراف الأمامية لأقراص مفصل الركبة.

رِبَاطٌ مُسْتَعْرِضٌ عِجَائِي : الجزء الأمامي المتخن للغشاء العجائي.

رِبَاطٌ شَبْهَ الْمُنْحَرَفِ : الجزء شبه المنحرف للرباط الغريباوي السرقوي؛ وهو شريط مسطح يتصل سفلياً مع حافة على السطح العلوي للنتوء الغريباوي لعظم الكتف، وفوقياً مع الخط شبه المنحرف للترقوة.

رِبَاطٌ مُثَلَّثِي أَيْمَن كَيْدِي : الثنية المزدوجة للصفاق التي تشكل الحد الحر للرباط التاجي للكبد.

رِبَاطٌ مُثَلَّثِي أَيْسَر كَيْدِي : ثنية مثلثة تشكل الطرف اليساري للرباط التاجي للكبد ، وتمتد من السطح العلوي للفص اليساري إلى الحجاب الحاجز.

رِبَاطٌ سُرِّي إِنْسِي : الشريان السري الزائل.

رِبَاطٌ سُرِّي وَسْطِي : الشريط الليفي الذي يمتد إلى فوق من قمة المثانة إلى السرة؛ المربط.

رِبَاطٌ دِهْلِيزِي : شريط ليفي يقع تحت الثنية البطينية للرغامى، ويتصل أمامياً إلى صفحة الغضروف الدرقي وخلفياً إلى الجانب الوحشي للغضروف الطرجهالي.

رِبَاطٌ صَوْتِي : الحد العلوي للغشاء الحلقي الصوتي الذي يقع تحت الحبل الصوتي، وهو يتصل أمامياً مع خلف الصفيحة الغضروفية الدرقية بقرب الخط الوسطي وخلفياً مع النتوء الصوتي للغضروف الطرجهالي.

رِبَاطٌ مُنْتَبِذ : الحالة عندما يكون الرباط خارج مكانه.

رِبَاطِي : يتعلق بالرباط، أو يشبهه.

رُبَاعُ الْأَثْدَاء : يمتلك أربعة أثداء.

رُبَاعِي : ما كان مؤلفاً من أربعة.

رُبَاعِي الْأَعْيُن : مسخ ولادي؛ مع وجه مزدوج وأربعة أعين وأربعة أذان.

رُبَاعِي الْأَقْدَام : مسخ ولادي يمتلك أربعة أقدام.

رُبَاعِي الْأُذْرُع : مسخ ولادي له أربعة أذرع.

رُبَاعِي الْأَلْوَان : له خاصية التعرف على أربعة من ستة ألوان الطيف، في تعريف عمى الألوان.

رُبَاعِي التَّكَافُؤ : يطلق على العناصر الكيماوية، أو الجذور التي لها تكافؤ أربعة.

رُبَاعِي الشُّرُف : ١- السن الذي له أربع شرف.

٢- أو يعني الصمام الأبهر الذي يتكون من أربع قطع هلالية.

رُبَاعِيَات : الأسنان الأربعة القاطعة، وتتميز بتاج إزميلي الشكل له جذر واحد.

رُبَاعِيَّة : ١- سلسلة من أربعة كتابات متصلة. ٢- أي شيء من أربعة.

رُبَاعِيَّة " فالو " : شكل من المرض القلبي الولادي يستكون من خلل في الحاجز البطيني، وضع يميني للأبهر الذي يتجاوز الحاجز، وتضيق في الشريان الرئوي، والمكون الرابع من هذه الرباعية هو التضخم البطيني اليميني، الذي هو نتيجة لتضيق الشريان الرئوي.

رُبَاعِيَّةُ السُّرُوس : له أربعة رؤوس وخاصة العضلات كما في العضلة الفخذية رباعية الرؤوس التي تقع أمام الفخذ.

رُبْدِي : عصوي الشكل، يشبه الديدان الخيطية.

رُبْدِيَّات : عائلة من الخيطيات، منها الأجناس ديبلوسكابتز والديدان العسوية لها أهمية طبية.

رُبْطٌ : شد عقدة، أو ربطة حول وعاء دموي، أو أي بنية مفرغة، أو سويقة مدورة.

رُبْطُ الْأَسْنَهَر : ربط الوعاء الأسهر.

حرف (ر)

رَبْطَة : أي مادة تربط حول بنية معينة بهدف ؛ إما إغلاق الأوعية، أو سد للكمة، مثلاً سد عنق الكيس الفققي.

رَبْطَة مُسْتَسَكَّة : طريقة لربط سويقة بسلسلة من الربطات.

رَبْطَة أَنْتِهَائِيَّة : ربطة توضع على النهاية المقطوعة لوعاء دموي، أو غيره.

رَبْطَة ذَوُوبِيَّة : ربطة بمادة ذووبية أي تنوب في داخل الجسم كالقصابة.

رَبْطَة جَانِبِيَّة : ربطة توضع على جانب الوعاء عادة في الأوردة الكبيرة لإغلاق تمزق في جدارها ولكن بدون إغلاق للكمة.

رَبْطَة مُتَشَابِكَة : طريقة مأمونة لربط وعاء كبير بواسطة ربطتين متشابكتين.

رَبْطَة مُوقَّتَة : ربطة موضوعة لمرحلة تجريبية بدنية؛ مثلاً على الشريان السباتي العام، وعند أي إشارة للشلل فإنها تزال بسرعة.

رَبْطَة مُزْدَوِجَة : ربطتين توضعان كأجراء أمان لضمان النهاية المقطوعة لوعاء عريض، أو غير منظور كالأوعية المعدية اليسارية، أو الشرايين الدرقية.

رُبْع : ١- يعود في فترات ٧٢ ساعة أي في اليوم الرابع ٢- نوع من الحمى البرداء تظهر في فترات كل أربعة أيام.

رُبْع : ربع دائرة، تقسيم أي منطقة تشريحية يمكن تقسيمها بخطين خياليين متقاطعين أحدهما أفقي والآخر عامودي كالبطن والشبكة، وتسمى الربع الأعلى والربع الأسفل الخ.

رَبْعَة : يتميز بقامة عريضة وقصيرة.

رَبْلَة : البروز الضخم على خلف الساق تحت الركبة ويتكون بشكل رئيسي من عضلة الساق.

رَبْلِي : يتصل بريلة الساق.

رَبْو : مرض تنفسي يعزى سببه إلى الحساسية.

وتلعب الوراثة دوراً مهماً في إمرضه، يتميز بنوبات متكررة من عناء النفس والسعال والإحساس بضيق في الصدر، ويصحبها صوت نحیح كالأنين في أثناء الزفير، وأكثر ما تحدث هذه النوبات ليلاً ومفاجأة، ومما يلاحظ عنها أنه بينما يقصر زمن الشهيق فإن زمن الزفير يطول في عسر وضيق، ويزداد الضيق إذا كان المريض مستلقياً على ظهره، ولذا فإنه يتوخى الجلوس مستعيناً على ضيق التنفس بعضلات التنفس الثانوية، ويفتح النوافذ للاستفادة من الهواء. يكون البصاق في العادة قليلاً جداً وعسير الإخراج أثناء النوبة، ولكنه يكثر وبسهل إخراجه إثر انتهائها، وهذه النوبات تنشأ من تقلصات تشنجية تحدث في الشعب الهوائية، بسبب تهيجها من مادة تستثير حساسية غشائها المخاطي، والمواد التي تستثير الحساسية متنوعة منها ما يطراً على الجسم من داخله؛ كسموم بؤرات التعفن في الفم والأنف والحلق وغيرها، أو ما يطراً على الجسم من خارجه؛ كروائح بعض الزهور وشعر بعض الحيوانات، أو ريشها، أو فرائها، ومختلف الأتربة وبعض الأطعمة ويمكن التعرف على نوع المادة التي تستثير الحساسية؛ باختبارات خاصة تجري بحقن المادة المشتبه بها في الجلد فإذا ما عرف نوع هذه المادة أمكن تجنبها، أو تحصين جسم المريض منها بحقنه بها. ومما يزيد التعرض لهذا المرض تأخر

وتتصف بأنها عديمة الأجنحة ومضغوطة جانبياً، وذات أطراف قوية يزداد طولها من الأمام إلى الخلف وفم أنبوبي الشكل، تنتشر أنواعها في كل أنحاء العالم وتضم ثلاثة أسر هي البراغيث، وأسرة البراغيث الطويلة وأسرة البراغيث القزمة.

رُئْبَةُ الحُمَات : وهي أصغر العوامل الخمجية وتُقَيس (٢٠-٣٠٠) نانومتر قطراً. ويحتوي على ذرة من حمض نووي RNA أو DNA، ولا يمكن مشاهدتها بالتفصيل إلا بالمجهر الإلكتروني، ويغطي الحمض بقشرة بروتينية، يطلق على كامل الوحدة الخمجية اصطلاح الوحدة الحمية التي تتكرر في الخلايا الحية فقط، ويحتوي الحمض النووي على معلومات ضرورية لبرمجة الخلايا المضيفة المصابة لتكوين عدد من الذرات الضخمة النوعية، وتخمس الحمات طيفاً واسعاً من المضيفين، كالعضويات وحيدة الخلية مثل المفطورات والجراثيم والأشنيات وكل النباتات العليا والحيوانات.

رُئْة : صعوبة تركيب الكلمات بسبب مرض في الجملة العصبية المركزية.

رُتَج : ١- من الطرق - مالا منفذ له، رتج الباب : أغلقه ٢- جراب مفرغ مغلق، يمكن أن يحدث في معظم الأعضاء المفرغة كأعضاء الجهاز الهضمي، وأشهر الرتوج التي تسبب مشاكل صحية هي رتوج القولون. والرتج الحقيقي هو الذي تكون جدرانه هي نفس جدران العضو الذي تنشأ منه.

رتج إحليلي : ١- تدلي حقيقي للغشاء المخاطي للإحليل، في الأنثى خلال الفتحة البولية الخارجية. ٢- رتب صغير في قاعدة الإحليل الأنثوي يتبع خمج، أو أكثر انتشاراً بعد رضخ الإحليل أثناء

استئصال الزوائد الأنفية والحلقية. والنزلات الشعبية المزمنة. علاج المرض يتوقف على معرفة السبب ويعالج عرضياً بالمواد المضادة للحساسية والكورتيزونات.

رَبْوِي : يتعلق بمرض الربو.

رَبْو آر جي : مرض الربو الناتج عن الحساسية (انظر ربو).

رَبْو قَصْبِي : هو مرض الربو.

رَبْو قلبي : ضيق نفس انتيابي قلبي. ضيق نفس عارض ي يحدث في فترات الراحة وأحياناً خلال الليل بشكل ثانوي لإخفاق قلبي يساري.

رُبَيْدَة : ليفة عضلة مخططة.

رَبِيطَة : في الكيمياء جزيء مربوط في العادة إلى عناصر معدنية عابرة بواسطة رابطات مانحة الكهارب، ويستعمل الاصطلاح لوصف جزء مرتبط بجانب واحد على البروتين، أو الحمض النووي.

رَبِيعي : جديد، نضر، شاب، المنسوب إلى الربيع.

رُتَاج : ١- الرتج : الذي لا منفذ له ٢- وجود رتوج في القولون بدون اشتراكات التهابية، أو أية أعراض ويمكن اكتشاف وجودها بالفحص بالأشعة السينية بعد وجبة ظليلة، والحالة نسبياً منتشرة، ويطور ١٥% من الذين يحملون الرتاج من التهابات الرتوج.

رُتْبَة : ١- المنزلة ٢- جماع الفصائل المتشابهة في تصنيف الكائنات الحية ج: رتب.

رُتْبَة البرغوثيات : تدعى أيضاً عديمة الأجنحة الأنثوية وهي حشرات طفيلية خارجية مميزة، تعلق على جلد الثدييات، أو الطيور لتتغذى من دمها،

خروج رأس الجنين في ولادة مطولة. ويتمدد الجزء المضعف من الإحليل تحت الضغط المترافق مع التبول.

رَقَق : ١- شدة أو لحمية، ٢- انسداد خلقي لقناة عادية أو فتحة في الجسم، أو انسداد مرضي لها ومن الانسدادات، أو الرتوق الخلقية المشهورة؛ رتق الشرج حيث يولد الطفل وشرجه غير منقبض، أو رتق المريء، أو الأمعاء ويمكن أن يحدث في جميع الأعضاء المفرغة.

رَتَقُ الإحليل : انسداد في الإحليل، إما خلقياً، أو مرضياً.

رَتَقُ المهبل : انغلاق، أو انسداد المهبل لسبب خلقي، أو مرضي.

رَتَقِي : يتميز بالرتق، أي الانسداد.

رُتُوج : جمع رتج، (انظر هناك).

رُثْيِيَّة : في تصنيف الأحياء الرتبة الصغيرة.

رُثْوِي : يتعلق بالرثية، أو التهاب المفاصل.

رُثْيَاتِي : يشبه الرثية في واحدة، أو أكثر من صفاته.

رُثْيَّة : اسم غير دقيق يطلق على كل مرض، أو ألم في المفاصل والعضلات والعظام والأربطة والأوتار والأعصاب، كما يطلق على آلام الأنسجة الضامة القريبة من المفاصل؛ كالتهاب الأكياس الزليلية، وألم عرق النساء، والتهاب غلاف الوتر، وهي آلام مزمنة في الغالب. وقد يكون المرض التهابياً حاداً أي مصحوباً بألم شديد وإحمرار وسخونة وورم، وهو ما يحدث في الحمى الرثية، أو ما يحدث في مرض النقرس، وإصابات العنف التي تحدث مباشرة على

المفصل، أو من جراء امتصاص السموم من بورات قححية في جذور الأسنان، أو جيوب الأنف، أو زوائد الحلق وغيرها، أو من بورات في الجهاز التناسلي في مرض السيلان المزمن، وقد يكون المرض مزمناً؛ إذ يتخلف عن التهاب حاد تعقبه تغييرات في الأنسجة، أو يبدأ مزمناً. وهو على نوعين : أحدهما : ضموري؛ ويتميز بالتهاب وتغييرات انحلالية في تراكيب المفصل، والآخر تضخمي؛ تؤدي فيه التغييرات الانحلالية إلى تكون زوائد شوكية عظمية في داخل المفصل، وكلا النوعين قد يؤدي إلى تشويه في هيئة المفصل يسمى بالتهاب المفصلي التشويهي، ومن أسباب هذه الأنواع المزمنة من المرض، التعرض لتقلبات الجو، الاضطرابات النفسية واختلاف إفرازات الغدد الصم. وأمراض المفاصل قد تقتصر على مفصل واحد، أو تشمل عدة مفاصل، ومنها ما يختار المفاصل الكبرى، أو الصغرى، أو يمسها جميعاً، ومنها ما يقتصر التغييرات المرضية فيه على تراكيب المفصل بذاتها ومنها ما تتعدى تلك التراكيب إلى الأنسجة المحيطة بالمفصل، وينبغي التذكير في العلاج، وبشكل عام يتوقف العلاج على سبب المرض كإزالة بؤر التعفن، والآخر موضعي تستخدم فيه علاجات متنوعة ترمي إلى إزالة الالتهاب وتسكين الألم وتصحيح التشوهات إما بأجهزة خاصة، أو بالجراحة.

رُثْيَّة مفصليّة : الشكل المميز للرثية الحادة عند الكبار حيث تبرز الحمى والتهاب المفاصل كأعراض مهمة، وقد يكون سببها خمج جرثومي قححي للمفاصل.

رَثِيَّةٌ مَفْصَلِيَّةٌ مُزْمِنَةٌ : الشكل المزمن لالتهاب المفاصل الرثي، أو السنقرس، أو التهاب العظام والمفاصل.

رَثِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ : آفة مؤلمة تصيب العضلات الإرادية وأغشيتها الغلالية، وسببه غير معروف.

رَجُ : ١- الدرجة : هزّه وحركه بشدة ٢- طريقة لتأكيد وجود سائل وغاز في أي تجويف جسمي بواسطة هز المريض، ويسمع صوت انتشار السائل بوضوح.

رجحان : حالة الزيادة عن شيء معين قريب، في الحجم، أو الوزن، أو الوظيفة، والرجحان البطيني يدل على توسع القلب نتيجة رجحان تضخم أحد البطينين.

رَجْع : تقنية فحص سريري تستخدم في حالات متعددة ومختلفة ومن أجل اكتشاف حركات أي جسم، أو عضو موجود في سائل من نفس الوزن النوعي، مثلاً أثر الجنين على الأصابع عند تحريكه في سائل السلى.

رَجْع الضربة : ظهور علامات نزيف وتمزق في أنسجة الدماغ في الجهة المقابلة للضربة نتيجة رجع الضربة.

رَجْعَة : عودة ظهور أعراض مرض بعد فترة من الاختفاء، أو العلاج.

رَجْفَان : ١- الإسراع ٢- الانقباض العفوي لألياف عضلية منفردة، وهو علامة على زوال التعصيب.

رَجْفَانٌ أَدْنِي : خلل شائع في نظم القلب، تنقلص كل حزمة أدينية على حدة بسرعة ٤٠٠-٥٠٠ في

الدقيقة، ويمكن مشاهدة هذه التقلصات كموجات "p" على تخطيط القلب الكهربائي غالباً ما يترافق الرجفان الأذيني مع مرض قلبي، وخاصة قصور الصمام التاجي وتضييقه، والانسمام الدريقي، والمرض القلبي الإكليلي، وارتفاع الضغط الشرياني، وقد يحدث في سياق الحميات وفي التهاب الستامور العاصر، وسرطان القصبات المنتقل إلى القلب، وقد يتلو تناول الكحول بغزارة والتدخين الشديد، وقد يشاهد بعد فتح الصدر، وقد يحدث بدون سبب ظاهر، قد يكون إنتائياً، أو دائماً ونادراً ما يحدث في أمراض الصمام الأبهري، ومعظم الأمراض القلبية الخلقية، وقد يشعر المريض بالرجفان الأذيني، أو قد يشتكي من ذبحة وعدم انتظام في النبض وقد يكون البدء عاصفاً يوهط وفقدان وعي، وربما تلاه استرخاء قلب حاد، يعالج المرض بالديجيتال ومع حاصرات بيتا، كما يجب استعمال مضادات التخثر كما يجب معالجة السبب الرئيسي للرجفان.

رَجْفَانٌ بَطِينِي : خلل في تنسيق النشاط متعدد البؤر للبطينين الذي يحل محل الانقباضات المنسقة ويثقله توقف دوري، ولهذا السبب فإنه سبب فوري للوفاة وهو ناتج في الغالب عن عوز الأكسجين في عضلات القلب.

رَجْلٌ كَاذِبَةٌ : نبتة جيلي ينبت عن الأميبا لتسهيل حركتها، أو لهضم طعام.

رُجُوعِي : اتجاه للحركة معاكس للاتجاه الطبيعي، أو السابق.

رُجُولِي : له صفات ذكورية، يتعلق بالجنس الذكري.

رُجَيْلَة : ١- رجل صغيرة ٢- الجذع المتضيق لورم، أو عضو، أو رقة جلدية.

رُجَيْلَة قَوْس الفقرة : الجسر الذي يصل صفيحة الفقرة مع جسمها.

رَحَى : سن الرحى سن واسع القمة يستخدم للطحن واحد من اثنين من الأسنان الخلفية في التسنين الساقط، أو واحد من الأسنان الخلفية الثلاثة في التسنين الدائم، يتوضع على كل جانب من الفكين.

رَحَى لَحْمِيَة : رَحَى دموية، بويضة قتلت بنزيف متعدد بين الساقط والمشيماء، في الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل وتسمى رَحَى ترفية أيضاً.

رَحَى عُدَارِيَة : مفهوم جرى فيه تغييرات كيسية تنكسية للزغب المشيمائية، وهو في العادة غير خبيث، ولكنه قد يعرف بالرحى العدارية الخبيثة، إذا ما اخترقت جدار الرحم، ولكن يجب تفرقه عن الظهاروم المشيمائي الخبيث حقيقة.

رَحْج : ١- رح رجحاً : اتسع الرجل، لم يكن أخمص القدمين.

رَحَج : سعة في حافر الدابة ٢- قدم مسطحة، وهبوط القعب.

رَحْلَان : حركة الجسيمات الغروانية المشحونة تجاه المهابط الموضوعة في سائل.

رَحْلَان مِطْقِي : تحوير طريقة الرحلان الكهربائي، بحيث يُنتج الحقل الكهربائي على داعمة صلبة؛ كالرحلان على مصفاة، هلامية النشاء، هلامية الآجار، كتلة النشاء، هلامية بولي أكريل أميد.

رَحْلَان دُرْقِي : طريقة للاستشراب، لاكتشاف خضابات الدم غير العادية.

رَحِم : عضو حيوي في الجهاز التناسلي عند المرأة وهو جسم عضلي أجوف، يتم فيه تكوين الجنين في تسعة أشهر قبل الولادة، وتقع الرحم الخالية في داخل الحوض بين المثانة والمستقيم، ولكنها عند الحمل تكبر وترتفع إلى البطن تدريجياً، طولها عند غير الحامل حوالي ٧.٥ ملم كمثرية الشكل ومسطحة في المنطقة التاجية وتقسّم إلى الجسم العريض من فوق الذي ينحني إلى الأمام بدرجات قليلة على الرقبة الأضيق تحته، وتفتح الرقبة في المهبل. ويتصل بقرنيها أئبويتان رحميتان تنقل كل منهما البويضة من المبيض إلى الرحم، فإذا لم تلقح فإنها تتلف وتطرد، وأما إذا لقحها حيوان منوي في الأئبوب الرحمي، فأنها بعد دخولها الرحم تنغرز في جدارها وتأخذ في النمو، إذا خرجت عن وضعها التشريحي الصحيح تسبب آلاماً في الظهر وخاصة في وقت الحيض.

رَحِم أَحَادِي الْفَرْجَة : تشوه في الرحم، حيث يكون نصف واحد من أنابيب جنيب الكلوة الجنينية المتوسطة متطور بشكل كامل، أما النصف الثاني فيكون صغيراً جداً، أو غائباً.

رَحِم جَنِينِي : رحم صغير رقبته أكبر من جسمها.

رَحِم حَامِل : رحم به بيضة ملقحة منغرزة طبيعياً في جداره وتتطور إلى جنين.

رَحِم ذُو مَسْكَنَيْن : رحم مقسم الى جزئين بواسطة حاجز.

رَحِم ذُو قَوْهَتَيْن : رحم فيه الفم الخارجي للرقبة مقسوم بواسطة جدار.

رَخَاوَة ١- ارتخاء التوتر، أو الضغط خاصة في العضلات. ٢- غياب الطاقة العادية، أو القوة.

رَخَدَ : اضطراب في استقلاب الكالسيوم والفوسفور الذي يحدث في الطفل النامي نتيجة نقص فيتامين "د". وهناك عوامل مؤهبة كالنمو الهيكلي النشط، والخداج، وبشكل عام خلال التغذية الأمية في الأطفال المرضعون والاستعمال المنفصل لحليب بقر غير مقوى، وعدم تعرض الجلد بانتظام للأشعة تحت البنفسجية من ضوء الشمس، والإضافة السريعة للنشاء بحيث يمنع الاينوزيتول الحمضي الفوسفوري امتصاص فيتامين "د" من قبل المصران الأعراض التقليدية تتعلق بالارتخاء العام والتطور المتأخر بحيث تظهر اضطرابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والسني والعصبي والجلدي قبل الأعراض التقليدية للشوشو الهيكلي، وتعتمد هذه على درجة طراوة العظام وعلى كمية الوزن التي تتعرض له لاحتماله، ويتألف العلاج من إعطاء فيتامين "د" مترافقاً مع التعرض لضوء الشمس، أو الأشعة فوق البنفسجية وتشمل الوقاية إعطاء فيتامين "د" بشكل منتظم للخداج، والطفل المطمع بشكل صناعي من نهاية الشهر الأول للحياة، وللطفل الرضيع من صدر أمه من نهاية الشهر الثاني. ويجب أن يستمر إعطاء فيتامين "د" طيلة فترة النمو أثناء الطفولة.

رَخَدِي : يتعلق بالرخذ، أو متأثر به، أو له ميزاته. **رَخَدَ متأخر** : تغييرات رخدية في العظم نتيجة وجود تعطل كلوي طويل الأمد.

رَحِمٌ ذُو قُرْنَتَيْنِ : رحم مقسوم إلى نصفين منفصلين في نهايتهما العليا ومتحدتين إلى حد ما في أسفلهما.

رَحِمٌ عديم العنق : رحم بدون رقبة.

رَحِمٌ مَقْوَسِي : رحم مضغوط في مركز الجسم مما يعطيه مظهراً مقوساً.

رَحِمٌ قصير العنق : رحم يكون جسمه عادياً ولكن العنق إما ضامراً، أو مختفياً.

رَحِمٌ طفلي : رحم يحافظ على شكله الطفلي قبل بدء الحيض إلى حياة الكبار؛ أي أن الرقبة والجسم يكونان من نفس الطول.

رَحِمٌ مزدوج : رحم مزدوج، أو رحمين لكل منهما بوق واحدة.

رَحِمِي : يشير إلى أو يتعلق بالرحم.

رَحِمِي بطيني : يتعلق بالرحم والبطن.

رَحِمِي بوقي : يتعلق بالرحم والبوق الرحمي.

رَحِمِي عجزي : يتعلق بالرحم وعظام العجز كالرباط الرحمي العجزي.

رَحِمِي عنقي : يتعلق بالرحم ورقبته.

رَحِمِي مبيضي : يتعلق بالرحم والمبيض.

رَحِمِي مثالي : يتعلق بالرحم والمثانة البولية.

رَحِمِي مستقيمي : يتعلق بالرحم والمستقيم.

رَحِمِي مشيمي : يتعلق بالرحم والمشيمة.

رَحِمِي مهبلِي : يتعلق بالرحم والمهبل.

رَخَدَ كَلَوِي : تغييرات عظمية نوعية تحدث عند الأطفال الكبار مترافقة مع تعطل وظيفة الكلوة ويمكن تمييز نوعين بالأشعة ؛ النوع التقليدي الرضيعي، ومظهر صوفي منقط للعظام الطويلة والقحف.

رُخْصَة : ١- التسهيل في الأمر والتفسير ٢- إذن تبيح به الحكومة لحامله مزاوله عمل ما، أو استعمال شيء، أو نقله كرخصة البناء ورخصة ممارسة المهنة.

رَخَو : الهش من كل شيء، -الشيء؛ لأن وسهل، بدون عظام.

رَخِيفَة : كرية هدفية ؛ كرة دموية حمراء رقيقة جداً بشكل غير عادي ج: رخائف.

رَدَ : إعادة الأنسجة المتحركة عن موضعها إلى موضعها الأساسي كالكسر، أو الفتق.

رَدَ مغلِق : رد يدوي لكسر، أو خلع بدون فتح الكسر وتعريض أجزائه.

رد مفتوح : الإجراء الجراحي لرد كسر أو خلع بفتح الكسر وروية العظام المنزاحة.

رد الانغلاف : تزييف أو رد انغلاف، غالباً في المصران.

رَدَاح : ١- المرأة الثقيلة الوركين، كفلاء. ٢- لها تجمع زائد من الشحم على الوركين.

رَدَاحَة : تجمع زائد من الشحم على الوركين والإلية، يشاهد في أجناس أفريقية معينة عند النساء.

رَدْبُ : ١- الطريق السذي لا ينفذ، حفرة في جسم مسدودة مه طرف ج: رُدوب ٢- انضغاط، أو حفرة.

رَدْبُ إِهْلِيلِجِي للدهليز : رذب في الجزء الخلفي من الدهليز، وهو المكان الذي توجد القرية فيه.

رَدْبُ بَصْرِي : امتداد لتجويف البطين الثالث إلى الفسحة بين السبل البصرية المبتدئة.

رَدْبُ ثِرْبَسِي عُلُوِي : حفرة في الثرب الصغير، رَتَج مَوْجَه إلى الأعلى يقع بين القص السفلي للكبد والحجاب الحاجز.

رَدْبُ ثِرْبَسِي سَفْلِي : حفرة في الثرب الصغير، رَتَج متوضع إلى الأسفل بين المعدة والمعدة.

رُدُوب جَنْبَوِيَة : امتداد شقي ضيق على طرف التجاويف الجنبوية، وتمتد إليها الرئتين فقط عند إجراء تنفس قسري.

رَدْب خُلْف الأَعور : جيب صفائي واسع الفم بين الأعور وشفق الحفرة الحرقفية.

رَدْب طَحَالِي : ذلك الجزء من جراب الثرب الذي يمتد إلى مرق المعدة الخلفي ويرتبط إلى اليسار بالأربطة المعدية الطحالية، والطحالية الكلوية.

رَدْب عَقْجِي سَفْلِي : جيب صفائي إلى يسار الجزء الثالث من العفج، ويفتح إلى الأعلى ويقع خلف ثنية صفائية تسير من العفج إلى صفق الجدار البطني الخلفي.

رَدْب عَقْجِي عُلُوِي : جيب صفائي صغير إلى يسار الجزء الثالث من العفج ويفتح إلى الأسفل، ويقع خلف ثنية صفائية تسير من العفج إلى الصفق الجداري للجدار البطني الخلفي .

رَدْب قَمْعِي : رذب في البطن الثالث في قاعدة قمع النخامى.

رَزَّ : أو **أَرَزَ** من محاصيل الحبوب الغذائية التابعة للفصيلة النجيلية موطنه الأصلي في الغالب شرق آسيا وهو غذاء رئيسي لأكثر من نصف سكان العالم، بعد ضربه وتبييضه، وتعتبر هذه من الصناعات الهامة في الدول المنتجة للأرز، ولعمليات ضرب وتبييض الرز منتجات ثانوية هامة. تستخدم حبوب الرز من الدرجات الواطنة علفاً، والقشور وقوداً، والرجيع الناتج عن عملية التبييض علفاً للماشية والدواجن والأرز المكسور لغذاء الطيور، أو يطحن ويخلط بدقيق القمح، ويستعمل لصناعة النشاء وبعض المشروبات الروحية ومساحيق الوجه، ويستعمل قشر الأرز لصناعة الورق والسماد العضوي، كما تربي الأسماك في أحواض الأرز.

رَزَّه : مفصل بكري؛ وهو مفصل يتيح الحركة في مستوى واحد فقط.

رُزْمِيَّة : جنس من الجراثيم يتبع عائلة المكورات الدقيقة، ويتميز بالانقسام في ثلاثة مستويات أثناء التكاثر، منتجاً مجموعات منظمة، وهي في العادة إيجابية الغرام، وتنمو على الأغار بغزارة وتنتج في معظم الأحيان صبغة صفراء، أو برتقالية، وقد تم وصف تسعة أنواع وفحصها كلياً ويظهر في الأدب الطبي؛ أنواع أخرى غير موصوفة بشكل جيد ربما تكون أسماء مرادفة.

رُزِّي الشكل : له مظهر حبوب الرز.

رُزِيم : نوع من الأزهار؛ حيث تنتظم الأزهار بشكل متناوب على جوانب متقابلة من الجذع، وأقدم زهرة تكون على القاعدة.

رَدَب كَسْبِدِي كَلَوِي : جراب من الصفاق؛ يقع خلف وتحت الفص الأيمن للكبد، وأمام الغدة الكظرية اليمنى، والجزء العلوي من الكلوة اليمنى، والجزء الثاني من الفعج، الثنية الكبدية للقولون، ومساريق القولون المستعرض، ورأس المعثكلة، وهو محدد إلى الأعلى بالطبقة السفلى للرباط التاجي والرباط المثث الأيمن ويعرف أيضاً بجراب 'موريسون'.

رَدَب كُرَوِي للدهلز : رذب في الجزء الأمامي من الدهلز ويحتوي على الكَيْس

رَدَب لَفَائِفِي أُعْوَرِي العلوي : رتج صفاقي بين الثنية الوعائية للأعور ومساريق اللفائفي النهائي، ويتجه فمه إلى الأسفل واليسار.

رَدَب لَفَائِفِي أُعْوَرِي سُفْلِي : رذب صفاقي يتجه فمه إلى الأسفل واليسار ويقع بين الثنية اللفائفية الأعورية " ثنية تريفس " ومساريق الزائدة الدودية.

رَدْبَة : جيب، رتج، كجيب الملحمة.

رَدُوذ : قابل للرد، والوضع في مكان مناسب كالفتق.

رَدِيم : في علم الأجنة؛ المرحلة الأولى في تمييز أي عضو.

رَدَّ : السماء: أمطرت الرذاذ أي المطر الخفيف.

رَدَّاذ : المطر الخفيف، محلول من نقاط دقيقة من سائل في الهواء أو غاز يستخدم في علاج الحلق والممرات الأنفية.

رَدَّوُذ : رذاذ يستخدم كدواء في محلول زيتي أو كحولي أو مائي لعلاج الحلق والأنف.

رَسَابِيَّةٌ : مادة كانت سابقاً في محلول، ثم ترسبت فيه كالترسب الحاصل كنتيجة للتفاعل بين عديد البييتيد الجرثومي مع مصله النوعي المضاد، أو المركب غير الذائب الناتج عن إضافة مادة إلى المحلول.

رُسْنُغٌ : رسغ اليد المكون من ثمانية عظام رسغية تسهل حركة اليد إلى عدة اتجاهات.

رُسْنُغِي : يتعلق بالرسغ.

رُسْنُغِي رُسْنُغِي : يتعلق بجزئين من الرسغ كالمفصل بينهما.

رُسْنُغِي سُلَامِي : يتعلق بالرسغ والسلامة.

رُسْنُغِي سِنْعِي : يتعلق بالسنع والرسغ معاً.

رُسْنُغِي قَدَمِي : يتعلق بالرسغ في اليد والقدم مثلاً أي بنية للرسغ، أو القدم، أو أي من أصابع اليد والقدم.

رَسْمُ عَتَمَةٍ وَعَائِيَةٍ : الطريقة المستعملة لاكتشاف ورسم العتمة الوعائية؛ أي العتمة الناتجة عن ظلال الأوعية الدموية في الشبكية وعبر الحقل البصري، وتظهر الظلال كامتدادات للنقطة العمياء وتحتاج إلى طرق خاصة لاكتشافها.

رَسْمِي : ١- عمل ينتسب إلى الدولة ويجري على أصولها المقررة.

٢- يدل على أن المادة، أو الدواء المعنية مضبوطة بنشرة حكومية كدستور الأدوية، أو الأقراباذين.

رَسَنُ الْخَصِيَّةِ : حبل سميك غني بعديدات البييتيد المخاطية وعلى نهايته العليا تقع الخصية والبربخ، وتقع نهايته السفلى في منطقة درز الخصية. وظيفته

هي توسيع القناة الإربية لمساعدة نزول الخصية، ونمو الناتئ العمدي، وهناك بنية مشابهة عند الأنثى ولكنها تتحول إلى الرباط المدور للرحم والرباط المبيضي.

رَسُوبٌ : يكون في وضع قابل للترسب، وهو حالة الشوارد التي يلقي بها خارج المحلول.

رَسٌ : مجموعة من الأشخاص لها صفات متشابهة، بحيث أنها تبدو من أصل واحد. ٢- مجموعة مميزة من الصفات التي تنتقل إلى النسل.

رَسِيٌّ : عنصري يتعلق بالرس.

رَشُلٌ : ١- رش الماء؛ فضضه ومزقه. الشيء؛ غسله. ٢- رش النباتات النامية بمحاليل المبيدات الحشرية وتستخدم موتورات الرش. ٣- رش

الحمى، ازدياد عدد أرومات تمر في الدم في بعض أمراض فقر الدم الانحلالي خاصة فقر دم أرومة الحمى. وأيضاً في فقر الدم اللبيل.

رَشَاحَةٌ : الذي يمر في مرشحة كرشاحة جرثومية، أو رشاحة الكبيبات في الدم.

رَشَاحَةٌ مُسَدِّقَةٌ : الرشاحة في غشاء غرواني معروف قطر الفتحات، حيث تكون الحمات المعروفة وجسيمات غروانية، بحيث لا تمر من المرشحة.

رَشَاشِيَّةٌ : جنس من الفطريات؛ من عائلة الفطور الزقية من أنواعه؛ الرشاشيات الدخنية والرشاشيات السود، وهي من الملوثات التي تتوضع في فتحات الجسم كالآذن والأنف والحجاج، أو تدخل جروح القدم فتسبب الورم الفطري القدي، أو تصيب الأظافر، أو الجهاز التنفسي، أو الهضمي، فعّلها

١- عمل ينتسب إلى الدولة ويجري على أصولها المقررة.

٢- يدل على أن المادة، أو الدواء المعنية مضبوطة بنشرة حكومية كدستور الأدوية، أو الأقراباذين.

رَسَنُ الْخَصِيَّةِ : حبل سميك غني بعديدات البييتيد المخاطية وعلى نهايته العليا تقع الخصية والبربخ، وتقع نهايته السفلى في منطقة درز الخصية. وظيفته

رَشْفُ العدسة : إزالة العدسة البلورية بواسطة فنجان صغير الذي يصمم ليلتصق بمحفظة العدسة بواسطة الرشف.

رَشْق : رمي أي شيء باتجاه الأمام.

رَشْن : ١- التلثة في النهر يستقى منها. ٢- رشن رشنا : تطفل وتحين للطعام. ٣- الحصاة المخصصة للشخص من الطعام والشراب.

رَشُوح : قادر على المرور من مرشحة.

رَشُوم : ورم ناتج عن فطريات الرشاشيات (انظر هناك).

رَشِيح : رشاحة - العرق.

رَصَاص : عنصر فلزي ثقيل وزنه الذري ٢٠٧، وعدده الذري ٨٢- لونه فضي خفيف، إذا كان حديث القطع، ويحول إلى الدكنة إذا تعرض للهواء، وهو رخو قابل للطرق، قوة شدة منخفضة، موصل ضعيف، يدخل في مركبات عديدة، يستخدم لتغطية الكابلات وتطين أحواض الغسيل في المعامل وفي الخلايا الحليكهربية وفي القاعات الرصاصية لتحضير حمض الكبريتيك ولعمل ألواح بطاريات التخزن الكهربية، كل مركباته سامة وتستخدم في الأطلية وصنع الزجاج وفي البناء ولصناعات ديزل السيارات. علاجياً تستخدم مركباته كمحاليل قابضة ولكن أهميته الطبية تكمن في سميته، وأهم أعراض التسمم الرصاصي هي التشنجات البطنية والإمساك. وفقر دم قعد منقط وارتخاء الرسغ وخط منقط مزرق قرب حدود اللثة عندما يحدث امتصاص كمية كافية من الرصاص. وقد استخدمت مركبات الرصاص لإنتاج الإجهاض وسببت وفيات عديدة.

المرضى ضعيف على الإنسان، إلا إذا ضعفت مقاومته نتيجة خمج شديد، أو أحداث مضعفة للمقاومة كالمعالجة الشعاعية وإستعمال المضادات الحيوية، عندئذ ينمو الفطر بسرعة مشكلاً مستعمرات قطنية تتركب من خيوط ذات حواجز تحمل كتلاً بوعية فتنتج الآفات المرضية. إما نتيجة الاستيلاء السطحي والتكتل في مكان وجود الفطر كما في ذات القصببات الرشاشية، حيث تخرش الرشاشيات القصببات فيزداد إفرازها المخاطي، فتتشكل من تكتل الخيوط وتشعبها ضمن المخاط كتلاً صغيرة تسد لمعة القصببات، أو تحدث أوراماً رشاشية، أو خراجات دموية وت شاهد الإصابات في الجهاز الهضمي، في الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء، وقد تؤدي لانتقال المريء إلى المنصف، وتعالج إما باستئصال الأورام جراحياً، أو إعطاء أدوية كالامفوتريسين.

رُشَافَة : ١- رشف : مرض بشفتيه ٢- ما يرتشف، أو يمتص بواسطة جهاز الشفط.

رُشَافَة : جهاز الشفط، وهو جهاز لإزالة السائل من تجويف بالرشف.

رَشَج : مرور سائل خلال غشاء كرشحة.

رَشْحَة : أي سائل قد مر خلال غشاء، أو الجلد مع بعض أملاحه المعينة.

رُشْد : ١- الهداية والنضج، السن التي إذا بلغها الإنسان استقل بتصرفاته، سن الرشد. ٢- حالة النضج الجسدي والنفسي التام. ٣- السنوات التي تكمل فيها الأعضاء التناسلية وظيفتها.

رَشْف : عملية إزالة أي سائل، أو غاز من تجاويف الجسم بواسطة المص، أو السحب.

رَصَاصِي : يتعلق، أو يتسبب عن الرصاص.

رَصْنَعَة : ١- ثلثة خفيفة تنتج بعد انقباض ندبة جرح، أو رضحة. ٢- ثلثة طبيعية، أو انضغاط على سطح جزء من الجسم.

رُصُغ : العظام السبعة للقدم التي بين الظنوب والشلطية والمشط، وتتألف من؛ العقب والقعب والزورقي والنردى والعظام الإسفينية الثلاثة.

رُصُغِي : يتعلق بالرصغ.

رُصُغِي رُصُغِي : يصف التماسك بين صفي عظام الرصغ.

رُصُغِي سَلَامِي : يشمل رصغ القدم والسلاميات.

رُصُغِي ظَنْبُوبِي : يشمل رصغ القدم والظنوب.

رُصُغِي مَشْطِي : يشمل رصغ القدم والمشط.

رَصُوص : قابل للتفاعل مع راصة نوعية.

رَصُوصِيَة : القابلية للتراص.

رَض : ١- دقه جريشاً ولم ينعم الدق. ٢- جرح سطحي سببه ضربة لم تفصل الجلد.

رَضَاع : تغذية الأطفال بالحليب منذ الولادة حتى الفطام.

رَضَاعَة : وسيلة لتعويض حليب الأم بإعطاء بديل كزجاجة الرضاعة.

رَضُح : رضح رضحاً، الشيء : دقه بالحجر وكسره - جرح.

رَضُح ولادي : أذى للجنين خاصة الرأس يحدث خلال الولادة.

رَضُح نفساني : اضطراب ضعفي نفسي.

رَضُح ضَغْطِي : اضطراب في وظيفة عضو نتيجة اختلاف الضغط الجوي على سطحين لأعضاء حيوية كالأذن والجيوب الأنفية.

رَضُحِي : يتعلق بالرضح، أو الجرح.

رَضُحِي المنشأ : يتسبب عن رضح.

رَضُحِيَّات : مبحث الجروح والرضوض. الفرع من الطب الذي يتعامل مع الإصابات المدنية والعسكرية الناجمة عن حوادث الطرق والحوادث الحربية.

رُضْفَة : وهي عظم سمسماني يقع ضمن وتر مربعة الرؤوس الفخذية يشبه مثلاً ذروته تقع في الأسفل وقاعدته في الأعلى، تتصل الذروة بأحدوية الظنوب بواسطة الرباط الرضفي، ويتمفصل سطحه الخلفي مع لقمتي عظم الفخذ، ويتوضع في موضع ظاهر في مقدمة الركبة، ويمكن أن يجس بسهولة عبر الجلد، ويفصل عن الجلد بجراب مصلي تحت جلدي.

رُضْفِي : يتعلق بالرضفة.

رُضْفِي الشكل : على هيئة وشكل الرضفة.

رَضِيع : الوليد إلى أن يبلغ السنتين، ويتفاوت معدل نمو الرضع تفاوتاً بعيداً لا يجوز فيه التعميم. ويزن الوليد السوي نحو ٥،٢-٥،٤ كغم، وينقص وزنه في الأيام الأولى بعد الولادة، ولكنه يسترد النقص قبل نهاية الأسبوع الثاني وفي الشهر السادس يتضاعف وزنه مثليين وفي تمام العام يتضاعف ثلاثة أمثال، وعند الولادة تكون بعض عظام جمجمته غير ملتحمة وفي الأسابيع الأولى القلائل، بعد الولادة تتغلق البروز ولكن تبقى بقعتان رخوستان، أو يافوخان أحدهما صغير في مؤخر

رُطُوبَة نسبية : نسبة كمية الرطوبة في الهواء وتعتبر نسبة الإشباع ١٠٠%.

رُعَاش : ١- اهتزاز غير عفوي، غير هادف، منتظم لمجموعات مقابلة من العضلات في انقباض وانبساط. ٢- رعشة تصيب الإنسان من داء يصيبه.

رُعَاش إرادي : ارتجاج خلال أداء عمل إرادي، وقد تمتد الأعمال الارتعاشية إلى جميع الجسم كمبالغة في رعاش الحركة، ويشاهد هذا في أمراض المخيخ والتصلب المتعدد.

رُعَاش الحَرَكَة : رعاش يظهر، أو يزداد مع حركات إرادية ويمكن أن يظهر بشكل واضح مع نهاية الحركة خاصة عند المبالغة.

رُعَاش رَفِيق : رعاش يحدث بعد إكمال حركة إرادية عنيفة، أو رعاش يتطور كنتيجة للتعب، أو استمرار تثبيت العضل.

رُعَاش غَلِيظ : رعاش تكون حركاته الارتجاجية بطيئة، أو غليظة.

رُعَاش الوَضْعَة : رعاش يتطور عند محاولة وضع طرف في وضع معين.

رُعَاشي : يتعلق بالرعاش.

رُعَاف : نزيف من داخل الأنف ينجم عن أسباب محلية بالأنف، أو أسباب عامة، ومن الأسباب المحلية المسببة للرعاف؛ حدوث إصابات للأنف، والتهاب شديد وقرح، وإخفاق، أو ورم في داخل الأنف حميد، أو غير حميد. ومن الأسباب العامة المسببة للرعاف؛ ارتفاع في ضغط الدم، ووجود بعض أمراض الدم مثل مرض الفرفرية، أو مرض

الرأس وينتقل بعد ستة أسابيع، والآخر كبير في مقدمة الرأس، وينتقل بعد حوالي عام. ومواعيد ظهور الأسنان تتفاوت كثيراً، فيظهر القاطعان الأوسطان الأسفلان ما بين الشهر الخامس والثامن، والقواطع الأربعة العليا ما بين الشهر العاشر والحادي عشر، والطواحين الأمامية الأربعة ما بين الشهرين الثاني عشر والخامس عشر، والأنياب الأربعة ما بين الشهرين الثامن عشر والتمم للعشرين، والطواحين الأربعة الخلفية ما بين السنة الثانية ومنتصف الثالثة. ويزود الحليب الرضيع بجميع عناصر غذائه اللازمة ما عدا فيتامين "ج"، "د"، اللذين يجب إضافتهما إلى غذائه حسبما يشير الطبيب، ومن المهم لنمو الطفل العقلي والنفسي إحاطته بمشاعر الرعاية والمحبة من قبل الأم والأشخاص المحيطين به.

رَضِيع مُزَرَّق : طفل حديث الولادة يشكو من زراق؛ إما ناجم عن انخماص خلقي، أو تشوه خلقي للقلب، وفي الحالة الأخيرة يمكن أن يكون نقص في تطور الحواجز بين الجوانب اليمنى واليسرى للقلب، أو تضخم للبطين الأيمن. ويمكن أن تنجم عن تشوه في الأوعية الكبيرة، أو وضع يميني للأبهر، أو تضيق رئوي. ويتسبب الزراق؛ عن اختلاط الدم من جهتي القلب وعدم وصول كمية كافية من الدم إلى الرئة.

رُطُوبَة : حالة كل جسم أو شيء رطب يحوي بعض الماء.

رُطُوبَة مطلقة : كمية البخار المائي، التي تتكون في وحدة معينة من الهواء، وتقدر في المادة بالغرام في كل متر مكعب.

السعال، أو مرض الإسقربوط، أو إصابة الشخص بأنواع شديدة من الحمى تأخذ اتجاهاً نزقياً.

رُعَام : داء يأخذ في الأنف فيسيل منه المخاط بسببه عسوية فايبريلا مالمى، وتنتقل إلى الإنسان مباشرة عن طريق حيوانات مريضة كالحصان والبغل والحمار، أو من المرض، مسببة الوفيات مرتفعة جداً، ويتميز المرض بأفات التهابية متقيحة؛ تبدأ من الغشاء المخاطي للأنف وأنسجة تحت المخاط. وتظهر أعراض مفصلية في الحيوانات المصابة، التي يجب ذبحها ويكون العلاج فقط عرضي.

رِعَايَة الْوَلِيد : الاهتمام بالطفل بعد ولادته، وقد تبدو رعايته في أول الأمر مسألة معقدة جداً للسيدة في أول عهدها بالأمومة، غير أنها سرعان ما تتمرس فيها، معتمدة في العادة على إرشادات الأكبر سناً وخبرة، وعلى ما يتيسر للقراءة من كتب تعليم الأم (انظر رضيع) وتشمل رعاية الوليد ١- التغذية حيث ينصح باستعمال الرضاعة الطبيعية وحبليب الأم كغذاء كامل ومع تقدم العمر يبدأ بإطعام الطفل الطعام العادي تدريجياً. ٢- النظافة، والنظافة مهمة جداً للوقاية من الأمراض من جهة ولراحة الطفل النفسية والجسدية. ٣- الرعاية العاطفية وهي مهمة جداً لتطور الطفل العاطفي وتجنب العقد النفسية والأمراض النفسية في مرحلة الشباب.

رِعَايَة الْحَامِل : تلقى العناية بالحوامل اهتماماً خاصاً. فقد أصبح من الثابت أن العناية الطبية بالحوامل من أنجع الوسائل لسلامة الحمل والولادة ولها أعراض أربعة، الأولى كفاءة الصحة للمرأة الصحيحة، والثاني تصحيح الاعتلال في المرأة المريضة، والثالث التنبيه لأسباب التي قد تسبب

عسر الولادة وإزالتها، والرابع إرشاد الحامل إلى الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للولادة. وتتلخص رعاية الحامل في الإرشاد الصحي من جهة، أي تنظيم المأكّل والملبس والتريض والعناية بالتدخين، كما يشمل التنبيه إلى علامات الخطر أثناء الحمل، ومن جهة أخرى تشخيص العلل التي قد تطرأ على الحامل والمبادرة إلى علاجها حتى لا تتفاقم، كذلك الوقاية من أمراض الحمل والتكهّن بما يمكن أن يحدث من مضاعفات وقد أدت رعاية الحوامل إلى انخفاض نسبة وفيات الولادة في البلدان التي تتبعها.

رُعْب : الخوف (انظر هناك).

رِعْدَة : نوبة ارتجاف مترافقة مع شعور بقشعريرة في الجلد بالرغم من أن الحرارة الداخلية قد تكون مرتفعة. كما قد يرافقها اصطكاك الأسنان وتثشّب من تتابع انقباض العضلات الإرادية، وتسبب الرعشة من إحساس بالبرد وتقترب ببعض أنواع الحمى، إذ تحدث في بداية الالتهاب الرئوي، أثناء مرض البرداء والتسمم الجرثومي، وقد تصاحب المغص الناشئ من حصوات المرارة وتزول بالتدفئة التدريجية. ويجب علاجها وسببها.

رَعْن : ضربة الشمس، وتسبب عن التعرض للحرارة الشديدة، أو لأشعة الشمس المتوهجة، مما يؤدي إلى اضطراب في الجهاز المنظم لحرارة الجسم. ويسبب هذا الاضطراب؛ كثرة ما يفقده الجسم من ملح كلوريد الصوديوم، فيما يفرضه من عرق غزير. والأعراض الأولية لضربة الشمس هي : الصداع، الدوار، الغثيان، واضطراب الرؤيا، ويعقب هذه الأعراض فقدان الوعي، وسخونة الجلد وجفافه واحمرار الوجه، وسرعة النبض وعناء التنفس،

وارتفاع حرارة الجسم ومن الأعراض التي تحدث أحياناً؛ الهذيان والتشنج والغيوبة، ومن الضروري أن يلزم المريض الراحة التامة في مكان بارد، مستلقياً على ظهره مع رفع رأسه، مع العمل على خفض درجة حرارة جسمه باستعمال الضمادات الباردة، أو حوض ماء بارد وينبغي استدعاء الطبيب إذا لزم الأمر.

رَعِيل : ١- قائمة أسماء، كأطباء التأمين لمعالجة مرضاهم، أو أسماء المرضى الذين يعالجهم طبيب معين. ٢- هيئة المحلفين.

رُعَامَى : أنبوب غشائي غضروفي مرن، يبلغ طوله ١٠-١١ سم وقطره الظاهري ٢ سم في الرجل البالغ، ٥،١ في المرأة الشابة. تتألف من سلسلة من القطع الغضروفية الزجاجية بشكل حذوة الفرس بحيث تبقى اللعة مفتوحة، تتحد النهايات الخلفية للقطع الغضروفية بواسطة ألياف عضلية ملساء ونسيج ليفي مرن. تبدأ الرغامى في العنق عند الحافة السفلية للغضروف الحلقى مقابل الحافة السفلية للفقرة الرقبية السادسة، وتنتهي عند مستوى الزاوية القصية مقابل القرص بين الفقرتين الصدريتين الرابعة والخامسة بالانشعاب إلى قسبتين رئيسيتين يعني ويسرى، وينخفض هذا الانشعاب في الشهيقي العميق إلى مستوى الفقرة الصدرية السادسة، يقع النصف العلوي للرغامى في القسم السفلي للعنق بينما يقع نصفها السفلي في القسم العلوي للصدر ضمن النصف العلوي، وتقع الرغامى على الخط الناصف، إلا أنها تتحرف في نهايتها السفلية قليلاً إلى اليمين بسبب قوس الأبهري، وفي مقدمة المريء مباشرة، ويتوضع العصب الحنجري الراجع

الأسرى في الزاوية بين الرغامى والحافة اليسرى للمريء. وترتبط الرغامى والمريء مع بعضهما بواسطة نسيج ضام رخو.

رُغَامِي : ينتسب إلى الرغامى.

رُغَامِي حَنْجَرِي : يتعلق بالرغامى والحنجرة.

رُغَامِي قَصَبِي : يتعلق بالرغامى والقصبات الهوائية.

رُغَوَة : ما يعلو السوائل عند غليانها، أو مزجها، أو ذوبان شيء فيها وهو مزيج من فقاعات غازية دقيقة في سائل.

رَف : ١- خشبة، أو نحوها تشد إلى حائط، كل مسترق من الرمل ج: رفوف، ٢- أي بنية منبسطة تشبه الرف.

رَفَ الجفن : عملية اهتزاز الجفن.

رَفَ المَجْهَر : المنصة التي تشكل جزءاً من تركيب المجهر حيث توضع الشرائح، أو الأشياء لتدويرها.

رِفَاع : درز، ندبة، في التشريح لوصف خط، أو مستوى، أو اتحاد نصفين لبنية مكونة في الجنين من رديم ثنائي ج: أرفية.

رِفَادَة : خرقَة يضمد بها الجرح ، قطعة من القماش كتان، أو قطن مننسي توضع على منطقة لتخفيف الألم، أو وقف النزيف، أو تخفيف الالتهاب.

رِفَسَار : النابضية الرجوعية وهي قدرة الجسم المضغوط، على استعادة حجمه، أو شكله. نابض، أو مزود بنوابض.

رَفُو الإِحْلِيل : خياطة الإحليل عند وجود جرح، أو ناسور.

رَفُو الارْتِفَاق : خياطة الأجزاء المتفرقة من الارتفاق.

رَفُو الأسْهَر : خياطة الأسهر خاصة إذا كان مجروحاً، أو مفصلاً.

رَفُو الأعْوَِر : خياطة جراحية للمصران الأعور.

رَفُو أَم الدَّم : عملية تصليح أم الدم

رَفُو الأمْعاء : الإجراء الجراحي لخياطة خرق، أو جرح في الأمعاء.

رَفُو البْطْن : خياطة جرح في جدار البطن.

رَفُو البوق : إصلاح البوق الرحمي بواسطة الجراحة.

رَفُو التَّامور : خياطة جراحية لجرح في التامور.

رَفُو الثَّرِب : الإجراء الجراحي لخياطة الثرب.

رَفُو الجَفْن : جراحة لخياطة الجفنين واتحادهما، وأهم سبب لإجرائها هي تخدير القرنية.

رَفُو الحَالِب : خياطة جراحية للحالب في حال جرحه، أو وجود ناسور.

رَفُو الحَنَك : خياطة الحنك المشقوق.

رَفُو الرِّبَاط : خياطة رباط ممزق.

رَفُو الرُّغَامِي : خياطة جراحية للرغامي لإصلاح خلل موجود.

رَفُو الشَّرِيَان : خياطة شريان ممزق لإعادة لمعته إلى ما كانت عليه.

رَفُو الصَّوَار : خياطة جراحية لصوار ممزق.

رَفَال : غلاف من الجلد الرقيق، أو أي مادة مشابهة تلبس فوق القضيبي خلال الجماع، من أجل احتواء السائل المنوي ومنع الإخصاب، أو انتقال الأمراض الجنسية.

رَفَّة : الإغلاق التلقائي للجفون والذي يوزع الدمع مما يحافظ على رطوبة الملتحمة، الحركة التلقائية للوجه الناتجة عن إغلاق وفتح عين واحدة.

رَفْرَف : الإطار.

رَفْرَفَة : ١- رفرف الطائر بسط جناحيه وحركهما، ارتعش، ٢- ارتعاش، ارتجاف.

رَفْرَفَة أذُنِيَّة : انقباضات سريعة منتظمة لأذنين القلب مستقلة عن نشاط العقدة البطينية الأذينية، وهي غالباً ما تترافق مع مرض قلبي ولا سيما الرئوي، أو ارتفاع الضغط الشرياني، أو المرض الإكليلي، ولم يتفق تماماً على آلية الرفرفة، إذ كان يعتقد أنها ناجمة عن موجة من الانقباض تدور حول الأذنين.

ولكن هناك ما يوحي حديثاً بأنها تتجم عن بؤرة متبعية في الأذنين تنطلق إيعازاتها بسرعة ٢١٠-٣٠٠ في الدقيقة ولا يستطيع البطين الاستجابة لهذه السرعة، لذا يحدث درجة من الحصار الأذيني البطيني الجزئي، فيستجيب البطين لكل ثاني، أو ثالث، أو رابع انقباض أذيني. أعراض الرفرفة الأذينية قد تكون أعراض المرض الأصلي، وقد يشكو المريض من خفقان ذي بدء مفاجئ، وقد يكون هناك نبض غير منتظم وتظهر الرفرفة في تخطيط القلب الكهربائي، وتعالج الرفرفة بالديجيتاليس.

رَفْض : نبذ، ترك الشيء، أو إعادة.

رَفُو المَثَانَة : خياطة جراحية لجرح في المثانة البولية.

رَفُو المَحْفَظَة : خياطة جراحية لمحفظة. خاصة محفظة مفصل لإصلاح جرح، أو لمنع خلع المفصل.

رَفُو المَسَارِيق : عملية خياطة جراحية للمساريق.

رَفُو المُسْتَقِيم : جراحة تقطيب تمزقات المستقيم والشرج.

رَفُو المَعِدَة : خياطة جراحية لتقرب في المعدة. وقد تعني تثبيت المعدة ورأبها.

رَفُو المِهْبَل : وتشمل إما خياطة أطراف جرح، أو تمزق في جدار المهبل، أو تضيق لمعة المهبل.

رَفُو المِهْبَل والعِجَان : جراحة ترميمية لتمزق في العجان لخياطة أطرافه الممزقة.

رَفُو المَوْق : خياطة جراحية لواحد، أو أكثر من اللحاظ.

رَفُو الوَتَر : جراحة لخياطة أطراف وتر ممزق.

رَفُو الوَرِيد : خياطة جرح في وريد لإغلاق لمعة مفتوحة.

رَفُو الوِعَاء : خياطة أي وعاء دموي خاصة الشريان.

رَقَاد : ١- النوم العميق، أو النوم العميق غير العادي كالذهول.

رَقَبَة : ١- مؤخر العنق؛ رقاب ورقبات. ٢- الجزء من الجسم الذي يصل الرأس بالجذع، أي جزء ضيق يقع بين، أو يصل جزأين.

رَقَبِي : يتعلق برقبة الإنسان، أو عنق أي عضو.

رَفُو العِجَان : خياطة العجان لإصلاح تمزق حاصل.

رَفُو العِرْقُوب : خياطة وتر العرقوب بهدف زيادة طوله، أو إصلاح تمزق.

رَفُو العَصَب : وصل نهايتي عصب مقطوع بالخياطة مفاغرة عصبية.

رَفُو العَصَل : خياطة عضل مجروح ومقطع.

رَفُو العَظْم : خياطة جراحية، أو تسليك إجراء عظم مكسورة.

رَفُو العَفْج : خياطة جراحية للعفج.

رَفُو عَنَق الرِّحْم : جراحة لإصلاح عنق الرحم بالخياطة.

رَفُو الفَتَق : العلاج الجذري للفتق بتغيير مكان الأنسجة المتدلية وتقوية الجدار الضعيف بخياطته.

رَفُو القَصْبَة : خياطة أطراف ممزقة للقصبه.

رَفُو القلب : خياطة جراحية لعضلات القلب.

رَفُو قَنَاة الصَّفْرَاء : خياطة أطراف شق مصنوع في قناة الصفراء.

رَفُو قَنَاة المَرَارَة : خياطة قناة الصفراء.

رَفُو الكَلْوَة : جراحة تثبيت الكلو المتحركة.

رَفُو اللَّحَاط : عملية خياطة أي واحد من اللحاط.

رَفُو اللِّسَان : خياطة جراحية لجرح في اللسان.

رَفُو اللَّفَافَة : خياطة لفافة، أو سفاق ممزق، أو مقطوع.

رَفُو اللَّفَافِي : خياطة جراحية للفافتي.

رَفُو اللِّهَاء : خياطة ترميمية للهاء والحنك.

رَقَبِي إِبْطِي : يتعلق بالرقبة والإبط.

رَقَبِي صَدْرِي : يتعلق بالرقبة والصدر، أو يؤثر بهما.

رَقَبِي شَفَوِي : يتعلق بالحدود الرقبية على السطح الشفوي للسن.

رَقَبِي ظَهْرِي : يتعلق بالرقبة والظهر، أو يشملهما.

رَقَبِي عَضْدِي : يتعلق بالرقبة والعضد.

رَقَبِي قَذَالِي : يتعلق بالرقبة والقدال.

رَقَبِي كَتْفِي : يتعلق بالرقبة والكتف، أو يتصل بهما.

رَقَبِي لِسَانِي : يتعلق بالحد الرقبي، أو السطح اللساني للسن.

رَقَبِي وَجْهِي : يتعلق، أو يتصل بالرقبة والوجه.

رَقَصْ : داء الرقص وله شكلان؛ أولهما داء

الرقص الحاد لـ "سيدنهام" ويحدث عند الأطفال المراهقين ويغلب حدوثه عند الفتيات، وكثيراً ما يتلو التهاب البلعوم بالمعديات، ولذا يعتبر من المظاهر الرئوية، ومنه شكل يحدث أثناء الشهور الأولى من

الحمل (داء الرقص الحلمي) وأهم مظاهره السريرية الحركات الرقصية، التي قد تشمل كل الجسم بما فيها

اللسان والوجه، كما يمكن أن يقتصر على طرف علوي، أو سفلي، أو على شق كامل الجسم ويترافق

غالباً باضطرابات نفسية كالإهمال وسرعة الاستثارة والنزق، تشفى الحركات الرقصية خلال ١-٣ أشهر

والنكس شائع، ويسترافق في ١٠% من الحوادث بأعراض رئوية مفصلية وقلبية. يعالج داء الرقص

الحاد بمركبات الفينوتيازين والهالوبيريدول ويُعطى البنسلين المديد للوقاية من النكس كالحصى الرئوية. أما داء الرقص المزمن لـ "هونتغتون"، فهو مرض وراثي ينتقل بسجية جسمية قاهرة، ويظهر في الثلاثينات من العمر وتترافق الحركات الرقصية فيه مع عته تدريجي تتحسن الحركات الرقصية بالنتراينازين، أما عته التدريجي فيستمر.

رَقَصْ شَقِي : داء الرقص مع حركات في شق واحد من الجسم.

رَقَصْ حَمْلِي : داء رقص الحمل، أنظر التعريف الرئيسي.

رَقَصْ وَرَاثِي : داء الرقص المزمن الوراثي، وهو مرض نادر يشاهد في العائلات ويبدأ بعد الأربعين من العمر، وتشبه الأعراض، أعراض الرقص الحاد ولكنها مترافقة مع عته تدريجي مستمر وتسمى أيضاً برقص "هونتغتون" (التعريف الرئيسي).

رَقَصْ "سِيدْنَهَام" : داء الرقص الحاد (انظر هناك). سيدنهام، توماس. طبيب إنكليزي، لندن ١٦٢٤-١٦٨٩.

رَقَصَانِي : يشبه داء الرقص في شكله.

رَقَصِي : يتعلق بداء الرقص.

رَقَصِي الشَّكْل : رقصاني يشبه داء الرقص.

رَقَصِي كَنْعِي : حالة عصبية، حركاتها مميزة بالحركات الرقصية والكنعية الشنجية.

رَقَم الوَضْع : الرقم الذي يدل على عدد الولادات كالبكرية.

رَقَم الولادات: عدد الولادات التي حصلت من قبل

ولادة واحدة.

رَقْوَع: قابض له قوة توقيف النزيف، إما بوسائل كيميائية، أو ميكانيكية.

رَقِيب : ١- الحارس، ٢- الحاجز النفسي الذي لا يسمح لرغبات وأفكار غير واعية، في الظهور إلى الوعي، حتى يجري عدم التعرف عليها، يجعلها غير قابلة لذلك من قبل الشخص حسب نظرية "فرويد".

رَقِيق : اللطيف ضد الغليظ، الناعم.

رَكَاب : واحدة من العظيماة الثلاثة المتحركة في التجويف الأذني، ولها رأس، وسويقتان أمامية وخلفية، وقاعدة تغلق النافذة البيضية، ويصل قاعدة الركاب بالنافذة البيضية الرباط الحلقى، ولها عضلة الركاب، وهي أصغر عضلة في الجسم؛ تنشأ من نتوء هرمي في الجدار الخلفي للصندوق وتمتد إلى الأمام لترتكز على عنق الركاب، تتعصب بشعبة من العصب الوجهي. وعملها جذب الركاب إلى الخلف لمنع حركاتها عند التعرض للأصوات الشديدة وذلك حماية للأذن الداخلية.

رَكَابِي: يتعلق بالركاب، أو العضلة الركابية.

رَكَابِي دِهْلِيْزِي: يتعلق بالركاب والدهليز.

رَكَاْزَة : محلول كثيف يخفف قبل استعماله.

رَكَب: المخدة الدهنية التي تغطي جسم العانة.

رُكْبَة : الجزء من الطرف السفلي الذي يصل ما بين الفخذ والساق ج: رُكْب ورُكْبَات.

رُكْبَة رَوْحَاء: تشوه حيث تقترب الركبتان من بعضهما ويبتعد الكاحلان.

رُكْبَة فَحْجَاء : سيقان منحنية إلى الخارج.

رُكْبَة لَكَاء : حالة لا تستطيع فيها الركبة الامتداد كلياً، في العادة ناجمة عن تمزق في الغضروف الهلالي.

رُكْبِي : له زاوية، أو يتعلق بالركبة.

رُكْمَة: ١- الطين المتجمع بكثرة ٢- أي تراكم، أو تجمع لأي مادة.

رُكُود : بطن، أو توقف تيار سائل جارٍ مما يؤدي إلى تراكمه.

رُكُود صفراوي: توقف الصفراء في الكبد والقنوات الصفراوية.

رُكُود الغائط: إمساك مزمن نتيجة احتشاش الغائط.

رُكُود لمفي: توقف سيلان السائل اللمفي في أوعيته.

رُكُود مستقيمي: إمساك ناجم عن نقص قدرة المستقيم على التفاعل مع المؤثر الذي يسبب البراز.

رُكُود وريدي: توقف الدم في الأوردة في العادة نتيجة ضغط جهاز قياس ضغط الدم، أو توقف الدم عن الدوران.

رُكُودي: يتعلق بالركود، متوقف، عكس متحرك.

رُكْبِيَة : ركبة صغيرة، أي زاوية كالركبة في أي عضو، أو بنية.

رُكْبِيْزَة : ١- ما يرتكز عليه الشيء، ٢- يستخدم الاصطلاح في كيمياء الإنظيمات لتعريف المركب الذي يعمل فيه الإنظيم.

رَمَاد : ما يتبقى من المادة بعد احتراق المواد النباتية، أو الحيوانية، ويتوقف تركيب الرماد على

مصدره، فأغلب رماد الخشب من كربونات البوتاسيوم وأكسيده، وأغلب رماد العظام من فوسفات الكالسيوم، وأغلب رماد البحر من كربونات الصوديوم واليود.

رَمَادُ الْعِظَام : الرماد المنقى بعد حرق العظام ويتكون غالباً من فوسفات، كربونات الكالسيوم.

رَمَادُ فَحَامِي : نوع من السحار، أو تغبر الرثة يتكون من سحار فحامي وسحار سليسي، ربو عمال المناجم.

رَمَام : أي كائن عضوي نباتي تعيش على مواد ميتة ومتفحمة، وليس على مواد حية.

رَمَان : اسمه العلمي "بيوتيك جراناتم " ؛ من الفصيلة الرمانية فاكهة معروفة، شجرته صغيرة معمرة متساقطة الأوراق يحتوي على القلوي بيلليترين والتانين ويستخدم في صناعة المشروبات وكذلك طارد للديدان.

رَمْدُ : التهاب ملتحمه؛ هو التهاب الغشاء المبطن للجفون من الداخل والجزء الأمامي من المقلة، وأخطر أنواعه الرمد الصديدي ، ويسمى في المولود حديثاً؛ الرمد الولادي. وينشأ عن مرور رأس الوليد في أعضاء المرأة التناسلية أثناء الولادة فتصاب الملتحمة بالمكورات السيلانية لهذا يتم تقطير الوليد بنترات الفضة بعد الولادة مباشرة لمدة ثلاثة أيام ، ويمكن تقسيم أنواع الرمد إلى: الرمد السطحي الذي يصيب الظهارة، والرمد الباطني، الذي يؤثر على الطبقات الأعمق للنسيج الضام بالإضافة إلى الظهارة.

رَمَدٌ قَيْحِي : وتسببه العقنوديات الذهبية وعصيات "كوخ"(السل)، والمكورات الرئوية، والمكورات العقدية الخضراء، والمتقلبات العادية. ويتصف هذا الرمد بإصابة العينين الواحدة بعد الأخرى بفاصلة ٢-٣ أيام، وحدوث احتقان في الملتحمة وقد تشاهد فيها نقاط نزفية، كما يظهر إفراز مخاطي قيحي يتجمع أثناء الليل ويظهر بين الأجفان وعلى الأهداب خاصة كما تصاب الأجفان بوزمة مختلفة الشدة، وقد يحدث التهاب العقد اللمفاوية قرب الأذنية، يشكو المريض من الانزعاج من الضوء، ومن الشعور بجسم غريب تحت أجفانه خاصة العلوية، فيؤدي ذلك إلى حك المريض عينيه فتتوثأ أصابه، وتنتقل العدوى إلى العين الثانية كما تنتقل العدوى بواسطة المناشف ومقابض الأبواب والأقلام، وقد يسبب بمضاعفات في الأجزاء الأخرى للعين كالقرنية والقزحية وغيرها، ويعالج بالمضادات الحيوية على شكل قطرات، أو على شكل حقن وكبسولات.

رَمَدٌ حُمُوي : رمد ناشئ عن عدوى حمية من حمات كثيرة متعددة ؛ أهمها التراخوما، أو الحثر (انظر هناك) والتهاب الملتحمة في الورم الحبيبي اللمفاوي الزهري، والتهاب الملتحمة الاشتمالي

رَمَدٌ اشْتِمَالِي : وهو رمد حموي وتسببه حمة تصيب الطرق التناسلية؛ الإحليل في الرجل وعنق الرحم في الأنثى، وتنتقل العدوى إلى الملتحمة باليد، أو أثناء الولادة، وتكون الإصابة في الغالب بين الولدان، أما البالغين فتنتقل العدوى في المساجح. تتراوح مدة الحضانة بين ٥-١٠ أيام ويتظاهر المرض باحمرار شديد بالملتحمة ورمص غزير، يعالج بقطرات ومراهم السلفا والمضادات الحيوية.

رَمَدٌ أَرَجِي : رد فعل أرجي للملتحمة ويتظاهر بأحد أشكال ثلاثة؛ ١- تفاعل حاد، أو تحت الحاد ويظهر بشكل نزلي (انظر هناك). ٢- تفاعل للأليرجيات الخارجية ويظهر بشكل رمد ربيعي (انظر هناك). ٣- تفاعل للأليرجيات الداخلية، ويظهر بشكل رمد نفاطي (انظر هناك).

رَمَدٌ نَزْلِي : نوع بسيط ربما يعود لعدة كائنات حية ويختلف عن التهاب الجرثومي؛ بالاحتقان الشديد والمفرزات المائية والتي تحتوي على أيوزينات، والميل للتنكس مع كل تماس للأرج. ويكن الأرج أحياناً بروتينياً جرثومياً من منشأ داخلي، وهذا الجرثوم يكون غالباً من المكورات العنقودية في جوف الأنف، أو طرق التنفس العليا، أو من منشأ خارجي كما في حالة ربو القش، وفي التماس مع بعض الحيوانات، أو الأزهار، أو المواد الكيماوية، أو مواد تجميل، أو الأدوية كالأدوية والبنسلين التي تؤثر بشكل حاد، والأيزيرين الذي يؤثر بشكل يميل إلى الازمان. يعالج بإبعاد الأرج، بالإضافة إلى استعمال قطرة الكورتيزون، أو مضادات الهيستامين.

رَمَدٌ رَبِيعِي : مرض يصيب العين يشتد مع حرارة الجو، لذا فإنه يظهر في الربيع ويشتد في الصيف، وتتناقص شدته في الخريف والشتاء، ويصيب الأطفال اليافعين خاصة الذكور. يشكو المريض من حرقة وحكة شديدين والدماغ والخوف من الضوء. ولدى الفحص تجد رمصاً قليلاً؛ أبيض اللون لزجاً، وأعراض مرئية تختلف حسب شكل الإصابة جفيفاً أو مصلياً، يلتبس الرمد الربيعي مع الحثر (التراخوما)، إلا أن شكل التتبّات المضلعة ولونها

الحبيبي ووجود الأيوزينات وسير المرض يكفي للتشخيص. أما الشكل البصلي؛ فيلتبس مع الرمد النفاطي الذي يتصف بوجود النفاطات والاحتقان المتوضّع حولها، وتقرح السفاطة وزوالها مع الاحتقان المرافق، يعالج المرض عرضياً وليس له علاج سببي شاف.

رَمَدٌ نَفَاطِي : يتصف الرمد النفاطي بوجود نفاطة، أو أكثر؛ وهي عقيدة صغيرة مستديرة الشكل صفراء، أو رمادية قليلاً على سطح الملتحمة البصلية قرب اللّم غالباً، وتكون الملتحمة محتقنة حول النفاطة، تنقرح النفاطة وتشفى خلال أيام، دون أن تترك أثراً. يكثر الرمد النفاطي في الأطفال ضعيفي البنية وبين ٥-١٢ سنة، ويندر بين البالغين ويرافقه عادة ضخامة اللوز والناميات والعقد الرقبية. يعالج بتقوية المريض ومراهم الكورتيزون.

رَمَدٌ زَاوِي : رمد يصيب منطقة الموق، سببه عسوية "موراكس واكسفلد".

رَمَدٌ خَاطَوِي : رمد غشائي كاذب، ويتميز بتكون غشاء كاذب من الإفراز الليفاني على سطح، وليس داخل ظهارة الملتحمة. وهو نوع نادر يتسبب عن جراثيم مختلفة؛ كحالة الدم النسجية وعسوية "كليبس - لوفلر".

رَمَدٌ جَرِيبِي : نوع من الرمد مترافق مع تضخم في الجريبات اللمفاوية في الملتحمة.

رَمَدٌ سَيَّلَانِي : رمد يتسبب عن مكورات سيلانية؛ وهو رمد قبيح شديد قد يسبب العمى خاصة للرضع.

رَمَدٌ حُبْنِي : الحثر، أو التراخوما وهو التهاب

مزمن معد، يتميز بوجود حبيبات دقيقة سنجابية بملتحمة الجفون والصلبة والقرنية، تكثر وتصبح صفراء نصف شفافة، كما قد تتكون أوعية رقيقة، أو غليظة على القرنية ويسبب المرض تضخماً داخلياً في الجفون ومشعرة وتقرحات بالقرنية وكتامات، كما قد يسبب العمى في الإصابات الشديدة.

رَمَدٌ غُشَائِي : حالة يتغطى فيها سطح الملتحمة بغشاء ليفاني، قد يكون من النوع الخنقي، أو الخانوقسي حسب شدة التفاعل؛ سببه عضية الدفتيريا ولكن جراثيم أخرى كالمكورات السبحية والمكورات الرئوية قد تكون مسؤولة.

رَمَدٌ غُشَائِي كَاذِبٌ : ويتميز بتشكيل غشاء كاذب مكون من إفراز ليفاني على سطح الظهارة وليس داخلها. وهي حالة نادرة تتسبب عن جراثيم مختلفة كالمكورات السبحية حالة الدم وعصية " كليبس - لوفلر ".

رَمَدٌ الْمَسَايِح : توسع الجريبات اللمفية نتيجة حمة تمر بالمصافي.

رَمَدٌ حَسْرِي : مرض مزمن يصيب بنياً الأنسجة تحت الظهارية للملتحمة والقرنية، وتترافق لاحقاً مع سَبَلٌ ويتم شفائها بالتدب الذي يسبب تشويه للأجفان وكتامة القرنية، قد يكون سبب المرض حمة من نوع الريكتسي، وهو منتشر في بلاد جنوب وشرق البحر المتوسط ونادر في أوروبا الشمالية.

رَمَزٌ : العلامة. علامة تدل على شيء ما له وجود قائم بذاته، فتمثله وتحل محله فالكتابة واستخدام الرموز من العمليات الرمزية، ويعمد العلم إلى

استخدام الرموز كما في الكيمياء، وفي الفن وعلم النفس وفي التجارة كالماركات المسجلة.

رَمْزِيَّة : ١- تقديم شيء بواسطة الرمز المخصص له. ٢- دراسة تأثير اللغة على التفكير.

رَمَعٌ : ١- سار سريعاً، تحرك بغضب. ٢- علامة على ازدياد نشاط المنعكس، كما في آفة العصبون الألي الأعلى، ويتميز بانقباض عضلي متكرر، محرض بالامتداد.

رَمَعُ الكَاكِل : منعكس وتري يحرض بمد المريض لساقه، وتثني خلفي للقدم، وباستمرار الضغط على القدم ليظهر رفع في الكاكال.

رَمَعُ غُلْقِ المَصْعَد : تتابع سريع لانقباضات وارتخآت يمكن أن تحدث في عضل تحت المصعد عن إغلاق الدائرة الكهربائية.

رَمَعُ فَتْحِ المَصْعَد : تتابع سريع لانقباضات وارتخآت يمكن أن تحدث في عضل تحت المصعد عند فتح الدائرة الكهربائية.

رَمَعُ غُلْقِ المَهْبِط : رمع يحدث في العضلات على المهبط عند إغلاق الدائرة الكهربائية.

رَمَعُ فَتْحِ المَهْبِط : رمع يحدث في العضلات على المهبط عند فتح الدائرة الكهربائية.

رَمَعُ الرَضْفَةِ : رمع ينتج في الرضفة وضعها بين الإبهام وإصبع الإشارة وضغطها إلى الأسفل.

رَمَعُ الجَفْن : تشنج رمعي عضلي في الجفون.

رَمَعُ عَضَلِي : انقباض عضلي مفاجئ كالصدمة يمكن أن تشمل عضلة، أو أكثر، أو ألياف قليلة من عضل، ويمكن مشاهدة هذه الحالة في حالات الصرع، أو بعد التخدير، أو حالات الفواق.

رَمَعَ العضلات : رمع عضلات متعدد كما يشاهد في التهاب الدماغ.

رَمَعَ كاذب : تشنجات رمعية تستمر لوقت قصير.

رَمَعَ مترامن : ارتجاج عضلي، الانقباض الرمعي لعدة عضلات عفوياً.

رمعي : يتعلق بالرمع، أو يشير إليه.

رَمْلٌ : ١- مادة معدنية توجد في صورة حبات غير متماسكة، تنشأ من تجوية الصخور. وتتكون أساساً من معدن الكوارتز (المرو)، وتوجد أكثر الرواسب الرملية اتساعاً في الصحراوات وعلى الشواطئ وتشمل استعمالات الرمل الصناعية صناعة الزجاج والبناء وتصفية المياه وصناعة المفرقات. ٢- رمل الأمعاء، حبيبات صغيرة بنية اللون، تمر غالباً من الأمعاء مترافقة مع قوالب مخاطية، وتتكون من فوسفات الكالسيوم وصابون الكالسيوم. ٣- حبيبات تشبه الرمل تكون حامض البوليك ومواد أخرى تشكل القاعدة للحصيات في الكلوتين، ويمكن إفرازها مع البول.

رَمْلُ الدماغ : كتلة المادة الدهنية الموجودة غالباً تحت الجسم النخاعي في الأشخاص فوق سن ١٦ سنة وتتكون من تصلب الكربونات والفوسفات.

رَمْلُوم : ورم قاس في الغالب ورم سحائي (سحاووم)، يوجد في أغشية الدماغ والصفيرة المشيمية، وحتى في مادة الدماغ وهو غني بالجسيمات الكلسية.

رَمْنُوز : مثيل خماسي يوجد في الكرستين والرامين الأصفر وجلوكوزيدات أخرى من نوع الرامنوز، ويشاهد في البول في مرض البيلة البنتوزية.

رَمِّي : يتعلق بالرمام، أو يشبهه.

رَمَّا RNA : حامض الريبونويد مكاثير الفوسفات الأحادي للأدينوزين والجوانوزين والسيتيومين واليوردين.

رَمَّا مِرْسَال Messenger RNA : ويتكون من نسخ عن الرنا النووي وهو رموز لتكوين البروتينات في عملية الترجمة.

رَمَّا نَقَال Transfer RNA : وزنه الجزيئي حوالي ٨٠ ألف وهو مستقبل الحمض الأميني النهائي قبل تركيب رباط الببتيد خلال الترجمة.

رَمَّان : إعادة الصوت، يكون صوت متموج عن القرع.

رَمَّة : موسيقى، كالجرس، أصوات عرضية تسمع فوق تجاويف رئوية كبيرة، أو فوق إسترواح الصدر.

رُوتِنَغِن : ١- فيزيائي ألماني في فورتبورغ وشتراسبورغ ١٨٤٥-١٩٢٣ تأثير الأشعة السينية على المادة. ٢- وحدة جرعة الأشعة السينية وأشعة جاما فقط حتى عام ١٩٨٥ ثم أدخلت وحدة كولومب / كغم حسب وحدات SI روتنغن = ١.٠×٥٨.٢ أس-٤ كولومب / كغم.

رَمَّخ : ١- أضعفه، غشي عليه، أو اعتراه وهن، ٢- فقدان السيطرة على الحركات الإرادية اليومية، التي تعتمد على مجموعات مختلفة من العضلات التي تتوازن مع بعضها، ويتحدد هذا الوضع المتوازن بعدة عوامل؛ أهمها النبضات الواردة من العضلات عبر الأعصاب الواردة، أو أي حالة تتدخل بمرور النبضات، إما في الأعصاب الطرفية،

رَنَجِي : يتعلق بالرنج، أو يشبهه، يشير إلى عدم تنسيق العضلات.

رَنَجِي الشَّكْل : شبيه بالرنج بشكل مخفف.

رَنِين : مضاعفة صوت بواسطة اهتزازات بالتأثير في ناقل آخر؛ كحجم محدد من الهواء، الذي يكون تكرر اهتزازه الطبيعي متناسق مع أحد نغمات الصوت. قرع الصدر يولد رنيناً في البنات التي تحته، وتختلف النبرة حسب ما إذا كانت الرنة عادية، نفاخية، هوائية، أو متغيرة الموقع بواسطة الهواء، كما في استرواح الصدر، وتتغير أصوات التنفس الناتجة عن مرور الهواء في الرغامى، والقضبات والرئتين ويتميز إلى أنواع مختلفة من التنفس القصبي، أو الحويصلي وكلما ازداد حجم الهواء في الاهتزاز كلما انخفض النغم.

رَنِين سَكُودِي : نغمة طفلية مرتفعة النبرة تسمع فوق رنة مسترخية كالرنة فوق انصباب جنوبي. سكودا، جوزيف. طبيب نمساوي ولد عام ١٨٥٥م

رَنِين صَوْتِي : الأصوات المسموعة فوق الصدر، بينما المريض يتكلم وإذا ازداد الصوت يسمى لفظ قصبي.

رَنِين مَغْنَطِيسِي نَوَوِي : طريقة لتحديد صفة رباطات تساهمية، بقياس اللحظة المغناطيسية للأنوية الذرية المتورطة.

رُهَاب : خوف شاذ مستمر، ويحدث من كبت بعض المشكلات النفسية في اللاوعي، ويعد عرضاً من أعراض الأمراض العقلية؛ ويكون للمصابين ردود أفعال غير محكمة وغير معقولة نحو ما يحيط بهم. وهناك رهاب الأماكن المغلقة، ورهاب، العزلة ورهاب التلوث، ورهاب الظلام.

أو مجمل الحبل الشوكي، أو مركزياً في مناطق المخيخ، تسمح بدرجة، أو بأخرى بأعراض من عدم الاستقرار في الحركات المعنوية.

رَنَج حَاد : رنج ناجم عن آفات متعددة في الحبل الشوكي، مترافق مع مرض خمجي حاد.

رَنَج كُحُولِي : رنج يشاهد في حالات التهاب الأعصاب الطرفية ناجم عن الكحول، وتترافق أعراض مشابهة مع التهاب أعصاب ناجم عن مواد سمية أخرى كالخانوق.

رَنَج مُخَيَّخِي : نوع من عدم التنسيق العضلي ناجم عن آفة في المراكز العليا من المخيخ.

رَنَج وِرَاشِي : مرض "فريدريش"، علة عائلية تبدأ أثناء الطفولة وتتميز بعدم استقرار المشية وحركات أخرى، وغياب المنعكسات ورد راحي باسطي، ناجمة عن تصلب الأعمدة الخلفي والجانب في الحبل الشوكي.

رَنَج فَرِيدْرِيش : رنج وراثي. فريدريش، نيكولاوس. طبيب ألماني، هيدلبرغ ١٨٢٥-١٨٨٢.

رَنَج نَفْسَاتِي : نقص التنسيق بين التفكير والوجدان، عدم انسجام في الوجدان.

رَنَج تحركي : الستابس الظهري، أعراض رنجية ناجمة عن تنكس الأعمدة الخلفية للحبل الشوكي.

رَنَج عَيْنِي : رآرة (انظر هناك).

رَنَج دِهْلِيْزِي : عدم تنسيق عضلي ناجم عن مرض في الدهليز.

رَنَج جَذْعِي : رنج يؤثر على الحركات الضرورية للحفاظ على قامة الجذع كما في الجلوس، أو الوقوف.

رُهَاب الجراثيم : حالة من الخوف الشديد من الجراثيم والأحياء الدقيقة عامة وتأثيرها على الصحة.

رُهَاب الجماع : الخوف المرضي من عملية الجماع الجنسي.

رُهَاب الحر : الخوف المفرط من الحر وارتفاع درجة الحرارة.

رُهَاب الحَلَم : الخوف غير المبرر من العدوى بالحشرات والعث.

رُهَاب الحيوانات : خوف غير مبرر من الحيوانات الأليفة خاصة.

رُهَاب الرعد : خوف غير عادي من صوت الرعد.

رُهَاب الزُّهُري : الخوف المفرط من الأمراض الزهرية، أو الخوف غير المبرر من الإصابة بالأمراض الزهرية وبالتالي الخوف من الجماع الجنسي.

رُهَاب السباح : الخوف المرضي من الأماكن الواسعة الفسيحة.

رُهَاب السَّرَطَان : الخوف غير المبرر وغير المؤسس من الإصابة بمرض السرطان، أو احتمال تطوره، أو الاستعداد للإصابة به.

رُهَاب السُّل : الخوف غير المبرر من الإصابة بالسل.

رُهَاب السُّم : الخوف غير المبرر من التسمم.

رُهَاب شامل : الخوف المرضي من أي شيء ومن جميع الأشياء.

رُهَاب الأجانب : الرفض غير المسبب للأجانب، والرفض الذهاني لهم.

رُهَاب الأدوية : الخوف المرضي من أخذ أدوية، أو علاج.

رُهَاب الإشعاع : الخوف المرضي من الأشعة السينية والإشعاع.

رُهَاب الأصوات : الخوف من الكلام وإصدار الأصوات والاكستقاء بالهمس، كما يحدث في شلل الحنجرة لما يسببه الكلام من ألم، أو بسبب الخوف المبالغ به من الحديث، أو الخوف من الضجة.

رُهَاب الإفرنجي : الخوف المرضي من العدوى بالإفرنجي، أو الحالة التي يعتقد فيها الشخص بأنه مصاباً بالإفرنجي.

رُهَاب الأكل : الخوف من تناول الطعام.

رُهَاب الأكم : الرعب الزائد من شكوى الأكم، أو تجربته.

رُهَاب الانغلاق : الخوف بدرجة مفرطة غير معقولة من المكوث في مكان ضيق، كالأنفاق، أو المصاعد الكهربائية، أو غرف الدخان.

رُهَاب الانفراد : الخوف المرضي من البقاء منفرداً.

رُهَاب التآبس : الخوف المفرط من الإصابة بالتآبس.

رُهَاب التبول : الخوف من التبول وعدم السيطرة على مصرات التبول.

رُهَاب التلقيح : الخوف الشديد غير المبرر لأخذ اللقاحات.

رَهَابِي : يتعلق بالرهابة وعظم القصر.

رَهَابِي ضَلْعِي : يتعلق بالأضلاع والرهابة.

رَهَابِي : يتعلق بالرهاب.

رَهِيم : قشدة، الجزء الدهني من الحليب الذي يرتفع على سطحه عندما يترك في وعاء لمدة من الزمن (انظر قشدة).

رَوَاضِع : الأسنان الأولية، أو أسنان الحليب وهي مجموعة الأسنان العشرين التي تكون في لثة الوليد عند ولادته. وهي أسنان مؤقتة، أو متبدلة تسقط أثناء النمو الطبيعي، وتحل محلها الأسنان الدائمة. ويبدأ الرضغ في الإثغار بعد ستة أشهر من عمرهم تقريباً. ويكتمل ظهور الأسنان الرواضع في الشهر الثلاثين وهي أسنان أصغر حجماً، وأقل من الأسنان الدائمة. ويبدأ الطفل بفقدائها في السنة السادسة، أو السابعة من العمر تقريباً. ويجب الاهتمام بالرواضع أيضاً ومعالجتها من أجل المحافظة على أماكن الأسنان الدائمة.

رَوْب : خثرة الحليب المتخبط الناتجة عن فعل الرينين مع الكازينوجين في وجود أملاح الكالسيوم كما تتميز من الجزء السائل، أو مصّل الحليب.

رَوْبَة : ١- الردعة، طين، أو ملاط رقيق القوام.

٢- خميرة تلقى في اللبن ليروب.

رَوْتِين : ١- كحول بلوري يحدث في البندورة

(الطماطم) والتبغ وأوراق السذاب أو الفيجن؛ وهي نبتة طبية ذات أوراق مرة.

الرَّوْح : تشوه في القدم، حيث يمشي المريض على الحدود الداخلية للقدم، الانفراج ما بين الرجلين دون الفحج، انقلاب الرجل على وحشتها.

رُهَاب الصوت : خلل وظيفي يؤدي إلى خوف من سماع الأصوات العالية.

رُهَاب الضوء : الخوف المرضي من الأمكنة المضئية، أو عدم تحمل الضوء نتيجة حساسية مفرطة في العينين.

رُهَاب الظلام : الخوف المفرط من الظلام والهدوء.

رُهَاب القذائف : الخوف المفرط من القذائف الحربية.

رُهَاب الماء : الخوف المفرط من الماء كما في داء الكلب (انظر هناك).

رُهَاب المخاض : خوف غير مبرر من الولادة.

رُهَاب المخاوف : خوف غير مبرر من الرهاب وهذا من أعراض الضغط النفسي.

رُهَاب المرتفعات : الخوف الشديد من البقاء في أماكن مرتفعة.

رُهَاب المرض : خوف مرضي، أو جنوني من المرض.

رُهَاب الموت : الخوف الشديد من الجثث والموت.

رُهَاب الهررة : خوف مرضي مبالغ به من القطط.

رُهَاب الهواء : خوف مرضي من الهواء النقي.

رُهَاب الوجع : الخوف الشديد من الألم.

رُهَاب الوهن : الخوف الشديد من الضعف.

رَهَابَة : شكله كالسيف وهو النتوء السيفي لعظم القص.

رُوح : ١- أي محلول فيه زيوت متطايرة، أو مواد متطايرة أخرى كالكافور في الكحول ٢- أي سائل محضر بالتقطير بتركيب مختلف كالكحول وغيره ج: أرواح. ٣- ما به حياة الأنفس.

رُوح النشادر العطري : محلول يحتوي على ٣ % من كربونات النشادر في ٧٠% من الكحول تقريباً ويعطر بزيوت الليمون وجوزة الطيب ويعطى مخلوطاً بالماء كمنبه وطارد للآرياح.

رُوحِي : متحرك إلى الخارج من مركز الجسم، الانفراج بين الرجلين، ما دون الفحج.

رُولَندي : يصف أي هيكل مسمى نسبة إلى رولاندو لويجي طبيب إيطالي - تورينو عالم تشريح (١٨٣١-١٧٧٣)، وقد اكتشف أعضاء كثيرة وسميت باسمه وخاصة في الدماغ.

رُؤُوس : جمع رأس، وهو أعلى كل شيء من الهياكل الجسمية كالعظام والعضلات وغيرها.

رُؤْيَة ١- أول طريقة لكشف الغيب، تنشأ عنها نظرية الأحلام التي قال بها المتعلمون والفلاسفة. ٢- رؤيا القديس يوحنا آخر سفر العهد الجديد ويتنبأ بالمستقبل. ٣- الإبصار: وهي حاسة تدرك بها الأشياء والألوان، وتعتمد على حساسية شبكية العين للضوء بالأشعة الضوئية تمر خلال القرنية والعدسة، ويمكن تغيير شكل العدسة بالمطابقة حتى تقع الأشياء القريبة والبعيدة في البؤرة. وطبقة الشبكية القريبة من المشيمية طبقة صبغية، ويعتقد أن الأرجوان البصري (رودوبسين) يتكون فيها، ويؤثر الأرجوان البصري على العين لتلائم الضوء والظلام، فهو يتحلل في الضوء وفيثامين "أ" ضروري

لتجديده. وفي الطبقة الثانية، خلايا عصبية تسمى العصبي والمخاريط، وهذه المنطقة حساسة للضوء، وتنتقل السيالات العصبية من العصبي والمخاريط إلى الكرة المخية بواسطة العصب البصري، وتنتقل الصورة المكونة على الشبكية لتقاطع أشعة الضوء، أما الصورة الذهنية فتعتدل، وفي الشبكية بقعة تعرف بالسبقعة الصفراء في وسطها منخفض هو الحفيرة المركزية بها مخاريط ولذلك فهي حادة الإبصار. والنقطة التي يخرج منها العصب البصري من العين عديمة العصبي والمخاريط ولذلك فهي نقطة عمياء، ويعتقد أن المخاريط تختص بالإبصار في الضوء الساطع والعصبي في الظلام، كما يغير إدراك الألوان وظيفة المخاريط. (انظر إبصار).

رُؤْيَة لالونية : إبصار بدون النقاط الألوان ويظهر الدنيا كما في صور أسود وأبيض ويحدث هذا في عمى الألوان الكلي، أو الرؤيا الظلامية.

رُؤْيَة ملونة ١- حالة تظهر فيها الأشياء الملونة أكثر تلويناً والأشياء غير الملونة تظهر ملونة؛ ٢- عمى ألوان جزئي. ٣- خلل في الرؤيا تظهر فيها الألوان نتيجة استهلاك عقاقير معينة، أو اضطراب في مراكز الرؤيا، أو بعد استئصال الساد.

رُؤْيَة ثنائية اللون : شكل من عمى الألوان، حيث تشاهد فقط اللونين، أو الثلاثة الأساسية في الطيف.

رُؤْيَة تلوينة : الوعي لصورة ما بعد الصورة.

رُؤْيَة صفراء : خلل في إبصار الألوان، يرافقه أحياناً اليرقان، ويظهر كل شيء أصفر.

رُؤْيَة مُصَغَّرَة : حالة تشاهد فيها الأشياء أصغر حجماً مما هي في الحقيقة.

رُؤْيَة نَهَارِيَّة : الرؤيا التي تحدث في الضوء الشديد كضوء النهار، حيث تشاهد التفاصيل وهي ملونة وتحملها المخاريط.

رُؤْيَس : تصغير الرأس.

رياضيات كيمائية : الحساب الكيمائي، دراسة النسب المتفاعلة بالوزن والحجم.

رَبَاسَة : واحدة من الجسيمات الدقيقة، التي تحتوي على الرنأ، أساساً في هيولي الخلايا الحية، والتي تشاهد في المجهر الإلكتروني (قطرها حوالي ١٠-٢٠ نانومتر). وهي الجهة داخل الخلوية التي يتم فيها تركيب البروتين، وذلك بتقديم سطح للتفاعل البيني والموضعي للجزيئات المشاركة. وهي توجد، إما حرة في الهيولي، أو مرتبطة على جدران الشبكة البطانية. وهناك نوعان؛ بدئي النواة وحقيقي النواة، تختلفان بالكبر والتعقد. والعضويات الخلوية (كالمتقدرات، وصناعة الخضراء، عند العضويات القادرة على التمثيل الضوئي) لها رباساتها الخاصة.

رِبَوز : ترمز فراغي مع الأرابينوز، تشاهد في الحمض النووي للخمائر والريبوفلافين وتميم الإنظيم I، II، كما في جليكوزيد بذور حب الملوك.

ريبوفلافين : هو فيتامين ب٢ أو لاكتوفلافين يذوب في الماء وهو جزء مهم في تركيب الإنظيمات في استقلاب الكربوهيدرات في الخلايا. ومن أعراض نقصه الضعف العام وتشقق جانبي الفم واحمرار طرف اللسان وحافتيه، وضعف أنسجة العين وضعف الإبصار، وإذا طال نقص الفيتامين

يؤدي إلى تغييرات في الجلد والأغشية المخاطية. الأغذية الغنية بالريبوفلافين هي الكبد وخميرة البيرة واللبن والخضراوات.

رِئَة : أحد أعضاء الجهاز التنفسي، وفي الجسم منها اثنتان تحتل كل منهما جانباً من التجويف الصدري، ويفصل بينهما حاجز يشمل القلب والتامور وما يتصل بهما من الأوعية الكبيرة، والرئة جسم طري يتمدد عند الشهيق وينكمش عند الزفير، ويغلفه غشاء رقيق ذو طبقتين يسمى الجنبه، ويكون لون الرئة وردياً عند الولادة ولكنه يصبح مع تقدم العمر داكناً بسبب ما يترتب فيها من حبيبات غريبة يحملها هواء التنفس، وتتصل كل الرئتان بالقصبه الهوائية بواسطة شعبة رئيسية تأخذ في التفرع مثل الشجرة حتى ينتهي بشعبيات شعيرية هي التي تتصل بنسيج الرئة ذاتها. وتتكون الرئة من عدد لا يحصى من الحويصلات الهوائية يبطن كل منها غشاء رقيق للغاية، ويحيط بالحويصلات شبكة واسعة جداً من الشعيرات الدموية يأتي إليها الدم المشبع بثاني أكسيد الكربون من الجانب الأيمن من القلب فيتخلص من هذا الغاز الضار في الرئة وينشعب بدلاً منه بالأكسجين الموجود في هواء التنفس، ثم يعود إلى الجانب الأيسر من القلب، والرئة عرضة للالتهاب الحاد والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السل والنفاح وغيره.

رِئَة صناعية : جهاز آلي اخترع من أجل تأدية عملية التنفس الصناعي للمرضى العاجزين عن التنفس مثل مرض شلل الأطفال، أو التسمم، أو الاختناق وتعتمد فكرة الجهاز على إحداث تغييرات في الضغط الهوائي المحيط بالصدر من شأنها أن

تحدث تحركات في القفص الصدري مماثلة لحركتيه الطبيعيين في عمليتي الشهيق والزفير. ويتركب الجهاز من إسطوانة من الصلب ويرقد المريض داخلها مطلاً برأسه خارجها من خلال طوق محكم، وهناك آلات أكثر حداثة تؤدي الوظيفة.

رَيْدِيَّة : المرحلة الثالثة من دورة حياة ديدان المتقويات، وهو شكل ثابت يتطور من كيسة أبواغ في القوقعة الثوي، وتنتج بالتكاثر اللاجنسي، إما ريديات أخرى، أو ذنابات.

رَيْشِي الشكل : له شكل الريشة.

رَيْطَة : ١- الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً. ٢- قشرة الدماغ، تطلق على ذلك الجزء من جدار حويصلة نصف الكرة الجنيني، الذي تتطور فيه قشرة الدماغ كما تعني أيضاً قشرة المخ مباشرة.

رَيْطَة المتقدمة : القشرة المتقدمة، هي تلك الأجزاء من القشرة نصف الكرة الدماغية. أعتقد أنها الأقدم في التطور، ويمكن إطلاق الاصطلاح على سالتشكيل الحصيني والفص الكثيري الشكل وتحدد غالباً في الأخير.

رَيْكْتَسِيَّة : أحياء دقيقة مجبرة على العيش داخل الخلية داخل الهيولي. تتطفل على نوات الأرجل المفصلية وتتمو في الخلايا المبطنة لأمعانها دون أن تؤذيها، وتنقل بلسعها وبالتلوث ببرازها وتشمل التيفوس الوبائي المحمول بالقمل وتسببه رككتسية برفازكي المستوطن وهو عبارة عن معاودة أو يقظة للتيفوس الوبائي دون عدوى جديدة. والتيفوس الجرذي المنقول بالبراغيث وتسببه رككتسية موزري، وحمى الجبال الصخرية المبقعة وتسببها رككتسية

ريكتسي، وينقلها القراد، وحمى تسوتسو كاموش، أو تيفوس الغسالات، أو تيفوس السوسة، والركتسية المجردة. تستوطن الأمراض الرككتسية أجزاء كثيرة من العالم ومن صفاتها المشتركة دور بادري طليعي تنتجه حمى مرتفعة وإعياء. تعالج الرككتسيات بالكلورامفينيكول والنتراسيكلين.

رَيْنِين : إنظيم حال البروتين يفرز من خلايا مجاورة الكبيبة في الكلوة. وهي تحفز عودة مولد الأنغيوتنزين المدور إلى أنغيوتنزين I - الذي يتحول إلى أنجيوتنزين II، ويسبب تحرير الألدوستيرون من الكلوة، ويسيطر على إفراز الرينين بثلاثة طرق أ- ضغط الدم داخل الشريينات التي تزود الخلايا مجاورة الكبيبات. ب- ترويد شوارد الصوديوم الذي يصل إلى القنوات السفلية. ج- الجملة العصبية الودية.

رَيْوِي : يتعلق بالرئة يتصل بها، أو يؤثر عليها.

رَيْوِي صِفاقي : يتعلق بالرئة والصفاق.

رَيْوِي كَيْدِي : يتعلق بالرئة والكبد، أو يتموضع بينهما.

رَيْسِي : أولي، له الأهمية الأولى، يتعلق بالرأس.