

خَارِج القلب : يقع، أو يحدث خارج القلب.

خَارِج الكبد : يقع خارج الكبد وليس متصلاً به، أو بسطحه.

خَارِج المحفظة : يقع، أو يحدث خارج محفظة مفصل.

خَارِج المفصل : يحدث خارج المفصل في منطقته وليس متداخلاً فيه، أو في هيكله.

خَارِج المقلة : يقع في منطقة خارج العين.

خَارِج النواة : يقع خارج نواة الخلية.

خَارِج الهرمية : يقع خارج الجمل العصبية الدفاعية الشوكية.

خَارِج من الشعرة : اصطلاح عام لبوغيات المفاصل التي تنتج فطريات على سطح الشعرة.

خَارِجِي : يتعلق بالخارج، يصف أجزاء من عضو، أو بناء ليست كلها داخل ذلك العضو، أو البناء، أو ممتدة من بناء آخر.

خَارِجِي الإفراز : يفرز إلى الخارج - الإفراز الخارجي - لغدة.

خَارِجِي المنشأ : يتعلق بعوامل نشأة وتطور خارج الجسم.

خَاصَّة : صفة الطابق العضوي وبالذات التعبير النمطي الظاهري لشخص، أو مجموعة من الجينات المتقاربة الصفات.

خَاصَّة شَعْرِيَّة : تحدث في الأنايب الشعرية إذا وضعت عمودية، إذ يرتفع الماء داخل الأنبوبة عن سطحه خارجها، أما الزئبق فينخفض والقوى المؤثرة هي الالتصاق السطحي والترابط والتوتر السطحي.

خَاتَم : الطابع تطبع به السمة، وخاتم الماء هو حجم الماء الذي يبقى ثابتاً في مصيدة منزح منزلي، لمنع وصول الغازات الكريهة من المجاري إلى المنزل.

خَادِرَة : كل عذراء من فراشات حرشقيات الأجنحة عندما تكون في دورها الانتقالي من يرقة إلى حشرة كاملة. وهو شكل هادئ يُظهر الصفات الخارجية للحشرة الناضجة ولكن بدون أجنحة ممتدة.

خَادِع : الناقص، الطريق الذي يبين ويخفي.

خَادِعَة : مؤنث خادع. والباب الصغير في الباب الكبير.

خَارِج : الخارج من الشيء ظاهره، العصب الخارج الذي ينقل الإشارة من المركز إلى الطرف.

خَارِج الأوعية : يحدث، أو يتموضع خارج الأوعية.

خَارِج الجافية : يقع خارج الأم الجافية.

خَارِج الجسم : ١- ليس له علاقة بالجسم، أو أي جسم تشريحي. ٢- يصف مراحل تطور الطفيلي خارج جسم الإنسان. ٣- دائرة خارج الجسم بتحويل الدورة الدموية إلى مأكنة قلب - رئة، وتستخدم في عمليات القلب المفتوح.

خَارِج الجنبَة : خارج تجويف الجنبَة.

خَارِج الخلايا : خارج هيكل الخلية.

خَارِج الرِّحِم : يتأصل، أو يحدث، أو يقع خارج الرحم كالحمل مثلاً.

خَارِج الصِّفاق : يقع خارج تجويف الصفاق.

خَارِج القصبة : يتموضع، أو يحدث خارج القصبة مستقلاً عنها.

خَاصِرَة : ما بين رأس السورك وأسفل الأضلاع، وهما خاضرتان. ج؛ خواصر.

خَاصِصِيَّة : نوعية مميزة، نسبة إلى الخاصة، وهي الميزة التي يتصف بها الشيء تكون وفقاً عليه، أو على جنسه ولا تكون عامة.

خَاطِف : فجائي كالبرق الخاطف. مركز وغارز كالم التابس.

خَافِض الضَّغْط : اصطلاح يستعمل لوصف الأمراض التي تسبب إنخفاضاً في ضغط الدم. كالأمراض المعدية وغيرها. ويستعمل أيضاً لوصف الأدوية التي تسبب تخفيضاً في ضغط الدم المرتفع.

خَال : شامة لحمية ملونة عادة، ويوجد بعضها ببيضاء - لاملانية وقد يكون منبسطة، أو شعرياً، أو ثولولياً، أو خال ذو سطح حلبي كما شوهدت إفرازات شديدة.

خَالِص : نقي، غير مختلط بأي لون، أو شيء آخر. **خَام** : ١- كل ما لم يتم إعداده لاستعمال الناس له، كالدواء، ٢- غير مكرر.

خَامِج : مرض خامج : مرض متسبب من كائنات دقيقة ولكنه ليس بالضرورة معدية.

خَامِل : الذي لا نباهة له. يتمتع بالخمول.

خَاتِق : أي شيء يسبب الاختناق خاصة من الغازات.

خَاتِق الذُّسَب : نبات هو الأكونيطس، جنس من فصيلة شقائق النعمان يستخرج من جذره القلواني (الأكونيتين) والاكوفين، الذي يولد عند وضعه على اللسان شعور النمنمة يتبعه تخدير موضعي، وفي

الجرعة السامة تحدث النمنمة أولاً في الحلق ثم المعدة ولاحقاً في الجلد. مع إفراز شديد لللعاب وشعور بالدفع وضعف عضلي - قد تحدث الوفاة نتيجة قصور قلبي، أو تنفسي، قد يسبقه تشنجات. يتم إفراز الدواء بواسطة البول ولكن توجد أيضاً آثار له في اللعاب والصفراء يستخدم المرهم خارجياً لآلام الأعصاب ويستخدم الأكونيت باطنياً كمضاد للحرارة، ولكن يفضل عدم استعماله نتيجة سميته.

خَاتَوْق : أي علة سببها انسداد تنفسي، خاصة العلل الالتهابية الحادة للحنجرة والرغامى عند الأطفال، أو سببها اضطرابات انعكاسية كتشنج الحنجرة الصريري وتشنجات المزمار. وتتميز الحالة بسعال مبحوح رنان وصعوبة في التنفس، وقد يكون هناك ترسبات غشائية موضعية خاصة عند العدوى الحمية.

خَاتَوْق خُنَافِي : مرض الدفتيريا (انظر هناك).

خَاتَوْق كَاذِب : تشنج الحنجرة الصريري. مرض يحدث عند الأطفال خاصة المصابين بالرخد، يشبه تشنج المزمار، ويتميز بشهيق قصير، مزعج ثم توقف في التنفس وأخيراً بشهيق طويل كصياح الديك.

خَاتَوْق غَشَائِي : التهاب الحنجرة الحاد مع تكوين غشاء، أو سعال خانوقي، خانوق حقيقي.

خَاتَوْق تَشْنُجِي : تشنج الحنجرة الصريري.

خَاتَوْقِي : يتعلق بالخانوق أو يشبهه.

خَبَائِثَة : ١- حالة وجود نمو جديد خبيث. ٢- حالة تؤدي إذا استمرت إلى استفحال المرض والوفاة. والسرطان أفضل مثل لهذه الحالة وتستعمل أيضاً

لوصف نوع من ارتفاع ضغط الدم يسبب الوفاة إذا لم يكبح. عكس الكلمة. يكون المرض، أو الحالة حميدة إذا لم تهدد الحياة.

خُبَازِي : جنس نباتات عشبية من فصيلة الخبازيات، أنواعه كثيرة منه نوع يُطهى ويؤكل.

خَبَايَا : جميع خبيثة وهي جيب صغير أعمى، أو رنب ذو حجم مجهري وتوجد خبايا في الشرج والأسنان واللسان واللوزتين.

خَبَب : ١- ضرب من عدو الخيل بين الخطو والعدو. ٢- في القلب يدل على نظم أصوات القلب عندما يكون هناك تسرع القلب مع ثلاثة أصوات في كل دورة. من خبب الخيل.

خَبَن الصبغي : ١- خبن السيء؛ أسقطه. ٢- في تكوين الخلايا؛ تغيير في بنية الصبغي ناتج عن فقدان جزء من المادة الجينية. ويعني أيضاً فقدان قطعة من الصبغي.

خَبِيء : جيب صغير أعمى، أو رنب ذو حجم مجهري.

خَبِيء شَرَجِي : جيب شرجي. واحد من جيوب صغيرة تتكون من الثآليل الهلالية للغشاء المخاطي الذي يصل النهايات السفلية لأعمدة الشرج.

خَبِيء الغُدَد : انغلاقات أنبوبية صغيرة في الظهارة المستقيمة للسطح، في النسيج اللمفي للحنك الرخو، والغدد الأنفية البلعومية.

خَبِيء السن : تطلق أحياناً على التجويف الذي يتطور فيه السن قبل بروزه.

خَبِيء اللسان : انغلاق أنبوبي صغير في الظهارة المستقيمة للسطح في النسيج اللمفي لغدة اللسان.

خَبِيء الفَرْجِيَّة : انغلاقات صغيرة غير منتظمة على السطح الأمامي للفرجية. أساساً قرب الحدود الهدبية والحنقية.

خَبِيث : يهدد الحياة، أو يسبب الوفاة، عكس حميد، يعود بعد استئصاله كالسرطانات، الرديء.

خَبِيْثَة : انظر خبيء وخبايا.

خَبِيْثِي : يتعلّق بالخبيثة.

خَتَان : إزالة الحشفة، أو الكمرة. وهي الجلدة التي تكسو النهاية المخروطية الشكل للقضيب. ويؤدي ذلك إلى وقاية القضيب من التهيج الموضعي والعدوى. والجراحة التي تجري تعتبر من الجراحات الصغيرة ولكنها يجب أن تتم من قبل جراح ضمن ظروف جراحية لتجنب أي مضاعفات محتملة. والختان عادة قديمة منتشرة في كثير من أنحاء العالم خاصة عند المسلمين واليهود والحشية. وعند قبائل البلاتكو وفيجي وكليدونيا ومولينيزيا وكانت معروفة عند الأزتيك في المكسيك وسكان حوض الأمازون وبدايتها طقس ديني كبديل عن تضحية الإبن للآلهة.

خَتَان الأنثى : قطع البظر وتتم عملية الختان عند بعض الشعوب الأفريقية.

خُطَار : تكون جلطة دموية في داخل وعاء دموي، أو إحدى جدران القلب أثناء الحياة. إن التخثر داخل الوعاء الدموي بعد الوفاة، أو خارجه أثناءها يؤدي إلى تكوين جلطة، أسباب التخثر غير مفهومة بشكل جيد ولكن العوامل المهمة تشمل: الإثتان، توقف جريان الدم، واضطراب تنظيم الدم الذي يمنع التخثر، ويذكر أيضاً ثلاثي "فيرشو" وهو؛ ١- تضرر في جدار الأوعية وما ينتج عنه من تغيير

بطانسي قلبي، ويحدث غالباً على شرفات الصمام المتضرر أثناء التهاب جرثومي لبطانة القلب، وقد تنفصل الخثرات الخمجة وتسبب انصمام شرياني نظامي.

خُثَار سَاعِي : خثار يتطور ببطء.

خُثَار مَشِيمِي : تكون خثرات في المشيمة وأوردة الرحم.

خُثَار صَفِيحِي : خثار متكون من تجمع غير عادي، أو تراص صفيحات دموية، كما في كثرة الصفيحات بعد استئصال الطحال..

خُثَار نَفَاسِي : خثار في أوردة الساقين، أو الحوض بعد الولادة.

خُثَار رَضْجِي : خثار في وعاء دموي، عادة في وريد، نتيجة رضح، أو تهيج. والأخير قد يكون نتيجة إجراءات داخل الوريد كتسريب محاليل فسيولوجية خاصة الجلوكوز الذي يهيج جدران الأوردة.

خُثَار وَرِيدِي : خثار في وريد.

خُثَار بَعْد الْجِرَاحَةِ : خثار يؤثر خاصة في الضفيرة الوريدية العميقة في الربلة والوريد الفخذي، الذي قد يحدث بعد أي جراحة ولكنه عام بعد جراحة البطن والحوض، أو عمليات وكسور عظم الفخذ.

خُثَار مُتَنَقِّل : خثار ينتقل من وريد إلى وريد، سببه في أجزاء معينة من الأوردة العميقة والسطحية وهو منتشر في التهاب الوعائي الخثاري المسد.

خُثَارِي : يتميز، أو يتسبب عن الخثار.

الشحنة الكهربائية وتنشيط عوامل دموية معينة والتصاق الصفحات الدموية يؤدي إلى تكوين خثرة.

٢- فرط التخثر؛ إخراج الثرومبين وبناء الفيبرين وتثبيت الخثرة الأولية إلى خثرة مساعدة.

٣- تغيير جريان الدم نتيجة تكوين دوامة وارتفاع اللزوجة واختلال التروية بالأكسجين، والعوامل المساعدة على ذلك هي؛ السن المتقدم والسمنة والتغيرات هرمونية والأورام السرطانية كما تلعب تغيرات الجو دوراً في هذا الموضوع.

خُثَار ضُمُورِي : خثار مترافق مع ضمور وجفاف ونقص التروية الدموية وازدياد لزوجة الدم، أو إلتان. ويستعمل الاصطلاح أيضاً للخثار الحادث في الجيب السهمي العلوي عند الأطفال الذين يشكون من إنتانات شديدة.

خُثَار إِكْلِيلِي : خثار في داخل شريان إكليلي يسبب إقفاراً عضلياً والمأ في القلب (نبضة صدرية) واحتشاء عضلياً قلبية، السبب الأهم هو مرض تصلب العصيدي للشرايين التاجية، وقد يكون أيضاً مرض الزهري، أو رضح، أو أم الدم المسلخة في الأبر، أو نادراً ما تكون صمة شريانية تاجية.

خُثَار أَنْصِمَامِي : خثار يحدث في منطقة انحشار جلطة دموية في وعاء دموي.

خُثَار قَلْبِي : خثار في الصمامات القلبية، أو داخل حجرات القلب والأخير يشاهد في البطين الأيسر عند المرضى الذين يعانون من تضيق تاجي ورجفان أذيني، ولكنه قد يحدث أيضاً في البطين خاصة في الأيسر بعد احتشاء قلبي واسع. نادراً ما يكون ثانوياً لرجفان أذيني لأي سبب، قصور احتقاني قلبي مطول، أو بالترافق مع أورام داخل القلب وتليف

خَثَرَاتِي : له صفات الخثرة ويشبهها.

خَثْرَةٌ : جلطة دموية تتكون وتبقى في وعاء

دموي، أو في القلب، وهناك عدة أنواع من الخثرات؛

١- خثرة إفرافية؛ تنتج عن ضرر في جدار الوعاء وتتكون من هيكل من كتل الصفيحات المحاطة

بالفيبرين وتلتصق بشده بجدار الوعاء وهي نادرة. ٢

- خثرة التخثر ؛ وتنتج عن تخثر الدم عند بطء

جريانه، أو ركوده، بين طبقات الفيبرين الموازية

للعاء، حيث توجد الكريات الحمراء والبيضاء بنفس

نسبها في الدم، وتملأ الخثرة حجم الوعاء كاملاً

بحيث تغلقه، ولا تلتصق هذه الخثرة بالجدار ولهذا

فإن أجزاء منه تتفصل وتؤدي إلى خطر الانصمام.

٣- الخثرة المختلطة؛ وتتكون من رأس من خثرة

إفرافية وذنب من خثرة تخثر.

خَثْرَةٌ احتضارية : جلطة في تجاويف القلب تماماً

قبل، أو أثناء الوفاة.

خَثْرَةٌ أوليّة : خثرة متوضعة في مكان نشوئها.

خَثْرَةٌ بِيَضَاء : خثرة متكونة بشكل رئيسي من

صفيحات وكريات بيضاء.

خَثْرَةٌ حَلَقِيَّة : خثرة متكونة بشكل خاتم.

خَثْرَةٌ حَمْرَاء : خثرة مكونة بشكل رئيسي من

كريات حمراء.

خَثْرَةٌ جدارية : خثرة متصلة بجدار الوعاء

الدموي.

خَثْرَةٌ حَائِطِيَّة : خثرة قبل الوفاة متصلة ببطانة

القلب لتمييزه عن الصمام.

خَثْرَةٌ خَمَجِيَّة : خثرة مخمجة بالجراثيم وتسبب

تفاعل التهابي شديد في الوعاء الدموي والأنسجة

المحيطة.

خَثْرَةٌ شَاحِبَةٌ : خثرة بيضاء.

خَثْرَةٌ صَفْرَاوِيَّة : سداة من حطام ملون

بالصفراء داخل أنبوب صفراوي

خَثْرَةٌ طَبَاقِيَّة : خثرة تتنظم محتوياتها في طبقات.

خَثْرَةٌ مُتَعَصِّية : خثرة حل محلها نسيج ندبي

تصلحي.

خَثْرَةٌ مُتَكَسِّسَةٌ : حصوة وريدية.

خَثْرَةٌ مُرْجَانِيَّة : خثرة قبل الوفاة تظهر فيها

ترسبات الصفيحات بشكل ظاهر تعطي تأثيراً

مرجانياً.

خَثْرَةٌ مُتَعَادِيَّة : خثرة انتشرت مسافة عن مكان

نشأتها.

خَثْرَةٌ مسدة : خثرة تسد لمعة الوعاء الدموي كلياً.

خَثْرَةٌ مَبْنِيَّة : خثرة تتكون في تجاويف القلب، أو

الأوعية بعد الوفاة.

خَثْرَةٌ قَبْلَ مَوْتِيَّة : خثرة تتكون في تجاويف القلب،

أو الأوعية قبل الوفاة.

خَثْرَةٌ ميكانيكية : خثرة متكونة نتيجة انسداد

ميكانيكي لوعاء دموي.

خَثْرَةٌ فبرينية : خثرة تتكون بشكل رئيسي من

الفيبرين.

خثرين : ترومبين، بروتين يشبه الالبوسين، (انظر

هناك).

خَنْثَلَةٌ : ما بين السرة والعانة المنطقة الوسطى من أسفل البطن.

خَنْثَلِي : يتعلق بالخَنْثَلَة.

خَنْثُورٌ : قابل للتخثر.

خَنْثُورِيَّةٌ : قابلية التخثر، أو التجلط.

خَذٌّ : الجدار اللحمي الذي يكون جانب الوجه.

خَذَّاجٌ : خدج خداجاً، خدجت المرأة ولدها، ألقته وقد أستبان خلقه، نضج قبل الأوان. ٢- ولادة الطفل قبل أوانه، مع اكتمال نموه الجسدي.

خَذَرٌ : ١- الكسل والفتور، تبنيج، تخدير (انظر هناك) فقدان الإحساس، أو الشعور في كل الجسم، أو في جزء منه نتيجة تعطل العصب، أو استعمال أدوية تسمى المخدرات، ويرجع استعمالها إلى الشعوب القديمة في وادي النيل وبين النهرين الذين استعملوا الأفيون في تخفيف الآلام، كما أستعمله الجراحون العرب في الحضارة الإسلامية.

خَذَرُ الأطراف : تخدير اليدين والقدمين، أو جميعها.

خَذَرُ شَقِيٍّ : فقدان الإحساس في أحد نصفي الجسم، نتيجة آفة عصبية في الجملة العصبية المركزية.

خَذَرٌ مُوَضَّعٌ : تخدير موضعي.

خَذَيٌّ : يتعلق بالخد، أو عظم الخد.

خَذِيحٌ : هو الوليد الذي وُلد قبل نهاية الوقت الطبيعي للحمل، ويسمى خديجاً من يولد بعد حمل مدته ٢٨ أسبوعاً، أو يزن عند ولادته أقل من كيلوجرامين ونصف، ولا يكون قادراً على الحياة،

ولا يعيش غالباً، من يولد قبل ذلك، لعدم اكتمال تكوين أعضائه، ويواجه الخديج عند عند ولادته صعوبات كثيرة، فيعسر تنفسه ولا يستطيع الرضاعة، ولا يحتفظ بحرارته بغير الوسائل الصناعية، ويبدو قصير الأطراف، طويل الرقبة، ويكون رأسه رخي الصلة بالجسم، وجلده كثير التفتضن، ولحمه متهللاً، كما أن كلوتيه وكبده وأعضائه الأخرى تكون منقوصة النمو، ولهذا تضعف مقاومته للعدوى، وتزيد فرصة الخديج في الحياة إذا وُلد في مستشفى مجهز بالمحاضن الصناعية والممرضات المدربات على العناية بالخداج.

خَذَامَةٌ : ١- القطعة. ٢- انتقال الأشياء نتيجة اضطراب في عناصر الشبكية في الغالب عند التهاب المشيمية المجاورة، في الرويا المكبرة تظهر الأشياء أكبر من العادة نتيجة تزاخم عناصر الشبكية، وفي الرويا المصغرة، تظهر الأشياء أصغر من العادة، نتيجة انفصال عناصر الشبكية.

خُرَاجٌ : ج: خُرَاجَات، تجمع قيحي محدد داخل تجويف سببه إلتان جرثومي قيحي حاد في الأنسجة مع فسادها وتخرها، ويغلب أن يكون ذلك خلال جروح صغيرة غير مهمة، حيث تأخذ الجراثيم بإلتلاف الأنسجة ويندفع الدم إلى البقعة المصابة، وتتبري خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة لمهاجمة الجراثيم، ويتراكم حطام الخلايا والجراثيم والأنسجة الميتة فتؤلف كمية متجمعة من سائل أصفر اللون هو القيح، أو الصديد، وعندما يُضاف إليه تورم الأنسجة الملتهبة المحيطة، يحدث ضغطاً على الأعصاب فيحدث الألم وتتشأ الخراجات في

خُرَاجٌ مُتَجَبِّنٌ : خراج سَلْيٍ يحتوي على مادة مصفرة نصف جامدة تشبه الجبن.

خُرَاجٌ بَارِدٌ : خراج سَلْيٍ في العادة يكون تطوره بطيئاً ويظهر قليل من الاحمرار والألم والحرارة الموضعية.

خُرَاجٌ مُزْمِنٌ : خراج يتطور ببطء ويبقى مدة طويلة.

خُرَاجٌ خُرْجِيٌّ : خراج مزدوج حيث يتصل تجويفان بواسطة رقبة ضيقة والمثال التقليدي هو العقد اللمفية المتجينة في الرقبة، حيث يخرق القناة الضيقة للنفقة العميقة، وتتوسع إلى تجويف يحتوي على المادة المتجينة في النسيج تحت الجلد.

خُرَاجٌ التَّنْبِيثُ : خراج اصطناعي من أجل جذب الجراثيم الدائرة لإنتان إلى الموضع المختار، مع تدعيم وتحفيز دفاع المريض ضد الجراثيم.

خُرَاجٌ صَمَمِيٌّ : خراج يتكون حول كائنات حية منقولة بواسطة الدم من مكان بعيد.

خُرَاجٌ فِطْرِيٌّ : خراج يمكن نسبته إلى إبتان فطري.

خُرَاجٌ ثِقَلِيٌّ : خراج ينزل من موضعه الأصلي إلى جزء أكثر انخفاضاً.

خُرَاجٌ مُتَجَوِّلٌ : خراج ينتقل خلال الأنسجة إلى نقطة بعيدة عن الموضع الأصلي.

خُرَاجٌ دُخْنِيٌّ : خراج ليس أكبر من حبوب الدُخْن (الجاروس)، وهو منتشر ومتعدد كنتيجة لإنتان دموي.

أنسجة وأعضاء كثيرة من الجسم أهمها الأنسجة تحت الجلد والغدد اللعابية، والأنسجة الرخوة والدهنية حول وجوار الشرج، والثدي في السيدات الحوامل، أو الممرضعات وعند جذور الأسنان، ويمكن أن تنشأ الخراجات أيضاً في الأعضاء الداخلية مثل الكبد والرئتين والمخ والكلى والزائدة الدودية. الخراجات الخارجية سطحية متورمة حمراء ومؤلمة ويصحب وجودها ارتفاع في درجة الحرارة والنسبض وكذلك ارتفاع في عدد الكريات البيضاء، أما الخراجات الداخلية فأعراضها تختلف حسب العضو المصاب، في علاج الخراج يجب بط الخراج وإخراج القيح، بالإضافة إلى استعمال المضادات الحيوية لمنع انتشار الجراثيم.

خُرَاجٌ حَادٌ : خراج سريع التطور يتميز بألم شديد والتهاب موضعي، وورم وحرارة.

خُرَاجٌ سِنَخِيٌّ : التهاب سنخ سني مع تكوين قيح.

خُرَاجٌ أَمْيَبِيٌّ : خراج ينتج عن الإصابة بالمتحولة الحاملة للنسيج وهي كائنات صغيرة تعيش في الماء، وقد تستطيع الدخول إلى الكبد فتسبب خراجاً كبدياً، أو إلى الدماغ عن طريق طريق الصفيحة المصفوية في العظم الغربالي.

خُرَاجٌ مِفْصَلِيٌّ : أي خراج في جدار الأمعاء يحدث كنتيجة لالتهاب المفاصل، أو نقرس إبهام القدم.

خُرَاجٌ زَائِدِيٌّ : خراج متموضع حول زائدة دودية ملتهبة ومقوية.

خُرَاجٌ شَرَجِيٌّ : خراج في الأنسجة الدهنية في منطقة حول الشرج.

خُراجُ إِبْطَاسِي : خراج في الثدي يظهر وقت الرضاعة.

خُراجُ الكَبِدِ : خراج في الكبد ناتج عن أسباب متنوعة كالمتحولات والتقيح الدموي الوريد الباطني، والتهاب القنوات الصفراوية.

خُراجُ لِمَقِي : خراج بارد نموذجي في غدة لمفية مع تحطيم تدريجي للأنسجة وهو في الغالب نتيجة إبتان سلي.

خُراجُ نَقِيلِي : خراج ثانوي يظهر بعيداً عن المكان الأصلي للالتهاب تتجه نقل الكائنات العضوية في الدم.

خُراجُ فِلْفَمُونِي : خراج حاد في النسيج الضام ليس محدداً بحدار موضعي، التهاب الخلايا.

خُراجُ صِفَاقِي : خراج في التجويف الصفاقي له حدار من التصاقات نتيجة التهاب الصفاق.

خُراجُ أُولَسي : خراج يحصل في النقطة الأولية للإبتان، بواسطة كائنات قبيحة.

خُراجُ قَيْحَمِي : خراج ثانوي ينشأ على مسافة من المكان الأصلي للإبتان القيحي، بواسطة نقل الكائنات بالدم.

خُراجُ رِئَوِي : مضاعفة التهاب الرئة، وهو يتبع خاصة التنفس لمواد منتنة من الفم، مثلاً خلال جراحة الفم.

خُراجُ ثَمَالِي : خراج يظهر إلى جانب موضع خراج قديم ويتسبب عن جراثيم قبيحة تعيش من الخراج القديم.

خُراجُ خَلْفِ الثَدِي : خراج يقع بين النسيج الغدي للثدي والأنسجة التي تحته لجدار الصدر.

خُراجُ حَلَقِي : رشح حلقي طرفي، التهاب طرف القرنية يتميز بوجود حلقة من القيح حول الموضع.

خُراجُ سَائِل : واحد من خراجات ثانوية قريب من الموضع الأصلي الذي نشأت فيه.

خُراجُ ثَانَوِي : خراج صمي يظهر منفصلاً عن الخراج الأولي نتيجة إنتقال الجراثيم بواسطة الدم.

خُراجُ مَصَلِّي : خراج يحتوي على سائل صافي كالمصل ويطلق الاصطلاح على تجمع السائل بين عظم ملتهب قليلاً وبين السمحاق.

خُراجُ مُعَقَّم : خراج لا يمكن استنبات كائنات حيه من محتوياته.

خُراجُ بُرَازِي : خراج في المستقيم، أو المصمران الغليظ يحتوي قيح وبراز.

خُراجُ الغُرْزَةِ : خراج يتطور حول غرزة، أو خيط.

خُراجُ تَخْتِ الحِجَاب : خراج يتطور تحت السطح السفلي للحجاب الحاجز عادة بعد التهاب الصفاق، أو بامتداد إبتان داخل البطن.

خُراجُ لَوَزِي : خراج قيحي في أنسجة متن اللوزة.

خُراجُ رَضَحِي : خراج يظهر في نسيج متضرر بجرح، أو رضح.

خُراجُ سَلِي : خراج نتيجة إبتان سلي وهو نتيجة غير عادية وغير محببة للسل، يمكن أن يحدث في العظم، الغدد اللمفية، المفاصل، وفي الأمعاء.

خُرَاج بَوْلِي : خراج يتصل بالمسالك البولية.

خُرَاج نَفْثِي : خراج يوجد فيه طفيليات حيوانية.

خُرَاج غُدَّة عَرَقِيَّة : خراج يظهر في غدة عرقية.

خُرَاج مُتَعَدِّد : واحد من تجمعات صغيرة لخراجات تتكون بأعداد كبيرة في القيحية.

خُرَاطِينِي : يتعلق، أو يشبه الديدان.

خُرَاطِينِيَّة : جنس من العلقيات، ديدان حمر طوال تكون في الأرض وأنواع أخرى تكون مضيف الديدان المطولة.

خُرْبَقِي : جنس نباتات عشبية معمرة سامة من الخربقيات وفصيلة الشقيقيات، وهناك أنواع كثيرة منها الأبيض والأخضر.

خُرْبَقِي أَخْضَر : نوع من الخربقيات يستخرج منه عدة قلويات منها الجرمتين والبروتوميزاترين.

خُرْخُرَة : صوت غير معهود في التنفس يسمع بالسماعة ويدل على حالة مرضية وقد قسمت الخرخرة قديماً إلى جافة ورطبة. والخرخرة هي الصوت الذي ينتج عن بقية الهواء في الإفرازات، أو السوائل في الرغامى، أو القصبات، ويعتمد الصوت على حجم الأنبوب الناتج منه ويختلف من الأخصن في الرغامى (خرخرة الوفاة) إلى الأنعم في القصبيات النهائية (الفرقات)، وتعتمد نوعية الصوت على طبيعة النسيج الذي ينتقل من خلاله إلى الأذن. والخرخرة مقسمة بناء على ذلك إلى رنانة، أو مكررة وغير رنانة، أو غير مكررة - فرقة إذا تم توصيلها خلال رنة صلبة، أو خلال تجويف، وتسمى غير رنانة إذا لم تكن الرنة صلبة كما في التهاب القصبات مثلاً.

خُرْخُرَة صَفِيرِيَّة : غطيط مرتفع، انظر غطيط.

خُرْخُرَة طَنَاتَة : غطيط منخفض، (انظر هناك).

خُرْدَل : ١- نبات حولي من جنس الكرنب براسيكا من الفصيلة الصليبية، أزهاره صفراء، فتستعمل بذور الخردل الأسود والابيض في التتبيل وله خواص طبية كثيرة ٢- مستحضر من بزر الخردل المسحوق والزيت والخل يطيب به الطعام.

خُرْدَل آزَوْتِي : مادة كيميائية، سامة منفضة تقضي على النسيج المرضي لأنواع معينة من السرطان ويخفف آثارها.

خُرْزَة : خرز وخرزات. ١- حب من زجاج، أو غيره يتقرب وينظم في سلك فتتخذ منه العقود والمسبحات. ٢- كل واحدة من فقرات العنق والظهر.

خُرْس : انعقاد اللسان عن الكلام، أو توقف القدرة على الكلام بتأثير نفسي.

خُرْس لَا حَرَكِي : حالة يعود فيها الوعي ويمكن لا يوجد فيها حركة سوى في العينين والعضلات التنفسية وهي في العادة نتيجة لآفة في الدماغ المتوسط.

خُرْس صَمَمِي : حالة عدم القدرة على الكلام نتيجة تأثر، أو غياب السمع.

خُرْس هِسْتِيرِي : حالة هستيرية يفقد فيها المريض القدرة على الكلام.

خُرْف : نوع من الخلل العقلي حيث تتأثر الوظائف المعرفية والذكائية بشكل كبير، وهو عرض لمرض دماغى عضوي وكقانون، فإن نقص الذاكرة هي

خُرُوج : إفراز، إخراج السوائل من تجويف.

خُرُوس : البكر أول حملها.

خِرُوع : شجرة من الفصيلة البتونية اسمه العلمي

(ريسينوس كومونوس) موطنه الأصلي الهند، بذوره ملساء كبيرة الحجم ذات قشرة رقيقة صلبة مختلفة الألوان تحتوي على ٤٠-٥٠% من الزيت، قديماً كان يستعمل لأغراض طبية كالإسهال مثلاً، والآن يستعمل ٩٨% من الإنتاج العالمي لأغراض صناعية وهو أفضل مواد تزييت محركات الطائرات، ويدخل في صناعات كثيرة كالصابون والدهانات والمواد العازلة وتحتوي الأوراق على مواد سامة.

خَرِيج : الذي يتخرج من جامعة، أو معهد بنجاح.

خريطة : ورقة ترسم عليها هيئة الأرض، أو إقليم منها خرائط والخريطة الجينية هي رسم الصبغيات على الورقة.

خِرْزامة : شريط رفيع من الكتان، أو الحرير موضوع في جرح جلدي كأساس للنزح، وهو الممر الناسوري الناتج عن ذلك الإجراء.

خِرْزانة : مكان الخزن ج: خزائن، خزنة ساوربروخ (جراح برلين مولود ١٨٧٥) : خزنة للضغط تستعمل لراحة الصدر، تمكن الجراح من فتح الصدر بدون انكماش الرئة وأهميتها تاريخية.

خَرْب : ١- سمن حتى كأنه ورم. ٢- ودمة.

خَرْز : ١- حَوْل وحشي. ٢- ضيق العين وصغرها خلقلة.

أول العلامات، والخرف يؤدي بالضرورة إلى تغييرات دائمة، ولهذا يمكن استثناء التغييرات التشويشية التي تبرز فيها تأثير الوظائف المعرفية والقابلة للشفاء.

خَرْف الصَّرَع : خرف يمكن أن يحدث في بعض حالات الصرع، في العادة بعد سنوات من النوبات غير المسيطر عليها كلياً، وبعض مظاهرها الأساسية تظهر في البطء ودقة التعبير، وتضييق فترة الانتباه والاهتمام، والتمسك بالتفاصيل، وافتقار النقاط المطلق والمهم.

خَرْف شَلَلِي : شلل عام للمجنون، مرض خاص بالدماغ والسحايا، يظهر متأخراً في مرض الزهري وسببه التريونيميا باليدوم، وإذا سمح له بالتطور من غير علاج فإنه يتبعه الخرف والشلل والوفاة، ولكنه إذا اكتشف وعولج في مراحل مبكرة فإنه يمكن علاجه بنجاح.

خَرْف زَوْرَانِي : اصطلاح قديم من تقسيم إمراضي نفسي ينوي تمييز متلازمة سريرية معينة، متساو في الامتداد مع الشكل الزوراني للانفصام ولكنه يشمل تراجع شديد في الشخصية.

خَرْف مُبَسَّر : شكل من الانفصام الشديد، حيث يحدث تدمير ملاحظ للشخصية، ولا يوجد خرف بالمعنى الحقيقي إلا إذا ظهر مرض دماغي عضوي.

خَرْف شَيْخُوخِي : خرف يصيب جميع المسنين، بعمر معين، والصورة الإمراضية التشريحية مميزة، وتظهر علامات كاللويحات.

خَرْف سُمِّي : طرف متسبب عن عملية سمية الكحولية، أو الرصاصية.

خِرْزَعَة : ١- القطعة من اللحم. ٢- فحص أنسجة مقطوعة من الجسم الحي لغاية التشخيص. ج؛ خزعات.

خِرْزَعَة بالرشف : استخدام ميزل، أو إبرة لأخذ رشفة من غدة لمفية، أو أي آفة عميقة.

خِرْزَعَة بالقرص : أخذ خزعة من الجسم بواسطة آلة للقرص.

خزعة القص : فحص نخاع عظم القص المأخوذ إما بالرشف أو بمنقب.

خِرْزَعَة سطحية : فحص مجهري لقشره من آفة جلدية، أو من الغشاء المخاطي من الرحم مثلاً.

خِرْزَعَة شاملة : دراسة نسيجية لنمو استئصال بكامله.

خِرْزَعَة بالمنظار : خزعة مأخوذة بواسطة المنظار من الأعضاء الداخلية.

خَرْف : نوع من الفخار، ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخاراً يستخدم في الصناعات وفي الأسنان البديلة.

خَزَل : ١- الكسر في الظهر. ٢- شلل جزئي.

خَزَل عام : الخزل الناتج عن الزهري الدماغي ويسمى أيضاً الخزف الشللي، أو الشلل العام للمجنون.

خَزَل الأحداث : شكل من الخزل العام عند الأحداث.

خَزَل أحادي : حالة خزلية تصيب جزءاً واحداً، أو طرفاً واحداً فقط.

خَزَل شقي : شلل عضلي أحادي الجانب.

خَزَل وعائلي : خزل الأعصاب الوعائية الحركية.

خَزَلِي : يتعلق بالخزل، يتميز به، أو يشبهه، أو مصاب به.

خُشَاء : ١- الجزء الخشائي للعظم الصدغي. ٢- شكله كالحلمة.

خُشَاء صَخْرِي : ذلك الجزء من الجمجمة الذي يحتوي على الأذن الداخلية (التيه الغشائي) وهو جزء من العظم الصدغي.

خُشَارَة : ١- الرديء من كل شيء، فضالة المائدة، من لا خير فيه.. ٢- أي مادة، نخرة مفصولة من الأنسجة، أو المادة من الأنسجة الميتة المفصولة من سطح قرحة.

خُشَام : فقدان حاسة الشم وهناك نوعان رئيسيان؛ أ- انسدادى حيث يعتمد فقدان الوظيفة على عدم قدرة جسيمات الشم على الترسيب في المنطقة الشمية فسي الأنف نتيجة انسداد أنفي، و ب- أساسي، حيث تكون الآلية العصبية المسؤولة عن هذا الإحساس الخاص متضررة.

خُشَام تَدَوُّقِي : فقدان حاسة الشم المترافق مع هضم الطعام.

خُشَام تَنَفُّسِي : خشام انسدادى نتيجة انسداد المجاري التنفسية.

خُشَام عُضْوِي : خشام ناتج عن مرض عضوي وليس لسبب هستيرى.

خُشَامِي : يتعلق بالخشام، فاقد إحساس الشم.

خَشَائِن : أي مادة خشنة في الطعام كقشر البطاطا والسيليلوز وهي تعمل كمحفز للأمعاء وتنشط حركة التمعج.

خُشَائِي : يتعلق بالخشاء.

خُشَائِي صَدْغِي : يتعلق بالقسم الخشائي للعظم الصدغي والعظم الجداري.

خُشَائِي قَدَالِي : يتعلق بالقسم الخشائي للعظم الصدغي والعظم القذالي.

خُشْبِي : يعطي انطباع نسيج خشبي، ويطلق على آفات معينة في الجسم خاصة تلك التي من أصل التهابي.

خُشْخَاش : نباتات حولية معمرة من فصيلة الخشخاشيات، أنواعه كثيرة العدد منها البرية والتزيينية والصناعية تتميز بعصارتها اللبنية المخدرة، زهورها لامعة قصيرة العمر.

خُشْخَاش أُبْيَض : وهو نوع من الخشخاش المنوم يزرع للتزيين ولإستخراج الأفيون، والخشخاش الأعمى ؛ هو شقائق النعمان وهو نوع من الخشخاش البري والزراعي والتزييني، والخشخاش المنوم، أو الأحمر والأسود يستخرج منه الأفيون، وقد استعمل الخشخاش والأفيون في التخدير منذ الحضارات القديمة في مصر والرافدين.

خُشْكْرِيْشَة : خشارة، أو جلبة جافة كذلك المتكون على منطقة في الجلد تعرضت لحرق.

خُشْم : ١- نتن الأنف. ٢- حالة بنوية مترافقة على خلل النخامية التي تسبب تضيق الأوعية والشرابين في الغشاء المخاطي للأنف ويؤدي إلى ضمور والتهاب الأنف ويظهر سريريا في رائحة نتنة.

خُشْن : ١- غير ناعم يتكون مجهرياً من جسيمات كبيرة. ٢- يطلق على التجمعات الجرثومية معوزة المضادات السطحية مترافقة مع فوعة.

خُصَاء : استئصال الخصية، فساد عمل التئاسل باستئصال الخصيتين.

خُصْر : ١- المستوى الذي فوق الورك من الإنسان. ٢- الجزء من جذع الإنسان بين أسفل الأضلاع وحافة الورك.

خُصْمِيْض : قند خنثى يتكون من مادة خصية ومبيض.

خُصَوَاتِيَّة : يشبه الخصية، يطلق خاصة على بقايا خصية تشاهد عند الأنثى.

خُصُوبَة : القدرة على إنجاب البنين، أو ولادتهم، ويفترض أن هذا طبيعي عند جميع الناس إلا نسبة قليلة، ومن العوامل التي تقلل الخصوبة، سوء الغذاء، وضعف الصحة العامة والتوتر العاطفي والعقم وهو العجز التام عن انجاب الأطفال وهو نادر، وأسباب عدم الخصوبة عند النساء قد تكون نتيجة اضطرابات في الغدد الصماء يؤثر على مراحل الدورة التناسلية من نضج البويضة في المبيض إلى انغراسها في الرحم، بالإضافة إلى أسباب ميكانيكية تؤثر على الدورة، وقلة الخصوبة عند الرجال ليس لها علاقة بقوة الذكورة، أو المقدرة على تأدية الجماع ولكنه يرجع إلى اضطرابات هرمونية أي نقص في الخلايا المنوية، أو تشوهها، أو أسباب ميكانيكية أيضاً.

خُصَوِي : يتعلق بالخصية.

خَصِيّ : ذكر أزيلت خصيته، أو قضيبه، أو كلاهما، أو جدعت، بحيث أصبح غير قادر على الإنجاب، أو عنيئاً.

خَصِيْب : قادر على تحميل المرأة، أو إنجاب طفل قادر.

خِصِيَّة : القند الذكري المتدلي في الصفن ومرتبطة بالحبل المنوي، وهو مغطى بغطاء لثافي كثيف؛ هي الغلالة البيضاء، التي يخرج من جزئها الخلفي المثخن المنصف وجدران الخصية التي تقسمها إلى فصين يحتويان على أنابيب ناقلة للمني، ويرتبط البربخ بحددها الخلفي، لها قطب علوي وقطب سفلي، والسطح الوحشي؛ هو السطح الخارجي المحدب والسطح الإنسي؛ هو السطح الداخلي المقعر، ويواجه الحد المحدب إلى الأمام وقليلًا إلى الأسفل، بينما الحد الخلفي المستقيم يواجه الخلف وقليلًا إلى الأعلى ويوجد في الخصية بين الأنابيب نوع من الخلايا "لايدغ" تنتج هرمون التستوستيرون، يؤدي وجوده إلى ظهور الصفات الجنسية الثانوية؛ مثل الشارب، وشعر الذقن، والإبط، والعانة، واخشوشان الصوت. والخصية تتعلق أثناء الحمل في داخل البطن ثم تنزلق تدريجياً مع نهاية الحمل إلى الصفن وعدم نزولها يؤدي إلى تلفها وعدم أداء الوظيفة.

خِصِيَّة قَفَّازَة : خصية مشدودة إلى القناة الإربية بواسطة انكماش شديد للعضلة المشمرة ولهذا تشخص على أنها خصية هاجرة، يمكن إرجاع الخصية القفازة بسهولة للصفن بيد الفاحص وتشاهد حين التعرض للبرد ولا يحتاج لمعالجة.

خِصِيَّة مُسْتَوْقِفَة : خصية تظل في البطن ولا تزال في الصفن وأول ظهور الخصية في الجنين في البطن بجوار الكلية، وتتطور في هذا المكان إلى الشهر السابع من الحمل، ثم تأخذ في النزول إلى الجزء العلوي من المنطقة الإربية ثم تجتاز القناة الإربية بين عضلات جدار البطن وتصل إلى الصفن، وقد تقف الخصية في أثناء رحلتها بالبطن، أو بالقناة الإربية، وقد تكون الخصية الهاجرة غير تامة التكوين، فلا تفرز هرمون الذكورة - التستوستيرون - الذي يسبب ظهور الأعراض الجنسية الثانوية، أو لا تكون الخلايا المنوية، التي لا تحمل درجة حرارة البطن، بل تحتاج إلى برودة الصفن لكي يتم تكوينها، يتم علاجها بإزالتها جراحياً في السنوات الأولى من العمر إذا أمكن.

خِصِيَّة مُنْبَذَة : يطلق هذا التعبير على الخصية التي شذت في سيرها أثناء نزولها من مسكنها القطني حتى الصفن، ويعزى هذا التشوش إلى سوء ارتكاز رسن الخصية، حيث ينتهي في مكان شاذ عوضاً عن انتهائه في قاع الصفن وتصادف في الأماكن التالية؛ ١- الناحية الإربية السطحية، حيث تتجه الخصية بعد مرورها من الفوهة الظاهرة للقناة الإربية نحو الأعلى والأمام وتتوضع تحت الجلد وأمام صفاف المنحرفة الكبيرة للبطن وهذا الشكل كثير المشاهدة، أما الأشكال الأخرى فنادرة وهي؛ ٢ - الناحية العجانية. ٣- الناحية الفخذية. ٤- قرب جذر القضيب وفي أحوال نادرة جداً تمر الخصيتان من قناة إربية واحدة.

خِصِيَّة مَبْضِيَّة : خصميص (انظر هناك).

ودقيق. وهناك هيموجلوبينات شاذة نذكر منها H,E,D,C,S، وسببها اضطراب يصيب أحد الجينات الخاصة بالخصب ينتج عنه استبدال أحد الحموض الأمينية بآخر، فإذا حل مثلاً الحمض الأميني فالين محل الحمض الأميني السادس في سلسلة بيتا الذي حول حمض الكلوتام، نجم عن هذا التبادل هيموجلوبين جديد يختلف اختلافاً كلياً بصفاته الفسيولوجية والحيوية والكيميائية عن الهيموجلوبين الأصلي السوي (A.P) والهيموجلوبين الجديد هو الهيموجلوبين المنجلي (S) الذي يسبب فقر الدم المنجلي.

خَضَابِيَّة : حالة يظهر فيها الخضاب في مصورة الدم، كما في الدم المتحلل.

خَضَار : الاسم الذي يطلق على نباتات الغذاء، وأغلبها حولي ويتركب جزؤها الأكبر من الماء ثم النشويات والسكريات والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، ج- خضراوات.

خَضْرَة : صار أخضراً، وهو لون في الطيف المرئي طول موجته بين ٤٩٢ و ٥٧٥ نانومتر، ويستحضر اللون الأخضر بمزج اللون الأصفر مع الأزرق.

خَضْرَة لَامِعَة : مثل رابع مشتق من المالاخيت الأخضر، وهو طبقة أساسية لها خواص كابحة للجراثيم خاصة الجراثيم إيجابية الغرام تستخدم للاستنبات المقارن للسالمونيلا.

خَضْرَة بَارِيس : مركب زرنيخي سام يستخدم كمبيد للحشرات، ويطلق الاسم على خضرة المثل التي تستخدم في صناعة الأقمشة..

خَضَاب الدَّم : الهيموجلوبين من الأصبغة التنفسية، يعود إلى زمرة الأصبغة المعدنية - البورفورينية - وتشكل هذه فئة كبيرة تساهم من الوجهة الوظيفية في التنفس سواء حاملة للأكسجين الجوي، أو كمعامل مؤكسدة خلوية وكلها تتألف من بوفيرين مثبت في مركزه جوهـر معدني ومجموعة بروتينية، وفي خضاب الدم يكون البروتين هو الجلوبين، أما الحلقة البرفيرينية فهي البروتوبوفيرين، أما المعدن فهو الحديد الثنائي، وتشكل المجموعة بروتوبوفيرين - حديد الزمرة الضميمة، أو الهيم. ويؤلف ذلك ذرة هامة وزنها الذري ٦٨،٠٠٠ ويتكون الجزيء من أربعة جزيئات من الهيم وأربعة جزيئات من الجلوبين، وهناك ثلاثة أنواع من الهيموجلوبين تختلف اختلافاً بسيطاً في تركيبها ويظل الهيم متشابه في جميعها، والأنواع الثلاثة هي؛ الهيموجلوبين "أ"، ويكون معظم خضاب الدم عند الأشخاص البالغين وتقدر نسبته بنحو ٩٧-٩٨% ويتركب من سلسلتين ألفا وسلسلتين بيتا. ٢- الهيموجلوبين "٢" : ويكون جزءاً بسيطاً عند كل شخص، وتقدر نسبته بـ ٢-٣ سم % ويتركب من سلسلتين ألفا وسلسلتين دلتا. ٣- الهيموجلوبين "ف" : أوالهيموجلوبين الجنيني ويكون معظم الهيموجلوبين عند الولدان وتتراوح نسبته عندهم بين ٧٠-٩٠% إلا أنه يأخذ بالتناقص تدريجياً مع نمو الطفل، حتى تصل نسبته إلى ١%، أو أقل عند بلوغ الطفل الشهر السادس من عمره، فتصبح نسبته عندهم كنسبته عند الكهول ويتركب من سلسلتين من ألفا وجاما. وكل سلسلة من السلاسل المسابقة تتألف من عدد محدد من الحموض الأمينية التي تتوضع إلى جانب بعضها بعضاً بشكل منتظم

خَضْرُوم : نوع غير عادي من ابيضاض الدم، حيث تتكون أورام مخضرة اللون في الجمجمة، الحجاج، العظام الطويلة، والبطن، وتنتقل بواسطة الأوعية اللمفية.

خَطّ : ما يصل بين نقطتين ولا عرض له وقد يكون مستقيماً، أو منحنياً، أو منكسراً. ج: خطوط.

خَطّ أبيض : رفاء وتري متكون من تشابك سفاق عضلات البطن المنبسطة، ويمتد بين النتوء السيفي في الصدر، وارتفاق العانة.

خَطّ إبطي : الخط العامودي على الجسم يمر في نقطة في منتصف الثديات الأمامية والخلفية للإبط.

خَطّ السوي أمامي : خط منحنى على السطح الألووي لعظم الخرقفة، يبدأ في الثلمة الوركية إلى حوالي هسم على عرف الورك من الفقرة الوركية الأمامية العليا، وهو يحدد الإتصال السفلي والأمامي لعضلة الإلية المتوسطة.

خَطّ أسود : خط أسود يشاهد على البطن في الأشهر الأخيرة للحمل ويمتد من العانة حتى السرة.

خَطّ الثديين : خط أفقي خلال الحلمتين.

خَطّ حلمي : خط عامودي يمر خلال الحلمة.

خَطّ خشن فخذِي : حافة خشنة على الحد الخلفي لعظم الفخذ تتصل به العضلات المقربة المتسعة الوحشية والأنسجة، والرأس الصغير للعضلة ذات الرأسين الفخذية والحواجز الإنسية والوحشية بين العضلات وهو محدود وحشياً وإنسياً بشفاة مميزة؛ الشفة الوحشية والشفة الإنسية التي يتصل بها العضلات المتسعة والحواجز بين العضلات.

خَطّ رصاصي : خط أزرق. تلوين مزرق لحد اللثة، يشاهد عند وجود التهاب اللثة. في التسمم المزمن بالرصاص والصبغة هي سلفيد المعدن المفرز في اللعاب.

خَطّ شبه المنحرف : حرف على السطح الأمامي للترقوة. قرب نهايته الأخرمية حيث يتصل الجزء شبه المنحرف من الرباط الغرابوي للترقوي.

خَطّ صدغي : مجموعة خطوط. استمرار الخطوط الصدغية من العظم الجداري وتتحد أمامياً لتشكل خطأ واحداً ينتهي في النتوء الوجني.

خَطّ فخذِي بين اللقمتين : الحد الفاصل بين المناطق المأبضية وبين اللقمتين على عظم الفخذ، وهو الحد الخلفي للثلمة بين اللقمتين ومنطقة اتصال الجزء الخلفي لمنطقة مفصل الركبة.

خَطّ القوس ١- الخط المنحني القريب من الحدود السفلية والخلفية للخرقفة، وهو في الورك الكامل يشكل الاستمرار الخلفي لممشط العانة. ويقع في منطقة اتصال الحوض الحقيقي والكاذب. ٢- النهاية السفلية المنحنية للجدار الخلفي لغلالة العضلة البطنية المستقيمة ويقع في منتصف الطريق بين السرة والارتفاق العاني. ٣- خط صغير أبيض هلالى الشكل يشاهد في القطب الخلفي لعدسة العين.

خَطّ قفوي أعلى : الأعلى من خطين منحنيين تمر جانبياً من البروز القذالي الخارجي.

خَطّ قفوي سفلي : خط يمر جانبياً على العظم القذالي في منتصف الطريق بين البروز القذالي الخارجي وخلف التقبعة العظمى.

خَطَّ قَفَّوِي عُلُوِي : الخط الأسفل من خطين

منحنيين تمر جانبياً من البروز القذالي الخارجي.

خَطَّ مَشَاشِي : الصفيحة العضروفية بين المشاشة

والجذَل، وعظمة طويلة.

خَسَطَ مَشَطِي : حرف حاد تشكل الحد العلوي

والخلفي للفرع العائلي العلوي ويتصل به الوتر

المشترك وجزء من الرباط الإربي.

خَطَّ شِبْهِ الْمُنْحَرِف : حرف على السطح السفلي

للترقوة قرب نهايته الأخرمية حيث يتصل الجزء

شبه المنحرف للرباط الغرباوي الترقوي.

خَطَّ مَائِل : الخط المائل لغضروف الدرقية، وهو

خط يمر نازلاً وإلى الأمام على السطح الخارجي

لكل صفيحة درقية، ويتصل بها كل من العضلة

القصبية الدرقية، والدرقية اللامية، والعضلات

الضامة السفلية.

خَطَّ هِلَالِي : الأخدود المنحني على الجدار الأمامي

للبطن الذي يحدد الحافة الوحشية للعضلة المستقيمة

البطنية.

خَطَّ نَاصِفٍ أَمَامِي : الخط الذي يلتقي عليه

المستوى الناصف مع السطح الخلفي للجسم.

خَطَّ الْإِسْتَوَاءِ : دائرة وهمية طولها نحو ٤٠٠٧٦

كلم تحيط بالأرض على بعد واحد من القطبين

فتشطرها إلى شطرين متساويين، شطر شمالي

وشطر جنوبي طول الواحد منها نحو عشرة آلاف

كلم، وخط الإستواء المغناطيسي هو خط يكون فيه

الاتحناء المغناطيسي معروفاً وهو قريب من خط

الإستواء الأرضي.

خَطَّ بَيَّاتِي : خط يبين الارتباط بين متغيرين، أو

أكثر.

خَطَأً : ضد الصواب والخطأ المعياري في الإحصاء

هو انحراف معياري للأخطاء بين سلسلة من القيم

المقدرة وسلسلة من القيم الحقيقية.

خُطَّاف : ١- حديدة معوجة كالكلوب يختطف بها

الشيء. ٢- صنانرة جراحية دقيقة الرأس تستخدم

لرفع ومسك الأنسجة المتنوعة خلال عملية جراحية

٣- رباط ليفي يحفظ الهياكل في أماكنها.

خَطَل : الخطأ والسرعة والاضطراب والمنطق

الفاسد.

خَطَلُ التَّقَرُّن : تكوين ناقص للخلايا القرنية في

البشرة، تتميز باستمرار النويات وتكوين غير كامل

للقراتين ورطوبة وورم الخلايا القرنية.

خَطَلُ التَّنْفِظ : كلام غير عادي يتميز خاصة، بعادة

إحلال حرف محل آخر، أو التفوه بصوت غير

مقصود من الشخص.

خَطَلُ السَّمْع : أي حالة غير عادية في حاسة

السمع.

خَطَلُ الشَّم : فساد حاسة الشم إلى درجة أن

الروائح لا يحس بوجودها.

خَطَلُ الْقِرَاءَةِ : عدم القدرة على القراءة بشكل

صحيح وتتميز بإحلال، أو استبدال كلمات أو

مقاطع.

خَطَلُ الْكِتَابَةِ : حالة تلاحظ عند أشخاص يعانون

من أمراض نفسية، وتتميز بأخطاء في التهجئة،

واستعمال كلمات غير صحيحة بدل الكلمات

المقصودة، كما يطلق خطأ الكتابة على عدم القدرة على الكتابة من الإملاء.

خَطَلُ الْمَنْطِقِ : إعطاء الأسباب الخاطئة، أو الدوران حول الموضوع.

خَطْمَاء : وهي من فصيلة ثمانية الأرجل وتمتاز هذه العائلة بصغر حجم أفرادها ويتألف جسمها من قسمين ويستتر جسمها شعيرات قصيرة أصغر أنواعها؛ الخطماء الخريفية والخطماء الحمراء. والخطماء الخريفية جوانبها حمراء اللون. إذا أرادت التغذية تثبت على جلد المضيف برويسها ثم تفرز لعاباً يتفاعل النسيج فيحله مشكلة قناة تمر فيها السوائل النسيجية اللصقية لتصل إلى الرأس الموجود بتماس الجلد، وبعد التغذية تسقط القاذبة على الأرض حيث تتسلخ فتتحول إلى هبيرة، ثم تتسلخ ثانية فتعطي حشرة كهلة تعيش بشكل حر غير طفيلي، ثم تبدأ بعد ذلك بوضع البيض الذي يفقس فتخرج منه قوائم، تحتاج للتطفل فتعلق الحيوانات كالأرانب مسببة فيهم الداء الأحمر وقد تسطو على أطراف الإنسان أيام الصيف والخريف وتتجمع حول أربطة الجوارب وتحدث في الجلد حطاطة محاطة بهالة بنفسجية ومترافقة بحكة، ومن عادة القاذبة أنها تتغذى مرة واحدة لمدة بضعة أيام فتسقط أثناءها الركستيات التي تأتيها بالوراثة. والخطماء الحمراء تعيش كهلتها بشكل حر لكن قوائمها تتطفل على الحيوانات اللبونة والقاضمة والمجتررة والطيور والإنسان وحببتها تتغذى بعصارات النباتات، وتُشاهد قوائم هذه الحشرة في المناطق المدارية طوال العام بينما يقتصر وجودها على الصيف في اليابان، وتنقل

للإنسان؛ الركستية الشرقية التي تدعى أيضاً ركستيات "تشوتشوجا موش" التي تسبب للإنسان مرض حمى نهر اليابان، أو حمى كداني مستودع هذه الركستيات الجردان المائية فإذا انتقلت لقاذبة الخطماء أورتتها لنسلها فيصبح النسل الثاني ناقل للمرض فإذا تطفلت القوائم الخمجة على الإنسان نقلت إليه الركستيات.

خَطْمَاوَات : عائلة الخطماوات منها الخطماء مهمة طبياً.

خَطْوَة : ١- مسافة ما بين القدمين عند المشي ٢- إجراء معين ضمن خطة.

خَطِي : يتعلق بالخط، أو الخطوط.

خُف : ١- للايل والنعام بمنزلة الحافر للذابة. ٢- واحد الخفاف التي تلبس في الرمل.

خَفَة الشعر : نقص ولادي في الشعر.

خَفَقَان : زيادة مؤقتة في سرعة ضربات القلب، يشعر بها الشخص كارتجاف في الصدر، وإذا حدثت والشخص مستريح كان سببها مرضياً، أو اضطراباً في وظيفة القلب، وقد تنشأ عن كثرة التدخين أو تعاطي الكيفات، ويحدث خفقان القلب في الشخص السليم إذا قام بمجهود رياضي ويستمر مدة دقائق بعد المجهود، ويكون خفقان القلب أكثر سرعة ويستمر مدة أطول عند القيام بمجهود رياضي معين في الأشخاص الخاملين، أو المرضى من الأشخاص الرياضيين، فيكون مقياساً لتقييم الكفاءة الجسمية للقلب والدورة الدموية.

خَفِي : غير ظاهر، أو مقنع كما في الأمراض التي تكون أعراضها غير واضحة.

خَفِيّ الْمَنَشَأُ : ١- المرض غير معروف السبب الأساسي، أو المتوسط. ٢- العيش كطفلي مع كائن حي آخر طيلة الوقت.

خَلَّ : سائل حامضي يتكون أساساً من حمض الخليك والماء، وينتج بفعل الجراثيم على المحاليل المخففة من الكحول الإيثيلي المستخرج مبدئياً من عملية التخمر ويستمد الخل لونه ونكهته من المشروب الكحولي الذي صنع منه؛ مثل الجعة والنبذ وعصير الفواكه ويستعمل الخل تابلاً ومطهراً خفيفاً وفي الطهي مليناً للألياف المتينة.

خَلَاء : ١- الفضاء الواسع الخالي ٢- نظرياً هو الحيز المحروم من الذرات، أو الجزيئات، وهو غير ممكن عملياً، ويستعمل الاصطلاح في الأمكنة التي فرغ منها الهواء، أو الغاز لأننى حد ممكن - الفراغ.

خَلِاص : المشيمة، الحبل السري والأغشية التي كانت تغطي الجنين وتصله بالأم والتي تخرج جميعها بعد الولادة.

خُلَاصَة : ١- ما يستخرج من المادة حاوياً لخلاصتها. ٢- مستحضر من مادة نباتية، أو حيوانية يحتوي على العناصر النشطة علاجياً من المادة الأصل وليس مادته الخلوية، وتصنع مع محلول مناسب وتعرف كخلاصة مائية كحولية، أو خلية، وهناك خلاصات متعددة مشهورة ؛ كخلاصة الكبد والغدد الدرقية والكظرية والنخامية، وخلاصة العجل التي تحتوي على بروتيناته وخلاصة الفواكه وغيرها.

خُلَال : ١- عرض يعرض في كل حلو فيخرجه إلى الحموضة ٢- وجود كميات من أجسام الكيتون في الأنسجة.

خِلَال : ١- أي حيز صغير، أو شق بين أجزاء الجسم. ٢- ما يُتَقَب به وينفذ.

خِلَال : خلال الأنسجة - ما بينها، عبرها.

خِلَال الإِحْلِيل : يمر خلال الإحليل لوصف أي جراحة تجري عن طريق الإحليل.

خِلَال الجَنْد : يؤثر عبر الجلد وخاصة المراهم التي تمر خلال طبقات الجلد.

خِلَال الجَنْبَة : عبر تجويف الجنبية.

خِلَال الحَجَاج : يمر عبر الحجاج.

خِلَال الصَّدْر : عبر الغلاف الصدري.

خِلَال الصِّفَاق : عبر الصفاق.

خِلَال العَجْز : عبر العجز.

خِلَال العَفَج : عبر المفج، أو الإثني عشر.

خِلَال القِشْرَة : عبر قشرة عضو، أو يصف الاتصالات بين الأجزاء المختلفة في قشرة الدماغ.

خِلَال المَثَانَة : يمر عبر المثانة.

خِلَال المَشِيمَة : يمر عبر المشيمة كما في إبتانات معينة.

خِلَال المِهْبَل : يمر خلال المهبل، أو يصف أي جراحة عبر المهبل

خِلَال اللُّوْحَتَيْن : المادة الإسفنجية المليئة بالنخاع العظمي الأحمر التي تقع بين الصنجة الداخلية والخارجية للجمجمة.

خَلَّاسِي : يقع ، أو يحدث خلال ألياف، أو خلايا النسيج.

خَلَّة : ج: خلال ١- الخصلة. ٢- صفة خاصة مميزة وثابتة للجسم، للعقل، أو الشخصية موروثة، أو مكتسبة.

خَلَّة مَنجَلِيَّة : التعبير عن وراثية صبغيات متباينة الأزواج التي تحدد الهيموجلوبين المنجلي Hbs، ويمتلك الشخص نوعي الهيموجلوبين في الدم Hbs، HbA، في خلاياه الحمراء بالرغم أن المنجلي يكون بدرجة تركيز خفيفة لأحداث منجلية داخل الأوعية في درجة تركيز الأكسجين الحاصلة في الأنسجة في وجود الصحة.

خَلَّة تَلَاسِيْمِيَّة : صبغة ناتجة عن حدوث الأزواج المتباين لصبغية التلاسيمية، وتحدث التلاسيمية نتيجة لها.

خَلَط : ج: أخلاط. ١- ما خالط الشيء. ٢- أي سائل في الجسم كاللحم والدم وهذا تعبير من الطب القديم.

خَلَط مَائِي : السائل الصافي الذي يملأ الحجرة الداخلية للعين.

خَلَط بَلُورِي : عدسة العين.

خَلَط عَيْنِي : السائل المائي، أو الزجاجي، أو عدسة العين.

خَلَط زَجَاجِي : المادة الدقيقة الشفافة التي تشبه الهلام وتملأ تحديق الشبكية وهي محاطة بالغشاء الزجاجاتي.

خَلَطِي : يتعلق بأخلاط الجسم.

خَلَع : هو انتقال مفصل من موضعه، وينتج الخلع نتيجة أسباب متعددة ويأخذ بناء على ذلك أشكالاً وأوضاعاً مختلفة، وقد يكون الخلع ناتجاً عن أسباب خلقية ؛ مثل الخلع الخلقي لمفصل الفخذ، حيث يكون الخلع موجوداً وقت الولادة، وسببه نقص خلقي في نمو بعض أجزاء العظام المكونة للمفصل، كذلك خلع مفصل الفك نتيجة لفتح الفم لدرجة كبيرة، وهناك كذلك الخلع المتكرر مثل خلع مفصل الكتف نتيجة لارتخاء في الأربطة، أو المحفظة المحيطة بالمفصل. وهذا النوع يحدث من أبسط الأسباب ويتكرر حدوثه في نفس المفصل، ويمكن أن يحدث الخلع كذلك نتيجة لضعف، أو شلل، أو ضمور في العضلات المحركة للمفصل، مثل الخلع الناتج عن شلل الأطفال، وتحدث الخلع نتيجة مرض يصيب العظام المكونة للمفصل، مثل سل العظام الذي يصيب مفصل الفخذ، أو الركبة، أو العمود الفقري، ونتيجة لالتهاب حاد، أو مزمن يصيب تجويف المفصل، أو المحفظة، أو الأربطة الخاصة به، ومنها الخلع الرضحي الناتج عن إصابة، أو حادثة شديدة، وربما يكون مصحوباً بحدوث كسر، أو إصابات أخرى حول المفصل. وأكثر المفاصل تعرضاً للخلع الرضحي مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل الفخذ، ويصحب الخلع الرضحي تمزق في محفظة المفصل، وفي الأربطة الموجودة داخله، أو خارجه وربما في بعض العضلات، ويسبب ذلك ألماً شديداً وتورماً وعدم مقدرة على تحريك عظام المفصل.

خَلَع جَزْئِي : خلع غير مكتمل، ويظهر كزيادة حركة المفصل مع تغير في موضع أجزائه.

خَلَع المِفْصَل : انظر خلع.

حرف (خ)

- خَلَفَ** : ١- الوراثة، بعد.
- خَلْفَ الْأَعْوَرِ** : يتموضع خلف المصران الأعور.
- خَلْفَ الْأَنْفِ** : يشير إلى المنطقة التي خلف الأنف، أو أجزاء الحفرة الخلفية للأنف.
- خَلْفَ الْبَصَلَةِ** : خلف الجسر في المخيخ.
- خَلْفَ الْبَلْعُومِ** : يقع خلف البلعوم.
- خَلْفَ الرَّحِمِ** : يقع خلف الرحم.
- خَلْفَ الصَّفَاقِ** : يقع، أو يحدث خلف الصفاق.
- خَلْفَ الْعُقْدَةِ** : حرفياً إلى الخلف من أي عقدة وفي العادة وراء، أو إلى الأسفل من عقدة، فمثلاً الليف بعد العقدة، ولهذا تحدث خلف، أو إلى أسفل العقدة.
- خَلْفَ الْقَصِّ** : يقع خلف عظمة القص.
- خَلْفَ الْمَرِيءِ** : يقع خلف المريء.
- خَلْفَ الْمُقَلَّةِ** : خلف كرة العين.
- الْخَلْفَةُ** : ١- المخالفة، العيب والفساد. ٢- موقف من المعارضة والعداء، السلبية.
- خَلْفِي** : خلف جزء من الجسم، أو وراءه.
- خَلْفِي أَمَامِي** : من الخلف إلى الأمام.
- خَلْفِي إِنْسِي** : يقع على الجانب الإنسي للجهة الخلفية.
- خَلْفِي جِدَارِي** : يتعلق بالجزء الخلفي للعظم الجداري.
- خَلْفِي سَفْلِي** : يقع في وضع خلفي وسفلي.
- خَلْفِي صَدْعِي** : يقسم، أو يحدث في الجزء الخلفي للعظم الصدغي.
- خَلْفِي عُلْوِي** : يقع خلف وفوق.
- خَلْفِي الْقَذَالِ** : يصف وضع الجنين عندما يكون عظم القذال متجهاً إلى ظهر الأم.
- خَلْفِي نَاصِيفِ** : يحتل الموضع المركزي إلى الخلف.
- خَلْفِي وَخْشِي** : إلى الخلف وإلى الجانب الوحشي.
- خَلْفِيّاً** : صوب الوراثة.
- خَلْفِي** : ١- يتعلق بالخلفة والوراثة. ٢- المرض.
- خَلَّلَ الْإِنْكِسَارَ** : حالة تكون فيها قوى الإنكسار في العين غير عادية، حيث لا تتركز الأشعة المتوازية على الشبكية، بل أمامها (قصر النظر)، أو خلفها (بعد النظر)، أو منتشرة فوق المنطقة كما في اللابورية.
- خَلَّلَ السَّأَزُرَ** : في علم القلب، تعطيل الانقباض المتناسق لمعضلة البطين خاصة الأيسر كنتيجة لتوصيل غير عادي للتوتر المنبه، أو تعطيل موضعي للانقباض بشكل ثانوي للإقفار.
- خَلَّلَ السَّرْعَ** : اضطراب في آلية التعرق يمكن حدوثه في أثناء ارتفاع الحرارة، أو نتيجة الإفراط في الشرب.
- خَلَّلَ التَّقَرُّنَ** : اضطراب في تفرغ خلايا البشرة، إما ذات طبيعة حميدة، أو خبيثة.
- خَلَّلَ التَّكُونُ** : ١- تعطيل، أو فقدان القدرة على التكون. ٢- حالة يكون فيها نسل هجين خصيباً عندما يتكاثر مع أحد أجناس والديه ولكن عقيم عند التكاثر مع نفسه.

خَلَل تَكُونُ قُنْدِي : تكون ناقص غير مكتمل للقند حيث يتميز بالمظهر الأنثوي مع ضهي أولي ونقص في تطور الميزات الجنسية الثانوية.

خَلَل تَنَادِبِيَّة الحركات : الأداء البطيء، غير الرشيق، غير المنتظم للحركات المتناوبة لطرف ما، يميز وجود آفة في المخيخ.

خَلَل التَنَسُّج : اضطراب في تطور النسيج في أي نسيج في الجسم.

خَلَل التَوَازُن : نقص في معادلة القوة، كما في طاقمين من العضلات المتقابلة.

خَلَل التَوَثُّر : نقص في توتر أي نسيج، وضع من عدم تنسيق التوتر نتيجة آفة عصبية تؤثر على العضلات.

خَلَل رُؤْيَةِ الألوان : عى ألوان جزئي، وضع يصعب فيه تمييز الألوان.

خَلَل الشَّحْمَانِيَّة : اضطراب في تخزين الشحوم في الخلايا.

خَلَل الضَّغْطِيَّة : اصطلاح يحتوي على آثار فرق الضغط بين الضغط المحيط وضغط الغازات المدابة والحررة في المادة الحية، ويعتمد الأثر على إذا كان الضغط الخارجي أكبر، أو أقل من الضغط الداخلي وعلى سرعة التطور كما في إزالة الضغط الانفجاري.

خَلَل غاما جلوبيولين الدَّم : نقص في كمية، أو وظيفة واحد، أو اثنين من الأنواع الرئيسية من مصل الجلوبيولين المناعي.

خَلَل القِرَاءَةِ : صعوبة في القراءة، أو التعامل مع الكلمات كجزء من خلل تعليمي، وهناك نوعين تم التعرف عليهما؛ ١- خلل أولي تطوري خاص. ٢- خلل ثانوي كما قد ينتج عن ضرر بسيط للدماغ، وقد عرف خلل القراءة في الاتحاد العالمي لأمراض الأعصاب كما يلي "خلل يثبت بصعوبة تعلم القراءة بالرغم من التعليمات التقليدية والفرص الإجتماعية والحضارية والذكائية المناسبة وتعتمد على عجز أساسي ذو أصل بنياني".

خَلَل القِيَّاس : نوع من الحركة المترابطة حيث لا يوجد قدرة على قياس المسافة الصحيحة المعنية في أي عمل عضلي؛ مثلاً تمتد الذراع لالتقاط شيء فإن اليد ستمتد فوق المسافة.

خَلَل الكِتَابَةِ : صعوبة الكتابة نتيجة وجود آفة في الدماغ والحالة ليست بصعوبة حالة عدم الكتابة.

خَلَل المنَطِق : تعطيل قوة التسييب، عدم القدرة على التعبير عن الأفكار بكلمات.

خَلَل النِّظْم : ١- اضطراب في النظم ٢- عدم الانتظام، أو نظم غير عادي أثناء الكلام.

خَلَل وَظِيفِي : حالة من عدم اكتمال، أو تعطيل، أو تغيير وظيفة عضو.

خَلْم : شحم ثرب الشاة، شحم يؤخذ طازجاً من ثرب الشاة ويستخدم في تحضير بعض المراهم.

خَلُون : سائل عديم اللون قابل للاشتعال، ذو رائحة وطعم شبيهين بالنعناع يغلي بدرجة ١٠٦ درجة مئوية يحضر من مقطر الخشب وأكسدة كحول الايزوروبيل وتخمر النشا، يستخدم مذبياً في الصناعة ولتحضير السيلولويد والمفرقات

عديمة الدخان والكلوروفورم واليودوفورم. يوجد بشكل آثار في البول والدم. وتزيد كميته عند مرضى السكري، يذوب في الماء والكحول والأثير بجميع النسب وهو مخدر ومبيد للديدان ويدخل في صناعة كثير من الأدوية.

خَلَوِي : يتعلق بالخلايا، أو يتكون منها.

خَلَوِيَّات : علم شكل ووظائف الخلايا، أي تشرحها وفسيولوجيتها إمرضها وكيميائتها.

خَلَوِيَّة : أن يكون الجسم مكوناً من الخلايا.

خَلِّي : يتعلق بالخل، أو مكوناً منه.

خَلِيَّة : في علم الأحياء، وحدة التركيب والوظيفة؛ وهي مجهرية عادة منها تتركب أجسام الحيوان والنبات، وتتألف المادة الحية للخلية وهي الجبلة من النواة والهوليولي، وتحتوي النواة في معظم الخلايا على نوية، وهي كتلة كثيفة مستديرة صغيرة، وينشأ غشاء جبلي رقيق على الحدود الخارجة للهوليولي. ولا نوية الخلايا شأن في عملية انقسام الخلية كما للهوليولي وظائف أخرى ويوجد بها عدد من المحتويات أهمها البلاستيدات الخضراء وكذلك الجسم المركزي وأجسام جولجي والأجسام السبحية، وتباشر خلية الجسم الوحيدة في وحيدة الخلية جميع الوظائف الأساسية للحياة، أما في ذات الخلايا المتعددة، فتتخصص الخلايا وتتجمع لتكون أنسجة تقوم بوظيفة معينة كالخلايا الغدية المفروزة والخلايا العصبية الخ. وتنقسم حسب شكلها أيضاً إلى عمودية، أو مكعبة، أو سطحية الخ، أو ترتبها كالخلايا المخططة الخ، أو التجمع في أنسجة معينة كالنسيج الضام والغضروفي، أو حسب صفات بنائية خاصة كالشعر والخلايا الشعرية.

خَلِيَّة إسفنجية : خلية مفرغة توجد في قشرة الغدة الكظرية.

خَلِيَّة بَدِينَة : نوع من خلايا الأنسجة الضامة تحتوي على حبيبات هيولية عديدة يبدل لونها بالصبغات القاعدية، توجد في الغشاء المخاطي في الأمعاء الدقيقة ووظيفتها غير أكيدة وربما تعنى بالحركة والإفراز ويعتقد أنها تنتج الهيبارين.

خَلِيَّة بَيَضِيَّة : البيضة، أو خلية البيضة غير الناضجة، وهي في مرحلة وسيطة بين البيضة البدائية والخلية الأولى للبيضة وبين البيضة الناضجة الجاهزة للإخصاب، وتحتوي الخلية البيضية الأولى على عدد مزدوج من الصبغيات مثلاً ٤٨ في الرجل وتخضع لانقسام انتصافي وتنتج الخلية البيضة الثانية والجسم القطبي الأول وكل منهما مع نصف الصبغيات أي ٢٤ في الذكر، وتنقسم البويضة الثانية بدورها بالانقسام التفتلي إلى بيضة ناضجة وجسم قطبي ثاني يحتوي كل منهما على نصف عدد الصبغيات.

خَلِيَّة تَوْتِيَّة : خلية في الغدة التوتية.

خَلِيَّة حَمَضَة : خلية محبة للحمض كالخلية الحمضة في الدم.

خَلِيَّة دَبْقِيَّة : خلية عصبية.

خَلِيَّة دَبْقِيَّة قَلِيلَة التَغَصُّن : خلايا عصبية لها نويات صغيرة دائرية، أو بيضاوية صافية وتنوات خلوية، وتنتج لتكوين أعمدة حول الألياف النخاعية المكونة للمادة البيضاء للخلية المركزيه العصبية حيث تلعب هذه الخلايا دوراً مهماً يشبه دور خلايا غمد الليف العصبي (شوان) في الأعصاب المحيطية.

خَلِيَّةٌ رَجُلَاءٌ : واحدة من الخلايا الظهارية المعقدة التي تكون غطاء غير مكتمل للشعيرات الدموية في كبيبات الكلوة.

خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ : خلية من الأنسجة الضامة محملة بالدهن المتعادل؛ إما بشكل كرية هيولية كبيرة، أو عدد من الكريات الملتصقة مع بعضها.

خَلِيَّةُ الْعَصَبُونِ : جسم الخلية العصبية لتمييزه عن نتواتها.

خَلِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ : خلايا متطاولة ذات شكل مغزلي، أو خيطي ولذا سميت الألياف العضلية، تتجمع الألياف مع بعضها مشكلة حزما يربط بينها نسيج ضام رخو.

خَلِيَّةٌ غَاذِيَّةٌ : خلية سرتولي في الخصية التي تدعم وتغذي تطور النطفات.

خَلِيَّةٌ غُذِيَّةٌ : أي خلية مفرزة كاملة التطور موجودة في غدة.

خَلِيَّةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ : شكلها مكور، أبيض نواتها مكورة كبيرة ومركزية فيها نوية، أو نويتان تحتوي هيولاما الغزيرة الحبيبية والمحبة للأساس بشكل خفيف على حبيبات ريبية غزيرة وشبكة هيولية باطنة حبيبية وجهاز جولجي وأجسام ريبية وفجوات وقطيرات دسمة، وحبيبات مولدة للسكر تتوضع في الخلايا الغضروفية ضمن أعشاش بكل مفرد، أو ثنائي، أو متعدد حسب عمر الخلية.

خَلِيَّةٌ قَنْدِيَّةٌ بِذَلْنِيَّةٌ : الخلية الجرثومية البدائية التي تنتج عن انقسام البويضات الناضجة.

خَلِيَّةٌ كَبِدِيَّةٌ : خلية منتية من خلايا الكبد.

خَلِيَّةٌ لِيْفِيَّةٌ : الخلية العامة في النسيج الضام، مسطحة، غير منتظمة الشكل لها نواة كبيرة بيضاوية، وهيولي حبيبي يصبغ قليلاً.

خَلِيَّةٌ مَلَاطِيَّةٌ : خلية عظمية في طبقة المادة المرنة للعظام التي تبدأ في جذر سن متطور.

خَلِيَّةٌ مِلَانِيَّةٌ : أي خلية تحمل صبغة كالتي توجد في الجلد، أو في الغلاف المشيمي للعين.

خَلِيَّةٌ مَنَاعِيَّةٌ : خلية متعلقة بالمناعة وخاصة تكوين المضادات كالأخلايا الشبكية البطانية واللمفية ومقدماتها.

خَلِيَّةٌ مُنَوَّاةٌ : مرحلة في تطور خلايا الدم الحمراء، عندما تتكثف النواة إلى جسم متناسق ملون بكثافة وتشاهد عادة فقط في النخاع العظمي وفي حالات استثنائية كحالات فقر الدم وإبيضاضه، فإنها يمكن أن تظهر في الدورة الدموية.

خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ : نوع من الخلايا العصبية تتكون من جسم الخلية وعدد كبير من النتوات المتفرعة. وأصل الخلايا النجمية من الأديم الظاهر وتعمل كخلايا متخصصة في الدعم في الجهاز العصبي المركزي، ومن الممكن أنها مشغولة بتغذية الخلايا العصبية المجاورة.

خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ لِيْفِيَّةٌ : خلية عصبية توجد بشكل أساسي في المادة البيضاء.

خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ جِبَلِيَّةٌ : خلية عصبية توجد في المادة الرمادية.

خَلِيَّةٌ نُطْفِيَّةٌ : مرحلة مبكرة في تطور النطفة، خلية كروية في جدار القناة ناقلة المنى، وتظهر عادة بعض مراحل الانتصاف كالانقسام الاختزالي.

والخلية البيضاء المحببة المتأخرة، والتي تحتوي على نويات مفصصة، نواتها غير ممزقة ولكنها غير مقسمة، أو محببة بينما يميل لون هيولها إلى البني.

خَلِيْن : فيزامين، مُرَخَّ للعضلات الملساء وموسع للأوعية التاجية يستخرج من مسحوق فاكهة أُمي فسغانا، ويحضر تركيباً يُعطى عند الذبحة القلبية والربو القصبي.

خُمَاسِي : المركب من خمسة، مؤلف من خمسة أجزاء، أو أركان. خُمَاسِيَّاتُ الفَوَاصِلِ : فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الأجنحة وطبقة نصفية الجناح تتميز بقرونها الإستشعارية المركبة من خمس فواصل.

خُمَاسِي التَكَافُفُ : عنصر له تكافؤ من خمس ذرات من الهيدروجين.

خُمَاسِي الشُرَف : يدل على رحي له خمس شرف، أو حديبات.

خَمَج : إجتياح الجسم بكائنات حية إمراضية وتكاثرها فيه. ج: اخماج.

خَمَج إِنْتَانِي : خمج قيجي، خمج بجراثيم تسبب تقيحاً.

خَمَج بَسِيط : خمج كائن حي واحد فقط.

خَمَج بُؤْرِي : خمج نشيط يتركز في بؤرة صغيرة محددة في جزء من الجسم كاللوزتين، جذور الأسنان، الجيوب الأنفية، المoothة الخ. وينتشر من هناك دورياً، أو بشكل مستمر.

خَمَج بِالتَّمَّاس : خمج ينتقل بواسطة التماس المباشر مع شخص مريض.

خَلِيَّة نُطْفِيَّة أَوَّلِيَّة : خلية كبيرة في الجزء الخارجي لجدار القناة المنوية تتشكل بالانقسام الانتصافي والتوسع اللاحق لبزرة النطفة، وتحتوي على العدد الضعفاني الكامل للصبغيات (٤٦ في الرجل).

خَلِيَّة نُطْفِيَّة ثَانَوِيَّة : خلية ناتجة من الانقسام الانتصافي للخلية النطفية، وتحتوي على العدد الفرداني للصبغيات ٢٣ في الرجل.

خَلِيج دُمَعِي : منطقة مثلثة على الزاوية الإنسية للعين يحدها من أعلى ومن أسفل جزءاً من حد الجفن الخالي من الشعر ويحتوي على اللحمة الدمعية.

خَلِيط : ١- ما أختلط من شئين، أو أكثر.

٢- اصطلاح يستعمل للدلالة على خريج من المسكنات والفيوتيازين، يستخدم لزيادة تأثير تسكين الألم.

خَلِيف : ١- سلبى عكس إيجابى. ٢- عدم القدرة على التفاعل في اختبار. ٣- في علم النفس؛ الموقف السلبي المعارض لأي امتزاج.

خَلِيفَة : ١- من يخلف غيره ج: خلفاء. ٢- بعد الشيء.

خَلِيفَة الذَّائِبَة : ذائبة متأخرة لدودة متقوية من المتقوبات في شكلها الحوصلي.

خَلِيفَة الْمُضَرَّجَة : أرومة الحمراء السوية في مرحلتها المتأخرة.

خَلِيفَة النَّقْوِيَّة : خلية نقوية غير ناضجة، خلية بيضاء بدائية تكون وسيطة بين الخلية الناقوية،

خَمَج ثَانَوِي : خمج مضاف إلى خمج موجود سابقاً.

خَمَج دُون السَّرِيرِي : خمج لا يسبب أعراضاً سريرية معروفة.

خَمَج خَفِي : خمج لا يوضح نفسه من خلال أية أعراض، أو علامات.

خَمَج رَذَازِي : خمج يتم بواسطة تطاير رذاذ، أو قطرات من اللعاب، أو البصاق.

خَمَج شَامِل : خمج ناتج عن الإصابة بعدد كبير من الكائنات الحية في نفس الوقت وتنتشر خلال الجسم.

خَمَج صَامِت : إما خمج دون السريري، أو خفي.

خَمَج قَمِي : خمج قمة جذر السن، أو قمة الرئة.

خَمَج قَبِيحِي : خمج بكائنات حية تسبب تقيحاً.

خَمَج كَامِن : خمج يصمت بعد فترة من النشاط، وتكون الجراثيم موجودة ولكنها متوقفة عن التكاثر.

خَمَج لَا مُبَاشِر : خمج ينتقل من شخص لآخر بواسطة وسيط بينهما كالماء، أو الطعام.

خَمَج مُبَاشِر : خمج بالتماس.

خَمَج مَنقُول بالماء : خمج ينتقل بواسطة الماء المحتوي على كائنات حية إمراضية.

خَمَج مَنقُول بالهواء : خمج بواسطة كائنات حية منتشرة في الهواء، قد تصل إلى الجسم عن طريق تنفس الهواء، أو بطريقة غير مباشرة بواسطة الطعام.

خَمَج مُخْتَلَط : خمج متوسط فيه أكثر من كائن حي إمراضي واحد.

خَمَج المَشَافِي : خمج ينتشر في المستشفيات بشكل خاص.

خَمَج مُنصَّالِب : خمج مريض في مستشفى في حالة مرض خمجي في نفس العنبر.

خَمَج خَارِجِي المنشأ : خمج من مصدر يقع خارج الجسم.

خَمَج إِضَافِي : إعادة الإصابة بالخمج بإدخال كائنات من نفس النوع الذي يسبب الخمج الموجود.

خَمَج الدَّم بالسَّحَائِيَات : حالة ظهور المكورات السحائية بالدم.

خَمَج ذَاتِي : إعادة الإصابة بالخمج بعوامل موجودة في الجسم ولكن في جزء آخر.

خَمَجِي : ١- الجراثيم القادرة على إحداث خمج بدخول الجسم والتكاثر فيه. ٢- الشخص الذي يعاني من خمج يمكن نقله إلى شخص آخر. ٣- مرض خمجي؛ أي مرض تسببه طفيليات إمراضية وينتقل إلى شخص آخر بوسائل مباشرة، أو غير مباشرة.

خَمَر : عصير العنب المخمر، أو عصير فواكه أخرى، ويستخدم في الأدوية كعامل مساعد في المقويات والمسهلات والمنومات. ويقل استعماله في مجالات الأدوية خاصة في الدول العربية والإسلامية بعد قرارات وزراء الصحة بعدم استعمال الكحول في الأدوية نظراً لتحريمه إسلامياً.

خَمْس : يحدث كل خمسة أيام ويطلق على الحمى التي تحدث في هذا التواتر.

خَمَل : ١- هذب الطنفسة. ٢- زوائن هديبة دقيقة متصلة بجدار الخلية في الأجناس المتحركة وغير المتحركة من عائلة الأمعائيات وهي أكثر وأقصر وأدق من السياط، وهي تعمل كعضو التصاق بخلايا النسيج.

خَمَلُ الحَصِين : ربطة من الألياف العصبية تشكل هداياً على طول الحد المحدب للحصين، وتبدأ الألياف في الحصين وتمر خلال الخمل إلى القبوء، وعلى الجسم الحلمي لتحت المهاد حيث تنتهي.

خَمَل البُوق : نتوء تشبه الخيوط تخرج من حد الفتحة الحوضية لبوق الرحم، تحدد كل واحدة بنشاء مخاطي مشابه لغشاء البوق ويتصل أحد هذه الخملات بالمبيض كخمل المبيض.

خَمَل المَبِيض : نتوء يشبه الخيط يخرج من حد الفتحة الحوضية لبوق الرحم ويتصل بالطرف البوقي للمبيض.

خُمُول : ١- لان وضعف. ٢- أصيب بداء في مفاصله تعثر عن حركته. ٣- لا مبالاة بالمحيط، أو بأي شيء يثير الاهتمام في الأحوال العادية.

خَمْسِيرَة : ١- فطور مجهري مكونة من خلية بيضية، أو كروية تحول السوائل السكرية إلى سائل كحولية، وقد ظلت الخمائر زمناً طويلاً ذات أهمية ؛ لأنها العامل الرئيسي في التخمر الكحولي فكانت ضرورية لصنع الجعة والنبيذ والكحول والخمائر البرية التي توجد في الطبيعة، والتي يحتمل أن تنقلها الحشرات من التربة إلى الفاكهة، والتي كثيراً ما تكون فعالة في عمليات التخمر. وفي عمل الخبز تؤثر الخمائر على الكربوهيدرات الموجودة في العجينة مكونة ثاني أكسيد الكربون وكحولها،

يطردان خلال عملية الخبز فيسبب ثاني أكسيد الكربون؛ ارتفاع وانفخاخ الخبز. وقد استعملت الخميرة منذ العصور القديمة في علاج أمراض مختلفة، وتحتوي خميرة البيرة على كمية كبيرة من الثيامين وغيره من فيتامينات مجموعة ب المركبة، وهناك شواهد على أن الجسم الإنساني يستفيد من هذه الفيتامينات عندما تؤكل الخمائر الجافة الفعالة، أو بشكل حبوب.

خَمِيرِي : يتعلق بالخميرة.

خَنَازِير : اسم قديم لمرض ليس له صفة مستقلة في هذه الأيام، أهم عرض منها هو تضخم العقد اللمفاوية مع، أو بدون تقرح وقد سميت كذلك لتشابه الأعراض مع حالة الخنزير، أو الثدييات الدهنية للخنزير.

خُنَاق : عدوى بحنجرة الأطفال يسببها جرثومة الوبتدية الخناقية، تفرز سموماً داخلية، يميز العدوى ؛ عسر تنفس صرصري وسعال أجش ويتكون في بعضها غشاء كاذب ويسبب تشنج في الحنجرة، يعقبه ضيق في التنفس يشبه الاختناق، يعرض بصفة خاصة للأطفال ما بين ستة أشهر وأربعة أعوام يصحب هذا العارض؛ ازدياد الحساسية والأمراض المعدية كالسعال الديكي والكزاز وإصابات الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بالأمراض المعدية والاضطرابات العصبية والنفسية. ترياق الخناق ؛ ترياق محضر بتحسين الخيل بذوفان الخناق، ويستخدم المصل في العلاج بقوة ودرجة معينة. عصابات الخناق ؛ جرثومة الوبتدية الخناقية. ذوفان الخناق؛ مترشحات مستبتات الخناق مضاف إليها كميات قليلة من الفورمالين والنتاج ليس ساماً، ولكنه يمتلك عوامل وقائية فعالة.

خُنَاقٌ مُؤَاتِي : نوع نادر وشديد من الخناق مع موات في الجلد، أو الغشاء المخاطي.

خُنَاقُ الْجُرُوح : خناق خارج الجهاز التنفسي حيث ينتقل الخمج عن طريق الأنف، أو الحلق إلى الجروح، أو التقرحات، أو التمزقات وقد يكون هناك نقشر بالرغم من أن تكون الأغشية قد يمنع بواسطة التضמיד الجراحي.

خُنَاقٌ كَاذِب : أي مرض مترافق مع تكوين أغشية تشبه أغشية الخناق.

خُنَاقَاتِي : ١- جرثومة الخناق الكاذب، كائنات غير مفعوة شبيهة بمظهرها بالوتديات الخناقية توجد أحياناً في الحلق، وأحياناً أكثر في الأنف والأذن. ٢- أي مرض يُكوّن أغشية شبيهة بأغشية الخناق.

خُنْثَى : حالة تجمع بين المميزات البدائية لكلا الجنسين وهذه حالة نادرة سببها؛ اضطراب هرموني، وفيها يحتوي الجسم على نسيج من الغدد الجنسية لكل من الذكر والأنثى، وذلك إما بأن يوجد المبيضان والخصيتان في الجسم بشكل أعضاء منفصلة، وإما بأن يقترن نسيج المبيض ونسيج الخصية في الأعضاء ذاتها التي تسمى عندئذٍ "المبيض الخصية" ويخلط الكثيرون بين هذه الحالة، وحالة أخرى مختلفة تسمى الخنوثة الكاذبة، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يوجد لجسم الشخص المصاب سوى نوع واحد من الغدد الجنسية، ولكن تكون جسمه أعضاء تناسلية تتسم ببعض مميزات الجنس الآخر، وقد يكون سببها إخلال التوازن بين الهرمونات الذكرية والأنثوية، أو خطأ آخر في وظائف الغدد الصماء.

خُنْثَى كَاذِب : شخص ذكر جنسياً ولكن اضطراب الغدد الصماء أنتج تحولاً إلى الجنس الأنثوي، كإنتاج أعضاء جنسية ثانوية.

خُنْخَنَة : ١- إخراج الكلام من الأنف نتيجة مرض، أو تغيير في الممرات الأنفية.

خُنْدُق : أخدود عميق مستطيل يُحفر في ميدان القتال ليبقى به الجنود ج: خنادق.

خُنْزِيرِي : يتعلق وينسب إلى الخنزير.

خُنُق : ١- تضيق، أو انضغاط الرغامى، أو أي جزء يؤدي إلى توقف التنفس والموت. ٢- حالة تضيق واختناق الفتق.

خُنُوْثَة : حالة وجود الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية معاً والصفات الخاصة بكلا الجنسين في شخص واحد.

خُنُوْثَة أَنْثَوِيَة كَاذِبَة : خنوثة أنثوية جزئية مظهرها الرئيس وجود قضيب وصفن.

خُنُوْثَة كَاذِبَة : حالة خلقية حيث تكون القنذ؛ إما خصيتين، أو مبيضتين ولكن الأعضاء الجنسية الخارجية مميزة بالجنس المعاكس، أو تكون مزيجاً من صفات الجنسين وتميز بأنها بيضة، أو مبيضين حسب العضو الموجود بغض النظر عن الأعضاء الخارجية.

خَوْث : خَوْث، استرخى واضطرب. ٢- حالة هبوط الأحشاء إلى الأسفل.

خَوْدَة : ١- السفاق فوق القحف. ٢- المنفر يجعل على الرأس، ج: خُوْد.

خَوَص : تراجع العين إلى تجويف الحاج.

خُوط : ١- الغصن الناعم، ج: خيطان، أو أخواط.

٢- واحد من العناصر الشبيهة بالخيطان في الأنطورة، أو الفطر وهي غالباً فوق السطح.

خوف : ١- بمعنى الفزع. ٢- إحساس بغيض يتسبب عن وجود خطر حقيقي يهدد سلامة الشخص، ويؤدي إلى حالة من التوتر العصبي وإلى تغيرات في الوظائف الفسيولوجية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنسان، أو الحيوان على مجابهة الموقف.

خِياطَة : غرزة جراحية لضم شفتي الجرح، من أجل الإسراع في شفاؤه.

خِياطَة مَصْوصَة : استعمال مادة قابلة للامتصاص التدريجي وتزول كلياً بواسطة بلعميات الخلايا.

خِياطَة أَدَمِيَّة : خياطة موضوعة في الجزء الأعظم في الجلد، أو الأدمة، تستعمل في جراحة التجميل.

خِياطَة دَائِرِيَّة : خياطة متواصلة تمر في كل المحيط كما في خياطة الأمعاء الدقيقة ومفاغرة الشرايين.

خِياطَة دَقِيَّة : أي خياطة لا تجمع لا الجلد ولا الغشاء المخاطي لأي أحشاء ولكنها تجمع النسيج الرخو فقط.

خِياطَة أَوَلِيَّة : الخياطة التي تتم في وقت العملية الجراحية الأولى.

خِياطَة الإِرْخَاء : خياطة تأخذ لقمة كبيرة ومصممة لتحمل الضغط عن جراحة مخيطة، خلال عملية الشفاء، مثلاً في البطن.

خِياطَة ثَانَوِيَّة : خياطة جرح سُمح له بالبقاء مفتوحاً حتى تغطي بنسيج حبيبي مثلاً بعد تمزق جرتي الجرح.

خِياطَة مُتَوَاصِلَة : خياطة واحدة متصلة تمر إلى الأمام وإلى الخلف بدون انقطاع تجمع نسيجين معاً.

خِياطَة تَحْتَ أَدَمِيَّة : خياطة متصلة موضوعة بعناية لجمع الأنسجة التي تقع تحت الجلد مباشرة، وقد تكون من مادة غير قابلة للامتصاص، وجذب طرفها لاحقاً بحيث لا تترك أي أثر.

خِياطَة مَصْلِيَّة - مَصْلِيَّة : خياطة تصل بين طبقتين من المصلية في جزأين من المصران عند تقريبهما في أثناء خياطة الأمعاء.

خِياطَة صَارَة : خياطة متواصلة تشكل دائرة حول جرح صغير في الأحشاء كجدة الزائدة الدودية وعند شدها تغلق الفتحة بشدة.

خِياطَة رَأْيِيَّة : خياطة تجميلية.

خِياطَة تَنْجِيد : خياطة موضوعة بشكل يكون هناك عروة في كل جانب، وتكون هذه العروة موازية لحد الشق، تتجيد أفقي، أو بزوايا قائمة له تتجيد عامودي والأخيرة تشكل خياطة مقلوبة ممتازة.

خِياطَة مَقْطَعَة : خيط منفرد مربوط لوحده.

خِياطَة كَالثَمَانِيَّة : خياطة تأخذ لقمة من الطبقة الأسفل على كل جانب من الجرح ثم تقطع خلال الطبقات الأعلى على الجانب الآخر قبل ربطها.

خِياطَة شَاتِرَة : خياطة تقلب حافة الجرح إلى الخارج لتأمين تقابل أفضل للجرح.

خِياطَة زَرِّيَّة : خياطة موضوعة فوق زر لمنع قطعه للجلد مثلاً في حالة تصليح الإحليل.

خِياطَة مُقَرَّبَة : خياطة مؤاتية غالباً تقرب حدي الشق إلى بعضهما مكفمة لتثبيتها النهائي.

خِياطَة مُصَاقِبَة : خياطة تحافظ على حدود الجرح وتبينهما من بعضهما.

خِيبَة : ١- انقطاع الرجا. ٢- عدم قدرة شخص على تحقيق رغبته. ٣- منع شخص من التصرف كما يجب أن يتصرف.

خِيبَة المَلْقَط : محاولة فاشلة للولادة باستعمال الملقط.

خَيْشُوم : ١- الجزء الأفتي من البلعوم؛ ما فوق نحرته من القصبة وما تحتها من خشارم الرأس. ٢- عضو التنفس عند بعض حيوانات الماء كالسمك وغيره.

خَيْشُومي : ١- يتعلق بتجويف الأنف والجزء الأنفي من البلعوم. ٢- يشبه الخيشوم، الغلاصم.

خَيْط : نوع من الغزل المبروم المصنوع من شعيرات بعض المواد ويتميز عن المغزول بنعومة أكثر وقوة احتمال أكبر وصلاحيه أكثر لعمليات الحياكة والخياطة، وتستعمل الخيوط لخياطة الجروح وأنواعها مختلفة حسب المادة المصنوعة منها كالحرير والنيلون ومصران القطة وغيرها، ج: خيوط وأخياط.

خَيْط مَصُوص : خيط يستطيع الجسم أن يمتصه ويذيبه.

خَيْط بَاقِي : خيط يقاوم جميع محاولات الأنسجة لإذابته وامتصاصه كالحرير والكتان والنايلون والحديد، ويمكن إزالة الخيوط الباقية في الجلد، أما الخيوط في داخل الأحشاء فتبقى، ج: خيوط.

خَيْط عَصَبِي : مادة دقيقة جداً، حرير في الغالب، يستخدم بعناية فائقة لجمع الغشاء الداعم لعصب مقطوع.

خَيْط مَحُورِي : حبل الصبغيات، حبل يشكل البنية الدائمة القاعدية للصبغيات.

خَيْط مَتَوِي : الخط المركزي في ذنب النطفة.

خَيْطَان : جمع خيط (انظر هناك).

خَيْطِي : ١- يشبه الخيط. ٢- يحتوي على جينة خيطية. ٣- قادر على السحب على شكل خيط كالمخاط مثلاً.

خَيْطِي الشَّكْل : شكله مستطيل دقيق كالخيط.

خَيْطِيَّة : شعبه الديدان الخيطية الشكل معظمها طفيلي تعيش في الأنسجة تحت الجلد وفي الجهاز اللمفاوي.

خَيْفَانَة : جنس من المتقوبات الصغيرة جداً في الامعاء. والخيفانة دودة توجد بكثرة في القطط والكلاب والإنسان في الشرق الأوسط والأقصى، ويمكن أن تسبب الإسهال والمضيف المتوسط هي قواقع الماء والسمك في مصر.

خَيْمَة : ١- تطلق في التشريح على أي بنيان يشبه الخيمة. ٢- سداة دائرية أو مخروطية من مادة قابلة للامتصاص تستخدم لتوسيع، والمحافظة على فتح فجوة جرح، أو جراب وتستخدم أيضاً لتوسيع رقبة الرحم بداية الولادة. ٣- غطاء بلاستيكي، أو

خَيْمِي : يتعلق بخيمة المخيخ.

خَيْطِيَّات : اصطلاح لوصف الشكل اليرقي للخيوط التي تدور في الدم، أو موجودة في الأنسجة الجلدية، أو العين، أو في تجويف الجسم في أنسجة الحشرة الناقلة.

نحاسي يوضع فوق السرير لتوفير هيئة تحتوي على نسبة أعلى من الأكسجين من الهواء، أو لإعطاء أدوية بالاستنشاق غازية، أو مذابة.

خَيْمَةُ الْبُخَار : خيمة يدخل إليها البخار.

خَيْمَةُ الأكْسِجِين : مظلة تشبه الخيمة تحيط برأس المريض ورقبته تحتوي على ضغط مرتفع للأكسجين وتستخدم في العلاج بالأكسجين خاصة عند الأطفال.

خَيْمَر : ١- كائن خرافي له رأس وجسم شاة وذنب حية ٢- وهم، حلم لا سبيل إلى تحقيقه. ٣- في الطب تطلق على توأم ثنائي البويضة نوع دمهما من مجموعات مختلفة، ولكن قد حصل اختلاط في الخلايا الأساسية في الرحم بحيث أصبح دمهما مختلطاً وهي حالة نادرة.